





E BIBLIOTHECA

VIRI

DR. J. C. G. EVERS.

N<sup>o</sup>.


EX LIBRIS  
JOHN FARQUHAR FULTON

YALE  
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL  
LIBRARY







# Historisch-pathologische Untersuchungen.

Als Beiträge

zur

Geschichte der Volkskrankheiten.

Von

**Dr. H. Haeser,**

ausserordentlichem Professor der Medicin zu Jena, praktischem Arzte und Secundär-  
arzte der akademischen Poliklinik daselbst; der naturforschenden Gesellschaft zu  
Halle und der lateinischen zu Jena ordentlichem, der physikalisch-medicinischen  
Societät zu Erlangen, der medicinisch-chirurgischen zu Brügge, so wie der Schle-  
sischen Gesellschaft für vaterländische Cultur correspondirendem, des Vereins  
Grossh. Badischer Medicinalbeamter zur Förderung der Staatsarzneikunde und des  
ärztlichen Vereins zu Hamburg Ehrenmitgliede.

Zweiter Theil.

„In der Natur getreuen Armen  
Von kalten Regeln zu erwärmen!“

---

**Dresden und Leipzig,**  
Verlag von Gerhard Fleischer.

1841.

Historisch-pathologische

# Untersuchungen.

Als Beiträge

zur

Geschichte der Volkskrankheiten.

Von

Dr. H. Hager.

RA649

839h

2

Zweiter Teil

„In den nächsten Jahren  
von 1840 bis 1842 zu veröffentlichen.“

Verlag von Gerold Fleischmann

in Wien, am Graben, im 1. Stock.

1841.



## V o r r e d e.

---

„Es ist dieses *Studium historicum* eine Zeitlang ziemlich unter der Bank liegen geblieben, da man sich nur mit lauter *Conceptionibus systematico-theoreticis*, *Speculationibus abstractis* und *praeconceptis Opinionibus* aufgehalten, und die *Circumstantias facti*, (die man nur obenhin und durch die Brille angesehen,) entweder nach diesen *Hypothesibus* mit Macht gezwungen, oder, wenn sie sich gar nicht schicken wollen, übersehen, oder auch zum öfteren fälschlich verdrehet und confundiret, ja wohl gar falsche supponiret.“

Joh. Kanold.

Wenn der Verfasser diese Fortsetzung seiner historisch-pathologischen Studien dem ärztlichen Publikum nicht ohne die Hoffnung einer freundlichen Aufnahme übergibt, so ist es zunächst die für ihn hocheufreuliche Zufriedenheit, welche sich von Seiten der Kenner allgemein über den ersten Theil derselben aussprach, dann aber auch das Bewusstseyn seiner eignen grösseren Vertrautheit mit dem historischen Studium selbst, wodurch jene Hoffnung geweckt und genährt wird. Unablässig ist er bestrebt gewesen, den Beifall zu verdienen, welchen der erste Theil dieser Schrift zu erhalten so glücklich war, unablässiger noch, die Mängel zu beseitigen, welche man zu rügen Ursache hatte. Der vorzüglichste von diesen betraf eine gewisse, eben so verführerische als gerade für den Geschichtsforscher verderbliche Neigung zur Speculation, welcher der Verfasser im ersten Theile, trotz der grössten Aufmerksamkeit auf sich selbst, nicht immer Meister zu werden vermochte. Im gegenwärtigen Theile ist derselbe so ängstlich bemüht gewesen, auch die leisesten Anklänge jener

Richtung zu vermeiden, dass er fast fürchtet, dem letzten Zwecke aller historischen Forschung, der philosophischen Deutung und Verknüpfung der Thatsachen, einen zu geringen Einfluss verstattet und sich so dem entgegengesetzten Vorwurfe ausgesetzt zu haben. In dieser Besorgniss indess tröstet ihn Goethe's herrliches Wort: „Es gibt eine zarte Empirie, welche sich mit dem Gegenstande innigst identisch macht, und dadurch zur eigentlichen Theorie wird.“

Aus diesem Grunde hat der Verfasser sehr häufig vermieden, die ganze Summe der Folgerungen auszusprechen, welche sich in so reicher Fülle aus der Geschichte der Volkskrankheiten ergeben, und es oft vorgezogen, statt seiner die Thatsachen selbst reden zu lassen, deren einfache, aber gewaltige Sprache dem aufmerksamen Beobachter verständlich genug ist.

Uebersies würde der anfänglich beabsichtigten Zusammenfassung der wichtigsten Resultate der in diesem Theile niedergelegten Untersuchungen der wider Vermuthen angewachsene Umfang desselben im Wege gestanden haben. Dieser Umfang hätte trotzdem um mehr als das Doppelte vergrößert werden können, wenn es nicht dem Geschichtsforscher, wie dem bildenden Künstler übel anstände, neben das fertige Werk, zum Verdruss des Betrachtenden, auch das ganze Handwerkszeug und den Haufen der Splitter und Späne aufzuthürmen, die während der Arbeit fallen mussten. Eine solche, wir möchten sagen ostentatiöse Bearbeitung der Geschichte muss überall vermieden werden, am meisten aber da, wo das Interesse im Ganzen der Anregung noch so sehr bedarf. Dieses Interesse an der Geschichte unsrer Wissenschaft hat sich, Dank den Bemühungen mehrerer ausgezeichneten Forscher, in den letzten Jahren bedeutend gesteigert, und es wird sich noch vermehren, wenn man immer allgemeiner erkannt haben wird, was die Geschichte der „Praxis“, der sie bisher nicht in der Wirklichkeit, sondern nur in dem Wahne des grossen Haufens fremd war, zu nützen im Stande ist. Der Verfasser verhehlt es nicht, dass er in



dem vorliegenden Theile noch mehr als in dem vorigen darauf Bedacht genommen hat, dieses innige Verhältniss der historischen Pathologie zur Förderung der Nosologie hervorzuheben, worauf ihm allerdings der der Gegenwart näher gerückte Gesichtskreis der jetzt vorliegenden Untersuchungen von selbst hinleitete. Vielleicht wird man auch erkennen, dass er sich dazu durch unablässiges Studium der bedeutendsten neueren nosologischen Werke, so wie durch sorgsame Beobachtung am Krankenbette noch mehr in den gehörigen Stand zu setzen versucht hat.

Noch immer wird der äusserst bedeutende Einfluss historisch-pathologischer Studien auf die Praxis viel zu wenig erkannt; fast allgemein räumt man zwar historischen Forschungen ein hohes Interesse ein, aber die Früchte will man nicht erkennen, welche aus der sorglichen Pflege dieses unendlich reichen, aber rüstiger Hände bedürftigen Bodens für die Gegenwart in reicher Fülle reifen.

Trotz dieser grossen Vernachlässigung der Geschichte der Krankheiten von Seiten der gewöhnlichen Praktiker hat doch eine Schule der neuesten Zeit den unbestrittenen Ruhm, in der Geschichte, als einer unversiegbaren Quelle reichster Erfahrung, eine ihrer wichtigsten Grundlagen, aber auch eine ihrer sichersten Stützen zu erkennen. Fürwahr mit Recht heisst die Schönlein'sche Schule die naturhistorische, in schöner doppelsinniger Andeutung der zwiefachen Quelle, die ihr aus Benutzung der eignen und der Erfahrung der Besten aller Zeit in reichen Fluthen zuströmt. Das ist, wenn wir nicht gänzlich uns täuschen, eins der grössten Verdienste ihres Gründers, dass er seine Jünger lehrte, die erhabene Stimme der Natur zu vernehmen, wie sie durch die unsterblichen Werke der Hohenpriester der Wissenschaft hindurchtönt, ihrem stillen Walten zu lauschen in den verborgensten Regungen des Lebens, ihrem Rufe zu folgen, der durch das Wehklagen von Millionen hindurch erschallt, wenn der finstre Todesgott die zagenden Reihen der Völker furchtbar lichtet.

Der erste Theil unsrer Untersuchungen versuchte einige Beiträge zu der Geschichte der Seuchen bis zum 16ten Jahrhundert zu geben, und wenn derselbe hier und da auch in jüngere Perioden übergriff, so geschah dies nur bei jenen Erscheinungen auf diesem grossen Schauplatze, deren Rolle schon vor jener Zeit begann, aber erst später ihre volle Bedeutung entfaltete. — Der gegenwärtige Theil soll die Geschichte der europäischen Volkskrankheiten vom Anfange des 16ten bis in die Mitte des 18ten Jahrhunderts behandeln, indem hier Hecker's neueste Arbeit und ihre meisterhafte Darstellung der Seuchen der siebenziger Jahre eintritt. Zudem bildet auch gerade diese Periode, in welcher die Entstehung des Brownianismus nicht ohne tiefen Zusammenhang mit der Eigenthümlichkeit der epidemischen Ereignisse ist, einen sehr deutlich hervorgehobenen Abschnitt, und die Geschichte der letzten 70 Jahre ist mehr als zu reichhaltig, um den 3ten Theil dieser Schrift, dessen Erscheinen von der Aufnahme des gegenwärtigen abhängig seyn wird, in Anspruch zu nehmen.

Man könnte es missbilligen, dass der Verf. die isolirte Darstellung des ersten Theils nicht auch für den gegenwärtigen beibehalten hat. Anfangs hatte derselbe den Plan, jener Form auch hier zu folgen, aber er hat ihn im Fortgange seiner Studien gar bald aufgeben müssen, da eine strenge Durchführung nicht allein sehr schwierig, sondern vorzüglich sehr unnatürlich seyn würde. Dies ergibt sich nicht allein aus Ozanam's Buche, welches nach diesem Principe bearbeitet ist, sondern auch aus den in diesem zweiten Theile niedergelegten Forschungen selbst, welche vielleicht mehr als bis jetzt darauf aufmerksam gemacht wurde den nahen Zusammenhang, die innige Verbindung darlegen, welche in der Natur zwischen Krankheitsformen obwaltet, welchen die Systematik gar häufig die entlegensten Stellungen anweist. Auf diesen vorzüglich interessanten und für die Nosologie selbst sehr wichtigen Punkt eindringlich hinzuweisen, haben wir die Gelegenheit niemals versäumt. Aus diesem Grunde



haben wir den Versuch gemacht, die Geschichte der hervorragendsten Krankheitsgruppen zu einem organischen Ganzen zu vereinigen, ohne dabei der Zeitfolge der Ereignisse, die gar häufig mit ihrer physiologischen Verbindung zusammenfällt, Gewalt anzuthun. Dennoch haben wir nicht geglaubt, diese Strenge noch da anwenden zu müssen, wo es Krankheitserscheinungen galt, die einer selbstständigeren Betrachtung fähig und bedürftig sind. So z. B. der Eriesel, dessen ganze Bedeutung für die Krankheiten der Vergangenheit und Gegenwart nur aus seiner Zusammenstellung mit den übrigen ihn umgebenden epidemischen Ereignissen klar wird. Aus diesem Grunde haben wir stets auf den neuesten Stand der jedesmaligen Lehren über die einzelnen Krankheiten hingewiesen, ohne dass wir fürchten, dass es uns später bei der ausführlichen Betrachtung der epidemischen Krankheitsereignisse in den letzten 70 Jahren an hinreichendem Stoff fehlen werde.

Wenn auch für die Periode, mit welcher sich die Betrachtungen des vorliegenden Theils beschäftigen, viele reiche Quellen fliessen, die dem Verfasser eine ziemlich vollständige Berücksichtigung der hervortretendsten Erscheinungen in dem kranken Leben der Völker möglich machten, so weiss doch Niemand besser als er selbst, dass seine Bemühungen nur als Vorarbeiten zu einer vollständigen Geschichte der Epidemien, als Versuche, die auffallendsten der Lücken auszufüllen, welche dieses Gebiet der Wissenschaft noch so sehr entstellen, betrachtet werden können. Ueberall hat er aber auch Kräfte gestrebt, diese Vorarbeiten brauchbar zu machen, was vor Allem nicht ohne die treueste Benutzung der Quellen geschehen konnte. Zuzufolge dieses Charakters seiner Arbeit hat er sich stets nur auf die Erörterung des noch weniger oder gänzlich Unbekannten gerichtet, und man wird dem Verfasser vielleicht nur selten den Vorwurf machen können, dass er längst bekannte Dinge wieder vorbringe, ohne ihnen einige neue Beziehungen abzugewinnen. Die grossen Mühen eines geschichtlichen Quellenstudiums sind

bekannt; sie wuchsen aber zu einem sehr bedeutenden Grade, wenn die Quellen der Forschung selbst bisher unbekannt waren und deshalb erst aufgesucht werden moosten. Der Verfasser ist sehr oft in diesem Falle gewesen, und hat sich häufig über verlorne Zeit und Mühe nur mit dem Werthe einzelner Funde trösten können. Er sah namentlich gar bald ein, dass ohne die vorhergehende Entwerfung eines vollständigen Verzeichnisses aller zur Geschichte der Volkskrankheiten gehörigen Schriften an die einigermaßen genügende Lösung seiner Aufgabe nicht zu denken sey, und dass eine solche Arbeit durch die wenigen bereits vorhandenen Versuche durchaus nicht entbehrlich gemacht werde. *Adami's bibliotheca toxicologica* ist theils aus dem Buchhandel verschwunden, theils, selbst wenn man nur die eigentliche Pestliteratur berücksichtigt, unvollständig und ungenau, indem der Verf. die wenigsten Schriften, die er verzeichnet, selbst gesehen hat. — Wie unendlich Viel aber der Verf. hier künftigen Forschungen übrig gelassen habe, zeigt ihn ein einziger Blick auf das von ihm erwähnte zu seinem Gebrauche entworfene Verzeichniss aller epidemologischen Schriften, zu dessen Herausgabe er sich vielleicht entschliesst, wenn er es durch fortwährende Nachträge für einigermaßen vollständig wird halten können. Dies führt uns auf das Verhältniss der vorliegenden Arbeit zu Schnurrer's Werke. Auf den ersten Anblick könnte es scheinen, als gewähre eine so unflüchtige Arbeit als die Chronik der Seuchen einen sichern Anhaltspunkt für die ausführliche Erörterung der Volkskrankheiten; Viele werden vielleicht selbst glauben, Schnurrer habe Alles auf diesem Gebiete zu Erreichendem bereits geleistet. Nicht ohne die Besorgniss, dass uns die Offenheit, mit welcher wir unsre Ueberzeugung aussprechen, übel gedeutet werden könne, bekennen wir, dass uns Schnurrer's Arbeit immer mangelhafter und ungenauer erschienen ist, je länger wir uns selbst mit der Geschichte der Volkskrankheiten beschäftigt haben, und dass wir uns sehr bald entschlossen, unsre Untersuchungen ganz unabhängig von



Schnurrer's Führung fortzusetzen. Damit leugnen wir nicht im Geringsten Schnurrer's sehr grosse Verdienste; wir sind aber auch überzeugt, dass eine neue Chronik der Seuchen von der Hand eines selbstständigeren Forschers eine von der Schnurrer'schen Arbeit sehr verschiedene Gestalt erhalten würde. Wenn wir im Einzelnen auf diese Mängel der genannten Schrift nur selten aufmerksam gemacht haben, so geschah es, weil wir selbst den Schein einer kleinlichen Polemik einem so überaus verdienstvollen Schriftsteller gegenüber vermeiden wollten. Ein sehr grosser, vielleicht der grösste Theil des Schnurrer'schen Werkes besteht in der sehr vollständigen Chronik der atmosphärisch-meteorologischen Ereignisse. Es mag ununtersucht bleiben, in welcher Verbindung diese mit der Geschichte der Volkskrankheiten stehen; wir selbst sind wenig geneigt, ihnen einen so ausgedehnten Einfluss, als den gewöhnlich zugestandenem beizumessen. Dagegen ist unter den Kennern über die grosse Ungenauigkeit und Unvollständigkeit der zoographischen Angaben Schnurrer's nur eine Stimme, und unsere Hauptaufgabe war es, gerade hier die oft so grossen Lücken auszufüllen. Der Vergleich mag erkennen lassen, mit welchem Erfolge dies geschehen ist.

Eben so haben die Kenner die grosse Unvollständigkeit der Seuchengeschichte Ozanam's schon längst erkannt. Der Hauptfehler dieses Werks ist die grosse Nachlässigkeit, mit welcher der Verfasser desselben seine offenbar sehr reichen Quellen benutzt hat; wahrhaft unverantwortlich aber ist die Bequemlichkeit, vermöge welcher derselbe diese Quellen fast niemals genauer bezeichnet. Ausserdem herrscht in diesem Werke die grösste Zerrissenheit und eine mehr als oberflächliche Systematik, vermöge welcher Erscheinungen, die nach Zeit und Art in dem innigsten Verhältnisse zu einander stehen, häufig an ganz entlegenen Orten besprochen werden. Trotz aller dieser Fehler hat Ozanam's Schrift als Vorarbeit grossen Werth, und wir haben sie in dieser Eigenschaft dankbar zu benutzen gesucht.

Der Anhang, einzelne seltene Dokumente zur Geschichte der Seuchen und das Verzeichniss der in diesem Theile von uns benutzten Schriften enthaltend, wird vielleicht nicht unwillkommen seyn. Das letztere mag zugleich zeigen, dass wir unsern Untersuchungen eine möglichst ausgebreitete Grundlage zu geben versuchten. Es dürfte als ein einigermaßen vollständiger Katalog der wichtigsten epidemiographischen Werke von 1500 — 1770 gelten können.

Dankbar muss der Verf. der wesentlichen Unterstützungen erwähnen, welche ihm für seinen Zweck die Jena'sche, die Göttinger, die Erlanger, Leipziger und Wolfenbütteler Bibliothek darboten, dankbar der Liberalität gedenken, mit welcher ihm die verehrten Vorsteher dieser Anstalten die ihnen anvertrauten Schätze zur Beantwortung überliessen.

Schliesslich kann der Verfasser den Wunsch nicht unterdrücken, dass das Interesse, dessen sich gegenwärtig die Geschichte der Krankheiten erfreut, recht bald auch der nicht minder wichtigen Geographie derselben zugewendet werden möge, durch welche viele Punkte der ersteren erst ihre wahre Bedeutung erlangen. Allerdings erscheinen die Schwierigkeiten einer geographisch-nosologischen noch ungleich grösser als die einer historisch-nosologischen Arbeit, aber dennoch fehlt es nicht an einem sehr bedeutenden, obschon noch gänzlich rohen und überall zerstreuten Material.

Möge auch diesen Beiträgen zur Geschichte der europäischen Volkskrankheiten die Zufriedenheit zu Theil werden, mit welcher die Kenner ihre Vorgänger aufnahmen; mögen sie vorzüglich tüchtigere Kräfte anregen, uns bald mit einer vollständigen Geschichte der Epidemien zu beschenken.

Jena, im April 1841.

**Dr. H. Haeser.**



# I n h a l t.

	Seite.
Rückblick und Einleitung. . . . .	1
<b>I. Pest und Petechialtyphus mit den verwandten Formen. . . . .</b>	<b>5</b>
1502. Pest zu Köln. Voets. . . . .	6
1505. Petechialtyphus in Italien; Fracasteri. Massa. . . . .	8
1513. Garotillo, Mundkule. . . . .	10
1528. Petechialtyphus, typhöse Pneumonie, Trousse galante. . . . .	13
1531. Wechselfieber, Valleriola. . . . .	16
1535 und 1537. Petechialfieber. Typhöse Pneumonie. — Massa, Mundella. — 1540. Kriegstyphus. — Colic, Kepser. . . . .	20
1555 und 1556. Pest in Oberitalien. — Landos de Bonagentibus. — In Deutschland, Willich, Luther. . . . .	23
1557. Tabardillo in Spanien. Vallesius, Torcus. — Coyttarus. . . . .	26
Pest zu Delft, 1537. Forestus. . . . .	23
Allgemeine Verbreitung der Pest. — Ingrassias, Gemma, Porcell, Joubert, Plater. . . . .	26
Lyon. . . . .	28
Hamburg. . . . .	28
Leyden. Ueberschwemmungen in Holland. . . . .	29
<b>II. Die ungarische Krankheit, 1566. . . . .</b>	<b>41</b>
<b>III. Fernere Geschichte der Pest und des Petechialtyphus im sechzehnten Jahrhundert. . . . .</b>	<b>60</b>
1568. Paris, Palmaris. . . . .	60
1572. Pest zu Harlem, Delft, Löwen u. s. w. — Cora, Gemma. . . . .	62
1574. Pest zu Harlem. — Forestus. . . . .	66
Kölk von Peitow. . . . .	68
1570 — 1579. Balloais. . . . .	68
Die Pest in den Jahren 1575 und 1577. . . . .	72
Malta, Messina, Palermo. — Ingrassias. . . . .	74
Triest, Verona, Mantua, Mailand. — de Hortensii. . . . .	75

	Seite.
Mailand. . . . .	78
Venedig, Padua. . . . .	82
Pest zu Vicenza. — Mastaria. . . . .	83
Ansichten der Aerzte; Mercurialis, Capivacci, Mari- nelli, Glisente, Susio, Hercules Saxaria (Miasma- tiker); Mastaria, Baimando (Contagionisten). . . . .	85
Infuenza, Kriechelkrankheit, Pest, rothe Ruhr. . . . .	92
Typhöse Pneumonien. — Oethuma. . . . .	94
Weit verbreitete Pest. — Gemma, Cavares, Frigoso, Sordes. . . . .	95
1587. Petechialtyphus in Italien. — Treviso. . . . .	96
1588 — 1590. Erysipelaceen. . . . .	101
1591. Petechialtyphus. — Truncosius, Roboretas. Camillas und Ader. . . . .	101
Pest zu Hamburg. — a Castro; in Spanien. — Bec- cangelini; zu Leyden. — Hearnsii. — Rinderpest. . . . .	105
<b>IV. Das siebzehnte Jahrhundert. . . . .</b>	<b>113</b>
1602. Typhöse Pneumonien in Italien. Codronchi, Lacina a Fonte, Joh. Colle, Ghiocchi. — Tosias. (1613.) . . . . .	113
1603 — 1611. Pest, Garstilla, Ruhr. — Flater, Potel, Labadie, Theset. — Die spanischen Aerzte. — Paschettia, Fontana. . . . .	116
Der dreissigjährige Krieg. . . . .	119
Lagerfieber. . . . .	119
1621. In der Pfalz. Fonseca, Rhumelin. — In Sachsen. Barzer. . . . .	120
1623. Montpellier. — Riverius. . . . .	122
1629. Lüttich. — Beer. . . . .	123
1632. Nürnberg. — Lagerfieber, Scharbat. — Bee- tesbeck, Horn. . . . .	124
1640. Marburg. — Latichius. . . . .	124
1643. Kriegstyphus in England. — Willis. . . . .	125
Ruhr. . . . .	126
1623. le Pais (Piso). . . . .	126
1624. Gent. — Hermann von der Heyde. . . . .	127
1625. Lyon. — Lamouliery. . . . .	128
Allgemeine Verbreitung der Pest in den Jahren 1624 — 1640. . . . .	130
1625. Pest zu Breda. — van der Myr. . . . .	131
1626 — 1630. Pest in Frankreich. — 1628. Lyon. Chalons sur Saone. — Mercet. . . . .	135
1629. Pest zu Dijon. — Lantaret, Gassendi. . . . .	135
1629 und 1630. Pest zu Montpellier. — Banchin, Pest in Deutschland und in der Schweiz. . . . .	137
1630. Die Pest in Italien. . . . .	139
Die Pest zu Verona. — Pona (Bagioniere). . . . .	140



	Seite.
1633. Typhöse Pneumonien in Oberitalien. — Baronius. . . . .	144
1635 und 1631. Pest zu Nymwegen. — Dierck- broeck. . . . .	146
1635. Pest zu Leyden. — Florentinus. . . . .	154
Amazeordentliche Verbreitung der Pest in den Jah- ren 1654 — 1657. . . . .	154
1654. Pest zu Kopenhagen. — Bartholinus. — Kriegsstopus an der Ostsee. . . . .	155
1656. Pest in Italien. — Neapel. Castro. — Rom. P. Zacchia. . . . .	157
Genoa. . . . .	157
Riena. Gelantonia. — Rom. Guastaldi. . . . .	158
1657. Pest in Deutschland. Braunschweig. — Gieseher. . . . .	159
Die Volkskrankheiten der Jahre 1657 — 1675 in England. — Willis, Morton, Sydenham. . . . .	161
1657 — 1665. Wechselfieber. . . . .	161
Willis. . . . .	162
Witterungsverhältnisse von 1661 — 1664. Erkran- kungen der Thierwelt. . . . .	164
Sydenham. . . . .	165
Morton. . . . .	172
Wechselfieber in Italien. — Borelli. . . . .	172
1662 und 1664. Pest zu Amsterdam. — Cardila- cine. . . . .	174
1665 und 1666. Pest zu London. — Hodges. . . . .	175
1668. Pest in der Schweiz. — Eslinger. . . . .	183
England. Die Volkskrankheiten der Jahre 1667 — 1675. Blattern, Blatterfieber, Ruhr. — Sydenham. Morton. . . . .	183
Willis. . . . .	193
1660 — 1680. Allgemeine Verbreitung der Wech- selfieber, Ruhren und Petechialfieber auf dem Continent. . . . .	196
1667 und 1669. Wechselfieber zu Leyden. — Syl- vius. Faveis. . . . .	196
1672. Ruhr in Thüringen. — Wedel, Laner. . . . .	200
1677. Ruhr in Dänemark. — Brand, Olam Boer- chius, Erasmus Bartholinus. . . . .	200
1672. Petechialfieber am Rheine. — Bonckers, Car- dineus, Scherf. . . . .	201
1675 — 1684. Pest auf der Nordküste von Afrika in Spanien, Ungarn, Oesterreich, Deutschland. . . . .	203
1679. Pest zu Wien. — Sorbait. Abraham a Santo Clara. . . . .	204
Wietterich-Nemtsch. Grütz. Prög. . . . .	206

	Seite.
1680. Pest zu Leipzig. — Donskrell, Rivinus. . . . .	206
1681 — 1684. Pest in Thüringen, im Braunschweigischen u. s. w. . . . .	209
1681 und 1682. Pest zu Magdeburg und Halle. . . . .	210
Pest zu Halberstadt und im Braunschweigischen. . . . .	216
1680 — 1684. Viehsucken. Wechselfieber. . . . .	218
1688. Petechialtyphus zu Wien und Preiburg. — Faekb. Löw. — Wechselfieber, Bahr. . . . .	219
Die Volkskrankheiten der Jahre 1690 — 1695 in Italien. — Ramazzini. . . . .	221
1690. Wechselfieber. . . . .	221
1691. Wechselfieber. Lungensentzündungen. Erysipelaceen. . . . .	224
1692 — 1695. Petechialtyphus. . . . .	226
Baglivi, Lancisi. . . . .	232
Die Volkskrankheiten der Jahre 1690 — 1695 in Deutschland und Frankreich. . . . .	233
Deckers, Hofmann, Valentin, Panthet, Apiano, Hoyer. . . . .	233
<b>V. Das achtzehnte Jahrhundert. . . . .</b>	<b>240</b>
1700 — 1716. Weit verbreitete Seuchen, Wechselfieber, Erysipelaceen, der Friesel, Petechialtyphus, Rachenpest. . . . .	240
Wechselfieber, Petechialtyphus, Erysipelaceen. . . . .	243
1697. Kiel. — Schellhammer. . . . .	245
1697 — 1704. Preiburg; Petechialtyphus, Maseru, Bahr. — Löw. . . . .	246
Fr. Hoffmann. Die Breslauer Aerzte. Italien. — Baglivi, Lancisi. . . . .	247
1709. Strenger Winter. Rheumatische Krankheitsconstitution. — Lancisi, Ramazzini, Fr. Hoffmann. . . . .	250
<b>Der Friesel. . . . .</b>	<b>253</b>
1652. Leipzig. — Gattfr. Welsch. . . . .	260
1656. Augsburg. — G. Hieron. Welsch. Lucas Schreackh. . . . .	262
1711 — 1713. Blattern, Masern, Scharlach, Friesel, Rachen, Petechialtyphus. . . . .	266
Ungarn. — Gemel. . . . .	267
1711. Universitätsfieber zu Altdorf. — Heister. . . . .	268
1712. Influenza. . . . .	268
1713. Friesel zu Mumpelgard. — Binsinger. . . . .	269
1715. Petechialtyphus zu Berlin. — Gahrhop van der Mullen, Gundelheimer, Schwarz. . . . .	272
1715. Typhus zu Toul. . . . .	274
1717. Bosartige Fieber, Wechselfieber und Rachen auf Sardinien. . . . .	275



1747. Friesland und Ingernmanland. — Kriechelkrankheit. . . . .	275
Belgrad. — Pest in der Türkei, Ungarn, Siebenbürgen und Polen. Rinderpest und andere Epizootien. . . . .	276
1717. Leipzig. Petechialtyphus. . . . .	277
1718. Wismar. . . . .	278
1718. Epidemische „Leberentzündung“ zu Peggau und Leipzig. — Fischer und Kübel. . . . .	278
Gastrische Fieber zu Berlin, in der Mark, in Thüringen. — Fr. Hofmann. . . . .	280
Typhöse Wechselfieber in den Jahren 1719 und 1720. — Seeland. de Koker. . . . .	280
1720. Wechselfieber in der Pfalz. Leipzig, Seehausen. . . . .	281
Nürnberg. Jauer. . . . .	282
1717. Bielefeld. — Böttcher. . . . .	283
Neussel. — Maller. — Binsland. Piga. — Fischer. Friesel. 1719. Berlin. — Gabelier van der Mullen. 1720. Friesel zu Nürnberg. — Gerhard. . . . .	284
1720. Weimar, Wechselfieber. — Müller. . . . .	291
Die Ruhr der Jahre 1717 — 1727. . . . .	292
1717. Ruhr zu Schweinfurt. — Cramer. . . . .	293
1719. Allgemeine Verbreitung der Ruhr in Ungarn. — Reimann. — Erysipelaceen. . . . .	294
1719. Ruhr zu Seehausen. — Singesbeck. . . . .	295
1724 — 1727. Magenleber zu Marburg. — Arnoldi. . . . .	297
1726. Ruhr zu Halle. — Bass. . . . .	298
1727. Friesel zu Jena. — Gieseler. . . . .	299
1728. Wechselfieber zu Ferrara. — Lamoni. . . . .	300
1729. Breslau. — Hahn. — Infuenza. . . . .	301
1729. Wien. — Infuenza, Friesel. — Löw. . . . .	303
1733. Friesel in Baiern. — Grünwald. . . . .	304
1734. Friesel zu Strassburg. — Salmann. . . . .	307
1735. Friesel zu Petersburg. — Weithrecht. . . . .	309
1735. Friesel in Lothringen und im Elsass. — Quessay. . . . .	310
1737 und 1738. Friesel zu Galar. — Trumph. . . . .	310
Die Krankheitsconstitution der Jahre 1715 — 1734 zu York. — Waintringham. . . . .	313
Viehseuchen der Jahre 1700 — 1713. . . . .	316
Rinderpest. . . . .	318
Die Bubonespest in den Jahren 1701 — 1716. . . . .	325
1707. Die Pest in Krakau. — Schar. . . . .	326
1708. Die Pest zu Rosenburg. — Holmann. . . . .	328
Warschau, Thorn u. s. w. . . . .	330
1709. Pest zu Freistadt. — Lauterbach, Holmann. . . . .	330

	Seite
1709. Die Pest zu Danzig. — Kulmas, Stückel . . . . .	352
1710. Pest zu Marienburg. — Erndl. . . . .	357
1710. Itäemark, Schweden, Rutschland u. s. w. . . . .	359
1710. Die Pest zu Kopenhagen, Helsing u. s. w. Büttcher. . . . .	340
Die Pest in der Moldau, Wallachei, Steyermark, Oesterreich. — Köleser de Keres-Eer, Katsi, Laigh. . . . .	342
1713. Pest zu Wien. — Beislerma. Amfeld. . . . .	346
Weitere Verbreitung in Oesterreich. . . . .	347
1713. Prag. — Focke, Schamky. . . . .	348
1713. Regensburg. . . . .	349
Wissenschaftliche Ergebnisse. — Kavelé, Eggerdes, Kulmas. . . . .	350
Die Pest der Jahre 1719 — 1721. . . . .	355
1719. Siebenbürgen. — Kaleser. — Lemberg. . . . .	356
Die Pest in der Provence. 1720 und 1721. . . . .	357
Marseille. . . . .	358
Aix. . . . .	365
Toulon. . . . .	364
1722. Marseille. . . . .	377
Verzeichniss der wichtigsten Schriften über die Pest des Jahre 1700 — 1714; 1720 — 1722. . . . .	374
Die Wechselfieber der Jahre 1734 und 1735. . . . .	378
1734 und 1735. Wechselfieber am Rhein. — Mo- llat. — Ruhr, Lagerfieber. — Krämer. . . . .	379
1735. Wechselfieber im Eiderstädtischen. — De- harding. — Im Cremonesischen. Vaccarengli. . . . .	382
1735. Petersburg. — Weichrecht. . . . .	382
1735. Kinderpest, Angina maligna in Nordamerika. . . . .	382
Die Ruhrpandemie zu Nymwegen im Jahre 1736. — Dogaer. . . . .	385
1737. Breslau. Petechialfieber. — Pauli. . . . .	390
1740 — 1741. Petechialfieber, Lagertyphus, Ruhr in Hessen. — Ritter, Fürstenau. . . . .	391
1740. Typhus im Rönthaldschen. — Schauer. . . . .	392
1741. Lagertyphus in Schlesien. — Brandhorst. . . . .	393
1742. Lagertyphus zu Prag. — Scrisci und Bache. . . . .	394
1743. Upala-Fieber. — Baek. . . . .	395
Die Feldkrankheiten der Jahre 1742 — 1747. Pringle. . . . .	396
Die Volkskrankheiten der Jahre 1727 — 1748 zu London. — Huxham. . . . .	411
Die Pest in der Ukraine, zu Messina und in Sie- benbürgen. . . . .	419
1738 und 1739. Die Pest in der Ukraine. — Schreiber. . . . .	419
1743. Pest zu Messina. — Melani. Tariano. . . . .	424



	Seite.
1755 — 1757. Pest in Siebenbürgen. — Chenol.	425
Die Volkskrankheiten der Jahre 1750—1770. . .	426
1746 — 1754. Wechselstieber. — Gröninger, Cartheuser, Fabricius und Farenholtz, Bourzento, Colley u. s. w. . . . .	431
1750 — 1755. Garonilla in der Schweiz, England, Schweden und Nordamerika, — Langhaus, Bexham u. s. w. . . . .	432
1755. Wechselstieber, Friesel, Lungenstich, Keschkestes, Ruhr, Blattern, u. s. w. zu Basel. — Zwinger.	433
1756. Typhus in Frankreich. — 1757. Alpenstich in der Schweiz. . . . .	434
1757 — 1759. Petechialtyphus (= typhöse Wechselstieber?) — zu Wien. — Hasenöhrl. Störck. Störck. — Petechial- und Frieselstieber, Wechselstieber, Erysipelaceen. . . . .	437
1759 — 1761. Einfache und typhöse Wechselstieber zu Laxenburg. — Lantzer. . . . .	441
1757 — 1762. Göttingen. — Biepenhausen, Boderer und Wagner, Werthuf und Saalmann, Heusler.	445
1757 — 1762. Biepenhausen. . . . .	445
1761. Schleichfieber. — Boderer und Wagner. . .	448
Die Blattern. — Heusler. . . . .	484
1761. Ruhr zu Münster und Hannover. — Saalmann und Weidhof. . . . .	486
1762. Alpenstich in der Schweiz. — Haller. . .	488
Die Volkskrankheiten der Jahre 1763 und 1764 zu Neapel. . . . .	489
1764. Typhus. . . . .	492
Die Krankheitsconstitution der Normandie in den Jahren 1763 — 1777. — Lepeque de la Cloture. .	501
Allgemeine Verbreitung der Ruhr in den Jahren 1760 — 1767. . . . .	506
1757 — 1762. Ruhr und Petechialfieber zu Mainz. Störck. . . . .	506
Die Feldkrankheiten der Jahre 1761 — 1763. . .	509
1762. Influenza. Fortdauer und höhere Ausbildung der erysipelatösen Krankheitsconstitution. Wien, London. — Baker. . . . .	510
1762. London. — Baker. . . . .	511
Ruhr und Faltfieber in Portugal und Spanien 1763 und 1764. — Douglas, Madervall. — 1765. Irland. — Sims. . . . .	513
1766. Ruhr in der Schweiz. — Zimmermann. . .	515
1767. Petechialfieber zu Sizilien. — Neracci. . .	519
1768. Eisenach. — Grimm. . . . .	522
1769. Garstillo, Scharlach. — Böhmer, Brunning, Marteau de Grassilliers. . . . .	523

## Anhang.

I. Auszug aus der Beschreibung des schwarzen Todes von Dionysius Secundus Calle. . . . .	325
II. Ueber die Krankheiten des Jahres 1440, nach den Beschreibungen von Vincentius und Bernardus Calle. . . . .	329
III. Ueber die Epidemie des Jahres 1547. . . . .	329
IV. Dr. M. Luther. Ob das Sterben zu fürchten sey. . . . .	335
V. Thomasin Beschreibung der Influenza des Jahres 1580. . . . .	338
Schriftenverzeichniß. . . . .	544



## Rückblick und Einleitung.

---

**D**ie bisherigen Betrachtungen dieser Schrift beschäftigten sich mit den hervorragendsten Erscheinungen im kranken Leben der Völker seit den Anfängen historischer Kenntniss bis zu dem Ende des 15. Jahrhunderts. Wenn hierbei auch spätere Ereignisse ihre Berücksichtigung fanden, so geschah dies nur bei denen, welche mit der ganzen Eigenthümlichkeit der an jener Stelle vorzugsweise geschilderten Krankheitsperiode in zu innigem Zusammenhange stehen, als dass ihre Trennung von denselben nicht würde unnatürlich erscheinen seyn. Denn die ewige Zeit kennt nicht die willkürlichen Theilungen der Menschen. —

Zerstreut und sparsam sind die Quellen, die uns über die Volkskrankheiten des Alterthums und des Mittelalters belehren; nur von wenigen berichtet uns die Geschichte in kurzen, aber desto ergreifenderen Schilderungen. Wir haben im ersten Theile dieser Schrift theils das Thatsächliche zu erörtern, theils den inneren lebendigen Zusammenhang des Einzelnen zu erfassen gestrebt, was in der bezeichneten Periode uns entgegentritt.

So folgten wir vor Allen dem Wechsel der Ereignisse und seiner Bedeutung, so fesselten uns die mythischen, die christlichen und die zu historischer Klarheit erwachenden Darstellungen der Verbreitung der Bubonensepe, jener unersättlichen Furie, die erst in unsern Tagen ihres furchtbaren Nacken unter das allherrscheidende Joch des Menschengeschickes heugte. Wir

folgten ihr bis in die entlegenen Zeiten ihrer Entstehung in einem Lande, welches, von der Natur zu einem Paradiese bestimmt, unter dem Drucke der Unwissenheit und Despotie zu einem unheilvollen Pfahle jeglichen Verderbens geworden ist. Wir erblickten ihre ersten ungeheuerlichen Verheerungen in Europa, wir versuchten die wahre Bedeutung jener furchtbarsten ihrer Epidemien darzustellen, in der die gelagete Menschheit den finstern Todsgott selbst über ihr Haupt dahinschweben zu sehen wähnte, — wir verweilten bei der langen Reihe der nicht viel gelinderen Uebel, welche die furchtbare Mutter in den grausigen Umarmungen mit dem über Europa herrschenden Dämon des Verderbens gebar. — So fesselte uns die Betrachtung der einheimischen Uebel, des Scorbuts, der Syphilis, so die vorübergehenden Gestalten der merkwürdigen Verbindungsglieder alter und neuer Krankheitsformen, des Peterbal-typhus, des Garotills, des englischen Schweistes. Ueberall begegneten wir demselben Unheil in verschiedener Gestaltung der äusseren Form, überall dem steten Wechsel dieses Aeusseren bei ähnlicher Bedeutung des Inneren, überall dem innigsten Zusammenhange aller Lebenserscheinungen, dem deutlichsten Wechselverhältnisse tellurischer, physischer und psychischer Umwälzungen. Niemals aber fehlte die Ahnung des ewig unergründlichen Gesetzes, welches über dem Geschick der Menschheit walhet, niemals die Offenbarung einer höheren Macht, die sie durch Tod und Untergang zu neuerem und schönerem Leben geleitet, zu einem fernen, irdischen Auge unerreichten Lichte. Nicht dieses Zool, nur den Wechsel der Bewegung mag der kühnere Blick erfassen: Klio aber, die ernste Göttin, zeichnet mit schwerem Griffel das Geschick des unabsehbaren Zuges in ihr ehernes Buch!

Das Leben der Menschheit war nie bewegter, nie äusseren sich vordem in langen Schlaf versunkene Kräfte reger und gewaltiger, als bei der Wendung des ungeheuren Zuges, durch welchen es die ewigen Mächte aus der Nacht des Mittelalters in die immer mehr zum Lichte sich erhellende Dämmerung der

neuen Zeit hinüberführten. Eine neue Welt, mehr erschaut durch das scharfe Auge des Denkers, als entdeckt durch die Kühnheit des Seefahrers, lag vor den staunenden Blicken der Menschen, eine unerschöpfliche Quelle neuer Kenntnisse, neuer Reichthümer, — neuer Laster und Schandthaten. Das stille Gemach eines sinnenden Bildners wurde zur Werkstatt der mächtigsten Waffe, welche je geistigen Aufschwung weckte, förderte und leitete, die Begeisterung eines kühnen Mönchs erlöste einen grossen Theil der Menschheit aus den schwersten Banden, denen sie je erlag und in denen sie länger als ein Jahrtausend geschmachtet, aus der Tyrannei der Hierarchie. Wohin der Blick sich wendet, überall neues Leben, neue Kräfte, neue Bedürfnisse, neue Segnungen, — neues Unheil.

Nicht gering ist in der Schale des letzteren das Gewicht Verderben-keingender Volkskrankheiten, die zu aller Zeit, in welcher das geistige Leben der Nationen in gewaltsamen Regungen erhebt, dem läuternden Element des zerstörenden, aber aus der Asche den neuen Lebensfunken erweckenden Feuers vergleichbar, das leibliche Daseyn durchwackten.

Noch immer finden wir zu Anfang des 16. Jahrhunderts, vermuthlich der Fortdauer der Verhältnisse, welche entweder in dieser Zeit ihre originäre Entstehung möglich machten, oder doch, im äussersten Falle, das üppige Aufkeimen anderswo gezeugten Samens unendlich begünstigten, die Bubonenpest an der Spitze der Volkskrankheiten, aber im steten Kampfe mit dem eignen Sprösslinge, dem Petechialtypus, dessen Erstehung mehr als alles Zeugnis ablegt von der Constitution der Krankheiten jener Zeit, die weder früher noch später wieder begegnet, und mit dem völligen Siege des Sprösslings endigt; einem Siege, den nur kurzweilige Einseitigkeit allein einer an sich hochwichtigen Massregel menschlicher Klugheit leihen kann <sup>1)</sup>.

Wenn früher eine getrennte Betrachtung der in dieser ereignis- und bedeutungsvollen Periode sich darbietenden

1) Huter., pathol. Catena, I. 8, (21 ff.)



Krankheitsgestalten zweckmässig schien, um ihren Ursprung und ihren Zusammenhang untereinander anschaulicher zu machen, wenn uns diese Art der Betrachtung zum Theil selbst über die Grenzen des Mittelalters hinausführte, — wie der Pinsel des Künstlers, ehe er an das ausgeführtere Werk sich wendet, die Umrisse des Planes der Beurtheilung der Kenner vorlegt, — so wird uns jetzt die ungetrennte Betrachtung der wichtigsten Ereignisse im kranken Leben der Völker zur vorzüglichsten, wenn auch schwierigen Aufgabe, da einerseits allerdings die Sonderung des Heterogenen den Ueberblick erleichtert, aber auch nur zu leicht die innere Verbindung des Verwandten nicht gehörig hervortreten lässt.

Wir finden, wie gesagt, zu Anfange des 16. Jahrhunderts überall eine Menge epidemischer Krankheiten erwähnt und mit dem gemeinsamen Namen „Pest“ bezeichnet, dessen fast allumfassende Bedeutung uns schon bekannt ist, obschon die Mehrzahl dieser Epidemien allerdings der Bubonenpest angehören.

## I.

### Pest und Petechialtyphus mit den verwandten Formen.

Im Jahre 1509 herrschte nach Lebenwaldt und der Chronik von Mansfeld die Pest in Deutschland und in aller Welt, ununterbrochen fortwährend bis zum Jahre 1595. Der grossen Kälte des Winters, der noch grösseren Hitze des Sommers, den dadurch herbeigeführten Ueberschneemungen<sup>1)</sup>, dem Misswachs und der Hungersnoth des Jahres 1502 xmal folgten in Deutschland, Holland und wahrscheinlich noch an vielen andern Orten<sup>2)</sup>, namentlich da, wo man in den vorhergehenden Jahren die merkwürdigen *Signacula* auf den Kleidern beobachtet hatte<sup>3)</sup>, verheerende Epidemien. Zu Brüssel herrschte nach Follinus<sup>4)</sup> im Jahre 1502 eine mörderische Pest, bei welcher

1) Gesnerus, *Corn. de veter. anim. character*, 58, II, p. 245.

2) Schwerner, *Chronik der Seuchen* II, S. 51 ff. nennt Brüssel, Basel, Stuttgart, Tübingen. — *Diarium Ferrariense* bei Muratori (vol. 24, p. 197): „*Hinc ibi tunc a Modena et quasi in tota in Lombardia facta multa mala*.“ Dort wird auch grosse Ueberschneemungen, namentlich der Elsch gedacht (p. 485).

3) Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass diese *Signacula* atmosphärische Niederschläge sind, erzeugt durch die Ausgleichung einer wie immer beschaffenen Luftelektricität mit der organischen Elektricität des menschlichen Körpers. Auffallend ist die von Vielen bestätigte Beobachtung, dass vorzüglich solche Personen später von der „Pest“ befallen wurden, bei welchen sich solche *Signacula* gezeigt hatten; wahrscheinlich zu Folge eines beide Vorgänge begünstigenden Ueberschusses organischer Elektricität. Wir erinnern daran, dass von Petechialtyphus von jeher die kräftigsten und rüstigsten jungen Männer am häufigsten und häufigsten befallen wurden, und haben mit Eisenmann v. Knoch die starken Nebel vor dem Ausbruch mancher Epidemien für Produkte ähnlicher elektrochemischer Vorgänge in der Atmosphäre, Vergl. Eisenmann, die Krankheitsform Typhus, S. 20. Besonders Hecker, engl. Scherius, S. 27 ff.

4) Follinus, *Asclepius Aesculapium 2*, *lib. pestiferar. sign.* Astr. 1458. \*

[1595.]

viele plötzliche Todesfälle vorkamen und an einem Tage oft 500 starben. An vielen Orten aber herrschten veränderte Krankheiten, so in Spanien und Portugal, wo sie, zunächst von Sevilla ausgehend, namentlich Lissabon ergriff<sup>1)</sup>, in Italien vorzüglich der Peterialtypus, und in immer weiteren Kreisen verbreitete die Lanthouche ihre schreckliche Herrschaft<sup>2)</sup>.

### Pest zu Köln. Vochs.

Die Schrift eines in Italien gebildeten Kölner Arztes, Joh. Vochs<sup>3)</sup>, über die Rubenpest der Jahre 1506 und 1507 enthält zwar wenig Besonderes in Bezug auf die Beschreibung der Krankheit, aber sie ist in anderer Hinsicht, als das Werk eines sehr aufgeklärten, frei denkenden und redenden Mannes einiger Bemerkungen nicht unwerth. Dieselbe ist an den Churfürst Friedrich von Sachsen gerichtet, und enthält gleich zu Anfang eine vom edelsten Unwillen belebte Schilderung der Sittenverderbnisse der damaligen Zeit bei weltlichen und geistlichen Ständen, die bittersten Klagen über Bedrückung des Volkes und frevelhaften Uebermuth der Grossen, — bittern Spott über die Thorheit astrologischer Träumereien und kindlichen Aberglaubens.

Schon im Jahre 1502 herrschte zu Köln eine heftige Bohnenpest<sup>4)</sup>, während auch in Sachsen, Thüringen, Meissen und Franken pestartige Krankheiten allgemein verbreitet waren<sup>5)</sup>; die Jahre 1503 bis 1506 aber zeichneten sich durch grossen Feuchthit und Ueberschwemmungen aus<sup>6)</sup>, und ihnen schrieb man vorzüglich in Italien die gleichzeitige Häufigkeit des Pe-

1) Meckel, engl. Schenck, S. 14.

2) Zu Augsburg bestand um diese Zeit schon ein vermehrtes Hospital für Syphilitische.

3) E. das Schriftenverzeichnis. (Alle in den Noten nicht aufgeführten Bücher sind bei angehängten Schriftenverzeichnissen zu suchen.)

4) „*pebbluola legumina*.“ — *Forde*, p. 12.

5) „*inter et postea pestilentialia*.“ — *Ibid.*

6) In andern Gegenden, z. B. in Schwaben, klagte man über grosse Trankheiss. — *Schwenck*, p. = 0.



techialtypus zu. — Die von der Pest Befallenen hatten in der Regel zuerst ein Gefühl von Wärme und Unruhe in der Herzgegend, und ein Verlangen nach kalter Luft, die sie mit geöffnetem Munde in sich zogen, der Athem war tief und pfeifend. Indessen waren die einzelnen Zufälle der Krankheit, namentlich die ihres Ausbruchs, häufig sehr verschiedenartig. Denn sie begannen bald mit apoplektischen, bald mit pneumonischen Erscheinungen; mit Husten, Gähnen und Angenschmerz, mit Pasteeln auf der Zunge, am Zahnfleisch und in der Luftröhre<sup>1)</sup>, mit Kolik, mit Schmerzen in der Nierengegend, mit paralytischen und podagrischen Zufällen. Sehr bald aber gesellten sich zu diesen durch die Individualität der Kranken herbeigeführten Formverschiedenheiten die gewöhnlichen Pest-symptome: Kopfweh, Delirien, Lethargus, Nasenbluten, Excoriation der Mundhöhle, bräunartige Zufälle (*regio natica*), pleuritische und peripneumonische Erscheinungen, Blutspeien u. s. w. Dabei war der Puls frequent und klein, das Herz schlugte, die Kranken klagten über heftigen Durst, die Zunge wurde trocken, rauh und schwarz oder citrongelb; die Darmabgänge und der Urin waren übelriechend. Zuweilen traten nach Erbrechen und Durchfall tödtliche Ohnmachten ein. Uebler Geruch des Athems und des gelassenen Bluts, schwarze Farbe des Erbrochenen und der Stuhlbgänge, Harnverhaltung oder übermässiger Harnabgang, grosse Schwäche, Lähmung der Sprache, Schluchzen, kalte Schweisse, waren absolut ungünstige Erscheinungen. Kachektischen Personen, Gelehrten und überhaupt Salchen, welche eine sitzende Lebensart führten, war die Krankheit besonders gefährlich. Zeitiger Ausbruch der Pest-exantheme (*varioli et vesiculae*), Bubonen und Carbunkeln gab eine gute Prognose, eine ungünstige, wenn er erst am 3ten und 4ten Tage oder noch später erschien. Dergleichen Ansprüche fanden oft noch nach dem Tode Statt, oder die Leichen schwellen an, wurden schwarz u. s. w. Wenncomplication bei Kin-

1) Wahrscheinlich war eine symptomatische Veranlassung des Effluviens.

[1285.]

dem liess einen unglücklichen Ausgang befürchten; es wird auch des brandigen Absterbens der Extremitäten Erwähnung gethan. Bei Vielen ging dem Tode unmittelbar Lachen voraus<sup>1)</sup>.

In der Behandlung verlässt sich Veches zwar vorzüglich auf einen von ihm angegebenen, aus einheimischen Aromaticis componirten Theriak, (er verwirft überhaupt alle exotischen Arzneymittel), aber er richtet doch sein Hauptaugenmerk auf die Hervorrufung kritischer Schweisse. Die Bubonen aber bringt er durch Kataplasmen von gekauten Zwiebeln und Einschalte zum Aufbruch<sup>2)</sup>.

### **Petechialtyphus im Italien: Fracastori. Massa.**

Die Beschreibung des schon früher ins Auge gefassten Petechialtyphus der Jahre 1505 (und 1528)<sup>3)</sup> findet sich bei Fracastori. Derselbe sucht die Ursachen der Krankheit in den vorangegangenen Witterungsverhältnissen, für 1528 namentlich in dem gelinden Winter und regnerischen Frühlinge, zu Folge dessen alle Ströme Italiens über ihre Ufer traten; Verhältnisse, welche typhösen Krankheiten zu allen Zeiten vorzügliches Vorschub geleistet haben. — Die Krankheit war nur bei unmittelbarer Berührung der Kranken ansteckend. Im Anfange waren, wie dies gewöhnlich der Fall ist, ihre Erscheinungen so geringfügig, dass Aerzte und Kranke es mit einem höchst unbedeutenden Uebel zu thun zu haben glaubten, dessen Verschwinden nach wenig Tagen zu erwarten sey. Bald indess offenbarte sich die hässliche Natur der Krankheit; es stellten sich grosse Abgeschlagenheit, Stumpfsinn, Geschwätzigkeit, Delirien, häufig mit Sopor abwechselnd, ein; der Puls war klein und langsam, der Harn war anfangs roh, später roth und trübe, die Stühle höchst übelriechend, Durst fehlte oder war unbedeutend;

1) S. 81 u. f.

2) In einem besondern Kapitel (II. c. 35) handelt Veches auch von der Kun der Syphilis, die nach ihm ihren Hauptgrund in schlechter verdauener Nahrung hat. Den Geleissch des Quecksilbers bei derselben verurtheilt er gänzlich.

3) S. Mater. path. Unters. I. 232.

am 7. bis 14. Tage brachen die Petechien aus. Es starben meist Kraben und Jünglinge aus den höheren Ständen, Frauen wurden selten, noch seltener Greise, Juden aber fast gar nicht ergriffen. Gleich zu Anfang eintretende grosse Mattigkeit, Harnverhaltung, Durchfälle, zögernder Ausbruch oder Zurücktreten der Petechien, profuses Nasenbluten waren schlimme Zeichen. Kritisch war vorzüglich der Ausbruch der Petechien, weniger Urin, Stühle und Schweisse.

Ob sich die Beobachtungen Massa's auf das Jahr 1505 beziehen, können wir, da uns die Schrift selbst nicht zu Gebote steht, nicht entscheiden. Aus Haller's Auszüge aus derselben <sup>1)</sup> geht hervor, dass dieser Arzt die eigentliche Pest von dem Petechialtyphus noch nicht zu trennen vermochte, dass er aber in Bezug auf die Meinung von der Contagiosität der ersteren, so wie auf die Behandlung beider sich auf sehr geläuterte Grundsätze stützte.

Von den verschiedenen Ärzten wurde eine höchst verschiedenartige Behandlung der Krankheit eingeleitet. Einige suchten alles Heil in Blutentziehungen, Abführungsmitteln u. s. w., während Andere einer reizenden Methode, dem Gebrauche des Weins, nahrhafter Diät u. s. w., Andere dem armenischen Belus vertrauten, noch Andere eine ganz einfache, gelind antiphlogistische Behandlung einschlugen. Unter ihnen Fracastori, welcher je nach der Individualität des Falles die Kur einrichtete, vorzüglich aber sünerliche Getränke, schleimige Decocte u. s. w. in Anwendung brachte, und die höchste Aufgabe des Arztes in die Beobachtung des Weges setzte, durch welchen die Natur die Einleitung der Krisen bewerkstelligen zu wollen schien <sup>2)</sup>.

1) Haller, *Bibl. med. pr.* I. 531. — Nath Hecker's Urtheil hat Massa's Schrift nur geringen geschichtlichen Werth. (Hecker, *de engl. Schwestern* S. 38.)

2) Fracastori, l. v. *III. c. 6. in fine.* „*Interca vide, si quid natura possit et per quod viam? si quidem res ingratas, qui crampas nervorum, sine malis, sine pueris, neque juvenis, neque senectute, nisi virtutis eodati: si vero multo et corrupta per aliquam materiam exierit, neque hanc comprimit, nisi virtutis collatione pueris: et vero, si senectute expellatur, res quidem juvare oportet, si na-*



## Garotillo. Mundfäule.

Anmer einer Influenza im Jahre 1510<sup>1)</sup> sind bis zum Jahre 1514, außer der isolirten Notiz einer dänischen Chronik über eine im Norden Europa's<sup>2)</sup> und einer in Italien im Jahre 1513 verbreiteten Pest, keine Epidemien aufgezichnet. Eine Beschreibung der letztgenannten Epidemie findet sich bei Joh. Colle<sup>3)</sup>, und es geht aus ihr hervor, dass jene Epidemie im Jahre 1513 nach einer Hungersnoth herrschte, dass sie einen ausgeprägten typhus-putriden Charakter hatte, und dass sie sich häufig mit dysenterischen Zufällen verband. Im Jahre 1514 aber verbreitete sich vorzüglich in Italien und Frankreich die Mundfäule unter dem Rindvieh, vielleicht als mittelbare Folge der grossen Ueberschwemmungen dieses Jahres.

Die Krankheit beschränkte sich auf das Rindvieh und breitete sich von dem Forl'schen über das Venetianische aus. Zuerst verloren die Thiere die Fresslust, und die Untersuchung der Mundhöhle zeigte eine gewisse Rauhheit und kleine Pusteln am Gaumen und in der ganzen Mundhöhle. Darauf verbreitete sich das höchstwahrscheinlich mit unserer Klauenseuche identische Uebel in einer nicht näher angegebenen Weise über die vorderen und hinteren Extremitäten, und nur die Thiere star-

non pignu erat, illi, quae ad exitum morient et contempni simul contraria dant illi.  
— Vergl. Becker, engl. Schweiz, S. 28 ff.

1) Becker, der engl. Schweiz, S. 35 ff. — Schwabach, S. 32. — Ginge, S. 38.

2) Heufeld, Danemærke Neger Kruuske.

3) Vergl. unten S. 15. Die Hauptstelle des Ausgangs bei Colle gibt folgende Beschreibung der Krankheit (p. 388): — „*Interdum anno 1512 cum ingens fames assuaret curibato, plurimis constitutionibus, ingens frigus ad flum eam per-terrenaret, humida prorsus coloris rubicundus, phlegma, huiusmodi reser eugemon- tas; propter hoc tandem fuit contagium, dysenteria et nigra putrida in toto corpore laborare coeperunt, et fere omnia interibunt. Interdum cum propter fenum et sanguinem prorsus marentium, prorsus ruber excochimis et humido rolio et pedum inflatum ex umbilicali et etc. morbo impetebant, et revivunt aut nigra excochimis, intestina et uterum nigra stranguis effluibant, non enim bilis in cava calide et sicca excochimis erant; et sine fovebant unius, multos quoque, sciam, quia et alii excochimis; omnes ingens defecabant et per-vel alidant.*

[1562]

ken, wo eine heilsame Metastase der Art nicht erfolgte. Die Krankheit war offenbar contagiös und wurde durch Absonderung des kranken Viehes verhütet<sup>1)</sup>. Dieselbe Seuche erwähnt Fernelius auch für Frankreich, ohne indess in die Beschreibung der Zufälle einzutreten<sup>2)</sup>.

Eigentliche Volkskrankheiten werden erst im Jahre 1517 erwähnt. Diese ganze Krankheitsperiode, über welche es leider an genaueren Nachrichten fehlt, ist aber theils durch weitverbreitete Erschütterungen im Gesamtleben der Erde, Stürme, Erdbeben an ungewöhnlichen Orten (Calw, Nördlingen)<sup>2)</sup>, theils durch die ungesehnelte Aufeinanderfolge der Erkrankungen in der Pflanz-, Thier- und Menschenwelt interessant. — Ob die Krankheit zu Bologna, während der Belagerung durch die schweizerischen Truppen, welche Leo X. gegen Herzog Franz Maria von Urbino antworteten, eine durch die örtlichen Verhältnisse bedingte gewesen sey, oder ob sie mit andern Erscheinungen aus der Reihe der damaligen Volkskrankheiten in Verbindung gestanden habe, läßt sich nicht entscheiden. Die Noth bei denselben war so gross, dass das Volk selbst den Genuss von Human- und Katzenfleisch nicht schonte<sup>3)</sup>. In den bald darauf folgenden Seuchen der Thiere und Menschen aber offenbart sich so deutlich der zu Grunde liegende Charakter der Schlangpest, dass an dem innigen Zu-

1) Falsch! Lauten, ob auch, richtig, S. 37. — Schneider (H. 42) nennt diese Krankheit „Zungenkreuz“ und gibt von ihr eine Beschreibung, die von den Angaben Franchetti's, den er doch ebenfalls zitiert, nicht unwesentlich abweicht.

2) Pervuchina, de abbat. ror., eod., lib. II, cap. 12.

2) Schürer, H. GE. — Hecker, a. s. O. S. 47.

4) Sub. Ruedaditus, „*Die anno 1317 in Septembri, cum eadem Monasterio in vicinis ei Hilvelii in auxilium suum pontificis Lewis decessit contra ducem Cistac Franciscum Maris accurisaret, reserens carissos gutturos et glorias in obitu. Post obituem in casis eorum mortuorum acuta est. In multis casis eorum filibus appropinquat fugitia spoliata tertio quatuor. Belenae et Gloria Galan dicitur poepe ducem cum tremore monachum et sanguine fortiter per eum tunc discurrerunt et nocte arcebat et moliebant per hospitale monia Remane.*”

[2517.]

sammenhänge, aus der Identität der diese Gestaltungen hervor-  
rufenden urächlichen Verhältnisse nicht gezweifelt werden  
kann. Eine Seuche unter den Pferden in Navarra zeichnete  
sich durch Geschwüre im Rachen und am Kopfe aus<sup>1)</sup>; dem in  
der Epidemie dieses Jahres noch auf sein Vaterland beschränk-  
ten englischen Schweisse gesellten sich ebenfalls Thierseuchen  
bei, deren Pestnatur schon aus dem vergiftenden Einflusse er-  
hehlt, welchen die Berührung des gefallenen Viehes auf Hunde  
und Raben ausserte<sup>2)</sup>, und denen eine Drüsenpest folgte. Rech-  
nen wir hierzu noch die Angina-Epidemien, deren Forest für  
Holland, Wurstiassen für Basel erwähnt<sup>3)</sup>, ferner die allge-  
meine Verbreitung des Pestechaltypus in Italien, des Schweiss-  
fiebers in England, der Pest in Spanien, Portugal und bald  
darauf in Deutschland<sup>4)</sup>, der Verschleppung der Pocken in den  
neuen Continent<sup>5)</sup>, so gestaltet sich ein grosses Bild, dessen  
einzelne Gruppen, trotz mancher Verschiedenheit in Anordnung  
und Form, dem Kenner die genaueste Beziehung zu einem Mit-  
telpunkte deutlich verrathen. Ueberall sehen wir das Leben  
der Völker von gewaltigen Kräften erregt, körperlich wie gei-  
stig regen sich Elemente der Entwicklung, die, schon lange  
wohl im Stillen keimend, jetzt zu frischer jugendlicher Entfal-  
tung gelangen, Elemente des Segens und der Beglückung, des  
Verderbens und der Trübsal.

1) Vitulina. — Schnurrer, II. 64.

2) Schnurrer, a. a. O.

3) Forestus, *altiss. lib. VI*, ult. 2. Schol. — Vergl. Hecker a. a. O. S. 66. Mit Recht hat Hecker die Krankheit in Holland und in Basel dem Wesen nach für identisch, und nur darin verschieden, dass in Holland der entzündliche, in Basel der ausgeblühte Gährungs-Charakter überwiegt.

4) Wurstiassen, p. 188 (1515.) „Am Sommer d. J. erregte sich in und um Basel ein schrecklich Sterben, welches viel tausend Menschen hinweg.“ — J. Latham, *Circulo*, p. 287. „a. 1519 pestis contagiosa occupavit Francofurtum et totam Germaniam.“ — Michael Stettin, *Annal. Helvet.* p. 274. (1520). „Ein grosses Landsterben gieng über die Eidgenosschafft, insonderheit regierte diese Nothe streng und heftig in und um die Stadt Zürich. Zu Bern wurden meistentheils Knecht und Mägde in Grab getragen.“

5) Schnurrer, II. 68. Hecker, a. a. O. S. 76.



### **Petechialtyphus, typhöse Pneumonien, Trousse galante.**

Immer häufiger, immer deutlicher tritt in den Epidemien dieser Zeit, für Italien vorzüglich, der Petechialtyphus, der lateste Zeuge der ursprünglichen Pestconstitution der Zeit, hervor. Seit dem Jahre 1492 war derselbe in Italien fast nie ganz verschwunden, der beständige Begleiter der aus ihm sich entwickelnden und in ihn sich verlierenden Bubonenpest, welche namentlich in den Jahren 1524 — 1526 Italien bedrängte <sup>1)</sup>. Dem Heere der Franzosen vor Neapel hatte er den Untergang gebracht, Herzog Heinrich von Braunschweig, von Carl V. mit 1000 Reitern und 2 Regimentern Landsknechten gegen die Venetianer geschickt, verlor durch eine ähnliche Seuche fast alle Mannschaft und alle Pferde bis auf 16. <sup>2)</sup> Aber auch über die Grenzen des Kriegsschauplatzes hinaus erstreckte sich seine unheilvolle Macht.

Außer den Angaben des Fracastorius <sup>3)</sup> und der Bemerkung Massa's, welcher den anhaltenden Regengüssen des Jahres 1527 die allgemeine Verberitung der in Rede stehenden Krankheiten zuschreibt, gehört hieher noch die Beschreibung der Krankheitsconstitution dieses Jahres (1528) bei Montanus, nach welcher sich in Folge anhaltender Südwinde zuerst halbdreitägige Wechselfieber, dann Petechialfieber entwickelten <sup>4)</sup>.

1) In Florenz raffte die Pest im Jahre 1525 30,000 Personen hinweg. Macchiavelli vertraute dem Schatze specifischer Mittel, obwohl diese Menge Bionchetti di Faenza, einer der wenigen Aufgeklärten dieser Zeit, von dem sonst Nichts bekannt ist, für „papierne Panzer“ (*corrose di carte*) erklärte. Oranam, IV, p. 11.

2) Wirsingberger.

3) Fracastorius, *de morb. contag.* II, cap. 6.

4) Montanus, *de febre pestil.* cap. 32. — (*Opus. T. II.*) „Ubi fuerit australis constitutio per totum annum, fieri non potest, quin contingant febres et aggritudines pestilentes. Talis fuit nostrae aetatis aera 1528. quae gravissimum in tota Italia, quam universam fovea pestilens, et ego solo plurimum et egregius quidem modum praedixit illam febrem pestilentem, ut si una crassa videtur. Bona tunc incepit quorundam febrilia constitutio duplici tertiana, quae non interferebat, sed postea successit febris pestilens, quae pestilenter appellatur.

[1836.]

Eine Aufeinanderfolge, welche uns bei späterer Gelegenheit, wo genauer beobachtete Thatsachen vorliegen, ausführlicher beschäftigen wird. Vorzüglich werthvoll sind die Angaben eines, wie es scheint, bis jetzt unbekannten Arztes, Franc. Thomasius, welchem wir die Aufbewahrung einer Beschreibung der Krankheiten des Jahres 1528 verdanken <sup>1)</sup>.

Auffallend gross ist die Ähnlichkeit dieser Seuche mit dem schwarzen Tode in Bezug auf das äusserst ausgeprägte Lungenleiden, dessen Erwähnung Thomasius selbst in den übrigen Pestschriften vermisst, und welches deshalb als dieser Epidemie eigenhändig angesehen werden muss. Die Beobachtungen, welche Thomasius benutzte, beziehen sich auf das Thal Elsa, (dessen geographische Lage wir aller Nachforschung ungeachtet nicht näher bestimmen können); dort herrschte die Krankheit seit dem Januar 1528 sieben Monate lang in zwei Formen, von denen die erste in den zwei ersten Monaten die vorherrschende war, und sich als ein anhaltendes, mit heftigem Kopfschmerz und Blutspeien verbundenes, am dritten Tage tödtliches Fieber darstellte. In den späteren Monaten trat dagegen der eigentliche Pestcharakter der nun erst am 3ten Tage tödtlichen Krankheit deutlich hervor, und dieselbe liess vorzüglich nach, während (vom sechsten Monate an) Bubonen und andere Geschwülste zum Heile der Befallenen sich erzeugten. Das Blutspeien war man geneigt einem in der Lunge sich bildendem Abscess zuzuschreiben <sup>2)</sup>. — Ähnliche Krankheiten herrschten auch in der Schweiz <sup>3)</sup>, in Deutschland <sup>4)</sup>,

*ter, acerbissima admodum. Nam rursusque febris praeputium interperant flare eenti potentissimum et septentrionalibus partibus per quatuordecim dies, — statim cessante et praetermittente cum febri et emulsiatibus eenti.*

1) Vergl. Beckler, engl. Schveizer, S. 21, 2.

2) Thomasius, p. 53 u. 54: „Primum horum morborum fuit cum febre continua, maxime capite gravitate, quibus pinguis et moribundus infusus erat. In altero morbo intermissione cere fuit etiam cum febre continua, apudmodicis et putabile, et in quinque diebus homines moriebantur. — In fine autem morbi morbi praetermittuntur est, quia multi correpti a febribus aliisque humores in fine febris cessant.“

3) Guggenbühl, der Alpenstich, S. 13.

4) Hister, pathol. Univers. I, S. 237.

und in Frankreich gestalteten sie sich in eigenhändlicher Weise zur *Troussé galante*<sup>1)</sup>. Ob sie im erstgenannten Lande sich zum „Alpenstich“ bildeten, ist nicht zu entscheiden; zu vermuthen ist es, wenn mit Guggenbühl den Südwinden bei der Erzeugung dieser Krankheit die Hauptrolle zuertheilt wird, da diese Richtung der Luftströme im Jahre 1528 die vorherrschende war<sup>2)</sup>. Wahrscheinlich verbreitete sich die Krankheit von Norden nach Süden über Italien, wenn wir annehmen, dass das Thal Elva am südlichen Fasse der Alpen liegt, indem sie hier im Januar, zu Cremona im Februar, zu Neapel im Juni beobachtet wurde. (Hecker.)

Dass aber alle diese Uebel sich zuletzt in weitverbreitete Epidemien der Bubonenpest auflösten, dass mit diesen die ursprünglich pestartige Krankheitsconstitution dieser Zeit ihr Ziel erreichte, bedarf, als schon früher besprochen, keiner näheren Angabe.

Unter den Nachrichten über die Bubonenpest dieser Periode verdient diejenige hervorgehoben zu werden, welche sich in dem, wie es scheint, seltenen Werke des Johannes a Colle findet<sup>3)</sup>. Dieses, für die Geschichte der Medicin des 16ten Jahrhunderts überhaupt nicht unwichtige Schrift wird vorzüglich durch die Auszüge werthvoll, welche ihr Verfasser aus mehreren handschriftlichen Werken seiner Vorfahren über epidemische Krankheiten mittheilt. Unter diesen<sup>4)</sup> ist auch ein Auszug aus

1) Becker, 2. auct. Schöner, 8. 28, B.

2) Girenberg sagt ausdrücklich, die pestilenzischen Fieber seyen durch die das ganze Jahr anhaltenden Südwinde entstanden.

3) Colle, Joh. Rullianensis, *Medicina practica, sive methodus cognoscendarum et curandarum morborum effectuum malignorum et pestilentialium*. Pissori, 1632. Fol. (Im Besitz der Universitätsbibliothek zu Bonn.)

4) Die Titel dieser Auszüge sind folgende:

a) *Ex libello vetusto Dionisii Secundi a me Titiano Colle filio Leonis Inguarici collecto. De pestilentia 1148. 1151 et praeparatione pestilentiali et alijs alijs.* —

(7 Kapitel auf obenverl. Seiten. —)

Da diese gleichzeitige Dokum. zur Geschichte des schweren Todes mittern Wiesens auch als verifizirlich worden ist, so haben wir kein Bedenken ge-



[1531.]

einer Schrift seines Vaters, Georg. Colle (eines Rechtsgelehrten) *de constitutione pestilenti Bellouacensi decessante, anno 1537*, enthalten <sup>1)</sup>).

Im Gefolge dieser Bubonienpest bildeten sich gewiss an vielen Orten Krankheiten von ähnlicher Eigenthümlichkeit, als die Epidemie des Gallenfiebers in der Dauphinée war, von welcher uns Valleriola <sup>2)</sup> eine so gute Beschreibung gibt.

### Wechselfieber, Valleriola.

Der Winter des J. 1531 war sehr reich an Regen. Selten wechelten Nordwinde mit den beständig verhenden Südwinden

nugen, das 1. Kapitel desselben, welches die Beschreibung der Krankheit enthält, im Anhange unter I. mitgetheilt.

b) *Medicina Historiarum Vincentii et Bernardi Colle de quibusdam epidemicis et malignis et pestilentialibus constitutionibus atque variolis ab egregio et strenuo viro Daniele Colle ejusdem collectis.* —

Nach dieser Abhandlung, welcher sich auf das Jahr 1440 bezieht, findet sich ausgesprochen im Anhange unter II. abgedruckt.

c) *Ex libello Georgii Colle patris auctoris, — de constitutione pestilenti Bellouacensi decessante, anno 1537.* (S. die Anmerkung.)

d) *Annotat. Colle Bellouacensis et Georgii filii — de constitutione pestilenti cum vixit paulatim universi corporis et dysenteria Zandam decessante, 1512.* (S. oben S. 16.)

e) *Bernardus de Colle Bellouacensis Georgii filii. — De pestilentia Angerdam oppidum decessante anno 1547, cum vomitu, deliria, ardente febre et illi.*

Findet sich im Anhang im Anhange unter III. —

Diese sämtlichen Schriften sind ein gewisser Stephanus Gornae von Trident, der sich selbst den Diener des Joh. Colle nennt, bei dem Verkauf der dieser Familie gehörigen Güter im Jahre 1553 und besorgte ihren Abdruck. Aus seiner kurzen Vorrede zu dieser Sammlung, noch mehr aber aus der des La Davinae Archangelus Ariminensis zu dem ganzen Werke geht hervor, dass die Familie Colle eine der ältesten und angesehensten Häuser war.

1) In der Unterschrift wird 1537, im Texte selbst 1521 als das Jahr der Epidemie genannt.

Joh. Colle, l. c. p. 584. „Cap. 1. Gravissima Bellouacensi pestilentia anno 1521 decessit. — Constitutionis humida et austriaca ad unum duntaxat pervenit. Postea pluvialis acutissima febris et vehementissima vixit corporis, delirabat unum cum maximo cordis dolore, urinis turbidis et nigris, ingenti jastralione, lingua laevissima et atra, extrorsum et bulosum, alii uridebant, ferocissimi correpti extrorsum.“ —

2) Valleriola, *essent. medic. lib. IV, cap. 7.*

ab; der folgende Sommer war wolkig, nebelig, warm und trocken. Unter diesen Umständen herrschten, wie es scheint, in nicht sehr bedeutender Ausdehnung, pestartige, mit Bubonen, Karbunkeln u. s. w., begleitete Fieber. Nachdem diese Krankheiten mit dem Sommersolstitium verschwunden waren, verbreiteten sich schwere, anhaltende sowohl als intermittirende Fieber, (welche seit je in der Dauphinée endemisch waren), letztere vorzüglich mit dem Tertiantypus, ohne dass indeß die Intermission eine vollständige gewesen wäre; — die gewöhnlichen Vorläufer epidemischer Krankheiten und die beständigen Zeugen der engen Verbindung ihrer einzelnen, der Form nach oft so verschiedenen Glieder. — Die Krankheit befiel Personen jedes Alters und Geschlechts, und begann mit einem starken äusserlichen Froste, dem heftige Hitze folgte; in den Remissionen aber trat entweder gar kein Schweiß ein, oder er erleichterte die Kranken nicht im Geringsten. Der Urin war dabei trübe und gefärbt, aber ohne ein Sediment; die Stühle flüssig, gallig, ungekocht. Die meisten Kranken erbrachen unter heftigem Würgen, Schloechzen und Magenschmerz gallige Stoffe. Dazu gesellte sich äusserste Unruhe, die nur selten mit soporösem, von Delirien und schweren Träumen unterbrochenem Schlafe abwechselte. Bei Vielen stellten sich Convulsionen ein. Der Durst war sehr bedeutend, die Zunge trocken und rau, der Schlund exulcerirt, die Sprache schwer, es fand heftiges und anhaltendes Herzklopfen Statt, und bei den Meisten beendigte tödtliche Dysenterie die traurige Scene. — Nichts war im Stande die Krankheit zu heben oder auch nur die Leiden der Befallenen zu vermindern, denn auf jeden Nachlass folgte nur eine um so heftigere Exacerbation, und selbst die Natur brachte nur unvollkommene, durchaus nicht erleichternde Krisen zu Stande. Trat Schweiß ein, so war er nur unbedeutend, und auf Hals und Nacken beschränkt, die Stahlabgänge unbedeutend und roh. So zog sich die Krankheit lange hin, und Viele starben, nachdem sie durch Erbrechen oder durch den Stuhl unter hef-

[1844.]

tigen Leibes Schmerzen grasgrüne Stoffe entleert hatten. Vallériola selbst genas, nachdem nur tödtliche Tage Krisen der oben bezeichneten Art eingetreten waren. Bei Andern ging die Krankheit gegen den Herbst in Quartanfieber, Milzanschwellungen und Wassersucht über, und dann machte oft heftiges Nasenbluten dem Leben ein Ende. Abgang Fleischwasser-ähnlicher Stoffe und schwarzen Blutes durch den Stuhl war oft günstig, wurde aber oft auch so übermäßig, dass es zu seiner Stillung der Styptika bedurfte. Von Petechien oder andern Hautaffectionen ist durchaus Nichts erwähnt. Von allen Mitteln leisteten gelinde, Abführungsmittel das Meiste.

Es ist nicht ganz leicht, den Charakter der geschilderten Krankheit näher zu bestimmen; aber ausgemacht ist es, dass ihr ein allgemeineres Leiden zu Grunde lag, in welchem sich neben der hervortretenden Hineigung des Uebels zum Wechselfieber (wie über vorzüglich der Anfang, das Ende der Krankheit und die Folgeübel bewiesen), eine Affection des Magenlebersystems hervorstechend ausbildete. Die Gefahr der dysenterischen Zufälle erwecken zwar den Gedanken an geschwungene Zerstörungen der Darmschleimhaut, aber leider fehlt es an jeder Bestätigung einer solchen Vermuthung, die nur in den zu damaliger Zeit noch ganz ungebräuchlichen Leichenöffnungen ihre Quelle finden könnte. Grossen Antheil an der Langwierigkeit der Krankheit hatte höchst wahrscheinlich die Zaghaflichkeit der Aerzte, welche die Erfolglosigkeit der gewöhnlichen Behandlungsweise dergleichen Affectionen von jedem neuen Heilversuche abschreckte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der frühzeitige Gebrauch der sich später in ähnlichen Formen des Petechialtyphus so sehr bewährenden Brechnmittel die offenkundigen Heilbemühungen der Natur vortheilhaft unterstützt hätte, während im ferneren Verlaufe vielleicht die, freilich noch eben so sehr als die Ipecacuanha unbekannte Peruvinde <sup>1)</sup>

1) Die China wurde erst im Jahre 1644 nach Spanien gebracht, die Ipecacuanha erst seit 1688 allgemein bekannt. Sprengel, Gesch. d. Med. IV. 542 B. 543.



dem Grundcharakter des Leidens schöcklich entsprechen haben würde<sup>1)</sup>.

Ähnliches möchte von einer späteren Epidemie gelten, welche derselbe ausgezeichnete Beobachter im Jahre 1544 zu Arles sah, und welche hier ebenfalls eine Stelle finden mag.

Nach einer ausführlichen Beschreibung der Lage und der epidemischen Verhältnisse von Arles, unter denen vorzüglich die freie Lage der Stadt, in einer durch die, häufig über ihre Ufer tretende, Rhone sehr sumpfigen Gegend hervorgehoben wird, schildert Valleriola die Witterung des Winters 1543. Derselbe war sehr warm und in Folge zahlreicher Regengüsse äusserst feucht, der herrschende Krankheitscharakter war der katarrhalische. Dagegen war der Frühling kalt, es herrschten Nordwinde, zuweilen mit Regen-bringenden Südwinden abwechselnd, und diese Kälte dauerte den ganzen Sommer hindurch fort. Unter diesen Verhältnissen verbreiteten sich intermittirende und anhaltende Fieber, von denen die ersteren meistens den Tertiantypus zeigten, sehr lange dauerten, und wieder vollkommen ausgebildete Paroxysmen noch gehörige Remissionen offenbarten.

Im Uebrigen beschreibt Valleriola die Erscheinungen der Krankheit, namentlich die Affectio der Unterleibsorgane, ganz so, wie für das Jahr 1531, nur mit dem Unterschiede, dass in jener Epidemie häufiger phrenitische Erscheinungen, in der gegenwärtigen mehr soporöse Zufälle vorkamen. Auch hier bildeten sich durch Hust, Harn und Stuhl nur sehr unvollständige Krisen, bei den Meisten aber erschienen, was in der früheren Epidemie nicht der Fall gewesen war, am den 14. Tag Hautausschläge („*effluventiae ex cute*“), die Valleriola leider nicht näher beschreibt, die aber höchst wahrscheinlich fieselfartige Petechien waren, indem neben denselben „*coriae ex-tuberationes, cum pruritu, rubore et lacciditate*“ erwähnt werden.

1) Nach den vorstehenden Angaben ist das zu ergänzen und zu berichtigen, was wir im ersten Theile (S. 172) über diese Epidemie mitgetheilt haben.

[1518.]

Es kommen zwar auch nach Wechselnfebern sehr häufig äußerst verschiedenartige Hautausschläge vor, und man könnte geneigt seyn, dafür die Haupteruptionen des Valleriola zu halten. Indess scheint die Zeit ihres Ausbruchs für unsere Ansicht zu sprechen, die sich auch mit der Annahme der Wechselnfebernatur des Uebels sehr wohl verträgt. — Recidive traten sehr häufig, selbst nach unbedeutenden Diätfehlern auf, und häufig zog sich die Krankheit bis zum Herbst hin. Der Tod erfolgte entweder unter den Zeichen allgemeiner Schwäche, oder unter ruhrartigen Zufällen; bei Vielen entstand Anasarca, bei Andern colligative Erscheinungen, bei Einigen profuses Nasenbluten, bei den Meisten Abzehrung. Vorzüglich gefährlich war die Krankheit dem kindlichen Alter, dagegen wurden Greise und Schwangere seltner, Letztere aber abdam an zu heftiges befallen. Die von ihnen geborenen Kinder waren ausserordentlich schwächlich und starben bald wieder, die Mütter aber erholten sich sehr langsam. So war es unter Andern bei Valleriola's eigener Gattin der Fall. — Valleriola behandelte die Krankheit bei kräftigen Personen mit dem Aderlass, nassendern mit verdünnenden und gelinde eröffnenden Mitteln. Vorzügliches Vertrauen aber setzte er auf ein ausserst complicirtes Cardiacum aus aromatischen und gewürzigen Substanzen; eine indirecte Bestätigung vielleicht, unzer Vermuthung über die Intermittens-Natur der Krankheit.

**1536 und 1537. Petechialfieber. Typhöse Pneumonien. — Massa. Mundella. — 1540. Kriegstypus. — Colle. Kepser.**

Sehr kurz scheinen nach Haller <sup>1)</sup> die Angaben bei Massa über die Petechialfieber und typhösen Pneumonien zu seyn, welche im Jahre 1535 in Italien, nach Mundella 1537 vorzüglich zu Brescia und in der Lombardei herrschten <sup>2)</sup>. — Von

1) Haller, *Bibl. med. pr.* I. 522. — Massa's Schrift (*De febre petechiali* Verc. Faust. 1540?) stand uns nicht zu Gebote.

2) Mundell's *Archiv. medicinal.* 36. p. 324. (K. Saml. 1541.)

der Pestperiode aber der Jahre 1540 — 1543 <sup>1)</sup> berichten nur die Chroniken. 1541 wurde Constantinopel durch die Pest verheert, und wahrscheinlich hatte der Feldzug dieses Jahre in Ungarn viel Einfluss auf die weitere Verbreitung der Krankheit, obgleich es scheint, dass die mörderische Seuche, welche das von Joachim II. von Brandenburg befehligte Reichsheer bei Pesth fast gänzlich aufrieb, originären, obwohl pestverwandten Ursprungs gewesen sey <sup>2)</sup>. Die wahre Pest indes verbreitete sich, obwohl in gelinderer Weise und stets wie es scheint mit dem Petechialtypus verbunden, im Jahre 1563 bis in die Harz-, Saale- und Moselgegenden.

So beobachtete Kesper <sup>3)</sup> im Jahre 1544 zu Bamberg heftige Krankheiten, die er, wie die meisten Aerzte des 16ten Jahrhunderts als *pestis* und *febris pestilens* aufführt, ohne indes, wie aus den von Pfefner <sup>4)</sup> mitgetheilten Notizen aus seiner Schrift hervorgeht, etwas Wichtigeres mitzutheilen.

Um diese Zeit (1545) begegnen wir in Frankreich dem Petechialtypus unter dem Namen der *Trause galeste*. Hecker hat bereits die Erscheinungen und den Zusammenhang dieser Krankheit mit den gleichzeitigen Ereignissen auf dem Gebiete der Volkskrankheiten vollständig abgehandelt <sup>5)</sup>, und es kann allenfalls noch für das genannte Jahr auf das Zusammentreffen der *Trause galeste* mit gestartigen Krankheiten an vielen andern Orten aufmerksam gemacht werden, deren allgemeiner Verbreitung vielleicht auch die höchst ungünstige Witterung desselben Jahres Vorrecht leistete.

So herrschte im Jahre 1547 unter einem Theile der kaiserlichen Armee in Deutschland kurz vor der Schlacht bei Mühl-

1) Vergl. Hecker, a. a. O. 8. 114 B.

2) S. das Nähere in dem unten folgenden Abschnitte über die asiatische Krankheit.

3) Kesper, Silvius, *Consultatio aulicorum de venis et venarum Epilemiae vice profertur aucti Raurigenensis epidemiam inter tempora ingratissima*, S. 2. et c. (Die Vorrede ist von 1544. Das Thurn'sche Bibliothek zu Villingen bewahrt ein Exemplar dieser äusserst seltenen Schrift.)

4) Pfefner, Beiträge zur Geschichte des Petechialtypus.

5) Hecker, a. a. O. 8. 114 B.



[1343.]

berg eine ansteckende Seuche, welche nach Thuanus Beschreibung, in welcher keine Ruhen und Karbunkeln, aber „verminantes papulae“ erwähnt werden, als ein sehr bössartiger Kriegstypus angesehen werden muss<sup>1)</sup>. So wurde die Ueier Zusammenkunft im Juni durch den Ausbruch einer Krankheit gestört, so starben zu Lübeck von Pfingsten bis Martini 68,277, zu Dresden 5103 Personen an der Pest, die auch noch in den folgenden Jahren zu London, an der Ostsee<sup>2)</sup>, in Schwaben, zu Basel u. s. w. grosse Verheerungen anrichtete<sup>3)</sup>. Für das Jahr 1547 findet sich eine interessante Nachricht bei Joh. Colle, über eine Petechialfieberepidemie, die sich im Gefolge von Hungersnoth und Krieg (— Maximilian I. befandte in dieser Zeit die Venetianer —) zwei Jahre lang in Italien verbreitete. In der im Anhange unter III. auszüglich gegebenen Beschreibung dürfte vorzüglich das originelle und erfolgreiche Heilverfahren des Volkes von Interesse seyn. In England erschien im Jahre 1551 die letzte auf ihre Geburtsstätte beschränkte Schutissfieberepidemie; zu Eisleben im Jahre 1553 die „Hauptkrankheit“<sup>4)</sup> zu Copenhagen, wo sie die Anländer verschonte<sup>5)</sup>, zu Paris<sup>6)</sup>, zu Mexina die Pest, und unter

1) Thuanus, *hist. sui temp. Edit. Francof. in 8. 68. II.*, p. 378. „*Illae aegae, quae ex Zairensis exaruerat, postea sequentibus, quod milites de praeis conlagione, quae eo anno tota illa regione magnam irrogem dederat, infecti essent. Eius anni erat illi, ut multis illis morbis in tam nova degenerantibus, ingenti fere virore se recipiantur, atqueque saluberrimum ex capitis veste dolorem sentiret, insensibus et insensibus morbis, tam angustiantibus et difficili respirantibus, ut fidei spiritus recedantur: verbi similes et omnigeni coloris bellaeque ejusdem, postremo corpora illa corollae patias, quae pallide, circumstantibus passim populo latifolia. Talis dicitur alterum vel tertium ex nobis habuerat, aut diximus aut illis propter periculum excubantur, aut antequam ad nos esset omnia videret ex contagione serpenti morbo italem excubant.*“ —

2) Liefand wurde durch eine fünfjährige Pest verödet. Hystow Heilighenstet Chonok.

3) Vergl. Schurzen.

4) Ekmundus, *hist. morbi etc.*, p. 92.

5) Utrikus (us), *hist. progr. recel. angl. cop.*, 4. 288 ff.

6) Zu Paris beobachtete Palmarina die Krankheit.

dem Hornvieh in der Gegend von Luzen herrschte eine Epizootie des Anthrax <sup>1)</sup>.

**1555 und 1556. Pest in Oberitalien. — Landus, de Bonagentibus. — In Deutschland. Willeh. Luther.**

Die Pestepidemien des Jahre 1555 und 1556 in Oberitalien verdienen in der Geschichte der Pest eine um so genauere Betrachtung, als sie theils bis jetzt noch nirgends berücksichtigt worden sind, theils weil sie auf die Umgestaltung der gangbaren Ansichten nicht ohne den heilsamsten Einfluss waren.

Nach Lancelotti wurde im Jahre 1555 die Pest durch Waaren nach Venedig eingeschleppt, und von hier aus nach Padua verbreitet, wo sie von Baxsianus Landus beobachtet und beschrieben wurde. Die Nachrichten des genannten Arztes indessen sind nur kurz, und beziehen sich vorzüglich auf die Nachweisung des rein contagiösen Ursprungs der Seuche, deren weiterer Verbreitung die feuchtwarme Frühlings- und Sommerwitterung des erwähnten Jahres Vorschub leistete. Die Krankheit brach zu Padua Ende Mai aus, und zeigte sich durchaus als echte Bubonenpest, wenn auch gleichzeitig der sogenannte Petechialtypus häufig vorkam, über dessen Verhältniss zum eigentlichen Pest sich Landus in der befriedigendsten Weise äussert. Dieser vortreffliche Beobachter stellt sich in seiner kleinen, aber überaus werthvollen Schrift vorzüglich die Aufgabe, den rein contagiösen Ursprung dieser Pest nachzuweisen, und die Meinung dorer zu entkräften, welche die Entstehung derselben entweder dem Zorne der Gottheit <sup>2)</sup>, der Verderbniss der Luft oder sonstiger Zerrüttung der Elemente zuschrieben. Leider ist in derselben Nichts über den Verlauf der Epidemie, ihre Tödtlichkeit u. s. w. aufgezeichnet, da sie während derselben als Flugschrift abgefasst wurde.

1) Knoch, *Faber die Seuche unter d. Hornvieh* p. 76.

2) „Non est verisimile (causam) esse Gravi Dei, quoniam hoc est peius, et infoliam.“

[1554.]

Drei andere Schriften über diese Pothianische und Venetianische Pest von Oddus de Oddis, Boechalinus und Ludov. Paxinus konnten wir nicht benutzen<sup>1)</sup>.

Durch thatsächliche Ergebnisse der angeführten Art trat in dieser Zeit die durch Uebertreibung zum Aberglauben gewordene Meinung von der Entstehung der Pest durch Vergiftung der Luft immer mehr vor der Ueberzeugung ihrer Verbreitung auf rein contagiosem Wege zurück. Die über diesen wichtigen Punkt geführten Streifigkeiten bestätigten es auf auffallende Weise, wie hartnäckig sich eine eingewurzelte, wenn auch noch so unsinnige Theorie den offenkundigen Thatsachen widersetzt. Die ersten Vertheidiger der Contagiosität der Pest hatten mit Axiomen der Schule zu kämpfen, die uns gegenwärtig wahrhaft lächerlich erscheinen; stellte man doch der Contagiosität selbst Schlussfolgen wie die folgende entgegen: „Krankheit und Gesundheit sind einander entgegengesetzt, Entgegengesetztes aber verhält sich gleich. Nun ist die Gesundheit nicht ansteckend, folglich auch die Krankheit nicht“<sup>2)</sup>.

Die Venetianer indessen hatten schon längst, weniger in der Theorie als in der Praxis das Rechte erkannt; die Ausdehnung ihrer Handelsverbindungen, namentlich mit dem Orient, begünstigte gerade bei ihnen die Entwicklung einer Ansicht, welche, wie es scheint, dem Volke fast früher, als den Aerzten geläufig war. Schon im Jahre 1540 hatte Nicolaus Massa die Pestangelegenheit als einen vorzüglich der Fürsorge des Staates obliegenden Gegenstand geschildert, aber erst Victor de Bonagentilens erwarb sich das unsterbliche Verdienst, die Contagionstheorie in einer fast Nichts zu wünschen übrig lassenden Weise durchzuführen<sup>3)</sup>. Erst später freilich konnte

1) Oddus de Oddis, *De peste et pestiferorum affectionum omnium causis, signis, praeservatione et curatione libri II.* Faust. 1578. 4. —

Boechalinus, J. F., *De causis pestilentiae Venetiae anni 1554.* Faust. 1556. Paxinus, Lud., *De pestilentia Patetion anni 1555.* Pat. 1558. 8. — *Annali Medici.* 1. Halber.

2) *Methodus Medica*, de pesti, cap. 3.

3) Vergl. die nähere Darlegung seiner Verdienste bei Lussanier, *Die Pest*



selbst in Italien die Wahrheit allgemein durchdringen, und an-  
 lingen zu reden, grösstentheils wohl zu Folge des mächtigen  
 Einflusses des „Reformators“, die deutschen Pestschriftstel-  
 ler, selbst noch im 18ten Jahrhundert, von Zorn Gottes, Ver-  
 giftung der Luft u. s. w., während dem Contagium zur ne-  
 bebei eine gelegentliche Erwähnung gegönnt wird. Trotzdem  
 erhoben sich doch auch in Deutschland schon sehr früh ge-  
 wichtige Stimmen für die Wahrheit, und als eine der bedeu-  
 tendsten muss eine kleine Schrift von Jodocus Willichius  
 betrachtet werden, welche Dryander nebst einem Auszuge  
 aus einer kleinen Schrift Luthers und einem in gleichem Sinne  
 geschriebenen Vorworte im Jahre 1553 abdrucken liess. Beide  
 Schriften sprechen sich unbedingt für die contagiöse Ursache  
 der damaligen Pest aus, namentlich aber muss Luther's An-  
 rede an das Volk als ein Meisterstück kräftiger Vermahnung  
 zu dem rechten Verhalten betrachtet werden<sup>1)</sup>. Vorzüg-  
 liches Interesse haben die Angaben über den Frevel ein-  
 zelner Büchsen, die entweder, um durch Ansteckung Ander-  
 er sich der eigenen Krankheit zu entledigen<sup>2)</sup> oder selbst um  
 des leidigen Trostes der Gemeinschaft willen, absichtlich  
 die Krankheit verbreiteten. Luther nennt sie „böse pestilen-  
 zische Leute, Mörder und Bösewichter“ und überantwortet sie  
 der ganzen Strenge der weltlichen Obrigkeit, — Schandthaten  
 dieser und ähnlicher Art sind zu allen Zeiten vorgekommen.  
 In der Galenischen Pest übten die Piqueurs ähnlichen Frevel,  
 und sehr häufig schreiben die Schriftsteller dieser Zeit die lange  
 Dauer der Pesten gleicher Verworfenheit zu.

des Orients, 8. 42 ff. — Ueber die Lebensentzündung Runnunga (c'a) haben wir  
 nirgends etwas angegeben.

1) Da wir diese kleine Schrift Luthers bis jetzt in keiner Ausgabe seiner  
 Werke abgedruckt haben, so haben wir kein Bedenken getragen, einen Auszug  
 aus derselben im Anhange mitzutheilen.

2) Dieser noch nicht ermittelte Volksglaube beruht an sich auf richtigen  
 Beobachtungen. — In jeder Krankheit verlieren die individuellen Erkrankungen an  
 Bizarrität, sobald sich das Contagium entwickelt, wenn auch mit diesem die  
 Vorbereitung des Uebels nach der Zahl der Erkrankungen wechselt. So der schwarze  
 Tod, die Pest und die contagiösen Krankheiten. Die hin und wieder vorgekom-

[1557.]

**1557. Tabardillo in Spanien. Vallesius, Toreus, — Coyttarus.**

Auch in den folgenden Jahren fehlte es nicht an schlimmer Krankheitsbeurtheilung; die Chroniken und einzelne Schriften (Lebenwaldt, — Klein, Zevelli), berichten von Pestseuchen zu Wien, in der Gegend von Florenz und an andern Orten. In Spanien herrschte der Petechialtyphus, Tabardillo, Tavardeite, vom Volke Pintas genannt, in solcher Allgemeinheit, dass man die Epidemie dieses Jahres für die erste hielt. Vallesius und Toreus schrieben über die Krankheit. Die Schrift des Letzteren war genau zu jener Zeit vorzüglich, für uns indes enthält sie wenig Besonderes <sup>1)</sup>. Ebenso herrschten diese Fleckfieber in der Gegend von Poitiers, wo sie an Coyttarus einen vortrefflichen Beobachter fanden. Der nachstehenden Darstellung des wesentlichen Inhalts seiner (von uns selbst nicht benutzten) Schrift liegen zunächst Rosenbaum's Mittheilungen <sup>2)</sup> zu Grunde.

In dem Distrikte Anais, dem jetzigen Departement Nieder-Charente geboren, practicirte Coyttarus zu Poitiers, und beobachtete hier und da in der Umgegend, vom Mai bis zu Weihnachten des Jahres 1557, eine Petechialfieberepidemie, welche, wegen Unbekanntheit der damaligen Aerzte mit dieser Krankheit, eine nicht geringe Verheerung anrichtete. Eine Hauptveranlassung zur Herausgabe seiner Schrift war für Coyttarus die Nichtigkeit einer andern des Dr. Nicolas Michaelex, Dekans der Aerzte zu Poitiers, in welcher zugleich die grüßten Anfälle auf die übrigen Genossen der Kunst enthalten waren. — Sorgfältig schildert Coyttarus die kosmischen und tellurischen Verhältnisse, welche dem Ausbruche der Epidemie

einer Schilbung von ausseren Mädchen, durch syphilitische und gonorrhoische Mägen oft in der gleichen Absicht ihre Veranlassung.

1) Der Titel des sehr seltenen Werkes von Toreus lautet sich im Schriftenverzeichnisse.

2) Becker's Archiv, Bd. 18, Febr. S. 178. — Vergl. auch Haller, *ibid.* vol. 18, 211. — Sprengel, *Gesch. d. Med.* III, 235.

vorhergegangen. Wichtiger als die Angabe des Kometen vom März 1556 ist die Bemerkung, dass vom Aufgange der Plejaden bis zum Herbstäquinoccium eine brennende Hitze herrschte. Hierauf regnete es mehrere Tage anhaltend, und dann folgte eine ziemlich heftige Winterkälte, welche bis zum Ende des Februars 1557 anhielt. Dann regnete es wieder bis zum April, wodurch grosse Nässe entstand, und hierauf folgte abermals eine ziemlich starke Hitze, die im September von einer plötzlich eintretenden Kälte verdrängt ward. — Im Frühlinge des Jahres 1557 herrschten in Poitiers und der Umgegend Mäsem und Pocken unter den jüngern Bewohnern, gleichzeitig aber keine andern Krankheiten, mit Ausnahme einiger sporadischen Fälle von Faulfebern, die aber bei passender Behandlung meist leicht geheilt wurden. Gegen den Mai begann nun an mehreren Orten Purpura zu wüthen, und den tödten dieses Monats brach die Krankheit auch in Poitiers aus. Sie hielt bis zu Weihnachten an, und verschwand dann, nachdem lange Zeit Nordwind geweht hatte. Während die Purpura noch mit verheerender Wuth um sich griff, erschien glücklich im Anfange des Septembers mit dem schnellen Eintritte der Kälte die Influenza<sup>1)</sup>, über welche sich bei Coyttarus mehrere Bemerkungen finden<sup>2)</sup>.

Was nun die Krankheit selbst betrifft, so herrschte sie, wie gesagt, nicht bloss zu Poitiers, sondern auch zu Rochelle, Angoulême, Bourdeaux, Tours etc., überhaupt in der jetzigen Vendée, Charente und Gironde, und zwar namentlich in den ersten Monaten mit einer solchen Wuth, dass eine Menge Menschen sehr schnell, sie mochten in ärztlicher Behandlung gewesen seyn oder nicht, starben: ja die Zahl der Todten fast grösser war, als in den Pestzeiten, da viele schon vor Schreck und Todesfurcht ins Grab sanken.

1) Schweich, die Infamien, S. 58, (wo statt „Pestes“ Poitiers zu lesen ist.) — Gluge, die Influenza, S. 51.

2) Carverre (Bibl. de la mort.) führt noch folgende Schrift von Coyttar an: „Dissertation de la vengeance et autres maladies populaires, qui ont eu cours à Poitiers en 1559.“ Poitiers 8. (n. n.)



[1325]

Fast alle Mittel zeigten sich Anfangs fruchtlos, weder über den Namen, noch über die Natur der Krankheit konnte man einig werden, Aerzte und Volk waren in Verwirrung. An den Kranken aber bemerkte man Folgendes: Sie fühlten zuerst grosse Mattigkeit und Trägheit in den Gliedern; drückenden Kopfschmerz; bei den meisten rütheten sich Anfangs die Augen, wenn das Fieber heftig war; Rachen und Kehle waren zusammengeknüpft, und ein eigenthümliches Gefühl zwischen den Schulterblättern vorhanden. Das Fieber war Anfangs bei Vielen gelinde, sie gingen noch herum und verrichteten ihre Geschäfte, Andere dagegen überboten gleich Anfangs heftig, waren entweder schlaflos und unruhig, konnten weder sitzen noch gehen, und wollten dennoch vor Unruhe und Hitze nicht ins Bett bleiben; oder sie waren comatös und blieben es bis zum Tode. Obgleich die Kranken über heftige innere Hitze klagten, so zeigte doch weder Temperatur noch Puls etwas Widersprüchliches, oder wenigstens nur geringe Abweichungen, meist fühlten sie sich vielmehr kühl an; der Puls war unentwickelt, selten, oft dem gesunden ähnlich. Die Zunge war in den ersten Tagen sehr rau und trocken, der Athem stinkend; Einige waren verstopft, Andere hatten Durchfall, sie mochten Medicin genommen haben oder nicht; die Stühle waren dünn, übelriechend. Der Urin dünn, wässerig, gelblich; ein Eosystem in der Mitte habend; oft war er während der ganzen Krankheit dünn und crud; öfter noch konnte man aber gar kein Urtheil aus demselben entnehmen. Das Fieber zeigte sich sehr verschieden, und C. theilte danach, indem er noch die Dauer der Krankheit berücksichtigte, diese noch in verschiedene Formen, in pathologischer und therapeutischer Hinsicht ein. Nämlich 1) *Purpura cum igne*; 2) *Purpura cum febre continua acutior*; 3) *Purpura cum febre maligna continua acuta*; 4) *Purpura cum febre continua ex accidentis acuta*; 5) *Purpura cum febre longa et mixta*. Die Krankheit endete zuweilen erst gegen den 31sten — 40sten Tag unter profusen Schweissen; nicht selten entstand auch ein bedeutender Len-

denabscess. Selbst Abscesse in den Muskeln der epigastrischen Gegend beobachtete man, die leicht für Leberabscesse, welche übrigens auch vorkamen, genommen werden konnten. Meist fiel diese längere Dauer der Krankheit in die Monate Juli und August. (Also vor dem Erscheinen der Influenza!) Bei Einigen konnte man Tertiantypus in den Exacerbationen wahrnehmen: sie bekamen an einem Tage zweimal Frost und Hitze, und an folgenden Tage nicht. Niemals erschien aber die Krankheit unter irgend einer Form von Intermittens. (Dennoch sagt C., dass die Krankheit zuweilen den Charakter einer böartigen Intermittens gehabt habe!) Niemals sah man Epidämie, wohl aber Epidämie damit verbunden, was auch Dr. N. Michaelis in seiner Schrift bemerkt. Ausserdem beobachtete man auch Hepatitis, Nephritis und Encephalitis mit der Purpura vergesellschaftet. Merkwürdig war die zahlreiche Menge von Spulwürmern, welche durch Mund und After, bei Einigen gleich Anfangs, bei Anderen auf der Höhe der Krankheit, oder in der Zeit der Krise ausgeleert wurden. Nur bei Einigen beobachtete man dies nicht, und dann fand man sie meist in den Leichen. In den 10 oder 12 Leichen, welche C. untersuchte, fand er sie an verschiedenen Orten, im Dickdarm, Dünndarm oder im Magen. Ihre Grösse zeigte deutlich, dass sie nicht in einem oder zwei Monaten entstanden waren, sondern viel früher; denn diese entstehen nur in dem Menschen, wenn eine Verdaulichkeit der Säfte vorausgegangen ist.

Was nun die Petechien betrifft, so äussert sich Coyttar darüber auf eine Weise, die gar keinen Zweifel übrig lassen kann, dass sie, und nicht Frösel, wie so Viele geglaubt haben, hier das begleitende Symptom waren. Bei Allen, sagt er, ehe sie ihren Geist aufgaben, brachen Flecke auf der Haut aus, in Gestalt von Blutstropfen, welche auf den verschiedensten Theilen des Körpers zerstreut, vorzüglich Arme, Brust und Schenkel bedeckten. Meistens sah man sie am 4., 7. und 14. Tage hervorbrechen, bei Einigen jedoch auch erst den 20. (s. Vorr.). Auf das Fieber hatte ihr Erscheinen meistens keinen Einfluss,

[1517.]

nur zuweilen waren sie bei der synochischen Form der Krankheit kritisch, was auch Prof. Rondelet zu Montpellier beobachtete. (Vorr.)

Was das Wesen der Krankheit betrifft, so ist es eine *febris continua epidemialis*, bei der an den kritischen Tagen Flecke auf der Haut erscheinen, die das Produkt einer im Inneren sich befindenden giftigen Materie sind. Denn der Name Purpura bezeichnet nicht sowohl eine besondere Krankheit, als nur ein Symptom derselben. Während bei der Pest vorzüglich die Lebensgeister ergriffen sind, ist bei der Purpura vorzüglich das Blut afficirt, und zwar im Centro. Obschon sie meist, wie jetzt, nur epidemisch erscheint (wir beobachteten sie mehrmals in unseren Provinzen), so wird sie doch auch zuweilen sporadisch beobachtet, wo sie aber leicht den ymasenden Mitteln weicht. Ausstreckend war die Krankheit nicht, da immer nur Einer oder der Andere aus einer Familie davon ergriffen ward und starb, während in der Pestzeit ganze Familien ausstarben, wenn erst einer ergriffen war. Dennoch muss man sie, wegen der Wuth, womit sie in den ersten drei bis vier Monaten ihre Opfer ergrieff, einen *Morbus epidemicus pestilens* nennen. Neu war die Krankheit eigentlich nicht. Die Alten kannten sie wahrscheinlich, rechneten sie aber zu den Exanthemen, wie ja noch jetzt die meisten Praktiker Purpura wie Morbillen beschreiben und behandeln; oder sie herrschte früher nicht so epidemisch und pestilenzialisch, wie sie Fracastori in Italien sah, und wir bei uns mehr als einmal! Was die Ursachen der Krankheit betrifft, so liegen sie vorzüglich in der Luft, die auf eine eigenthümliche Weise verderbt ist. (*Purpura vero et ambientis aeris vitio in humana corpora insculpi ostendimus.*) Namentlich ist der Grund in dem schnellen Witterungswechsel, der in diesem und dem vorhergehenden Jahre Statt fand, zu suchen.

Denn meist ging verhinderte Ausdünstung bei den Kranken vorher. Viele erkrankten unmittelbar, nachdem sie vom Regen durchnässt waren, und sich mit den nassen Kleidern zie-



dergelegt hätten. Auch sind die Bewegungen der Gestirne, das Erscheinen des Kometen in Anspruch zu nehmen. Der Uebereinstimmung der Alten mit den letzten Momenten ist namentlich die mangelhafte Kenntniss mehrerer Krankheiten zuzuschreiben.

Der Genuss schlechter Nahrungsmittel ist zwar auch mit in Anschlag zu bringen, nur darf man nicht zu viel darauf geben, da Krankheit bei verschiedenen Menschen ausbrach, die keineswegs eines und dasselbe genossen hatten. Uebermäßige Ausübung des Coitus trug ebenfalls zur Entstehung der Krankheit bei. Obgleich Leute jedes Standes, Alters und Geschlechtes, Knaben, Jünglinge, Jungfrauen, Menschen in der Blüthe der Jahre, Greise, Bauern, Städter, Arme wie Reiche und Vornehme, Priester, Mönche, sowie Frauen jedes Alters und Standes von der Krankheit ergriffen wurden und starben, so herrschte dieselbe doch meist unter dem gemeinen Volke, von dem die meisten ein Opfer derselben wurden, weil sie entweder keinen Arzt hatten, oder dessen Vorschriften schlecht befolgten.

Die Uebrigen waren meist kakochymische, plethorische und solche Subjecte, die schon längst an Obstructionen und Schwäche innerer Theile gelitten hatten. Auch Schwangere erkrankten, namentlich erwähnt C. die Geschichte zweier, von denen die eine, 6 Monate schwanger, den vierten Tag der Krankheit Abortus erlitt und an *Haemorrhagia uteri* starb, weil sie durchaus den Aderlass verweigerte; die andere, im vierten Monate der Schwangerschaft, ward gerettet, und gebar zur gehörigen Zeit glücklich.

Die Behandlung der Krankheit gibt nun Ceyttar im zweiten Bande, nachdem er zuerst eine lange Litanei über die Unwissenheit der Aerzte seiner Zeit, und die Frechheit derselben, Krankheiten behandeln zu wollen, die sie nicht verstehen, abgesungen hat. Anfangs sey weder Aderlass noch Arznei nöthig, wenn nicht *Synocha* oder andere dringende Symptome sich zeigten. Wenn deutliche Zeichen, namentlich galliger Creditäten, vorhanden sind, gibt er Emetica, die oft

[1857.]

die ganze Krankheit endigten. Dagegen war Vorsicht nöthig bei dem Gebrauche von Abführmitteln, welche höchstens im Anfange der Krankheit passten. Die Hauptsache beruht bei eingemessenen erheblichen Symptomen auf Aderlass, der aber nicht zu stark seyn darf! denn 7 bis 8 Unzen sind vollkommen hinreichend. Dagegen war es oft nöthig, besonders bei der synochalen Form, die Venäsection zwei- bis dreimal zu wiederholen; denn wenn dies nicht geschah, so entstand meist eine nicht zu stillende Blutung aus der Nase, und die Kranken mussten ohne Rettung sterben. In Hinsicht der Zeit hatte C. sie sowohl am 3., als am 18., 22., selbst 25. Tage der Krankheit mit Glück vorgenommen und wiederholt. Das zum zweitenmale entleerte Blut war meist dick, schwarz oder aufgelöst. Bei Vielen bemerkte man schon nach einer solchen zweiten Venäsection, die meist nur aus 4 bis 6 Unzen bestand, auffallende Besserung, es stellten sich allgemeine copiose Schweisse ein, und die Kranken genasen. Bei der bereits erwähnten vier Monate Schwangeren hatte er am fünften Tage der Krankheit, zwei Tage nach dem Ausbruche der Flecke, eine Venäsection von 8 Unzen gemacht, und sie genas, wie gesagt, ohne Abortus zu leiden. Bei deutlich ausgesprochener *Phrenitis illiasta* er *V. cephalica* oder *frontalis*, und wenn dann die Symptome nicht schwinden, liess er die Haare abschneiden und *Ol. rosar.*, *Nuc. jagl.*, oder *Amygdol. amar.* einreiben, in gelinderen Fällen aromatische Kräuterkräusen auf die Stirn, oder Leinwandlappen mit den genannten Oelen bestrichen auflegen. Bei Schmerzen in der Magenregion, Einreibungen aus Salben von *Ol. mentic.*, *Ol. rosar.*, *Ol. papav.* uß. Ähnliche Einreibungen und Ueberschläge auf das Herz, das ja vorzugsweise afficirt ist, so wie auf Milz- und Nierenregion. Innerlich wurden überall herzmädische Tränke gegeben. Sehr ausführlich gibt C. die Krankengeschichte und Behandlungsart seines ersten Patienten an. Die Krankheit war mit Synochus verbunden, daher gleich Anfangs eine Venäsection von 8 Unzen; das Blut war hellroth und gerann; C. glaubte, es würden sich *Paradoxe* bilden, bis

*Purpura* am dritten Tage erschien. Dann liess er ihn baden, abermals eine Ventosection von 4 Unzen machen, und gab *Potio benzoedrat*; die Krankheit entschied sich durch Schweiss, und der Patient genas.

Vorzügliches Interesse bietet die in das Jahr 1556 fallende Verbreitung des *Scarhuts* an den Küsten der Niederlande, von welcher schon im ersten Theile dieser Schrift berichtet worden ist <sup>1)</sup>, zu welchem sich vielleicht die Kriebelkrankheit als ein Genos gesellte, der vor Allen geeignet war, die Bösartigkeit des Uebels zur äussersten Höhe zu steigern.

Das Jahr 1557 ist ferner nicht allein durch die schon oben erwähnte *Influenza* <sup>2)</sup> und durch die Fortdauer der im vorhergehenden Jahre hegenden Senche, sondern vorzüglich durch die Epidemie der *Buboneugest* zu Delft ausgezeichnet, welche *Forestus* beobachtete.

#### Pest zu Delft. 1557. *Forestus*.

*Forestus* <sup>3)</sup> schreibt einen grossen Antheil an der ersten Entstehung dieser Pest der Verderbniss der Säfte zu, die durch die Theuerung der vorhergegangenen Jahre, welche durch die habstichtigen Künste der Kornwucherer noch gesteigert worden war, nach seiner Meinung entstehen musste. Es ist indessen nur zu wahrscheinlich, dass auch diese Pest nicht isolirt dasteht, sondern mit den Verheerungen zusammenhängt, welche in derselben Zeit von *Gratiolus* <sup>4)</sup> und *Cornarius* <sup>5)</sup>

1) *Haver. path. Univers.* L. 178 ff.

2) Die kurze Beschreibung, welche *Leiden* a. d. d. von demselben gilt, mag hier eine Stelle finden:

„Diese Landplage war mit schweren Schmerzen des Hauptes, schmerzhaftem Athem, Husten u. s. w., der Hals voll Heiserkeit; der Auswurf war blutbeim; aber es folgte Verlust aller Kräfte, aller Speises Verdauung, Angestaltlichkeit des Herzens. Sobald eine Person ergriffen ward, bekamen es alle im Hause ohne Unterschied, gross und Klein, Mann- und Weibspersonen: tief aber gramem nieder, unter die Kinder, welche arbeits alle starben, weil sie die Brust durch den Auswurf nicht ertragen konnten.“

3) *Gratiolus, comment. de peste.*

4) *Cornarius, de peste.* (Nicht von *van Arsat*.)



[1553]

für Braunkind, Liefkind, Pommern, Sachsen, Thüringen und die Rheingegenden angegeben werden.

Die Pest war zuerst in einem Dorfe, „Anticastro“, zwischen Haag und Delft ausgebrochen, verbreitete sich aber bald, nach Forest's Angabe durch den Marktverkehr, in die letztgenannte Stadt, deren tiefe, von Sümpfen und Gräben stehende Wassers umgebene Lage nach Forest's Meinung die Verbreitung sehr beförderte. Einige Zeit vor dem Ausbruche waren, bei Kindern vorzüglich, exanthematische Fieber, bei schwangeren Frauen Abortus, vorgekommen, und die Nachwächter wollten häufig Feuer auf die Strassen niederfallen gesehen haben, — vielleicht Nichts Anderes als eine abergläubische Uebertreibung der Beobachtungen in den Sternschnuppennächten des Mai's. Forestus selbst beobachtete im Jahre 1556 einen Kometen, nicht ohne theilverkündende Ahnung. Im Juni war sie sehr verbreitet, aber ihre Höhe erreichte sie, wie in vielen andern Pesten dasselbe beobachtet wird, in den Händtagen. Sie dauerte durch den ganzen Winter dieses bis in den Mai des folgenden Jahres fort, und raffte zuweilen in einem Tage hundert Opfer dahin. Schon im September wandte sich die bedrängte Stadt an Forestus um Hülfe, der indess, an der in Alkmaar herrschenden Angina darniederliegend, erst im Winter nach Delft kommen konnte, um seinem Freunde Ericus in der Behandlung der Pestkranken beizustehen. Die gesammte Todtenzahl in der Stadt belief sich auf 5000, Jene ungerechnet, die in der Umgegend umkamen, auf welche sich die Pest verbreitete, nachdem sie in Delft nachgelassen hatte. — Wie immer wurde auch hier vorzüglich die ärmere Volksklasse befallen, um so mehr, da man, wie es scheint, auf das Contagium keine Rücksicht nahm. Dagegen litten die höheren Stände vorzugsweise an den halbdreitägigen Fiebern, welche wie es so oft, namentlich bei einer so begünstigenden örtlichen Eigenthümlichkeit geschieht, nach dem Aufhören der Pest erschienen.

Die von Forestus geschilderten Erscheinungen bieten nichts Besonderes dar. Carbunkeln in der Nähe der Augen

zogen in der Regel Verlust derselben nach sich<sup>1)</sup>; wie dies geschehen sey, darüber liest uns Forest eben so im Unklaren, als Thucydides, der in der atheniensischen Pest dasselbe bemerkte.

Eben so entspricht die von Forest eingeschlagene Behandlung den bewährtesten Anforderungen einer naturgemässen Therapie. Den Aderlass wandte er nur bei Plethorischen, und auch hier nur beim ersten Beginn des Uebels, während der ersten 12 Stunden an, später war derselbe, wie zahlreiche Erfahrungen bei Solchen bewiesen, die sich unberufenen Quacksalbern, Barbieren und Todtengräbern überliessen, in der Regel eben so tödtlich, als der Gebrauch der Purganzen. Forest erkannte sehr richtig die hohe Bedeutung der allgemeinen Hautkrise, und suchte diese durch zeitige Verabreichung von *Alexipharmacis*, die er, selbst wenn sie anfänglich wieder weggehoben wurden, consequent fortgab, herbeizuführen. Dem erlitzenden Theriak, dem kurz vorher Jakob Theodosius, auf Versuche an vergifteten Tauben gestützt, alle giftwidrige Kraft abgesprochen hatte<sup>2)</sup>, vertraute er weniger. — Wie viele Opfer sind wohl diesem namenlos unsinnigen Gemische gefallen, welches noch im 18ten Jahrhundert einer übergläubischen Verehrung genoss! —

Aus dem Jahre 1558 hat sich eine Schrift von Ingrassias über eine Epidemie zu Palermo erhalten, über deren Charakter wir Nichts wissen, da uns die Einsicht jenes Werkes, welches mit dem für das Jahr 1576 nicht zu verwechseln ist, versagt war<sup>3)</sup>. Ozanam<sup>4)</sup> bezieht die Nachrichten bei Ingrassias auf die Influenza der Jahre 1557 und 1563<sup>5)</sup>. Das Letztere

1) „(Carbunculi) qui eadem scabies ardeat quod trisma ex illa oritur, quia patitur oculis orbatur etc.“ Foresti l. c. p. 153.

2) Haller, *Med. med. pr.* II. p. 59.

3) Ingrassias, *J. Phil.* Ragguionamento fatto sopra l'Infermità epidemica dell'anno 1558. Palermo. 1568: 4.

4) Ozanam, l. 162.

[1562.]

gilt auch von einer zweiten, in der Anmerkung genannten Schrift <sup>2)</sup>).

**Allgemeine Verbreitung der Pest. Ingrassias.**

**Gemma, Porcell, Joubert, Plater.**

Ueber die nächsten Jahre berichten die Chroniken von Erdbeben, Meteoren, u. s. w. aber erst im Jahre 1562 werden weiterverbreitete Krankheiten erwähnt, deren Charakter keinen Zweifel übrig lässt, wenn man erfährt, dass dieselben im genannten Jahre Alexandrien, Constantinspel, Oesterreich, Steyermark und Franken heimsuchten, (Wintzenberger) und sich sodann im Jahre 1563 über ganz Deutschland, wo sie zahlreiche Volkskriegen hervorriefen <sup>3)</sup>, Frankreich, Spanien und England verbreiteten.

So sicher aber auch angenommen werden darf, dass der Verbreitung der Pest das Contagium zu Grunde lag, so sicher scheint es auf der andern Seite, dass eine allgemein verbreitete Krankheitsansteckung den Verheerungen der Pest den bedeutendsten Vorschub leistete. Cornelius Gemma <sup>4)</sup> schildert die von ihm in Holland beobachtete Witterung des Jahres 1562 als sehr unbeständig. Im Januar und März wütheten furchtbare Orkane, anhaltenden Regengüssen folgten Ueberschwemmungen und eine Krankheitsconstitution, welche offenbar als typhus bezeichnet werden muss. Ausser häufigen Wundschmerzen und Fehlgeburten, so wie sehr schwerer Beendigung des Geburtsgeschäfts kamen Dysenterieen, und bei dem Herrn ich eine Krankheit vor, bei welcher sich Würmer in der Leber, in den Lungen und im Darmkanal erzeugten. Zu drohenden Vorzeichen am Himmel (Sonnenfinsternisse) gesellten sich im Jahre 1563 Erdbeben mit Gewittern zu unangenehmlicher Zeit; (am 27.

1) Peucer, Balib., *Oratio, qua continetur commemoratio de peste, quae fuit per Europam negata.* Frib. 1568. 8.

2) Im Jahre 1562 erschien: Gabriel Ajala, *ceremoniae per uera indicia de hoc pestilentiali elegitum liber unus.* Antwerp. 1562. 4. (Fen.)

3) Cressus, de natur. diuin. clausul. lib. II. p. 10 seq.



Januar) Ueberschneemungen (am 10. Juli), und um das Elend des Landes voll zu machen, so folgte auf den harten Winter der vom 9. December 1563 bis zum April 1564 anhielt, und in welchem die gesammte Vegetation erlag, Theurung <sup>1)</sup> und Pest, welche letztere namentlich Brüssel verödete. Und zu dieser gesellten sich nun, der deutlichste Zeuge einer entwickelten typhösen Krankheitsstimmung, im Jahre 1564 die allgemein verbreiteten typhösen Pneumonien, deren wir nebst den übrigen Erscheinungen dieser Zeit auf dem Gebiete der Volkskrankheiten im ersten Theile <sup>2)</sup> ausführlich gedacht haben, so wie endlich noch der Scorbut.

Ähnlichen Charakters dürften die Krankheiten gewesen seyn, welche nach Bruguer im Jahre 1562 zu Barcellona und in der Umgegend herrschten. Aus dem Titel der unten genannten Schrift geht wenigstens die Neuheit und Eigenthümlichkeit der Krankheit hervor <sup>3)</sup>.

In Augsburg dauerte im Jahre 1563 die Pest vom Mai zum October, und raffte täglich 70 Menschen hinweg; in der Gegend von Erfurt herrschten seit dem Jahre 1562 anhaltend böartige sehr verheerende Fieber und Gelbsucht, zu Danzig starben im Jahre 1564 an der Pest über 32,000 Menschen <sup>4)</sup>; weit und breit herrschte sie in Frankreich, wo sie Simon Simonius beobachtete <sup>5)</sup>, London verlor 20,000 Einwohner durch dieselbe, und von Frankreich her fand sie der strengsten Spermasoregeln ungeachtet den Weg nach Barcellona, wo ihr vom Mai bis December 10,000 Opfer fielen. Dort beobachtete und beschrieb sie Porcell <sup>6)</sup>, zu Montpellier Laur. Joubert; hier konnte sie indess nur in ein Ham, durch Verschleppung von

1) Diese Theurung war nach F. de Villiers allgemein verbreitet.

2) Hist.-pathol. Catal. I. S. 205. F.

3) Bruguer, Oisiphrius, *Nomen et morbus circa Agrammum, quatuor diebus in Barcinonensi et faustis circa Agrammum observatus anno a Christo vero 1562 etc. scriptis, breviter narratis Barcinonae, 1562. 8.*

4) H. Leustreidl.

5) Simonius sah häufig die Kranken ganz plötzlich starb Fieber und Gelbsucht sterben. (S. 8.)

6) S. d. Schriftverzeichniss. Ueber den Inhalt derselben vergl. Schaeffer.

[1565.]

Lunel aus eindringen <sup>1)</sup>. Zu Basel starben 4000 Personen <sup>2)</sup>. Vorzüglich heftig indess wüthete die Krankheit zu Lyon.

**Lyon.** — Schon im Frühjahr 1564 kamen einzelne Pestfälle vor, die man indess nicht beachtete und selbst für eine Erdichtung der Protestanten ausgab, erfanden, um den König Carl IX. von einem Besuche der Stadt abzuhalten. Indess nahm das Uebel bis zum Winter, wo es aufhörte, so furchtbar überhand, dass man die gesamte Todtenzahl nach genauer Zählung auf 60,000 bestimmen musste. Am meisten litten die in der Stadt sehr zahlreichen Protestanten, denen der Geschichtsschreiber einen türkischen Fatalismus und eine Verblendung beimeist, welche sie verhinderte, der von Gott über sie verhängten Strafe durch vernünftige Maassregeln zu entgehen. Hüthlich erwähnt derselbe die fromme und anopfernde Fürsorge eines jesuitischen Priesters, Pater Edmond, für die Kranken <sup>3)</sup>.

**Hamburg.** — Zu Hamburg herrschte die Bubonepest bei warmem, nebligem Wetter noch im Jahre 1565. Sie war von Lübek her eingeschleppt worden, und man war von ihrer contagiösen Verbreitung vom Orient her überzeugt. Zuerst wurden Frauen, vorzüglich Schwangere, Jungfrauen und Greise, seltner Jünglinge und Männer ergriffen. Unter dem Zufällen wird tiefer und anhaltender Schlaf, unter den therapeutischen Bemerkungen die Tödtlichkeit des Aderlasses und der Purganzen hervorgehoben <sup>4)</sup>. Höchst wahrscheinlich hängt mit dieser Epidemie auch die weitte Verbreitung der Pest in Thüringen, namentlich zu Weimar im Jahre 1566 zusammen <sup>5)</sup>.

H. 197. Dasselbe auch die näheren Notizen über die Verbreitung der Seuche, denen wir im Oligon Oligon ergänzend beigelegt haben.

1) Lant. Jonstet, *de peste, cap. 2 et apothemat. à l'île, de peste, cap. 2.* — Vergl. Sprengel, III. 245.

2) Plater, S. Othman, IV. p. 12.

3) Rukys, *Mémoire de la ville de Lyon. Lyon. 1664. p. 401. 404.*

4) Bockst, (S. Schreiberstracha), dessen Schrift übrigens von sehr unlegendarem Werthe ist.

5) Vgl. Kärner, Pflüchdel.

**Leyden. Ueberschwemmungen in Holland.**

Auch Leyden litt in diesem Jahre an derselben. Hier wiederholte sich die häufig beobachtete Rachlosigkeit der Todtengräber, welche die Wände der Häuser (angeblich) mit Pestreiter verunreinigten, um die Bewohner aus denselben zu vertreiben und sich in den Besitz der zurückgelassenen Habe zu setzen<sup>1)</sup>. — In den folgenden durch Misgeschick jeder Art für die Niederlande so unheilvollen Jahren fehlten auch mannigfaltige Krankheiten nicht. Den Regengüssen des Jahres 1567 folgten häufige katarrhalische Affectionen und Anginen; die unendlichen Bedrücknisse des von Alba seit 1567 6 Jahre lang verheerten und seiner edelsten Kräfte beraubten Landes erzeugten durch ihre unheilvolle und aus dem allgemeinen Jammer nur zu erklärliche Rückwirkung auf das geistige Leben bei Vielen Schlagflüsse, Epilepsie und Melancholie, und auf vielen Punkten herrschten Pest und bösartige Petechialfieber. So zu Löwen und der Umgegend. — Zu diesem Unheil gesellten sich im J. 1569 Ueberschwemmungen, welche namentlich die letztgenannte Stadt hart betrafen und an den Küsten erneuerte der Scorbut seine so häufig behauptete Herrschaft. Das Jahr 1570 war wieder von Ueberschwemmungen bezeichnet, welche fast alle übertreffen, die in den Annalen dieses Landes aufgezeichnet sind. „Ein anderer schrecklicher Unfall,“ sagt Curth<sup>2)</sup>, „traf das Land am 1. November 1570, und es schien fast, als hätte die Natur sich mit den Menschen zum Untergange desollen verschworen. Von einem heftigen Orkan ergriffen, stürzten die Wellen des Meeres plötzlich an jenem Tage mit unwidertestlicher Gewalt wider die Dämme, welche die nördlichen Provinzen gegen seine Wuth beschützen sollten, dass sie diese künstlichen Brunnwehren durchbrachen; das offene Land über-

1) Boreangelinus, *de pestib.* p. 176. Wahrscheinlich gehört hierher Telleus, Petr. Jac., *Actio judicialis ad sanatum Lugdunensem in angustissimo praesentis et nocturno furore.* Lugd. 1577. 8. (Hallier.)

2) Curth, *der niederländische Revolutionskrieg.* (Fortsetzung von Schiller's Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande.) S. 25.



[1576.]

schwemmen, und über Holland, Seeland, Friesland und Flandern eine allgemeine Verwüstung verheereten. Der Schade war unermesslich, und mehr als 20,000 Menschen wurden von den Wellen verschlungen. — Ganz Europa theilte seine Theilnahme an diesem Unfall, nur Alba blieb ungerührt, und liess sich durch keine Vorstellung bewegen, den verunglückten Provinzen die gewöhnlichen Steuern zu erlassen.<sup>1)</sup> — Zu diesen Bedrückungen gesellten sich in diesem Jahre die Ruhr, die Märsen und die Pest, welche diesmal vorzüglich vom Juni bis zum October Brüssel und Antwerpen verödete<sup>2)</sup>.

1) Cuvier, *Essai sur les caractères*. II. p. 40 u. s.

## II.

### Die ungarische Krankheit, 1566<sup>1)</sup>.

Wir begegnen auf dem Gebiete der Volkskrankheiten von Zeit zu Zeit einzelnen Erscheinungen, bei denen es ohne nähere Untersuchung aller bei ihrer Entstehung und in ihrem Fortgange oluauftender Verhältnisse ungewiss bleibt, ob bei denselben untergeordnete Einflüsse der Oertlichkeit, des Zufalls und der geschichtlichen Wendung der Ereignisse, oder die allgemeinen Gesetze, unter denen der Ursprung und die Verbreitung weit ausgedehnter Volkskrankheiten stehen, mit andern Worten, ob lokale, gewissermassen endemische, oder allgemeine epidemische Verhältnisse eine grössere Rolle spielen. Der beschränktere Blick des oberflächlichen und nur das Nächste ins Auge fassenden Beobachters ist stets geneigt, das den Sinnen sich Darbietende als die nächste Ursache solcher Ereignisse anzuklagen; das schärfere Auge des umsichtigeren Forschers findet fast stets, bei aller Wichtigkeit, die er jenen von der Oertlichkeit und dem Zusammentreffen der Umstände dargebotenen und in Wirksamkeit gesetzten Verhältnissen zuzuschreiben genöthigt ist, noch eine höhere und allgemeinere Beziehung, einen innigen Zusammenhang scheinbar isolirter Ereignisse mit den allgemeinsten und durchgreifendsten Umgestaltungen allgemeiner Lebens- und Krankheitsverhältnisse.

Gesetze solcher Art treten in Wirksamkeit, wenn sich ursprünglich sporadische Krankheiten, wenn sich endemische See-

1) Vergl. den von Becker bearbeiteten Artikel „Hungariae pestis“ in des Verfässers Kryptographie medic. Wissenschaften.

[1866.]

chen zu epidemischer Verbreitung steigern; und häufig genug sehen wir, dass die verheerendsten Pandemieen in einer solchen Entfesselung örtlich gebundener Mächte des Unheils ihre Quelle finden. Bei einseitiger Berücksichtigung der am Nächsten gelegenen Erscheinungen begegnet es dann in der Regel, dass man das Räthsel der Verbreitung durch ein noch schwierigeres Problem, durch die bequeme Satzung der Contagion lösen zu können glaubt, zumal da häufig genug dieser Weg der Verbreitung neben anderen weit geheimnissvolleren Bedingungen derselben, eine Hauptrolle spielt.

Der Cyklus der Krankheiten, als deren Mittelpunkt das ungarische Fieber erscheint, beginnt schon mit dem Jahre 1542. In den Jahren 1539—1542 schien das Toben unheilvoller Mächte, welches vorher kein Jahr die Völker Europa's mit den Verheerungen weitverbreiteter Krankheiten verschont hatte, zu ruhen. In dem Genuss des Friedens und der reichen Ernte des letztgenannten Jahres erholten sich die Menschen von den Drängsalen der vergangenen Zeit. Aber nur zu bald brach neues Verderben herein, nur zu bald loderte die Kriegsfackel wieder empor, und gerade auf einem Punkte, der vor vielen andern zur Erzeugung verheerender Krankheiten geeignet war.

Kaum wurde ein Land Europa's von der Natur mit schöneren Gaben gesegnet als Ungarn. Eine unglaubliche Fruchtbarkeit, die den Bewohnern nicht allein die Nothdurft des Lebens fristet, sondern ihm auch Bequemlichkeit und Reiz verleiht, Reichthum der edelsten Früchte, Fülle des künstlichen Weins, fischreiche Ströme und Seen, ein südlicher Himmel; Alles vereinigt sich, um wenigstens seine südlichen Provinzen zu einem reichbeglückten Lande zu machen. Und doch schreckt ein altes Wort den Fremdling von seinen Grenzen zurück, dennoch warnt es namentlich die Stämme des nördlicheren Europa vor dem Eintritt in das Tod bringende Land.

Dicht neben dem Füllhorn des Lebens steht die Schale des Verderbens! Die fast übermässige Vegetation, die zahlrei-



chen Seen, die Überschnemmungen der Fluren durch Europa's grössten Ström, die Donau, der eine grosse Anzahl untergeordneter Flüsse sich zugesellen, die angedelmten Sümpfe und Moräste (vorröglieh im Gebiete der Theiss), die Trägheit und Unreinlichkeit des gemeinen Volkes, Alles vereinigt sich, um Ungarn einen Charakter zu ertheilen, dem nur noch eine tropische Sonne und verpestete Ausdünstungen unbeerdigter thierischer und menschlicher Leichen fehlen, um eine Gleichstellung seiner endemischen Schädlichkeiten mit denen Aegyptens zu rechtfertigen. In der That herrschen in dem südlichen Theile Ungarns fast fortwährend bössartige Krankheiten, dem Geschlecht der Wechsellieber und der Typhen zugehörig, und sie verhindern verflüglieh den Flor des Landes, zu welchem dasselbe sonst wohl ohne Mühe gelangen würde.

Unter diesen Krankheiten ist eine der häufigsten ein gastrisch-typhöses Leiden, welches von den Eingebornen je nach dem Vorwiegen des einfach gastrischen oder des typhösen Elements Tsemor (Tsömör, Tschemmerle, oder Hagymatz genannt wird<sup>1</sup>). Der Tsemor ist Nichts als ein einfaches gastrisch-billiges Fieber, welches fortwährend nach der Einwirkung von Diätfehlern u. s. w. vorkommt. Der Hagymatz aber tritt in der Regel in epidemischer Verbreitung auf, und ergreift Personen jedes Alters, Geschlechts und Temperaments, vorzüglich indess Plethorische und die ärmern, in schlechter Wohnung, bei schlechter Diät lebenden Volksklassen. Die Krankheit beginnt in der Regel mit einem gelinden Froste und allgemeiner Abgeschlagenheit, Kopfschmerz und Ueblichkeit. Oft, namentlich bei sporadischem Auftreten, ähnelt es bei diesen leicht vorübergehenden Erscheinungen des Tsömör. Oft aber steigert sich der Frost zu einem bedeutenden Grade, der Kopfschmerz wird un-

<sup>1</sup>) Kreysel, ein geborner Ungar, versichert in seiner Dissertation (s. d. Schriftverzeichniss) dass ihm die Etymologie des Wortes Hagymatz unbekannt sey. — Kötter dagegen, ein Niederländer, führt als Stimmwort „Hagyma“ an, welches Zwißel bedeutet. (Die Schwärme der Hagymatz-Kranken sollen wie Zwißeln riechen;) vielleicht erhielt die Krankheit nach dem Namen e. *zumbilus*.) (*De zumbula mafferrona*, Odov. 1160. Voss.)

[1866.]

erträglich, so dass oft das Bewusstsein schwindet, und dem Froste folgt die heftigste Fieberhitze, unersättlicher Durst, gänzliche Appetitlosigkeit und Ekel vor jeder Speise, äusserste Angst, und vorzüglich ein constanter drückender Schmerz in der Magengegend, von häufigem Erbrechen begleitet; das Gesicht erscheint bleich und aschfarbig, die Kranken sind sehr unruhig, bewegen fortwährend die Extremitäten, verlassen ihr Lager, zeigen Neigung zum Entfliehen. Die Lippen erscheinen trocken, die Zunge schwärzlich belegt, rissig, geschwollen, die Sprenge wird, vorzüglich wenn Parotiden hinzutreten, unartikuliirt, der Athem schwer, häufig, kalt und stinkend; die Kranken klagen über Ohrenklingen, Einige verlieren selbst das Gehör, die Nächte sind bald schlaflos, bald finden tiefer Sopor, Convulsionen, Delirien Statt. Die sich einstellenden Schweisse sind meist partiell, wenig reichlich und kalt; der Stuhl ist meist verstopft, selten durchfällig. Die Exacerbation der Krankheit fällt meist in die Abendstunden. Zu diesen constanten Erscheinungen gesellen sich häufig, nach Verschiedenheit der individuellen Constitution, der Lebensweise und der epidemischen Einflüsse, katarrhalische Affectionen, Petechien, ruhrartige Durchfälle, anginöse Beschwerden, Nasenbluten, Parotiden, Lähmungen. Nichts ist in dieser Krankheit veränderlicher als der Puls; im Allgemeinen weicht indess derselbe zu Anfang wenig von seiner Normalität ab, während er später auf der Höhe der Krankheit klein, schwach, aussetzend und leer, oft aber auch, im Gegensatz zu den übrigen Erscheinungen des allgemeinen Sinkens der Lebenskräfte, stürmisch und fieberhaft wird. Aehnliche Unbeständigkeit zeigt auch der Urin. So dauert die Krankheit meist 2—3 Tage; ihre Entscheidung aber erfolgt meist unter häufigen Schweissen, symptomatischen Blutungen, Durchfällen, Geschwülsten hinter den Ohren, oder unter den Achseln und in den Weichen.

So beschreibt Schniller <sup>1)</sup>, ein österreichischer Arzt, im Jahre

1) Der Titel der auch im Manuscripte (Disputat. ad usum. etc. n. 40), findet.

1726 die Krankheit seines Vaterlandes, welche untreifelhaft als der Prototyp der Epidemie anzusehen ist, welche in der Mitte des 16ten Jahrhunderts die Reihen der christlichen Heere in Ungarn lichte, und deren typhöser, der wahren Bubonensepest ebenso als ihrem europäischen Repräsentanten, dem Petechialtyphus, verwandter Charakter auf den ersten Blick erkannt wird. Wenn aber Schuller bei Aufzählung der Ursachen des Uebels allgemein epidemischen Schädlichkeiten einen eben so grossen Einfluss als diätetischen beimißt, Cober dagegen, ein Norddeutscher, Feldarzt im kaiserlichen Heere, der zu Ende des 16ten Jahrhunderts ebenfalls eine Epidemie des in Rede stehenden Uebels beobachtete, letzteren in der Aetiologie des Uebels die Hauptrolle zuschreibt, so scheinen sich beide Ansichten sehr einfach dahin vereinigen zu lassen, dass durch die bloße Einwirkung der diätetischen Schädlichkeiten die einfache sporadische Form des Uebels, der Typhus, beim Hinzutritt der entsprechenden epidemischen Einflüsse der pestartige Hagymatz entsteht.

Cober gibt höchst schätzbare Notizen über die von ihm als *Legeor panonica* bezeichnete Krankheit, die er selbst in Folge des Felddienstes zu überstehen hatte. Es wurde von derselben bei der Belagerung von Papa im J. 1597 (Papa, ein befestigter Marktflecken in der Wexprauer Gespanschaft, wurde 1524 von den Türken erobert, 1597 aber von Erzherzog Maximilian wieder gewonnen), charak. die Noth auch die vorsichtigeren Ungarn zwang, sich des schlechten Trinkwassers aus den Lagergruben zu bedienen, vorzüglich die Italiener, (über 8000 Mann seldesener Truppen), ergriffen. Die Krankheit lichte ihre Reihen mehr als das Schwert des Feindes, und nur Wenige (man sagte 500) kehrten über die Alpen zurück.

Zu den Hauptursachen des Hagymatz gehört nach Cober die Nichtbenutzung der so nöthigen Vorsichtsmaass-



(1266.)

gels in Hinsicht auf die Wohl und das Maass der Nahrung, der Genuss schlammigen, trüben und abgestandenen Trinkwassers, Uebermaass im Genuss des Weins, namentlich des jungen heissen und trüben Weins, übermässiger Genuss von Fischen, zu jungen, kranken, gestorbenen Thieren u. s. w. Kommt hierzu, wie es auf Märschen und in Kriegslagern so oft der Fall ist, grosse körperliche Anstrengung, heftige Hitze, so wie die unendliche Plage durch Mücken und Hautungeziefer, an welchem letzteren es dem gemeinen Ungar niemals fehlt, so ist die Entstehung allgemein verbreiteter Krankheiten kein Räthsel mehr. Die Eingebornen selbst sind theils durch die Gewöhnung gegen diese Schädlichkeiten abgestumpft, theils kennen sie die Gefahren derselben und wissen sie zu vermeiden, theils benutzen sie gewisse Mittel, um den Nachtheilen dieser vorzüglich die Verdauungsorgane afficirenden Schädlichkeiten zu begegnen. Hierher gehört vor Allem der Knoblauch, welchen der gemeine Mann in fast ungläublichen Quantitäten, vorzüglich als Gewürz zu dem häufig genossenen jungen, frischen und fast rohen Fleische zu sich nimmt, und dessen Entbehrung er deshalb härter empfindet, als selbst den Mangel des Brodes. Ausser diesem Volksmittel gegen den Taönmör nennt Schuller<sup>1)</sup> noch Salz und Essig.

Deshalb entstehen diese Krankheiten am leichtesten bei Fremdlingen, vorzüglich bei ausländischen Truppen, für welche sich alle Schädlichkeiten des Lagerlebens überhaupt mit den einheimischen um so mehr vereinigen müssen, als gerade in diesem Lande der augenblickliche Genuss so verlockend ist, als dass die Stimme der Warnung Eingang finden könnte.

Für das hohe Alter dieser Uebel spricht auch die Behandlungsweise derselben bei dem Volke, die sich bei Schuller noch fast eben so angegeben findet, als bei dem fast 200 Jahre früheren Cohér, und an deren Erfolg durchaus nicht gezweifelt werden kann.

1) Schuller, l. c. p. 278.

Das Hauptmittel bei denselben ist die *Ossair spinosa* („Hagystatz-Kraut“), welche mit Zwiebeln, Gewürznelken und Wein gekocht, und alsdann mit Brod zu einer breiartigen Salbe gemacht wird, mit welcher man 3mal täglich den Kopf oder auch die Gelenke des Kranken einreibt. Fast stets ist die Anwendung dieses Mittels von dem besten Erfolge begleitet, namentlich lassen die Delirien nach, es stellt sich ruhiger Schlaf und vor Allem ein gelinder, wahrhaft kritischer Schweiss ein. In Ermangelung der Hanhechel bedient man sich andrer Kräuter, der *Artemisia latifolia*, *Majorana*, *Rosmarin*, des *Abrastava*, mit Zusatz von Gewürznelken, Zwiebeln und Essig in derselben Weise, obschon mit weniger zuverlässigem Erfolge.

Seit dem Jahre 1541, in welchem Ofen von den Türken erobert wurde<sup>1)</sup>, war das östliche Europa fortwährend mit dem Joch der Knechtschaft bedroht. Zahlreiche, häufig genug gelingende Einfälle, unterstützt durch die Verräthereien habgieriger Magnaten und durch die inneren Zerwürfnisse des Reichs, unterwarfen einen grossen Theil der österreichischen Länder dem Halbmonde, und es bedurfte der grössten Anstrengungen des Kaisers, um einem neuen und furchtbaren Feinde nur einigermaßen die Spitze zu bieten, nachdem er in Deutschlands eigner Herzen einen nicht weniger drohenden Sturm nicht sowohl besänftigt, als gewaltsam unterdrückt hatte. Es ist schwer zu bestimmen, wie sich das Geschick Oesterreichs gewendet haben würde, wenn nicht die Macht der Pforte theils durch die Tapferkeit einzelner christlicher Heerführer, theils durch die ihr selbst von Persien her drohende Gefahr, theils durch verheerende Krankheiten und widrige Naturereignisse gebrochen worden wäre. Von diesen letzteren hatten gewiss die Türken eben so sehr zu leiden, als das nach Lebenwaldt von Pest und Hunger aufgeriebene Reichsheer. Der eben genannte Chronist führt bei diesem Jahre für Constantinopel eine „erschreck-

1) Ofen konnte erst nach 140 Jahren der Gewalt der Ungläubigen wieder zurückgewonnen werden.

[1568.]

liche Pest<sup>1)</sup> an. Im Jahre 1538 herrschte jene schon oben (S. 17.) erwähnte Ruhr durch ganz Europa, während einer Witterungsbeschaffenheit, welche durchaus keinen Erklärungsgrund für die Entstehung so allgemein verbreiteter Krankheiten darbot, und die kesseren Aerzte nachdrücklich an *das Gesetz des Hippokrates* erinnerte<sup>2)</sup>. Neben diesen brachen überall pestartige Krankheiten aus, an vielen Orten die erklärte Bubonenpest. Diese auch im Reichsheere, welches nach der Niederlage König Ferdinand's unter Markgraf Joachim von Brandenburg gegen die Türken zog, verbreiteten Seuchen befielen in Ungarn, im Lager in Oesterreich, und auf dem nothgedrungenen Heinszuge Tod und Verderben über mehr als 30,000 tapfere Krieger, und vielen Genesenen wurden die überstandenen Uebel noch später zur Quelle langen Siechthums. Wientzenberger bezeichnet die Krankheit unter den zur Wiedereinnahme Ofens bestimmten Truppen, als eine „pestartige Bräune.“ So aber wurde im J. 1566 das ungarische Fieber von Feldchirurgen und Quacksälbern genannt<sup>3)</sup>, und es wird deshalb im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die ungarische Krankheit es war, welche im J. 1542 die Belien der Reichstruppen lichte, und dass ihr Auftreten im J. 1566 nur durch die Verbreitung des Uebels über ganz Europa zuerst die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog.

In den folgenden Jahren herrschten, wie schon oben erinnert worden ist, ebenfalls an vielen Orten pestartige Seuchen, unter denen z. B. Kesper die wahre Bubonenpest und den Petechialtypus („*febris pestilens*“<sup>4)</sup>) hervorhelt<sup>5)</sup>. Zu Wien starben im J. 1542 18,000 Menschen an der Pest, und ähnlicher

1) Fernellus, *de epid. rev. ven.* lib. II, cap. 13.

2) Schaller (p. 264) und mehrere Andre führen Kelsus als den deutschen Namen des Haggymale an. — Mehrbrünne nannten die empirischen Aerzte die Krankheit, indem sie vorgaben, in den Urinen der Geisteskranken Purpura gefunden zu haben.

3) Kesper's sehr seltne Schrift, ist uns nur aus Pfaffen (Beilage zur Gesch. des Petechialtypus, 8. 24) bekannt.



Verheerungen wird für Breslau gedacht<sup>1)</sup>. Auch in den Jahren 1549, 1550, 1552 und 1558 herrschten Pesten, und an die Verheerungen der *Trouxe galante* in Frankreich (1545), an die des Schweissfiebers in England (1551), der Blattern in Frankreich<sup>2)</sup>, der Influenza vom J. 1558<sup>3)</sup>, mag hier noch einmal erinnert werden, um die Fülle des Unheils bemerklich zu machen, welches Europa in der Mitte des 16ten Jahrhunderts betraf.

Unter diesen Umständen stellt sich die ungarische Krankheit des J. 1566 weder als eine unvorbereitete, noch als eine von den übrigen Ereignissen in der Krankheitswelt getrennte dar.

Im Fröhlinge dieses Jahres traten, nach dem Berichte von Thomas Jordanus, welchem wir vorzugsweise folgen, in Folge heftiger und anhaltender Regengüsse die Donau, Säu und Drau über ihre Ufer, und die dadurch herbeigeführten Ueberschwemmungen hielten das von Sultan Soliman selbst befehligte türkische Heer länger als 2 Monate von dem Einrücken in Ungarn zurück<sup>4)</sup>. Die Trockenheit aber des folgenden Sommers wurde durch die des Herbstes noch übertroffen. Im Lager von Weaxprim und Tacx herrschte eine Zeitlang Mangel an Lebensmitteln, und wenn auch am ersten Orte gutes Quellwasser nicht fehlte, so konnte man am letzteren nur das Wasser eines grossen Sees benutzen. Dazu kamen die eigenthümlichen Bedrängnisse der Belagerung von Weaxprim. Theils um sich vor der Hitze der Witterung und des Kampfes in der brennenden Stadt zu schützen, theils um sich vor den glühenden Kugeln der Feinde zu sichern, stürzten sich die Sol-

1) Wintzenberger, — S. auch Schnurrer, II, 85 ff.

2) Fernelius, *de uld. rer. caus. cop.* 12, p. 212.

3) Schweick, *de Influenza*, S. 59. — Gluge, *d. Med.* 8, 51.

4) Die Brücke, welche Hasana-Pascha bei Ottava über die Drau schlug, um Solimans Heere den Uebergang zu bahnen, wurde dreimal von den Fluthen weggerissen und nur den kühnsten Anstrengungen gelang ihre spätere Herstellung an einer günstigeren Stelle bei Ouwach. Gradelich, *angie. Chron.* 1665.

(1866.)

daten kaufteneris in das Wasser. Nach dem Vorrücken des Heeres bis zu der in diesem Jahre überaus hochreichen Donau wurden Fische das vorzugswürdige und beliebteste Nahrungsmittel. Dabei genossen die Soldaten einen trüben, kiefigen und sauren Wein und ein eben so schlechtes Bier, und dem heilsamen aber warmen Donnawasser zogen sie das kühleren Getränk der trübten Lagerbierbrauen vor.

Unter diesen Umständen brach im Lager bei Komorn (am Zusammenflusse der Donau und Wag) die Krankheit aus, wurde im Lager bei Raab (an der Einmündung der Raab und Rabnitz in die Donau, rings von diesen Flüssen umgeben) wo sich die Truppen vereinigten, höchst mörderisch, entfaltete aber ihre grösste Wuth, nachdem die entlassenen Soldaten sich hier- und dorthin zerstreut und den Samen des Uebels über Deutschland, Bazarund, Belgien, Italien und Böhmen ausgebreitet hatten. Am Meisten litt Wien, wohin die Seuche offenbar durch Soldaten eingeschleppt worden war. Die öffentlichen zur Aufnahme der Truppen bestimmten Gehäule waren mit Kranken erfüllt, die Strassen mit Leichen und Sterbenden bedeckt 1).

Auch in Wien lehrte die Erfahrung, dass die Krankheit, so wie die gleichzeitig herrschende, häufig tödliche Ruhr, vorzüglich nach Diätfehlern, in Folge übermässigen Genusses frischen Fleisches entstehe, dessen sich deshalb die Vornehmern sorgfältig enthalten.

Dieselbe begann in der Regel um 3—4 Uhr Nachmittags mit einem leichten oberflächlichen Frostschauer, auf welchen nach  $\frac{1}{2}$  Stunden eine die Kranken Tag und Nacht peinigende Hitze folgte. Bei Einigen gingen dem Ausbruche des Uebels Kolik und Seitenschmerzen vorher. Die vorzüglichste Klage

1) Die Ungarn schienen, wie es sich aus den oben mitgetheilten Bemerkungen leicht erklärt, eine besondern Immunität gegenwärtig zu haben. Wenigstens berichtet Erdmanns, dass (zu Wien) nur 2 ungarische Militärregimente gestorben seien. Dieser thätlichen Immunität gedenken auch Cacher (p. 108) auch die Türken.

über der Befallenen betraf den sehr heftigen Kopfschmerz, so wie einen Schmerz in der Gegend des Magensandes, in welcher sich bei allen Kranken durch das Gefühl eine gewisse Härte und Anschwellung wahrnehmen liess, welche beim leisesten Druck mit den Fingerspitzen so heftige Schmerzen erregte, dass die Kranken laut aufschriemen. Der unerträglichste Durst peinigte sie unaufhörlich, Viele krochen, um ihn zu stillen, aus ihren Betten zu den entlegenen Wasserbehältern, Viele hanchten trinkend ihren Geist aus. Alle Kranken hatten eine unüberstehliche Begierde nach Wein. Diese Gier aber war so gross, dass Viele, obsehon sie wussten, dass die Befriedigung desselben den Tod bringe, ihr dennoch nachgaben. Am 2ten oder höchstens am 3ten Tage stellten sich Delirien ein, erfüllt von den verschiedenartigsten Gedanken, je nach der Denk- und Lebensweise jedes Einzelnen. Gegen Abend trat die Exacerbation, in der Nacht die Remission ein. Die Zunge war trocken, die Lippen aufgespenigen; Einige speckten Blut aus. — Bei allen Kranken brachen Petechien von verschiedener Grösse, bald über den ganzen Körper, bald nur auf der Brust und dem Rücken, auf den Schulterblättern und Armen aus. Dieselben waren meist von rother Farbe; schwarzes und livides Ansehn derselben gab eine absolut ungünstige Prognose. Bei Einigen entschied sich die Krankheit durch schleimige, gallige, zum Theil stinkende Durchfälle. Ein sehr günstiges Zeichen pflegte Schwerhörigkeit zu seyn, besonders wenn ihr, wie es häufig der Fall war, ein eiteriger Ohrenfluss oder in Eiterung übergehende Parotiden folgten. Dergleichen Entscheidungen zeigten sich je nach dem Verhalten des Kranken und dem eingeschlagenen Kurverfahren am 14ten — 20ten Tage. — Häufig kam bei Solchen, welche unter freiem Himmel gelegen hatten, oder des Nachts bei kalter Luft zu Fusse gegangen waren, oder sich auf andere Weise erkältet hatten, spontaner Brand der untern Extremitäten vor. Kranke dieser Art hatten in der Nacht ein Kältegefühl, welchem Hitze folgte, und am Morgen zeigte sich alsdann auf dem Fessrücken ein Karbunkel, mit



[1246.]

dessen Auftreten die entzündliche Hitze nachliess. Wenn dieser wegen des durch ihn verursachten Juckens aufgestrichet wurde, so griff er in kurzer Zeit weit in der Tiefe um sich, und führte brandige Zerstörung des ganzen (oft beider) Unterschenkele herbei<sup>1)</sup>.

Zur Beseitigung der Krankheit wandten das Volk und die in solcher Zeit am ungestörtesten ihr Wesen treibenden Ackerärzte sehr verschiedene Mittel an. Am gebräuchlichsten war eine Mischung aus geschlagenem Eitreiss, Crocus und Brantwein, ein Mittel, dem Rulandus herrliche Erfolge nachrühmt. Derselben Zusammensetzung bediente man sich als Gurgelwasser gegen die angewissenen Beschwerden, und rieb dabei die Zunge, das Zahnfleisch und den Gammern früh und Abends, natürlich ohne besondern Erfolg, mit einem rauhen Tuche ab. Vortheilhaft wirkte unter diesen Volksmitteln<sup>2)</sup> der frisch ausgepresste, mit Wasser verdünnte Saft von *Sedum majus* in Verbindung mit Salmiak oder etwas Kampher, zuweilen mit Zusatz von *Rad. Iridis albycae*, zum Getränk. — Etwas abweichend von Schuller's späteren Angaben<sup>3)</sup> schildern Jordannus und Cober<sup>4)</sup> das Kurverfahren der Ungarn in dieser und der folgenden Epidemie des Jahres 1597, welches nach der oben angeführten Notiz von grossem Erfolge gewesen zu seyn scheint. Sie rieben eine aus *Rad. Levistici* und Schweinefett bereitete Salbe auf den ganzen abgeschorenen Kopf, vorzüglich die Stirn und Schläfen ein. Ausserdem wickelten sie den ganzen Körper in ein mit warmem Wein oder Brantwein getränktes Tuch,

1) Vergl. unten die Nachrichten des Careu. Grewen über den Petechialtyphus zu Lissabon im J. 1713, in welchem dieselbe Ersehnung vorkam.

2) Das Heilverfahren des Volkes, häufig freilich nur den Vortheilen der gerade gangbaren Schultherapie entlehnt, häufig gerabezu verwerflich, eben so häufig aber auch einfacher Beobachtung des Empirischen entzählend, hat auch bei epidemischen Krankheiten nicht selten über das „wissenschaftliche“ Verfahren der Aerzte den Sieg davon getragen. Wir erinnern hier nur an die ursprünglich dem Volke entlehnte künstliche Zeitigung der Babonen bei der Pest, an das Verfahren der Engländer im Schweinefieber, und an die Einspaltung der Blattern.

3) S. oben.

4) Cober, p. 60.

war auf diese Weise Schweiss hervorzurufen. Ferner rieben sie in Essig geweichten und mit Salz und Pfeffer vermischten Knoblauch auf eine ziemlich gewaltsame Weise in die Hände und Füße ein <sup>1)</sup>.

Die Aerzte wandten vorzüglich Purganzen und Aderlässe, säuerliche Getränke und demnächst die gewöhnlichen pestwidrigen Mittel, (Mithridat, Theriak u. s. w.) an, letztere vorzüglich, um den vorzugsweise die Genesung einleitenden Schweiss herbeizuführen. — Die späteren Aerzte, vorzüglich Cöber, Ruilandus und Petraeus, rühmen dagegen vor Allem den Gebrauch der Brechmittel, zu welchen die Natur selbst durch die günstigen Folgen des freiwillig sich einstellenden Erbrechens aufforderte <sup>2)</sup>, (der *Aqua benedicta Ruilandii*, des Kupfervitriols u. s. w., erst später der *Ipecacuanha*), und es musste allerdings Alles einen günstigen Erfolg derselben erwarten lassen. — Sectionsbefunde finden sich bei Jordanus nicht, wohl aber bei einigen Späteren.

Es bedarf nach diesen Angaben keines weiteren Beweises, dass die ungarische Krankheit im Wesentlichen ein Petechialtyphus war, in welchem nur, zufolge diätetischer und endemischer Einflüsse, eine gastrische Richtung des Leidens sich vorwiegend ausbildete. Diese Eigenthümlichkeit der Krankheit bewirkte, dass man noch lange nachher jede nur einigermaßen ähnliche Krankheit, namentlich den Petechialtyphus selbst, als ungarisches Fieber bezeichnete; wie sich überhaupt die Namen verheerender und weit verbreiteter Epidemien dem Gedächtniss so fest einprägen, dass sie noch lange hernach zur Bezeichnung oft sehr heterogener Uebel dienen <sup>3)</sup>. Indessen scheint sich doch der eigenthümliche Charakter des ungarischen Fiebers noch längere Zeit, vorzüglich in Ungarn selbst und den

1) So sieht bei Cöber, (p. 61) angeführten Falle aus, indem sie durch diese Behandlung herbeigeführten Reactionen in ein heftiges Geläufeschen (*gelaifus orala et remissio*) aus.

2) Cöber, p. 66.

3) Beispiele geben die Pest, der schwarze Tod, die Cholera, die Grippe u. s. w.

(1566.)

angrenzenden Ländern erhalten zu haben. Nicht weniger gewichtig drängt sich die Erinnerung an manche Formen des Wechselfiebers auf. Der Verlauf unserer Untersuchungen wird uns noch oft auf das Verhältniss dieses Uebels zu dem Ptechialtypus hinführen.

Vorzüglich interessant sind, selbst für die Epidemie des Jahres 1566, die Angaben Ruland's über das Auftreten der ungarischen Krankheit in Böhmen zu Ende des 16ten Jahrhunderts, also gleichzeitig mit den von Cöber beobachteten Erkrankungen in Ungarn, und höchstwahrscheinlich mit diesen in näherer Beziehung stehend.

Martin Ruland machte seine ersten Beobachtungen über die ungarische Krankheit im J. 1594 in mehreren bei Regensburg gelegenen Dörfern, von denen zwei, Pettendorf und Herrentried, fast gänzlich anstarben. Er bemerkte, dass diese Epidemie, wie mehrere andere, auffallend gelinder war, als die ursprünglich in Ungarn heimische Krankheit <sup>1)</sup>. Zu den Ursachen derselben rechnet er vorzüglich örtliche Schädlichkeiten, den Genuss schlechten Trinkwassers <sup>2)</sup>, grosse Sommerhitze u. s. w. Er identificirt das Uebel durchaus mit dem Ptechialtypus, der *febris lenticularis* der Italiener und Franzosen, welches er schon bei Hippocrates, Galen und Aëtius findet, schreibt denselben eine pestartige Eigenthümlichkeit zu <sup>3)</sup>, und ist von der Contagiosität desselben durchaus überzeugt <sup>4)</sup>. Seine Beschreibung ist vollständig, aber ungeordnet und an vielen Stellen seiner Schrift zerstreut.

Im Anfange machte die Krankheit häufig Intermissionen, ohne indess deshalb als Wechselfieber betrachtet werden zu können; eine bekannte Eigenthümlichkeit, welche bei späterer

1) Ruland, p. 16.

2) Ders., p. 454 u. s. d. 51.

3) Ders., p. 192, 208, 216.

4) Ders., p. 217, 222. — Ueber die Beziehung der Typhen zu den Wechselfiebern vergl. Hecker, Gesch. d. neuer. Heilk. 8. 66 ff. und vorzüglich auch Hirsman, die Krankheitsfamilie Typhus.



Gelegenheit nähere Besprechung finden wird<sup>1)</sup>. Sie charakterisirte sich durch eine bedeutende innerliche Hitze, während äusserlich die Temperatur nicht erhöht war<sup>2)</sup>. Erst später trat *cantor mordax* ein<sup>3)</sup>. Der Puls war während des ganzen Verlaufs äusserst trügerisch, im Anfange oft normal, später klein und leer. Häufig stellten sich Ohnmachten, übler Geruch aus dem Munde und heftiges Herzklopfen ein. Die Augen waren geröthet und funkelten, die Kranken klagten über Ohrenklingen, zuweilen über Schwerhörigkeit. Der Schnod war mit einer feuchten schleimigen Masse überzogen<sup>4)</sup>. Zuweilen bildete sich eine wahre Cynanche aus<sup>5)</sup>, die Zunge ziemlich trocken, rau und schrullig. Dabei allgemeine Abgeschlagenheit, heftiges Kopfweh, Delirien, Krämpfe, Coma, Rausch. Der Appetit war während der Krankheit gänzlich verschwunden, dagegen wurden die Kranken von dem furchtlichsten Durste gequält. Bei Allen aber fand die auch von Jordannus erwähnte charakteristische Aufgetriebenheit und Schmerzhaftigkeit der Magengegend Statt, von Engesogemeyn des Hypochondrien begleitet<sup>6)</sup>. Im ferneren Verlaufe der Krankheit bildeten sich als kritische und krisenartige Erscheinungen folgende Symptome. Blutungen aus der Nase waren sehr häufig, ohne indess von kritischer Bedeutung zu seyn. Eben so wenig zeigte der Urin auffallende Veränderungen, derselbe war dick, trübe, roth, und zeigte ein fettartiges, sehr übelriechendes Sediment<sup>7)</sup>. Der Schweiss war zu Anfang der Krankheit selten beträchtlich, wenn dies aber der Fall war, so versprach er nicht als Alles Uebrige einen glücklichen Ausgang<sup>8)</sup>. Bei den meisten Kranken brachen ferner Petechien aus, die indess, zu bald

1) Bufand, p. 51.

2) Dorn, p. 252.

3) p. 26.

4) p. 249.

5) p. 25—41.

6) p. 45.

7) p. 42, 52.

8) p. 46, 57.

[1594.]

ihr Ausbruch im Anfange der Krankheit erfolgte, eine sehr schlimme und selbst an kritischen Tagen eine sehr unsichere Prognose gewährten, und, wie gewöhnlich, durchaus nicht pathognomonisch waren <sup>1)</sup>. Am schlimmsten waren Petechien von schwarzer und livider Färbung. Eben so wenig konnte dem in der Regel eintretenden Durchfalle eine kritische Natur beigemessen werden. Derselbe war höchst ähelfüchend <sup>2)</sup>, zuweilen colligativ <sup>3)</sup> und machte selbst wenn er zu Anfang der Krankheit erschien die Prognose sehr trübe <sup>4)</sup>. Zuweilen erschienen auch Parotidengeschwülste <sup>5)</sup>, deren Uebergang in Eiterung zu den besten prognostischen Zeichen gehörte <sup>6)</sup>. Eben so günstig war Fussoedem, vor Allem aber wahrhaft kritischer Schweiß und Urin <sup>7)</sup>. — Nach der Genesung fielen häufig die Haare aus <sup>8)</sup>. Des brandigen Absterbens der Extremitäten wird nicht gedacht. Die Kormethode Ruland's lässt im Ganzen wenig zu wünschen übrig, und sie würde unsern bestigen Aerzten wenig Veranlassung zu Abänderungen und Verbesserungen zu geben scheinen. Namentlich werden in derselben deutlich die Früchte der Erfahrungen erkannt, die man im Verlaufe des 16ten Jahrhunderts über die Behandlung des Petechialtyphus gemacht hatte, besonders die Fortschritte im Vergleiche zur Behandlung Jordan's. So verwirft Ruland x. B. im Allgemeinen die Blutentziehungen als nutzlos und, namentlich bei vorhandenem Durchfalle, selbst schädlich <sup>9)</sup>, und statuiert sie höchstens gleich zu Anfang der Krankheit, indem er von der Ursache der Krankheit, einem Leiden der „*humores pituitosæ*“ ausgeht. Dagegen rühmt er den vorsichtigen Gebrauch der Purganzen, indem er beobachtet hatte, dass Personen mit habituell flüssigem Stuhl-

1) Ruland, p. 46, 57.

2) *Ibid.*, p. 43.

3) p. 45, 788.

4) p. 43, 292.

5) p. 138.

6) p. 24.

7) p. 292.

8) p. 27, 241.

9) p. 284, 285.

gänge von der Krankheit verschont blieben <sup>1)</sup>, vor Allem aber Brechmittel und die Hervorrufung eines gehörigen, 3 Stunden lang an unterhaltenden Schweisses <sup>2)</sup>. Ausserdem bediente sich Ruland häufig auch der Cantharidenpflaster, deren Nutzen bei Delirien u. s. w. im Petechialtyphus Roboretus kurz vorher so sehr gepriesen hatte <sup>3)</sup>. Zur Nachkur aber diente ihm der gewöhnliche Apparat der Cordialien und Bexoardica.

Vorzüglich interessant sind die von Ruland mitgetheilten Sectionsbefunde, und trotz ihrer Ungenauigkeit verschaffen sie uns wenigstens einige Blicke in das Leiden der vorzüglich ergriffenen Organe.

Sehr genau untersuchte Coiter das Gehirn einer im J. 1567 an der ungarischen Krankheit verstorbenen Nüßerin. In dem unten mitgetheilten Sectionsbefunde <sup>4)</sup> treten die gewöhnlichen pathologischen Veränderungen typhöser Krankheiten hervor. In andern Fällen fand Ruland das Herz schlaff, blass und blutleer, die Leber auf ihrer convexen Fläche mit Pusteln besetzt, auf der concaven Seite entzündet <sup>5)</sup>. Jessenius, ein Prager Arzt, fand ebenfalls in einem Falle die concave Fläche der Leber erysipelatös entzündet <sup>6)</sup>.

Spätere Schriftsteller beschreiben sehr häufig den Petechialtyphus unter dem Namen der ungarischen Krankheit, ohne damit den Gedanken an eine besondere Modification des ersten zu verbinden. So identificirt Petraeus <sup>7)</sup>, ein Marburger

1) Ruland, p. 82.

2) Bern., p. 102, 103.

3) S. un.

4) Ruland, p. 8. „*Aperi caput, dum terra cranium removelam; effusus aqua liquor carnis similis; tenuis membrana et plura claustra vasa aquosa et pituitas sanguine turgentes, uterque ventriculus, tam dexter quam sinister plenus aqua fuit levitatus: nullam nec in membrana nec in cerebri substantia deprehendere quivi inflammationem. Ex vasis dures membranae cerebri, ut videtur ex suspensio intestinum cerebri, extenuata sunt pice filamenta vasa; hemisphaeria non distinctio, et alba pituita coagulata. Similia sumpsi ex cordis ventriculis.*“

5) Ruland, p. 9.

6) Bern., p. 657 uq.

7) Petraeus, H. *Agonimete medico*.



[1653.]

Arzt, die Krankheit, welche er „ungarische Hauptschwachheit, Hauptkrankheit, ungarische Sacht, Hirntölen, Maud- und Herzbräune“ nennt, durchaus mit dem Petechialtyphus, wobei er eine Kurmethode derselben angibt, welche noch lange zeitlich unverändert in Ansehn geblieben ist. Bei kräftigen Personen und im Anfange der Krankheit lässt er zur Ader, gibt, wenn kein Durchfall da ist, ein gelindes Abführmittel, legt aber den grössten Werth auf Brechmittel und Sudorifera <sup>1)</sup>. Selbst schon vorhandenes Erbrechen und Durchfall schliesst nach ihm die Darreichung des Emetica's nicht aus <sup>2)</sup>. — Auch Petrus erwähnt das in den Leichen gefundene „cor flaccidum.“

Bei einem noch späteren Schriftsteller, Tudecius, einem Prager Arzte <sup>3)</sup>, findet sich indess doch die ungarische Krankheit von dem gewöhnlichen Petechialfieber symptomatisch scharf getrennt. —

Kurz zwar, aber, als an Ort und Stelle gemachte, werthvoll sind die Angaben des Wundarztes Esslinger aus Zürich über die ungarische Krankheit im J. 1661 <sup>4)</sup>. Der Genannte, der zugleich als Fähndrich diente, später auch in gleicher Aspijelter Eigenschaft in Spanien war, alsdann zu Uster im J. 1668 die Pest beobachtete, hatte das sogenannte ungarische Fieber schon im J. 1659 im Stift Bremen an der Weser unter den schwedischen Truppen beobachtet, in einem Lager, in welchem sich alles Ungemach des Kriegelebens vereinigte. Später hatten diese Truppen das Uebel weit und breit im Lande verschleppt.

Bald darauf fand Esslinger, der nun Feldwundarzt im Kaiserlichen Diensten war, Gelegenheit, die hechte Gestalt des Uebels in seiner eigentlichen Heimath kennen zu lernen.

1) Petrus, p. 413.

2) Dem, p. 416, Item 5.

3) Tudecius, Sin. Alojz., *Amoris antilabiae*, p. 4. — „Quidam enim ex istis sic laborant, ut hoc tantum caput redmarcepimus non debet, amantissimam, aliquam probatam, existerunt in unguem dicitur: distinguatur a communis petechiali exanthemate, tantum namque et insuperabili capitis dolore, cum maximo dolore originis stomachi.“

4) Joh. von Nurali, *Schriften von der Wundtzeitsch*, Basel 1711. S. 591 ff.

Zwölftausend Oesterreicher hatten unter Montecuculi im J. 1661 Ungarn besetzt. Wiederum entstand die Seuche im morastigen Lager zwischen Komorn und Neuhausel, und in kurzer Zeit riss sie, die man nun auch Hauptweh, Bräune und (von einem früher nicht erwähnten Symptome) rothe Ruhr nannte, über tausend Personen hinweg; später aber scheint sie noch viel bedestendere Verheerungen angerichtet zu haben, denn auch diesmal bewirkte sie das schnelle Ende des erfolglosen Feldzugs.

Die übrigen, ziemlich zahlreichen Schriften, auf deren Titel die ungarische Krankheit genannt wird, gewähren, so weit sie uns bekannt wurden, wenig Aushente. Selbst die Dissertation von Läu, einem Ungar, ist Nichts als Compilation. Später aber verschwindet der Name „ungarische Krankheit“ immer mehr vor der genaueren Kenntniss der Vielgestaltigkeit des typhösen Krankheitselements.

### III.

## Fernere Geschichte der Pest und des Petechialtyphus im sechszehnten Jahrhundert.

#### 1568. Paris. Palmarius.

Die grosse Allgemeinheit des Petechialtyphus in dieser Zeit lässt eine weite Verbreitung der ihn bedingenden constitutionellen Ursachen leicht erkennen. Unter den Beobachtern desselben nimmt Palmarius eine um so achtungswerthere Stelle ein, als er sich zugleich in Bezug auf die Behandlung der Krankheit in einer Weise äussert, welche seine hohe Achtung vor den deutlich ausgesprochenen Winken der Natur an den Tag legt. —

Die Epölemie zeigte sich zu Paris im Frühlunge des Jahres 1568, dem ein überaus milder Winter vorherging, und erreichte ihre Höhe im Sommer und Herbst. Unter der bekannten Vielgestaltigkeit der Erscheinungen hebt Palmarius vorzüglich den heftigen Kopfschmerz hervor, welcher die Kranken in den ersten 4—7 Tagen quälte, und dessen Aufhören oft so ohne alle eigentlich kritischen Erscheinungen erfolgte, dass er nur für symptomatisch gelten konnte. Palmarius äussert sich über diesen Punkt in einer Weise, welche sehr lebhaft an die Verblendung einiger deutschen Aerzte der neueren Zeit erinnert <sup>1)</sup>.

1) Palmarius, p. 416. „*Perillentes febres petechiales constitutioni impulerunt, quos Lucetius periclitatus anno 1568, ut atrocissimas fere capitis dolores incipere cupiscant, qui nulla plane remedia levatus, quarto vel septimo die sponte conquiescant, interdum nulla, interdum manifesta reviviscant. Causa igitur certis debet non crediti, ut membrorum ipsius inflammatio, sed maligna prae-*



Die Krankheit entschied sich in der Regel durch Schweisse, gelinde Durchfälle und Petechien („*maxime toto corpore conspersae*“), unter den bekannten Verhältnissen. Die Gerber von Paris wurden selten, aber abdann um so gefährlicher ergriffen <sup>1)</sup>. Bubonen werden nicht, wohl aber Karbunkeln erwähnt <sup>2)</sup>.

Die Angaben andrer Beobachter aus dieser Zeit bestätigen die grosse Verbreitung des Petechialtyphus. In Spanien, wo Vallesius und Luis de Torres denselben beobachteten <sup>3)</sup>, schenkte man ihm in dieser Periode eine vorzügliche Aufmerksamkeit, und überzeugte sich namentlich von der Unzweckmässigkeit der Aderlässe, welche man erfolgreich mit kalten Begiessungen vertrat. — Im Mannsfeldischen und zu Amberg in Baiern herrschte ein „*morbus cephalicus contagiosus*“ <sup>4)</sup>, sicher Nichts als die mit dem Petechialtyphus durchaus identische Hauptkrankheit.

Für das J. 1570 beschreibt Cagnatus eine Epidemie (typhöse Pneumonie?) zu Rom, welche beträchtliche Verheerungen anrichtete <sup>5)</sup>. Selbst bis nach Mexiko wurde in diesen Jahren die Krankheit von Spanien aus verschleppt <sup>6)</sup>, obschon nach

*tristis causis perierit.*“ — p. 217. „*Qui contagium abunde miscebat, vel calide cathartica propinabant, fractis naturae viribus mortem accipiebant. Alii contra, qui sine morbi progressionis adhaerent oculum et malignam perniciem cordis cum alimentis tam medicamentis pugnant, quam plurimos a morte vindicabant. Incredibile dictu, quomodo multos necavit eorum qui nihil in febribus praeter intemperiem, obstructionem et putredinem agnoscerant, imperitis stultitiae. Hi enim neglecta insensata periculis, quae praecipue erat mali causa, quatuor repetita petrelius et aliam remissa egros torpe de medio tollibat, dum purgandi et mitandi contagialis nullum finem facerent, attritis naturae robore omnes fore misere peribant.*“ Worte, deren Krikenung noch nach fast 200 Jahren für Viele nicht überflüssig erscheint!

1) Palmarius, p. 247.

2) Vergl. Hist. pathol. Untersuchungen, Th. I. S. 162.

3) Villalba, S. oben S. 26.

4) Rhumelius, Hist. morb. etc. p. 85.

5) „*anno 1570, Roma et veris infecta, magna scita est pleuritidis et capitis epidemia, quae multa hominum milia utrinque terens et omnes aetatis interfecit, cum interius equitibus flatus via maxima et avidus et longo tempore irruisset.*“

6) Franc. Bravo, Opera medicinalia, in quibus quatuor plurima scita medica neciteria, in quatuor portis digesta. Mexico 1576, 8. (Villalba.)

[1572.]

Schnarzer's richtiger Vermuthung unwahrscheinlich ist, dass die constitutionellen Verhältnisse Amerika's dem europäischen Uebel eine weite Verbreitung verstatteten. An andern Orten aber herrschte in derselben Zeit die ausgebildete Bubonenpest, z. B. zu Genf, wo man bereits zweckmässige Besuchsanstalten eingerichtet hatte, und zwei Jahre später zu Lyon, wo, trotzdem dass bei zeitiger Hülfe die Rettung Vieler gelang, 50,000 Menschen starben<sup>1)</sup>.

**1572. Pest zu Harlem, Delft, Löwen u. s. w.  
Corn. Gemma.**

Vorzügliches Interesse gewährt die von Corn. Gemma<sup>2)</sup> mitgetheilte Geschichte der Pest des J. 1572 in Löwen, vorzüglich deshalb, weil sie uns vielleicht einen tieferen Blick in die Geurze verstattet, von denen die originäre Entstehung der Pest und ihr Verhältniss zu andern Krankheiten beherrscht wird. Auf diese Verhältnisse ist theils von uns selbst bei wiederholter Gelegenheit, theils und vorzüglich von Hecker in seiner neuesten Schrift hingewiesen worden, und der aufmerksameren Beachtung derselben, wie sie sich in der Vereinigung der gleich zu besprechenden Ereignisse gestalteten, wird die naturgemässe Deutung ihres Zusammenhangs unmöglich entgehen, obgleich allerdings auch die Vermuthung nahe liegt, dass selbst die eingreifendste Wirksamkeit ungünstiger Verhältnisse jeder Art nicht ohne den Antheil des Contagiums als letztes Glied der Krankheitserscheinungen die Pest entwickeln konnte.

Das J. 1571 zeichnete sich durch eine höchst veränderliche Witterungsbeschaffenheit aus. Der Herbst war warm, feucht und neblig, eben so der Winter bis zum Februar 1572, in welchem heftige Kälte eintrat. Der Sommer des letztgenannten dagegen war nicht allein durch seine mit Feuchtigkeit

1) Hauckin, Joh., Kurzer Bericht u. s. w. Haubin (Caspar's Bruder, vorzüglich als Botaniker bekannt) war erst zu Genf, dann zu Lyon als Pestarzt thätig. — In den Jahren 1576—1578 verbreitete sich die Pest von Lissabon (Kewenau) nach Polen und Schweden. Raskow, Heilhistorische Chronik.

2) Gemma, l. c.

abwechselnde Hitze, sondern auch durch eine besondere Häufigkeit von Meteoren ausgezeichnet. Gallus beobachtete im J. 1571 eine sehr bösartige Epidemie des Petechialtyphus, welcher zu Anfang den Tertiantypus zeigte <sup>1)</sup>.

Eine ganz ähnliche Witterungsbeschaffenheit herrschte in den folgenden Jahren bis 1574, nicht allein auf Holland beschränkt, sondern, wie aus vielen andern Nachrichten hervorgeht, in sehr weiten Kreisen verbreitet <sup>2)</sup>. Zu dem Jammer des Krieges und der Bedrückung durch die blutige Habgier der Spanier gesellte sich überall die dringendste Noth der Nahrung, und niemals fehlte es weniger an weitverbreiteten Krankheiten: hitzige Fieber, welche im Sommer, vorzüglich aber seit dem October des Jahres 1572 durch ganz Europa herrschten. (In Thüringen erschienen sie, wie wohl fast überall als Fleckfieber <sup>3)</sup>). Für die Beurtheilung der Aufeinanderfolge dieser Krankheiten in Holland darf weder die gleichzeitige Hungersnoth, noch die allgemeine Verberitung des Scharbats übersehen werden, welcher vorzüglich im J. 1573 ganze Dörfer verödete <sup>4)</sup>, und dessen allgemeinste Verbreitung nicht allein mit der Akute der gleich zu beschreibenden typhösen Erkrankungen, sondern auch mit der gleichzeitig herrschenden Ruhr und masernartigen Exanthemen (*populæ et morbilli*) zusammenfällt. Zu Löwen liess sich ihre Annäherung an den Charakter der Wechsellieber nicht verkennen; der Typus derselben war auffallend remittirend; ihre Symptome Anfangs leicht, und ihr Verlauf in 4 bis 27 Tagen beendet. Auf der andern Seite war der typhöse Charakter derselben weder in Bezug auf die deutlich sich offenbarende

1) Gallus, Carolus, *de febr. petibaculis*. Ferrar. 1583. p. 4.<sup>a</sup> (anno 1571), qui agrestabant (interpolatio tertiana primi dicitur innotescere); quoniam ab oculis illis et peractum acrius quilibet pestilentialis et molleque putris effluuium, et fere unum, qui ex temporale soli febrem genere habuerunt, (n. 1571).

2) Vrgl. Schenck.

3) Vrgl. Zuck. Wüllich, von der jetzt regierenden Beschaffenheit. Flac. 1574.

4) S. Hockler, neuere Gesch. d. Heilkunde.



[1572.]

Ansteckungskraft, (man glaubte an eine Verschleppung des Uebels aus dem Lager), noch in Bezug auf die später eintretende Gefahr der Zufälle zu verkennen. Vorzüglich wurden Erwachsene aus den ärmeren Volksklassen ergriffen, Kinder Anfangs weniger heftig als später. — Das Uebel entfaltete in seinem Verlaufe die bekannten Erscheinungen des Petechialtyphus in seiner höchsten und bösartigsten Entwickelung; nach heftigem Kopfschmerz, Schlafsucht, Magenschmerzen u. s. w. traten Erbrechen und Durchfälle ein, die in der Regel tödtlich waren, und zum Zeichen der auf den höchsten Grad vorgeschrittenen Entmischung der Blutmasse bedeckte sich die Haut mit grossen lividen Geschwülsten, Blasen und Excoriationen<sup>1)</sup>. Jene Geschwülste traten vorzüglich an den Unterschenkeln auf, und zogen häufig den Brand nach sich; eine Erscheinung, die sich, selbst abgesehen von diesem dem Kriegstyphus vor Allem sehr gewöhnlichen Symptom, aus dem Elende jeglicher Art, in welches die ärmeren Volksklassen versetzt waren, leicht genug erklärt. — Eintretende Taubheit bewährte sich nach hier als günstige Erscheinung, und Gemma ist geneigt, die Ursache dieser Heilsamkeit in der Versetzung des Krankheitsprocesses auf ein peripherisches Organ zu finden; eine Erklärung, die zwar unbestimmt genug ist, ohne dass indess die neuere Nosologie eine bessere entgegenstellen könnte, und doch durch die in andern Epidemien dieser Taubheit folgenden kritischen Parästhesengeschwülste hinreichend gerechtfertigt wird. Blutungen, welche vor dem 7ten Tage eintraten, mussten als nachtheilig betrachtet werden, plötzliches Zurücksinken der Petechien aber folgte nach hier unter Convulsionen, Schändlähmung u. s. w. unfehlbar den Tod mit sich, der indess in der Mehrzahl der Fälle vorzüglich von den profusen Durchfällen bedingt wurde.

Es ist schwer, ja unmöglich, mit Gewissheit zu entscheiden, welche pathologischen anatomischen Veränderungen des Darmkanals diesem in der Geschichte des Petechialtyphus und

1) „*Tumores lividi, vesicae et impuiles, excoriationes cutis.*“

der wahren Pest so häufig vorkommenden Durchfällen zu Grunde lagen, obschon mit grosser Sicherheit vermuthet werden kann, dass denselben dieselben Geschwürbildungen ihre Entstehung geben, welche unserem Abdominaltyphus so eigenthümlich sind. Nur höchst selten nahmen die Aerzte der damaligen Zeit Sectionen vor, theils aus Furcht vor Gefahr der eigenen Ansteckung, theils auch in dem engherzigen Wahne, es bedürfte der Sectionen nicht, wo die Erscheinungen so laut für eine „Vergiftung“ sprächen, die dem Messer ja doch stets unzugänglich bleiben werde. Diese traurige, allem Fortschritt hemmend entgegenstehende Ansicht erhielt sich bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts, ja sie wurde nie unumwundener als damals ausgesprochen. Aber selbst dann, wenn man in äusserst seltenen Fällen Sectionen anstellte, nahm man dieselben in einer Weise vor, die für die Erkenntnis der krankhaften Veränderungen einzelner Organe durchaus Nichts fruchtete, und nur wenigstens ist wohl je einem Arzte des 15ten bis 17ten Jahrhunderts die genaue Untersuchung der Darmhöhle bei Kranken in den Sinn gekommen. — Nur auf einzelne Andeutungen Einzelner hin kann zuweilen über die materiellen Veränderungen der Organe eine Vermuthung gebaut werden, und von dieser Art sind unter Andern die Angaben Gemma's. Derselbe beobachtete nämlich häufig bei seinen Kranken Abschupfung der oft schwarz und grün belegten Zunge, vorzüglich wenn sich die Kranken den Genuss des Weins erlaubt hatten: ja bei einer Kranken stiess sich mit tödtlichem Ausgange die Epidermis von der Zunge bis zum After los. (!)

Gemma behandelte seine Kranken mit leichten Abführungen und gelinden Schweißmitteln, zu welchen letzteren die Natur selbst auch in dieser Epidemie dringend anforderte, indem keine andere Krise, als diese, heilsam erschien.

Noch hatte indess die Noth des durch Alha's Abzug im J. 1573 zwar von seinem Wütherich befreiten, aber noch immer nur zu unglücklichen Laudes ihr Ziel nicht erreicht; die geschleimte Krankheitsform ging im J. 1574 in die entwickelte



[1574.]

Babonerpest über, deren nur allmählig sich kundgebender Eintritt leichter aus dem Elend des Volkes, den Drangsalen des Kriegs und dem gänzlichen Mangel aller Vorsichtsmaßregeln zur Abhaltung eines gerade in jener Zeit überall mehr oder minder deutliche Krämpfe erfaltenden Uebels, als aus der ungünstigen Constellation vorhergesagt werden konnte, welche Germania mit überglühender Steigbarkeit beobachtete, ohne sein eignes Schicksal (er starb im J. 1575 an der Pest) in den Sternen zu lesen vermögend zu seyn.

### 1574. Pest zu Harlem. — Forestus.

Schon ein Jahr früher (1573) war die Pest auch in Harlem ausgebrochen<sup>1)</sup>, welches den ganzen Winter vom 13. Dec. 1572 bis zum 13. Juli 1573 von den Spaniern belagert wurde, und dessen von den Niederländern beabsichtigte Entsetzung nicht gelang. In der Stadt herrschte die furchterlichste Hungersnoth im Verein mit allen Bedrängnissen der überaus strengen winterlichen Jahreszeit<sup>2)</sup>, zu denen sich, wie es scheint, vorzüglich nach der Uebergabe, die Pest gesellte. Während der ganzen Belagerung hatten die Spanier theils durch die Tapferkeit der Belagerten, theils durch die Kälte (= häufig fand man die Wachen auf ihren Posten erfroren =), vorzüglich aber durch Krankheiten, in Folge des ungesunden, moorigen Bodens, über 10,000 Mann verloren<sup>3)</sup>. Diese Krankheit verbreitete sich alsdann auch nach Rotterdam<sup>4)</sup>, Briel und

1) Forestus, *observ. med. lib. FZ. obs. 26. seq.*

2) Curtius, *der niederländische Revolutionskrieg*. S. 88 ff. —

3) Curtius, *a. a. O.* S. 121.

4) Zu Rotterdam wurde Wilhelm von Oranien selbst im J. 1574 von der „Pest“ befallen, und er schwelte eine Zeitlang um so mehr in der augenblicklichen Lebensgefahr, als die Furcht vor der Ansteckung Jedermann, selbst seine Bedienung, von ihm entfernte, und er oft von aller menschlichen Gesellschaft verlassen war. Diese Krankheit befiel ihn während der Belagerung Leydens durch die Spanier, welche nur durch Oranien's heldenmüthiges Geiste zu einem glückreichen Ende gebracht wurde. — Wie würde sich das Schicksal Leydens, wie das des niederländischen Volkes, vielleicht für alle Zeiten, gewendet haben, wenn durch Wilhelm's Tod die Seele der Revolution erloschen wäre! — In Leyden



nach Delft, wo sie im November 1573 ihre höchste Höhe erreichte, und wiederum vorzüglich die ärmeren Klassen, namentlich aber die Landbewohner ergriff, welche sich mit ihrer Habe, namentlich ihren Viehställe, vor der Hahlgier des Feindes in die Stadt geflüchtet hatten. Dort erfüllten sie die Kirchen und Klöster, und es ist nur zu erklärlich, wenn unter ihnen die Seuche furchtbarlich wüthete. In einem Kloster (St. Clara zu Delft) starben in kürzester Zeit („*calito*“) 600 dieser Flüchtlinge! Die Krankheit bewährte sich zwar häufig durch den Ausbruch von Blüthen und Karbunkeln als wahre Pest, aber in den meisten Fällen fehlten jene charakteristischen Zufälle, und dieselbe erzeugte die Erscheinungen des sogenannten Petechialtyphus in seiner ausgebildetsten Gestalt (*Typhus bellicosus*). Ein Umstand, der von Nennet die Vermuthung begründen könnte, dass die Pest in dieser Zeit, in der sich alles Unheil, was die Völker betreffen kann, vereinigte, in Holland primär zu erzeugen im Stande war, obschon freilich auch der Einwurf der contagösen Vermittelung durchaus nicht zurückgewiesen werden kann, da in derselben und in der späteren Zeit die Bubonenpest fast ganz Europa überzog <sup>1)</sup>.

Von diesen und ähnlichen Krankheiten hatten indess die Niederländer während des von ihnen so glorreich durchgeführten Befreiungskampfes nicht weniger als die Spanier zu leiden. Unter Anderem misslang der Anschlag, welchen man im J. 1574 auf die niederländische Flotte machte, bloss deshalb schon vor seiner Ausführung, weil auf der spanischen, mit 15,000 Mann besetzten Armada die rothe Ruhr ausbrach, und einen grossen Theil des Heeres und den Admiral selbst hinwegraffte <sup>2)</sup>.

starben während der Belagerung 6000 Menschen an einer durch die entsetzliche Hungersnoth verursachten Seuche. — Curtius a. a. O. S. 203, 206.

1) Namentlich werden Oberschnaken, Logelung, Blersack, Kempten und der Allgau genannt.

2) Curtius, a. a. O. S. 191.

### Kolik von Poitou.

Schaeffer zählt zu den Volkskrankheiten dieser Zeit auch die Kolik von Poitou. Es ist indess bekanntlich durch Baker und Andere erwiesen, dass die so genannte Krankheit (nach Kolik von Devonshire) Nichts ist, als Bleikolik, in Folge der Aufbewahrung saurer Weine, Most, Cyder u. s. w. in kleineren oder mit Blei versetzten Gefässen<sup>1)</sup>.

In Spanien aber herrschte eine der bedeutendsten Epidemien des Petechialtyphus<sup>2)</sup>.

### 1570 — 1579. Ballonius.

In diese Zeit fallen die Beobachtungen von Ballonius (Baillon) über die epidemischen Constitutionen der Jahre 1570 — 1579, nach seinen zu Paris gemachten Beobachtungen<sup>3)</sup>. Ueber die Bedeutung derselben ist bei den Kennern mit eine Stimme, und jedenfalls verdienen dieselben eine genauere Betrachtung, als ihnen von Haller<sup>4)</sup> (welcher übrigens den hohen Werth derselben vollkommen anerkennt) und Sprengel<sup>5)</sup> vergönnt wird.

Das J. 1570 war im Allgemeinen feucht und neblig. Wechselstieber waren an der Tagesordnung und nahmen nicht selten einen böartigen Charakter an. Sehr häufig war Uebergang in Wassersucht. Im Herbste bildete sich die Constitution zu einer katarrhischen mit entzündlichem Anstriche aus, und die „Pleuritis“ spielte die Hauptrolle, während zugleich Nerven, Parotiden u. s. w. vorkamen. Ballonius selbst schreibt demselben einen erysipelatösen Charakter zu<sup>6)</sup>. Phthisiker

1) Vergl. die Artikel Colica und Colique in der Berliner Encyclopädie des med. Wissenschaft. und im Diet. des sciences med.

2) Torrea, dessen Schrift in diesem Jahre erschien.

3) S. d. Schriftensatz.

4) Haller, *ibid.* n. pr. II, p. 445.

5) Sprengel, *Gesch. d. Med.* III, 3, 251.

6) „Pleuritis prodita autem exanthemata pustulosa sunt; petechiae dilatae et anales, ut ait, ab hisque sed est differentia; uti et exple. Non erat sanguis durissimus;

befanden sich sehr schlecht und wurden häufig wassersüchtig. Im Winter nahm die Ruhr noch mehr an Ausbreitung zu, aber zu ihrer völligen Höhe bildete sich diese erysipelatöse Constitution aus, als der bedeutenden Winterkälte ein warmer Frühling, plötzliches Thauwetter und sehr ansehnliche Ueberschneunungen folgten. Anginen und Lungenentzündungen waren die häufigsten Krankheiten; diese aber vertrugen nun den Aderlass nicht mehr, und zogen häufig auch den Darmkanal und das Gehirn in den Bereich des Erkrankens. Ballonius aber erklärt wiederholt: „*Pleuritides erant erysipelatodes.*“ — Im Sommer 1574 herrschten Durchfälle, Bohren u. s. w. —

Im Sommer des Jahres 1573, der sich durch Unbeständigkeit auszeichnete, zeigten sich bössartige Quartanfieber als die vorherrschende Krankheit. — Der darauf folgende Winter war einer der kältesten, deren man sich erinnern konnte, er währte vom November 1573 bis zum März 1574. Die Krankheitsconstitution war vorherrschend rheumatisch-katarrhalisch. Von Neuem erhob die typhöse Pneumonie ihr Haupt, von Neuem wurde sie vorzüglich im Frühlinge bössartig, von Neuem bezeichnet sie Ballonius als erysipelatös, nicht als entzündlich<sup>1)</sup>. Die Inspiration war bei denselben nicht sehr gehindert, der Schmerz gering, der Auswurf unbedeutend, und so täuschten sich viele Aerzte über die hohe Gefahr des Uebels, die sich doch deutlich durch die grosse Schwäche und den heftigen Durst verrieth. Gleichzeitig kamen „Herpes“ und bei fast allen Kindern Aphthen und mit Serum gefüllte Pusteln auf der Spitze der Zunge vor, die bei „Unzähligen“ in tödtliche Geschwüre übergingen.

Im Juni und den folgenden Monaten entwickelte sich nun ein ausgebildeter gastrischer Krankheitscharakter, dessen Zusammenhang mit dem bisherigen nur so deutlich aus den von Ballonius geschilderten Erscheinungen hervorgeht. Die „hö-

non tam de tunc et plurimum consistant, quam de effusione quodam erysipelatode. *Arachni venae testis.*“ (Raffin. I. p. 5.)

1) Ballonius, I. p. 21: „*Erant erysipelatodes, non phlegmonodes.*“



[1574.]

artigen<sup>2)</sup> Fieber dieser Periode traten mit äusserster Unruhe, unaufhörlichem Erbrechen und Abgang von Wärmern durch Mund und After auf, und dieser letztern wurde nicht bloss bei jüngeren Personen, sondern selbst bei Greisen beobachtet. Das aus der Ader gelassene Blut hatte eine petrierte und seröse Beschaffenheit; später traten Delirien, Convulsionen u. s. w. ein. Viele übrigens gesund bleibende Personen klagten über untrügliches Hautjucken, bei Andern rief die kleinste Ursache Fieber hervor. Kurz der sogenannte typhöse Charakter der herrschenden Krankheitsconstitution war höchst ausgebildet, und es fehlt nur an näheren Angaben, um die eigentliche Natur derselben durch einen wenigstens unbestimmten Ausdruck zu bezeichnen. Indessen scheinen diese Fieber ursprünglich der Familie der Intermittentes beigezählt werden zu müssen, ob schon Ballonius selbst dieser Meinung nicht ist, weil er eine vollständige Intermittion für ein wesentliches Erforderniss der Wechselieber zu halten scheint. Wirklich betrachteten indess einige Aerzte die Krankheit aus dem erstgenannten Gesichtspunkte, und Ballonius selbst gibt zu, dass dieselbe in ihrem ersten Stadium intermittirt, und dass sie sich dem Hemitritaeus und der Tritaeophya genähert habe<sup>1)</sup>. Alle Kranke verbrachten die Nächte höchst unruhig, am Tage dagegen waren sie bei vollem Bewusstseyn, und gewissermassen von Schmerzen frei<sup>3)</sup>, während dagegen die Zunge im höchsten Grade trocken blieb, bitterer Geschmack, Abneigung gegen Speisen, Durst, Unruhe u. s. w. fortzuwarte. Abends trat plötzlich ohne vorhergehendes Fröst- und Hitze- oder ein sonstiges Gefühl von besonderem Unwohlseyn die Exacerbation mit furchtbaren Kopfschmerz, Geistesverwirrung, heftigem Durst, Schlaflosigkeit, aber ohne deutliches Fieber ein. Der so verbrachten Nacht folgte am Morgen die äusserste Schwäche, kalte Schweisse, gänzlichcs Darniederliegen der Circulation, kleiner und unglei-

1) Ballonius, l. c. p. 22. „*Febris quidam erat febris intermittens, sed postmodum utque alterum periclypsum intravit erat febris.*“

2) Ballon., l. c. „*Febris quidam intermittens.*“

cher Puls, brennende Hitze (*calor ardens*). Und dennoch erhielten Viele gar bald ihre Kräfte wieder.

Bei Vielen entschied sich die Krankheit am 9ten oder 11ten Tage unter stürmischer Bewegung günstig oder ungünstig durch Parotiden. Unter den Kindern aber herrschten zu jener Zeit die Masern (*morbilli*). Vortreflich hebt Ballonius die nahe Beziehung der Masern zu den eben geschilderten Krankheiten der Erwachsenen hervor; eine Beziehung, die ihm durch den Ausbruch rother bald livid werdender Flecken bei Vielen der an letzteren Erkrankten noch bestätigt wird <sup>1)</sup>.

Wirklich dürfte diese Meinung insofern unantastbar seyn, als sie die gemeinsame constitutionelle Ursache der verschiedenen Formen des Erkrankens im kindlichen und erwachsenen Organismus naturgemäss auffasst. — Hierbei ist nicht zu übersehen, dass Gemma in Holland gleichzeitig Masern, Röhren und Wurmflieber beobachtete <sup>2)</sup>.

Der folgende Winter (1574) zeigte eine ausgebildete katarhalisch-rheumatische Krankheitsconstitution, aber vorzüglich interessant ist die bekannte Beobachtung, welche Ballonius über den Einfluss der im December eintretenden Mondfinsternisse auf das Befinden der Menschen mittheilt.

Jedermann wurde während derselben von einer plötzlichen Mattigkeit ergriffen, Manche verfielen plötzlich in Convulsionen, Delirien, und bei Kranken ereigneten sich die bedeutendsten und unvorgesehensten Veränderungen <sup>3)</sup>.

Diese rheumatische Krankheitsconstitution dauerte den ganzen regnerischen Sommer und Herbst des Jahres 1574 hindurch fort <sup>4)</sup>. Aehnlicher Art war die Witterung des Winters

1) Hallen. p. 23. „*Satis notum manifestum erat, eos febres quae in gradibus incidere, ejusdem vis morbi cum febribus parvis exanthematicis obnoxio exserentibus, quod cum nimia inquietudine et dolore tenuiss, ut vix ne minimum quidem contrahere possent; vidimus multos abstinere esse mox rubentes, mox livaces cum summa membrorum conflatuione, cui Græci laçipatu vocant*“ etc.

2) S. oben S. 62.

3) Hallen. p. 24.

4) Hallen. p. 34.

[1375.]

1512 und ausgezeichnet durch einen ausgebildeten erysipelatösen Krankheitscharakter<sup>1)</sup>.

Die folgenden Jahre bieten bei Ballonius kein besonderes epidemiographisches Interesse dar. Im Fortgange unserer Betrachtungen aber wird sich die Veranlassung zur Erinnerung an diesen von Ballonius geschilderten erysipelatösen Krankheitscharakter noch sehr häufig wiederholen.

### Die Pest in den Jahren 1575 und 1577.

Die in den genannten Jahren überall, vorzüglich aber in Italien verbreiteten Epidemieen der Bubonenpest verdienen weniger wegen auffallender pathologischer Eigenthümlichkeiten, als vielmehr deshalb eine Stelle in der Geschichte dieser Krankheit, weil sie theils durch die Streitigkeiten, welche sie zwischen den Contagionisten und Miasmatikern hervorriefen, zu einer besseren und richtigeren Ansicht von der Natur der Bubonenpest Veranlassung gaben, theils auch weil sich durch die in ihnen gewonnenen Erfahrungen die unzweideutigsten Ergebnisse für eine hochwichtige, aber noch in ihrer Kindheit befindliche Wissenschaft, die Sanitätspolizei, gestalteten. — Die Geschichte dieser Pest hat aber noch ein andres Interesse, insofern aus ihr in erfreulicher Weise der blühende Zustand der Heilkunde dieser Zeit in Italien hervorgeht. Wie wir bei der Betrachtung der Volkskrankheiten fast überall auf die vorzugsweise Theilnahme der hervorragendsten Geister stossen, so begegnen wir besonders in dieser Periode in Italien, für dessen geistiges Leben sich, aller äusseren Drangsale ungeachtet, das goldne Zeitalter erneuert zu haben schien, den erlesenen Lehlungen der Wissenschaft als Beobachtern und Geschichtsschreibern der Volkskrankheiten.

Anders unser deutsches Vaterland! Verleumdung wäre es, zu leugnen, dass auch hier die Blüthen zu kräftiger und früh-

<sup>1)</sup> Haller. p. 26. „Morbilorum, variolarum, postularum, erysipelatorum, rubellorum morbus (Vergl. Hist. path. Natur. 1. 5. 363 E.



licher Entfaltung strebten, welche den weitverbreiteten Zweigen der neu belebten Wissenschaft entsprossen, Verblendung, das Verdienst zu verkennen, welches einem Wierus, Plater, Gessner, Crato und so vielen Andern gebührt. Aber noch fehlte den Unserigen jene Frische, namentlich jene Allgemeinheit der freieren Richtung, wie sie Italiens Aerzte auszeichnet; denn unsere deutschen Landeute jagten zum grossen Theile den Phantomen nach, welche ihnen die kecke Willkür des „Reformators“ von Einsiedeln vorgezaubert hatte. Und wie hätte mit dieser Richtung sich auch nur die kleinste Neigung vertragen, auf einen Gegenstand zu merken, den der vergötterte Meister niemals einer Rücksicht würdigte? <sup>1)</sup>

Uebereinstimmende Aussagen mehrerer gleichzeitiger Schriftsteller bezeichnen Constantinopel als den entferntesten Ausgangspunkt dieser Epidemie, welche sich dann, während einer den Hypothesen der Miasmatischer absolut ungünstigen Witterungsconstitution über Oesterreich, Illyrien, Siebenbürgen, Calabrien, Sicilien, ganz Italien und gleichzeitig oder schon früher über die Schweiz und Deutschland, wahrscheinlich über ganz Europa verbreitete <sup>2)</sup>. Diese Pest hatte schon mehrere Jahre vorher im Orient geherrscht, und namentlich die kriegerischen Unternehmungen Saltan Amurath's gegen die gerade in dieser Periode auf dem Gipfel ihrer Macht stehende Republik Venedig vereitelt <sup>3)</sup>. Alles deutet auf eine von vielen Seiten her Statt gefundene Einschleppung derselben durch Seefahrer sowohl, als durch den lebendigen Verkehr zu Lande. Fast alle specielleren Nachrichten aber beziehen sich auf die Verbreitungen der Krankheit in Italien und Sicilien.

1) Vergl. H. Huxer: Mit welchem Rechte heisst Paracelsus der Reformator der Medicin? (Huxer's Archiv für die ges. Med. I. 9)

2) Schnurrer, II 8. 124 ff.

3) Thuanus, Jac. Aug., *Historiar. rei tempor.* p. III. p. 175. (Fremont. 1614. 8.) — Valerius Maximus, *Tomus. method. et fabr. patr. cur. rat.* Paris 1632. Lib. III. p. 45. „*Simocritus patris Caesaris a 1575 testimonio ex Asia transibit*“ —

**Malta, Messina, Palermo. — Ingrassias.**

Nach letztgenannter Insel kam dieselbe durch einen Piraten, welchem sie ein maltesisches Freudenmädchen mitgetheilt hatte<sup>1)</sup>. Zu Messina erlagen ihr 40,000 Menschen, und die Stadt wurde auf diese Weise fast ganz verödet<sup>2)</sup>. Zu Palermo herrschte sie in den Jahren 1575 und 1576. Auch hier, wo Ingrassias<sup>3)</sup> die Krankheit beobachtete, trug Verkenennung ihres wahren Charakters und selbst später noch die Unzulänglichkeit der angewendeten Spermmaßregeln die vorzügliche Schuld des unendlichen Elends, welche sie über diese so oft durch Seuchen jeder Art verheerte Stadt brachte. Ingrassias wurde weder durch die geringe Berücksichtigung seiner Vorschläge<sup>4)</sup>, noch selbst durch die Anfeindungen Uebelwöhlender, welche ihm den hohen Lohn, den er Anfangs für seine gefährlichen Bemühungen forderte, zum Vorwurfe machten, — (später eilte er den Kranken unentgeltlich zu Hilfe) — von der redlichsten Berufserfüllung abgehalten. Zu Palermo zeigten sich Petechien als das gefährlichste, selbst die sonst so gefürchteten Anthracen an schlimmer Vorbedeutung übertreffende Symptom; seine Therapie aber stützte Ingrassias auf zeitige Aderlässe, denen mit dem besten Erfolge Abführungs- und später Schwitzmittel, so wie die hergebrachten Cardiacen u. s. w. folgten. In die Nähe der Karunkeln legte er Vesicatoren, und vermittelt des Glüheisens wurde die Zeitigung der Babonen erzielt. Fontanelle schützten vor der Krankheit.

1) *Bellicochus* bei Schaurzen.

2) *Thucyd.* u. s. O.

3) Statt des im Schrifttumsreichthum genannten Werkes dieses Autors kennen wir nur die kurzen Angaben, welche sich in Haller's *Abhandl. med. pract.* II. 78 finden, so wie den lateinischen Auszug aus demselben bei Cameracius lesen.

4) Ingrassias verlangte die Errichtung dreier Hospitäler für die Verdächtigten, Kranken und Genesenden. Ein Vorschlag, der später in Mailand und Vercelli zur Ausführung kam. S. unt. S. 89.

**Trient, Verona, Mantua, Mailand. — de Hortensii.**

Im Anfange Jani's 1575 (während welchen Jahres das grosse Kirchenfest viele Pilger nach Rom zog, denen man einen Antheil an der allgemeinen Verbreitung der Krankheit zuschrieb<sup>1)</sup>), kamen zu Trient Krankheiten vor, welche Personen aus allen Ständen, von jedem Alter und Geschlecht am 2ten, 3ten, 4ten, höchstens am 7ten Tage tödteten, und sich bis zum November, in welchem Monate die Seuche erlosch, so sehr ausgebreitet hatten, dass in der wenig umfänglichen und nicht sehr bevölkerten Stadt der Menschenverlust auf 6000 gestiegen war<sup>2)</sup>. Bald nach dem Ausbruche dieser Krankheit in Trient besch dieselbe auch in dem nahen Verona (im Juli), im September in Mantua und an vielen andern Orten aus. Wir entnehmen diese und den grössten Theil der später mitgetheilten Nachrichten über die Mailänder Pest dem ausgezeichneten, bis jetzt noch nirgends benutzten, ja wie es scheint ganz unbekannten Werke von de Hortensii, dessen Titel das Schriftenverzeichnis enthält, und für dessen Mittheilung wir Hrn. Dr. Schönnemann, Vorsteher der Herzogl. Braunschweigischen Bibliothek zu Wolfenbüttel, um so dankbarer verbunden sind, als wir vorher weder von der Wichtigkeit, noch überhaupt von der Existenz dieses Werkes einige Kenntniss hatten. Der Verfasser desselben, einer der angesehensten Mailänder Patricier und Mitglied des Gesundheitsrathes, dessen Präsidenten, Girolamo Montio, das Werk gewidmet ist, theilt in 5 Büchern sämtliche in den Jahren 1575—1577 erschienenen Verordnungen und Gesetze des Mailänder Gesundheitsrathes, stets von erläuterten Bemerkungen begleitet, mit, ausserdem eine Anzahl ähnlicher Gesetze der Republik Venedig, Bologna u. s. w. das Gutachten des Arztes Cesare Rincio (vollständig auch bei Camerarius), viele Präservationsmittel u. s. w., und seine Schrift erhält auf diese Weise für die Geschichte dieser Pestepidemie,

1) Thümmel, a. a. O. in Anl.

2) Mazzucchi, *de peste*, ob. cit.



[1476.]

so wie besonders für die der Sanitätspolizei die äusserste Wichtigkeit. —

Nach Mantua kam die Pest durch einen jüdischen Kleiderhändler. Der Gesundheitsrath von Mailand, welcher die Verhütung der Krankheit in den benachbarten Städten gleich Anfangs mit der grössten Aufmerksamkeit verfolgte, liess das zu Mantua inficirte Haus niederbrennen, allein vergebens. Als sich das Uebel in dieser Stadt immer mehr verbreitete, schickte derselbe auf Befehl des spanischen Generalgouverneurs, Marchese Ayamonte, zwei Aerzte von Mailand und Cremona nach Mantua ab, um den Charakter der Krankheit näher zu untersuchen. Diese (ihre Namen werden nicht genannt) bestätigten auch in einem unter dem 20sten Jan. 1576 an den Mailänder Gesundheitsrath gerichteten Schreiben, ungeachtet der Einwendungen eines andern ebenfalls nicht genannten Arztes, die Gegenwart der Pest in Mantua.

Die Beschreibung der Epidemie von Mantua findet sich bei Somentius, einem Cremoneser Arzte, in dessen Vaterstadt die Krankheit am 13. Aug. 1576 (dem Datum der Vorrede) noch nicht ausgebrochen war. Somentius gehört zu der kleineren Zahl der damaligen Aerzte, welche den rein contagösen Charakter der Krankheit standhaft behaupten. Er misst das Unglück Mantua's lediglich der Versäumniß aller Sperrmassregeln zu, und beschränkt durch seine Schrift Nichts, als die kräftige Mahnung seiner Mitbürger zu passender Abwehr der Krankheit. Die Geschichte schweigt von dem Loose des später ergriffenen Cremona; glücklich war es, wenn es seinem Somentius fest vertraute. —

Bald darauf zeigte sich die Pest in Paruzzaro, 2 Miglien von Arona, wo in 3 Tagen von 600 Einwohnern 22 starben. Auch hier liess sich die Einschleppung durch von Mantua eingebrachtes Leinwandzeug nachweisen. Mailand aber ordnete alsbald eine strenge Absperrung der anliegenden Orte (Bergomagniero, Orta, Oleggio) gegen Paruzzaro an. Nach Arona, wo bis zum 27sten März 1576 25 von 530 Einwohnern

(also fast 1) gestorben waren, wurden von Mailand Chirurgen, Todtengräber und das zur Desinfection nöthige Personal geschickt. In das Castell Momo kam die Pest durch einen aus Paruzzaro fliehenden Priester. Immer weiter verbreitete sich aus, trotz der sorgfältigsten Sperrmassregeln, die entsetzliche Krankheit, immer deutlichere Beweise ihrer Contagiosität gewährend. So wurden Voghera, eine auf der Strasse nach Genua liegende Stadt von 11,600 Einwohnern <sup>1)</sup>, Torre di Menapace (wo die anfänglich glücklich unterdrückte Krankheit später doch wieder ausbrach), das Schloss Fortunago (wo 14 Personen starben), ergriffen. Zu Marignano, einem Flecken, 10 Miglien von Mailand <sup>2)</sup>, erschienen zu Anfang der Epidemie keine Bubonen und sonstige charakteristische Pestsymptome, sondern petechienartige, blasige Hautausschläge, und man gab sich trügerischen Hoffnungen so lange hin, als es unbekannt blieb, dass die Verbreitung der Krankheit von einem der Pest erlegenen Kutscher aus Mantua sich herleitete. Durch strenge Sperrmassregeln, z. B. die Abtragung der die beiden Theile der Stadt verbindenden Brücke über den Lambro, gelang es, die Pest bald wieder zu tilgen. In dem bald darauf ergriffenen Monza <sup>3)</sup> liess sich die Einschleppung der Pest durch eine mit Korallen und Kleidern handelnde Frau aus Mantua nachweisen. — So rückte die Pest trotz aller Anstrengungen des Gesundheitsrathes der Hauptstadt immer näher, und brach endlich am 11ten August 1575 in Borgo degli Ortolani, einem sehr nahe vor den Thoren Mailands liegenden, vorzüglich von Gärtnern bewohnten Flecken mit 6000 Einwohnern, schon am folgenden Tage in Mailand selbst aus. Nach Borgo degli Ortolani war sie durch Mäler von Marignano eingeschleppt worden. In Mailand aber wurden die nach Borgo degli Ortolani zu gelegenen Strassen zuerst ergriffen <sup>4)</sup>.

1) Voghera hat noch gegenwärtig dieselbe Seelenzahl.

2) Bekannt durch die Niederlage der Schweizer im J. 1515.

3) In der Domkirche dieser Stadt wird bekanntlich die eiserne Krone des lombardischen Königs bewahrt.

4) de Harlemael, p. 351.



**Mailand.**

In dieser Stadt hatte die Thätigkeit des Gesundheitsrathes, welcher von der rein contagösen Natur der Krankheit auf das Unwidersprechlichste überzeugt war, schon lange vor dem Ausbruche der Pest begonnen, und ihre Verbreitung in den entlegeneren Stätten im Auge gehabt. Zahlreiche Verordnungen suchten auf jede Weise die Verschleppung der Krankheit durch Menschen und leblose Gegenstände zu verhüten, harte Strafen folgten der Entdeckung des geringsten Vergehens. So drohte dem, der ohne Gesundheitspass aus den als infectirt bezeichneten Orten nach Mailand kam, durch ein Gesetz vom 28sten März 1876 die Todesstrafe <sup>1)</sup>; reisenden Kaufleuten wurde der Zutritt zur Stadt selbst unbedingt untersagt <sup>2)</sup>. Patriotisch geeizte Männer aus den edelsten Familien theilhafteten in der Sorge für die Bewachung der Thore und die Prüfung der Pässe der Ankömmlinge; die gewuesten Instructionen unterrichteten sie und die ihnen untergeordneten Wachen über die ihnen anvertraute Fürsorge <sup>3)</sup>. Ein anderes Gesetz (vom 23sten Juni) ist gegen die gerichtet, welche, wie es an der nach Borgo degli Ortolani hin gelegenen Porta Comasca vorgekommen war, sich durch Stellvertreter die Last der übernommenen Verpflichtung zu erleichtern suchten. Die Bewohner wurden stets von der Fürsorge der Regierung in Kenntniss erhalten, in passender Weise über das zweckmässigste Verhalten unterrichtet, und ihnen jeder Beweis gegeben, dass man selbst bei den lästigsten Anordnungen lediglich das Wohl Aller im Auge habe. So verbot schon vor dem Ausbruch der Krankheit ein Gesetz den Wechsel der Wohnung <sup>4)</sup>. Eben so erspriesslich und zum Glück, wie es scheint, durch die Folgsamkeit der Bewohner unterstützt, zeigten sich die zahlreichen Verordnungen des Gesundheitsrathes nach dem Ausbruche der Krankheit, und wenn auch

1) *de Hortensii*, p. 27.

2) *S. das. das Gesetz vom 7ten August.*

3) *S. das. S. 33. das Verzeichniss desselben.*

4) *Vom 5ten August.*



die Verheerungen desselben immer bedeutend genug waren, so ist doch offenbar, dass der Wachsamkeit der Regierung eine Milderung des Unheils gelang, welches das in Folge der Verblendung seiner angesehensten Aerzte weit unglücklichere Venedig zu erreichen nicht vermochte <sup>1)</sup>. Die gerechte Furcht der Verschleppung der Krankheit durch den Pöbel und obdachlose, jedem Elend preisgegebene und nur den nächsten Vortheil ins Auge habende Bettler veranlasste schon am 27sten August die Aufhebung dieser Klasse der Bevölkerung, und ihre Unterbringung und Verpflegung auf Staatskosten <sup>2)</sup>. Bei schweren Strafen war jedem Einwohner verboten, sich der Theilnahme an dem allgemeinen Unglück durch die Entfernung zu entziehen <sup>3)</sup>; der Habsucht derjenigen Verruchten, welche Thüren und Wände der Häuser mit ekelhaften Salben bestrichen, um durch den Abscheu und die Furcht vor einer eingehüllten Gefahr die Bewohner zu schleuniger Flucht zu bewegen, wurde durch Belehrung über das Betrügerische dieses Frevels, und durch Verheissung hoher Belohnung für den Angeber, wäre es auch einer der Schuldigen selbst, ein Ziel gesetzt <sup>4)</sup>. Die überhäuften Geschäfte der Behörden veranlassten die Suspension der Gerichte für unwichtigere und des Aufsichtsfähige Sachen, eine Suspension, welcher in immer neuen Fristen neue Verlängerung gegeben wurde, und welche zuletzt vom 12ten September 1576 bis zum 1sten Juni 1577 währte. Gleichzeitg wurden alle in Civilsachen Gefangenen ihrer Haft entlassen. Da das Spital San Dionigi sehr bald für die Aufnahme der Reconva-

1) S. unten.

2) de Martenali, p. 99 und 112. — In der genannten Schrift sind diese und andere Kosten in einem Berichte an den Generalgouverneur (S. 352 ff.) genau berechnet. Sie gehen weit in die Hunderttausende (nach Lire). Die Stadt verpflegte ausser den Armen in den Hospitälern (über 2000) während der Pestperiode täglich über 27000 Arme. (S. 355.)

3) 500 Goldscudi und Verlust des Bürgerrechts auf ewige Zeiten. (de Martenali, S. 101.)

4) Durch Gesetz vom 12ten Septbr. Das. S. 112. — Ähnlicher Frevel kam in andern Epidemien nicht selten vor.

[1176.]

lescenten zu wenig Raum darbot<sup>1)</sup>, (die eigentlich Kranken nahm das grosse Hospital San Gregorio auf), so erbaute man vor den Thoren eine Anzahl Baracken. Bei dieser Gelegenheit hatte man mit der Widersetzlichkeit der dazu entbotenen Arbeiter viel zu kämpfen<sup>2)</sup>. — Ein Gesetz (vom 22ten September) verbot die Ausfuhr von Lebensmitteln; ein anderes, häufig übertretenes und deshalb oft wiederholtes untersagte Frauen und Kindern die Betretung der Strasse, und von jeder Familie war es nur einer männlichen Person erlaubt, täglich einmal auszugehen, um die Bedürfnisse des Hauses zu beschaffen. Ein besonderer Pass schrieb selbst die Strassen vor, deren Betretung erlaubt war. Auf der anderen Seite wurde aber auch die eigenmächtige Verschliessung solcher Häuser verboten, deren Bewohner noch gesund waren; eine Massregel, welche die Vermehrung unnöthiger Besorgnisse des Publikums im Auge hatte. Diese Quarantäne der ganzen Stadt und der umliegenden Ortschaften begann am 29ten October 1576, und wurde, da sie wegen schlechter Befolgung der hinsichtlich ihrer erlassenen Gesetze wenig Nutzen brachte, vom 6ten December an noch strenger durchgeführt. Sie wurde erst am 23ten März des folgenden Jahres, wo die Pest als völlig erloschen angesehen werden konnte, wieder aufgehoben. Ihr vorzüglich schrieb man die Abwendung noch grösseren Unheils und die endliche Befreiung der hart geprüften Stadt zu. Während der Quarantäne und schon vor derselben waren Besuchsanstalten eingerichtet, deren Beamte (angesehene und zuverlässige Bürger) jeden Morgen jede Familie besuchten und sich von dem Gesundheitszustande ihrer Glieder Kenntniss verschafften. Zugleich wurden an die Armen die nöthigen Lebensmittel verabreicht. Die vorkommenden Krankheitsfälle wurden den Bezirksärzten (13 an der Zahl) zu näherer Untersuchung und weiterer Verfügung angezeigt. Vor diesem Besuche durften selbst die zum Ausgehen Berechtigten das Haus nicht verlassen. Ja,

1) Die Zahl der Bepraschestrassen stieg einmal von auf 4000. (Das. 8. 334.)

2) Das. 8. 117.

der Grundtze der rein contagösen Verbreitungsart der Krankheit wurde selbst bei der Anordnung einer feierlichen Procession festgehalten, welche am 10ten Januar 1577, als man sich gegründeten Hoffnungen des baldigen Erlöschens der Seuche überliess, zu Ehren des heiligen Sebastian gefeiert wurde, an welcher aber nur die Geistlichkeit, unter der Anführung des hochwürdigsten Erzbischofs Carl Borromeus, Theil nahm. Diesem Letztern werden wegen seiner aufopfernden, keine Gefahr schenkenden Thätigkeit von de Hortensii sowohl als Thuanus die grössten Lobspprüche ertheilt. Selbst nachdem man seit dem 1sten Februar dem Verkehr eine freiere Bewegung gestattet hatte, wurde noch einmal eine 14tägige strenge Quarantaine angeordnet, weil noch officiellen Nachrichten vom 20ten Febr. die Pest in dem nahen Brescia ausgebrochen war. Und selbst nach Aufhebung der Quarantaine (seit dem 23sten März) blieb noch eine Zeitlang der Besuch der Wirthshäuser untersagt, den Weibern aber und Kindern unter 10 Jahren wurde nur der Besuch der Kirchen gestattet. Erst am 2ten Mai hielt man eine allgemeine grosse Dank-Procession für zukuftig, schloss aber selbst von dieser noch die Bewohner der inficirt gewesenen Häuser aus. Vom 6. Mai an aber fand 14 Tage lang eine vom Gesundheitsrath angeordnete und unter der speciellen Aufsicht seiner Beamteten ausgeführte Reinigung aller Kleidungsstücke der in inficirt gewesenen Häusern Wohnenden Statt, und gleichzeitig wurden auf Staatskosten alle inficirt gewesenen Zimmer geweißt. Hierbei fand sich, dass 4606 Familien Pestkranke gehabt hatten, und dass dieselben in 8923 Zimmern vertheilt gewesen waren.

Dies sind die interessanten Hauptpunkte der genannten Schrift. Sie legen für die Umsicht, für den Eifer und die Sorgfalt des Gesundheitsrathes der Stadt Mailand das ehrenvollste Zeugniß ab, sie liefern den erfreulichen Beweis, dass der Samen der besseren Einsicht, der anderwärts, namentlich in Deutschland, unter dem schweren Drucke Galenischer Dogmen und Paracelsischen Aberglaubens zu verdampfen drohte, unter



[1576.]

dem hellen Himmel Italiens, obschon er noch hier noch an manchen Stellen nur mit Mühe sich unter der tausendjährigen Last hervordrängte, zu fröhlicher Entwicklung entsprossenen begann.

### Venedig. Padua.

In Venedig hatten zum nach schon seit dem Juli, in welchem Monate ein Trientinischer Schiffer unter verdächtigen Umständen gestorben war, bis zum December des Jahres 1575 verdächtige Krankheitsfälle vor, aber sie blieben doch immer vereinzelt, und zu Anfang des Jahres 1576 schienen alle Keime des unheimlichen Uebels erstickt zu seyn. Ende Februar aber oder Anfangs März wiederholten sich die Erkrankungen häufiger, wie es liess, in Folge der Wiederbenutzung eines verpesteten, mehrere Monate verschlossen gewesenen Geräthes. Immer aber blieben die Pestfälle bis zur Mitte des Juli, wo anhaltendes, obwohl nicht bedeutendes und warmes Regenwetter eintrat, nachdem die Witterung bis dahin im Allgemeinen warm und trocken gewesen war, wenig zahlreich <sup>1)</sup>; von da an aber verbreitete sich die Krankheit immer mehr und mehr, und erreichte im August, September und October ihre grösste Höhe, bis sie endlich Anfangs März 1577 als erloschen angesehen werden konnte <sup>2)</sup>.

Einen ganz ähnlichen Verlauf nahm die Krankheit zu Padua, wo die ersten vereinzelt und wenig gefährlichen Pestfälle zu Ende Mai oder Anfangs Juni 1576 vorkamen <sup>3)</sup>. Ihre grösste Höhe erreichte die Pest in den Monaten vom Juli bis zum October, und als ganz erloschen konnte sie erst im April 1577 angesehen werden <sup>4)</sup>.

1) Taglich starben ungefähr 400 Personen, Massaria, c. 1.

2) *Mercurij Italia, tractatus de pestilentia*. Die Ursache der ersten Bürger-Ausgabe ist von Salus März 1577 datirt.

3) *Mercurij Italia, l. c. c. 6, paragraffo, punctatione sexta*.

4) Massaria, p. 2.

## Pest zu Vicenza. — Massaria.

Der Verlauf der Epidemie zu Vicenza wird von Massaria, den klassischen Augenzeugen derselben, genau geschildert. Am 17ten December 1576 starb ein Mann nach 3tägiger Krankheit; dieser Todesfall wurde aber nicht eher beachtet, als bis Anfangs Januar 1577 auch die Frau und die beiden Kinder derselben Familie nach kurzer Krankheit gestorben waren. Die sogleich angeordnete Untersuchung constatirte diese Fälle, bei denen sich Geschwülste und schwarze Flecken an verschiedenen Körpertheilen fanden, als der Pest zugehörig, und es ergab sich nun, dass der zuerst verstorbene Mann wollene und linnene Kleidungsstücke von Padua nach Vicenza gebracht hatte. Diese wurden alsbald verbrannt und die inficirte Wohnung gehörig gereinigt. Es kam noch im Verlauf des Januar kein weiterer Pestfall vor. Am 2ten Februar indess erkrankte die Tochter eines Stoffkaufers in einem mit dem erst erwähnten zusammenhängenden Hause, und starb am 4ten Tage. Massaria fand bei derselben einen Inguinalbubo und veranlasste sogleich die Absperrung dieses Hauses, welches noch von den Aeltern, einer Schwester und drei Brüdern des gestorbenen Mädchens bewohnt wurde. Am 10ten Febr. erkrankte der ältere, 13jährige Bruder, an heftigem Fieber, Kopfschmerz, Delirien und starb am 11ten Tage; die Leiche war mit zahlreichen Pusteln bedeckt. Sogleich wurde auch dieses Haus gereinigt, die Bewohner desselben gebadet u. s. w. und in ein altes, jeglichen Verkehr fernes Vorwerk gebracht. Sogleich aber erkrankte die 16jährige Tochter unter ähnlichen Zufällen wie der verstorbene Bruder, zu denen sich noch ein Leistenbubo gesellte. Massaria, der bis dahin noch keinen Fall der Bohnerpest beobachtet hatte, nahm sich mit dem größten Eifer der Kranken und ihrer Familie an, und stellte die erstere glücklich wieder her. Die übrigen Mitglieder der Familie, welche in jenem Vorwerk 42, und dann in ihrer eigenen Wohnung noch 23 Tage lang in strenger Absperrung gehalten wurden, blieben fortwäh-

[1577.]

rend gesund. Trotzdem kamen im Februar noch 5, im März ebenfalls 5, im April 8, im Juni kein, im Juli 22 Pestfälle vor. Von da an aber stieg die Zahl der Erkrankungen ausserordentlich schnell, und es starben im August 156, im September 340, im October 295, im November 75, im December 9. — Schon im März trafen die Behörden der Stadt die strengsten Massregeln, um das Umsichgreifen der Krankheit, von deren Contagiosität man durch Maxxaria überzeugt worden war, zu verhüten. Die Hausgenossen der Erkrankten und Gestorbenen wurden in öffentlichen, streng abgesperrten Gebäuden, und in breiteren Häusern, welche man auf dem auf einer Insel gelegenen Marsfeld errichtet hatte, untergebracht. Die Gesandblichen durften nach 20 Tagen in ihre vorher desinficirten Wohnungen zurückkehren, blieben aber auch in diesen noch 20 Tage lang abgesperrt. Ausgemachte Pestkranke nahm das in der Nähe des Marsfeldes gelegene Lazareth auf. Die in diesem Genesenen kamen auf das Marsfeld, um dort noch der Quarantaine unterworfen zu werden. Im Lazareth starben im März 1, im April 10, im Mai 10, im August 121, im September 303, im October 278, im November 182, im December 60, zusammen 978. Hierzu 220 Todesfälle in der Stadt gibt als Totalsumme der tödtlichen Pestfälle in Vicenza 1208. — Als im August die Seuche plötzlich sehr zunahm, wurde verboten, die Stadt zu verlassen, eine Massregel, über welche sich, obschon erfolglos, vorzüglich die Aerzte beschwerten. Zu ihrer Erleichterung wurde indess die Einrichtung getroffen, dass je vier derselben mit je 64 Bürgern je 14 Tage lang die Geschäfte besorgten. Diese in 32 Strassen der Stadt vertheilten Bürger besuchten vom 1sten September 1577 an jeden Morgen alle Einwohner, denen es streng verboten war, vor dieser Untersuchung das Haus zu verlassen. Die aufgefundenen verdächtigen Fälle wurden bei einem der vier Pestärzte, deren jedem 8 Strassen zugetheilt waren, zur Anzeige gebracht<sup>1)</sup>. Eine

1) Wahrscheinlich gab es also damals in Vicenza 8 Aerzte. Die Einwohnerzahl aber (— genau hatten sich wohlhabendere Einwohner die Stadt verlas-



Massregel, die später häufig mit dem besten Erfolge wieder angewendet worden ist <sup>1)</sup>. — Die Desinfection der von den Kranken benutzten Geräthe, Kleider u. s. w. wurde durch Zügiges Einlegen in Wasser, durch Abwaschen mit Lauge, 30tägige Lüftung u. s. w. bewirkt, und auf diese Weise gleichzeitig den Erfordernissen der Vorsicht und der Schonung des Eigenthums entsprochen.

**Ansichten der Aerzte: Mercurialis, Capivacci, Marinelli, Glisente, Susio, Hercules Saxonia, (Miasmatischer); Massaria, Raimundo (Contagionisten).**

Die Zufälle der Krankheit waren die gewöhnlichen der Bubonenpest. Deutlich indess verriethen das heftige Fieber, der Kopfschmerz, die Delirien, das Erbrechen und der Ausbruch reichlicher Petechien die dem Charakter des wesentlich identischen Petechialtyphus verwandte Natur der Krankheit. Die Mailänder Pest wenigstens änderte während ihres Verlaufs ihren Charakter nicht unbedeutend. Anfangs trat sie in ihrer wahren Gestalt mit Bubonen und Carbunkeln auf, später erschienen statt deren vorzugsweise die Pestauschläge. In dieser letzten Gestalt war sie am verheerendsten und tödtete fast alle Befallenen. Rincius hält für die Ursache dieser Wendung der Krankheit die bedeutende Wärme des Frühlings nach dem kalten Winter <sup>2)</sup>. Anderer Eigenähnlichkeiten erwähnt Mercurialis, obwohl die durchgängige Richtigkeit seiner Beobachtungen gerechtem Bedenken unterliegt. Sicher scheint es

seyn, weil angegeben wird, es seyen täglich 2000 Einschaare auf öffentliche Kosten ernährt worden —) betrug nach Massaria 1046. (In besseren Zeiten hatte nicht über 20,000 betragen, eine Wille, mit der sie sich in neuerer Zeit wieder erhöhen hat.) Herr: 382 in den Krankenschiffen, gibt 10,324. Von diesen starben 1585; die Sterblichkeit betrug also nahe 10, 12 oder fast  $\frac{1}{2}$  der Bevölkerung. Ein Resultat, welches vielleicht noch etwas weniger ungünstig gewesen seyn würde, wenn die Sperrre noch consequenter hätte durchgeführt werden können. Wenigstens starben in Venedig, wo man fast alle Sicherheitsmassregeln vernachlässigte, 70,002, also ungefähr  $\frac{1}{2}$  der Bevölkerung. Von 140 Kranken grünten etwa 10, (Gemmi, p. 221.) Dennoch bezeichnet Mercurialis diese Pest, — so sehr war man an noch stärkere Verheerungen gewöhnt. — als eine mässige!

1) Namentlich bei der Cholera zuerst in der jüngsten Asiatischen Epidemie.

2) Rincius, bei Comaratus, 2e Auf.

[4476.]

indess zu seyn, dass sich die gewöhnlichen Zeichen der Bösartigkeit, Karunkeln, Petechien und faulige Zustände schon sehr früh entwickelten. Auch in Venedig starben die meisten Kranken schon am 1ten Tage, oft schon am 2ten und 1sten, selten am 3ten, während bekanntlich in den meisten Pestepidemien der Tod am 7ten und 9ten Tage eintritt. Die Krankheit betraf vorzüglich das weibliche Geschlecht, besonders Jungfrauen, Mädchen und Schwangere. Nach Camerarius <sup>1)</sup> starben in Venedig fast alle mündbaren Jungfrauen. Sehr gross war auch die Sterblichkeit bei den Knaben bis zum 14ten Jahre; sehr selten aber wurden Greise ergriffen. — Unter den niederen Volksklassen war die Krankheit, wie es die Erfahrung früher und später unzählige Male bestätigt hat, weit allgemeiner verbreitet, als unter den höheren Ständen <sup>2)</sup>. Unmäßigkeit und Regellosigkeit des Lebens steigerte die Anlage zu derselben in bedestendstem Grade. Einige Aerzte machten die Bemerkung, dass Wunden einen pestartigen Charakter annehmen (Hospitbrand <sup>3)</sup>). Vielen, übrigens Gesunden, sollten auch nach angestrengter körperlicher Thätigkeit die Leisten- und Achselhöhlen angeschwollen seyn <sup>4)</sup>.

Der grösste Theil des Unheils, den die Venetianische Pest vom J. 1576 über Tausende von Familien brachte, muss der Unkenntnis und Sorglosigkeit der Aerzte, namentlich des Mercurialis zugeschrieben werden. Dieser Arzt war mit Capivacci von Padua getroffen worden, um die oberste Leitung der ärztlichen Angelegenheiten während der Seuche zu übernehmen. Gegen die Ansicht der übrigen Aerzte <sup>5)</sup> erklärten die-

1) Camerarius, *loc. cit.*

2) Mercurialis, *loc. cit.* und *loc. cit.* den wahren Grund dieser Erscheinung zu erkennen, erklärt dieselbe aus dem häufigsten Einathmen der pestbehafteten Luft bei den körperlichen Ausdrückungen der arbeitenden Klassen. (1)

3) Mercurialis, *loc. cit.*

4) Dies scheint wenigstens aus einer Aeusserung Giacomini's, eines prominenten Venetianers, welcher diese Pest als Ungestyrte beschrieb, und auf Beleid den grössten Aerzten seiner Stadt um den Vorwurf der Krankheit legte, hervorzugehen. Dessen ungeachtet wurden Giacomini's Rück von dem Senat wegen ihrer Leichtgläubigkeit und schlafenden Hülfsleistungen (1581) (Vergl.

selben die ersten, nämlich genug ausgesprochenen und tödtlichen Fälle der Pest nicht für diese selbst, sondern für hitzige pestartige Fieber, und berücksichtigten das Gesetz der Entstehung epidemischer Krankheiten von einem begrenzten Anfangspunkte aus so wenig, dass sie die anfängliche geringe Zahl der Pestfälle, der Galenischen Definition der Pest gegenüber, nach welcher dieselbe eine allgemeine und Viele befallende Krankheit ist, durchaus nicht für die Pest gehalten wissen wollten, selbst da noch nicht, als die ihnen folgende nur zu deutlich ihre Natur verrathende Seuche ihren epidemischen Verlauf beendet hatte<sup>1)</sup>. Eine um so weniger verzeihliche Verblendung, als Mercurialis die beiden Grundbedingungen der Verbreitung der Pest, eine eigenbründliche Pestconstitution und das Contagium klar genug erkennt<sup>2)</sup>. Aber er hält mit Unrecht und verführt durch viele falsch erklärte Thatsachen die constitutionellen Verhältnisse für ungleich wichtiger, als das Contagium. Ja er führt selbst in einem besonderen Capitel alle gegen seine Meinung gerichteten Argumente des Contagionisten vor an, um sie durch alle Scheingründe Galenischer Sophistik zu widerlegen.

Hecker, *Gesch. d. neuer. Heilk.* 5. 26.) Ungegründet scheint es zu sein, dass Mercurialis aus Lichon die Stadt vertriebe und sich nach Bologna wendete, was nach Türkerzchi (VII. 2. p. 66.) erst allfälliger später erfolgte. — Bedeutende Contagionen grüßte Gentius für das Jahr 1555, in welchem zu Prag die Pest herrschte, und von dort durch einen Schüler nach Weysskirch, von Genua, als Leibarzt König Sigismund III. Janszki dahin gebracht wurde. Die Ärzte erklärten die Babonen diese Krankheit für epidemisch; Genua aber verhielt demgegenüber, daß eine Nacht bei diesem Krankenleben würde, 500 Kranke über, und erreichte so die mit dem vollständigen Erstirge dazugehörige Absterbung des hinf. darauf stehenden Kranken. (Genua) p. 329.) Ueberhaupt zeigt sich in der Behauptung eines a' la des Urtheiles eines gestrigen Besichters und Meeres Doctors, und als lang geübt in einer heissen Krankheit und Behandlung der Pest unanfechtlich viel bei.

1) Mercurialis, c. 9. — *Uera pestis in libris septuaginta octo fuit ante Julii mensem 1575, ad tantum pervenit et praedictis diebus fuit.*<sup>3)</sup> — „Non patitur existeret, appellandum esse non pestem, in qua est duo vel tres praesentia singula illa. Quasi fortasse forte quendam pestem, sed non istam pestem.“ — 5. 45.)

2) Merc., a. l. — „De causa quoniam pestis exoritur non dubium, sed et quoniam patitur perpetuo contagione causae, similis alicuius quoniam contagionis.“



[1576.]

Leider blieb Mercurialis nicht der Einzige, der so verderbliche Vorurtheile nährte; mehrere angesehenen Aerzte suchten durch ähnliche Demonstrationen das Irrige der entgegengesetzten Meinung darzuthun, was wenigstens in so fern nicht ganz ohne Erfolg geschah, als unglücklicher Weise die meisten Contagionisten sich gerade ziemlich schwacher Argumente bedient hatten. So wird es z. B. einem Venetianischen Arzte, Mariavelli, nicht schwer, die Schwächen der Gegner aufzudecken, welche sich vorzüglich auf vier Gründe beriefen: a) Die Krankheit sey aus verpesteten und durch sie selbst verüdeten Orten eingeschleppt worden. b) Sie tödte in kurzer Zeit. c) Sie sey durch ein Contagium wirksam. d) Sie sey von Karbunkeln, Bohren und Petechien begleitet<sup>1)</sup>. In demselben Sinne ist die Schrift von Glisente abgefaßt, die sich zum Theil der biederlichsten Beweisgründe für die Nichtcontagiosität der Krankheit bedient. So erklärt ihr Verfasser z. B. die Immunität der Gefängnisse aus dem in der Nacht erzeugten Dunste derselben, welcher des Morgens beim Öffnen der Fenster die Pestluft vertreibt. Die Trientiner Epidemie sey von den fauligen Exhalationen der in die Elsch geworfenen Leichen entstanden, und in Venedig sey die Krankheit auf ähnliche Weise durch den Gestank der Todten in dem „allerdings ziemlich entfernten“ Lazareth ausgebrochen. Argumente solchen Gewichts konnte gewiss Glisente's Gegner, Hannibal Baimondus von Verona, leicht bekämpfen<sup>2)</sup>. Der heftigste, aber unbedeutendste Gegner der Contagionisten ist ein Mantuanischer Arzt, Giov. Batt. Suxia.

Vielleicht wäre der Einfluss einer so angesehenen Auctorität, als die des Mercurialis war, hinreichend gewesen, um eine bessere Einsicht in die Natur und die Verbreitungsweg der Pest noch lange zu verriteln, wenn nicht Alexander Massaria, in Erfahrung und Gelehrsamkeit seinem Gegner

1) Mariavelli, p. 2.

2) Die Schrift des letzteren ist aus eben so wie Haller und Plönquist schickend.

gleich, an Scharfsinn und ruhiger Beobachtungsgabe ihm bei weitem überlegen, die Unhaltbarkeit der von diesem vorgebrachten Gründe für den miasmatischen Ursprung der Pest schlagend dargethan hätte. Mit dem unzweifelhaftesten Erfolge beschäftigt er sich in dem ersten Buche seiner klassischen Schrift mit der Widerlegung der von Mercurialis vorgetragenen Theorie. Dabei wird der Streit so ohne alle Erbitterung, so ganz mit wissenschaftlicher Würde geführt, dass auch in dieser Beziehung dem Verfasser das größte Lob nicht entgehen kann. Durch die ausführliche Beschreibung der Pest zu Vicenza und die umsichtigste Benützung der durch dieselbe dargebotenen Thatfachen gelingt es ihm vollständig, den rein contagösen Charakter der Krankheit darzustellen. Hierauf werden Punkt für Punkt die von Mercurialis aufgestellten Behauptungen vorgenommen, die Thatfachen, auf welche sich die Ansicht des Letzteren stützt, geprüft, und die Irrigkeit der meisten derselben auf eine Weise nachgewiesen, welche die Vorurtheillosigkeit des Gegners nicht eben im besten Lichte erscheinen lässt.

Mercurialis hatte behauptet, dass die Pest in Folge ungewöhnlicher Erscheinungen im Leben der Erde und der Atmosphäre aufgetreten, dass sie durch Erdbeben, anhaltende warme und feuchte Witterung, durch anhaltendes Regenwetter im Juli 1576 eingeleitet worden sey <sup>1)</sup>. Maassaria dagegen zeigt, dass diese gewöhnlich, aber ohne allen Grund, angenommen Ursachen <sup>2)</sup> zur Erzeugung der Pest Nichts beitragen, weil dieselbe sonst gleichzeitig in den verschiedenen Städten hätte ausbrechen müssen, was doch nicht der Fall war; dass einzelne Orte nicht von derselben hätten verschont bleiben dürfen n. s. w.

Ferner bemerkt er, dass die Luftconstitution zu Vicenza nicht sowohl feucht warm, als kalt (*aqueōsanā*) gewesen sey.

1) Mercurialis, c. 6 s. 3.

2) Maassaria, l. c. p. 28. „*Ex his plurime sunt velum fecerit et levita, ad vicem asperitatis et asperitatis non injuria videtur potius.*“

[1556.]

Eben so wenig seyen während der Pest die Singvögel und Cicaden verstummt. Lächerlich sey es, wie Mercurialis es gethan, unter den Ursachen der Pest anzuführen, dass das J. 1576 ein Schaltjahr gewesen sey<sup>1)</sup>. Es zeige ferner von gänzlicher Unkenntniß der Gesetze des Krankheitsverlaufs und der Logik, die ersten wenig zahlreichen Fälle der Pest für gewöhnliche Brennfeber zu halten<sup>2)</sup>. Fälschlich werde auch von Mercurialis behauptet, dass mit dem Eintritt der Pest alle anderen Krankheiten zurückgetreten seyen. Im Gegentheile habe es während derselben, wie auch in früheren Epidemien, viele andere Krankheiten, namentlich Tertianfeber, gegeben; er selbst auf sein Dienst seyen an einem solchen erkrankt<sup>3)</sup>. Ferner habe Mercurialis behauptet, bei vielen an andern Krankheiten Gestorbenen habe man nach dem Tode Pestflecken, Striemen u. s. w. beobachtet. Diese Behauptung aber widerspreche theils der früheren Aussage von dem Fehlen anderer Krankheiten, theils sey zu vermuthen, dass die Fälle dieser Art ebenfalls der Pest angehörten. Uebrigens sey das Vorkommen der Todtenflecken eine bei Leichen jeder Art sehr gewöhnliche Erscheinung<sup>4)</sup>. Unwahr sey es, die Immunität einzelner Menschenklassen, z. B. der Todtengräber zu behaupten. Zwar dürfe auf die abstumpfende Kraft der Gewöhnung an das Contagium Rücksicht genommen werden, es seyen aber doch in Venedig selbst binnen kurzer Zeit 4000 Todtengräber gestorben<sup>5)</sup>. Es vertrage sich nicht mit der von Mercurialis vorgetragenen Hypothese, spreche dagegen unzweifelhaft für den contagösen Ursprung der Krankheit, dass in Venedig in den Gefängnissen kein einziger Pestfall vorgekommen sey<sup>6)</sup>. Eben so wenig sey die Krankheit in die sich absperrenden Klöster und in die Wohnungen vieler, gleiche Vorsicht gebrauchenden,

1) Mazzaria, I. c. p. 25. b.

2) Das. p. 27. b.

3) Das. p. 32. a.

4) Das. p. 32. b.

5) Das. p. 33. a.

6) Das. p. 38. a.



Einwohner gedrungen. Einem so gewichtigen Gegner war Mercurialis nicht gemacht, und es läßt sich erwarten, daß die äusserst matten Gegenstände des Heracles Saxonii<sup>1)</sup> nur dazu dienen, den Sieg der Wahrheit zu vervollständigen.

So finden wir also zufolge einer der verheerendsten Epidemien die Pestlehre in Italien zu einer Klarheit entwickelt, die weder in theoretischer noch praktischer Beziehung bis zur Mitte des 18ten Jahrhunderts wesentliche Fortschritte machte<sup>2)</sup>. Diese aber würden gewiss nicht ausgeblieben seyn, wenn nicht die Macht verjährter Vorurtheile bei dem grossen Hofen die laute Stimme der Wahrheit, die zu allen Zeiten von den geweihten Geislern verkündet worden ist, überhört hätte, wenn sich nicht von Geschlecht zu Geschlecht der alte Fluch der Ärzte fortgeerbt hätte, in blinder Haß dem grossen Ziele der „Erfahrung“ nachzugehen, und ihren reichen Schatz, die Geschichte unbenutzt am Boden liegen zu lassen, wenn nicht zu Folge solcher Verblendung die neuen Geschlechter sich immer von Neuem in die längst begangenen Irthümer der Vorgängerinnen zu verstricken, und dem Sisyphus gleich die Felsenslast zum nie errichteten Berggipfel endlos empor zuwälzen verdammt wären.

Der Vollständigkeit wegen führen wir hier noch die Titel der historischen Schriften über die Pest der J. 1576 und 1577 auf, die wir entweder wegen ihrer Werthlosigkeit, oder weil sie uns nicht zu Gebote standen, nicht benutzt haben. (Die von uns nicht benutzten sind mit † bezeichnet.)

† Ajelli, Sebast., *Devisi diuersive de immunitate in regna Neapolitano peste n. 1575, 1576 et 1577. Neap. 1577. 4.*

1) Das 2te Buch des im Nachdruck erschienenen genannten Werkes.

2) Eine sehr kostliche Deutsche Pestschilff (Jahrgang 17) Auct. Prumptianum. Wie zur Zeit des Pestilenzs ein jeder Gemeinder und Krancker, Anfangs 1610 n. u. m. — sich mit ihm versehen und curiren soll. Leipzig. 1610. 4. 14 Bögen, (Universitätsbibliothek zu Jena) verleiht sich sehr leicht zu werden, weil der Verfasser auf die Gefährlichkeiten als Prophylaktikum das grösste Gewicht legt.

[1576.]

† Masucci, Marino, *Trattato sopra la pestilenza. Macerata, 1577.* („*Describit summa quae cidebat epidemia.*“ Haller.)

† Ingrassias, J. Phil., *Informazione del pestifero e contagioso morbo il quale affligge ed ha afflitta questa città di Palermo nel a. 1575, 1576, con regimato preservativo e curativo. Palermo 1576, 4.* (Holl. bibl. m. pr. II. 70.)

Zovelli, Petr. Jacob., *Carnagolemis; De pestilente stata. Venet. 1577. 12.* (Leipziger Universitätsbibliothek. — Völlig werthlos.)

(Anonymus), *I fatti di Milano al contrasto della peste ovvero pestifero contagio dal 1. Agosto fino all' ultimo dell a. 1577 particolarmente caduti, coll' aggiunta della historia del Rev. P. Baguta, Milanese. Milano, 1578. 4.* (Haller, *ibid.* m. pr. II, 218.)

Marinelli, Joh., *De peste ac de pestilenti contagio liber. Venet. 1577. 4.* (Erlanger Universitätsbibliothek. Ziemlich werthlos.)

† Bufacchini, Bar., *Raggionamento sopra la peste dell a. 1576. — Bei Targioni, viaggio, VII. p. 72.* (Haller, *l. c.* II. 232.)

Garnerus, Georg., *Liber de peste, quae gravata est Venetia a. 1576 et Braventi a. 1582. Braventi 1610. 8.*

† Taro, Salad., *Trattato della peste. Venet. 1576.*

† Gabrielli, Andr., *De peste. Bonav. 1577. 4.*

### **Influenza, Kriebelkrankheit, Pest, rothe Ruhr.**

In den nächsten Jahren bis 1580 findet sich für die Geschichte der Volkskrankheiten, wenn man von der östlichen epidemisch-contagiösen Verhreitung der Syphilis zu Brüssel <sup>1)</sup>

1) S. Blatz-pathol. Untersuchungen. Th. I. S. 209.

im J. 1527, und dem bekannten Kerkeflieber zu Oxford in demselben Jahre absieht, wenig Bemerkenswerthes aufgezeichnet. Nur in Chroniken wird erwähnt, dass die Spanier bei der Belagerung von Maestricht sehr an pestartigen Seuchen zu leiden hätten, und dass zu Geropolis in Morea 70,000 Menschen starben<sup>1)</sup>. Erst im J. 1580 begegnet uns wieder eine Influenza-epidemie, welche überall die lebendigste Aufmerksamkeit erregte, für welche wir aber auf die von Schweich und Gluge gesammelten Angaben verweisen können, denen wir im Anhang (unter V.) noch die bis jetzt unbekannte Beschreibung des Thomaxius<sup>2)</sup>, eines italienischen Arztes, ihres mannigfaltigen Interesses und der Seltenheit seiner Schrift wegen zugefügt haben<sup>3)</sup>. — Gleichzeitig raffte die Pest, welche im Juni desselben Jahres zu Paris ausbrach, 40,000, und zu Cairo im November 500,000 (!) Menschen hinweg. Am Oberrhein, z. B. in Straassburg, und zu Bruntrut herrschte sie noch im J. 1582.

Ferner verbreitete sich, höchstwahrscheinlich in Folge des allgemein herrschenden Mangels an Getreide und der Verderbtheit desselben durch Mottenkorn, im J. 1581 im Lüneburgischen die Kriechelkrankheit. Die Beschreibung, welche Ronseus von derselben gibt, findet sich bei Schaurrer, auf welchen wir verweisen müssen, da uns die Originalschrift nicht zu Gebote stand. Es ist diese Epidemie die erste in Deutschland, von welcher genauere Nachricht gegeben wird<sup>4)</sup>.

Im J. 1583, in welchem die Theuerung noch fortbauerte, finden wir in dem nach einem trocknen Winter folgenden heissen Sommer die rothe Ruhr in sehr weiten Kreisen verbreitet,

1) Wiatrenbeger. — Lauretati.

2) Vergl. auch zwei Briefe des Mercurialis an Crato bei Schaft de Roscanan, *opusc. medic. et philol.* p. 122. Haller nennt zur Illustration dieses Jahres noch: Camperus Franc. *De morbis acutis*, Lips. 1586, 8. — und Leips. 1592: Von eigenen Zufällen epidemischer und catarrhalischer Fieber, so 1589 angelogen.

3) Vergl. oben S. 14.

4) Vergl. Hecker, *Gesch. d. neuer. Weltkunde*. S. 261.



[1698.]

obson es, wenn das Uebel auch zahlreiche Volkschriften hervorzief, an brauchbaren Nachrichten gänzlich fehlt.

Nur Camerarius gibt bei Schenk eine kurze Notiz, nach welcher die Krankheit vorzüglich Kindern gefährlich war. Am häufigsten traten sich leichte Abführungen von Bläulichen und Klystiere, so wie absorbierende Kuren und Opiate. Abgang reiner Galle mit Erbrechen und allgemeiner Unruhe war ein höchst bedenkliches Zeichen.\*

### **Typhöse Pneumonien. Oethaeus.**

Dagegen traten die eigentlich pestartigen Krankheiten schon im J. 1585 wieder stark hervor; unter ihnen vorzüglich eine typhöse Pneumonie im Frühlinge des genannten Jahres, welche Oethaeus nach Beobachtungen in der Gegend von Ingolstadt und Dillingen beschreibt.

Diese Pneumonien verbreiteten sich im Anfang des Winters des genannten Jahres<sup>1)</sup>. Sie begannen mit heftigem Fieber, mit Erstickungsanfällen, oder auch mit heftigen, stechenden, reissenden Schmerzen in allen Gliedern und in der Brust, in welcher sie sich nach einem Aderlaß, welcher die ersteren bewiligt, fortzuwirken pflegten. Später ergriffen sie auch die Magenregion und die Hypochondrien, als Gefühl heftigen und bewegenden Druckes, zu welchem sich nicht selten Erbrechen und heftige, reissende Schmerzen im Unterleibe gesellten. Diese Zufälle wurden weder durch Aderlaß und Schröpfköpfe, noch durch Abführungen oder irgend ein sonst unter ähnlichen Umständen gebräuchliches Verfahren gemildert, sondern die Kranken starben durch Erstickung oder unter plötzlich eintretenden Erscheinungen allgemeiner Schwäche am 4ten bis 6ten Tage. Dabei waren fortwährend heftiges Fieber, feuriger Urin, lang-

1) Die ältere literarische „Hypothese“ würde dies Jahr nicht erst 1581.

2) Schenk, *opere*, II, 111.

3) Diese Nachrichten finden sich auch bei Schenk, *opere*, *mon.*, II, 129. Oethaeus selbst selbst (Zur. Oethaeus *obituario* *prope* *Mon.* *op.* —) konnte wir nicht besitzen. Vergl. Schenk, *opere*.

samer, zuweilen intermittirender Puls, zu Ende der Krankheit Delirien zugegen, welche letztere Oethaenus von einer Entzündung des Zwerchfells ableiten genügt ist<sup>1)</sup>. Aderlass schien eher nachtheilig als nützlich zu seyn. Unter diesen Umständen fand sich Oethaenus bewegen, die Krankheit für eine „pestilentialische“ zu halten, und sie demgemäss nicht ohne Erfolg mit gelinden Schwitzmitteln und dem gewöhnlichen Apparate der Bezoarden zu bekämpfen. Die typhöse Natur dieser Pockenarten, welche unbedingt an den schwitzrischen Alpenstich erinnern, dürfte wohl um so weniger einem Zweifel unterliegen, als nicht allein die ihrem Auftreten vorausgehende Witterungsbeschaffenheit, sondern auch vorzüglich die ihnen vorhergehende Rahr aus gemeinsamer Band, welches diese Glieder einer Krankheitsconstitution, der erysipelatösen, deren Eigenthümlichkeiten uns noch häufig beschäftigen werden, untrüglich, leicht erkennen läßt.

**Weit verbreitete Pest. — Gemma, Caxanes, Fragoso, Serdes.**

Joh. Bapt. Gemma<sup>2)</sup> erwähnt für das genannte Jahr eine Pest in Prag, welche ein Italiener nach Warschau verschleppte, durch dessen strenge Absperrung es aber gelang, die Weiterverbreitung des Uebels zu verhindern<sup>3)</sup>. — Zu Barcellona herrschte im demselben Jahre eine „*pestis ravennatica*“, von welcher Caxanes die unten angeführte Notiz mittheilt<sup>4)</sup>. Derselbe Krankheits beobachtete auch Fragoso in den folgenden

1) Hitz 1685 Schaeffer. Vom Oethaenus die Verwundung in den Mund, aus dieser Diaphanitas faciem et subpectorem Character gehabt habe.

2) Gemma, de cur. feb. etc. p. 223.

3) S. oben S. 87.

4) CAXANES, R., *Alcorum Valedictio de variae morborum singulari in filiis patriis illi III. Barcin. 1592.* — lib. I, 2. p. 22. „*In ea horribilissima peste, quae anno 1585 hanc urbem tenuit, singulis periculis, quibus singulis fuit detractus, insidit, quoniam plures vires etiam etiam faciliorem; horum, peccatula et membra multorumque*“ — „*Inda arum, dictum, totum*“ — „*Amicis fuerunt resistit. Quoniam enim, ut quoniam nix, corpus arduum, etiam con istipit angustia copia autem tollit viciis abiret.*“

[1587.]

Jahren, in welchen sich neben denselben die Pocken verbreiteten, zu denen sich häufig Karunkeln gesellten, und an welchen in Madrid 3000 Menschen starben <sup>1)</sup>. Eben so herrschte die Pest zu Heilbronn und Leipzig, zu Figene in Frankreich, wo sie 2500 Menschen hinwegrüllte und von Pierre Sordes <sup>2)</sup> beobachtet wurde, und in der ganzen Provence <sup>3)</sup>; in Schlesien, wie gewöhnlich nach warmer Witterung, welche eine von 1586 — 1593 dauernde Theuerung zur Folge hatte, die Kriechkrankheit <sup>4)</sup>.

### 1587. *Petechialtypus* in Italien. *Treviso*.

Ueber die *Petechialtypus*, welche in diesem Jahre, wie es scheint, in sehr weiten Kreisen verbreitet waren, finden wir sehr werthvolle Nachrichten bei Trevisius, welcher dieselben zu Gallarate bei Modena, wo er seit 2 Jahren wohnte, beobachtete. Seine in Dinge geschäulter praktischer Thätigkeit abgelaute Schrift legt von der einfachen und naturgetreuen Beobachtungsgabe ihres Verfassers ein rühmliches Zeugnis ab, und führt das erfreuliche Bild eines aufgeklärten und denkenden Mannes vor, der nicht ohne Kühnheit, aber mit dem besten Erfolge altverjährten Dogmen entgegen tritt <sup>5)</sup>. Dieselbe beginnt mit einer übersichtlichen Darstellung der Witterungsverhältnisse vom J. 1586 bis zum 17ten Juni 1588, von welchem Tage die Vorrede datirt ist. Der Sommer und Herbst des Jahres 1586 waren ausserordentlich regnerisch und kalt; der Herbst begann mit milder Witterung und warmen Südwinden. Eben so zeichnete sich der Winter durch eine warme Temperatur aus. Im Frühjahr 1587 dagegen gab es viele Nebel, Nordwinde, Kälte und Schnee, um die Frühlingsnachtgleiche Stürme aus verschiedenen Richtungen, zuletzt anhaltende Südwinde; dagegen zeich-

1) Fragon, bei Villalba und Kolumbo.

2) Sordes, *Traité de la peste*, Lyon 1626. 12. (Haller, *SSM. med. pract.* II. 587.)

3) Erssl. Sauml. Vers. 15. 156.

4) Hecker, *Geogr. d. neuer. Welt.* 5. 265.

5) Trevisius wurde später auf Veranlassung Gross-Weil's Leibarzt des Erzherzogs Albert, Statthalter der Niederlande. *Tiraboschi*, VII. 2. p. 92.



neten sich der folgende Herbst und die erste Hälfte des Winters durch feuchte und kalte Witterung aus. Später wurde es wärmer, feucht und nebelig, Schnee aber fiel fast gar nicht. Vor der Frühlingsnachtgleiche des Jahres 1588 regnete es selten und wenig, selten wehten Nordwinde, später herrschten Südwinde, Regen und Wärme vor. Mitten im Sommer dagegen trat plötzlich trockne Kälte ein, es fiel Reif; später wurde das Wetter wieder warm, nebelig und feucht, ohne dass es indess geregnet hätte. — Eine ähnliche Witterungsbeschaffenheit, zugleich mit grosser Theurung, (auf welche auch Trevisius hindeutet), scheint noch an sehr vielen anderen Orten beobachtet worden zu seyn und überall Krankheiten hervorgerufen zu haben, deren Eigenthümlichkeiten unten näher besprochen werden sollen.

Zu Gallarate und in der Umgegend<sup>1)</sup> erschienen im Frühling 1587 zuerst hitzige Fieber, denen Viele unter „pleuritischen“ (pneumonischen) Erscheinungen unterlagen, welche auch an vielen anderen Orten herrschten. Diesen folgte eine Anfangs gattartige, später aber mit dem Eintritt des regnerischen Herbstes gefährlichere Petechialfieber-epidemie, (denn nur dafür können die „*morbilla*“ des Trevisius gehalten werden) welche sich durch eine sehr langsame Convalescenz auszeichnete. Im Anfang des Winters liess sie zwar eine Zeitlang nach, gewann aber am Weihnachten wieder an Allgemeinheit und Bösartigkeit. Reichliche Schweisse und freiwillig entstehende Blutungen gaben eine gute Prognose. Bei Einigen stellte sich am 6ten Tage eine Gelbsucht ein, welche durch ausleerende Mittel durchaus nicht gebessert wurde, und bei Aeltern eben so gefährlich war als Durchfälle und ruhrartige Erscheinungen, während die letzteren bei jüngeren Personen die Prognose sehr günstig machten. Phrenitische und soporöse Zufälle waren fast absolut tödlich. Dabei war der Urin trübe, die Kranken klagten über heftige Schmerzen in den Armen und

1) Trevisius führt S. 16 die einzelnen Ortschaften namentlich auf.

[1887.]

Schenkeln, und das Fieber zeigte einen äusserst unregelmässigen und zu Recidiven sehr geneigten Verlauf. Vorzüglich wichtig aber und theils für den Zusammenhang der Kretakluft mit der Babonenpest bedeutungsvoll, so wie für die Möglichkeit einer originären europäischen Entwicklung in jener Zeit beweisend, ist die Bemerkung, dass bei fehlenden kritischen Blutungen Geschwülste hinter den Ohren und in den Weichen entstanden<sup>1)</sup>. Denn wenn auch in denselben Jahre an andern Orten, z. B. in Spanien, in Leipzig und Heilkronn die Pest herrschte<sup>2)</sup>, so wird nur eine gewaltsame Verkettung von Hypothesen jene entfernten Erkrankungen mit der Krankheit in Oberitalien in Verbindung setzen können, abgesehen davon, dass diese Erscheinung, wie wir wiederholt zu bemerken Gelegenheit hatten, früher und später häufig genug beobachtet worden ist.

Das männliche Geschlecht wurde häufiger und heftiger als das weibliche befallen, schon das Geburtsgeschäft in dieser Periode in der Regel schwer von Statten ging und viele Kindbetterinnen starben. Absolut günstig dagegen war bei erkrankten Frauen der Eintritt der Menstruation und reichlicher Nasenblutungen. Noch günstiger war der Ausbruch von Petechien, derselbe mochte an einem kritischen Tage erfolgen oder nicht. Trevisius nennt dieselben, wie erwähnt, fortwährend „morbilli“ und sagt von ihnen, ihr Ausbruch habe mehr eine Vermehrung als eine Vertheilung der Blutmasse angedeutet<sup>3)</sup>. Bei allen Kranken wurden Würmer beobachtet, die schon zu Anfang der Krankheit abgingen. Wie erfreulich ist es nicht zu bemerken, dass Treviso auf diese so häufige Symptomata weder nosologisch noch therapeutisch das ungehörliche Gewicht legt, wie die Aerzte des 18ten Jahrhunderts, welche sich bis zur Aufstellung eigener „Wurmfieber“ verirrten. (S. unten.) — In der Genesungsperiode zeigten die Kranken ein sehr gros-

1) Trevisius, p. 8.

2) Vergl. Schürrer.

3) Trevis., p. 26.

ses Verlangen nach Wein; dessen Befriedigung, wie bei der ungärischen Krankheit, Vieles das Leben kostete. — Vorzüglich gefährlich war die Krankheit Greisen, Erwachsenen von melancholischem Temperamente, Solchen die früher syphilitisch waren<sup>1)</sup> oder sonst ein unmässiges Leben führten und anstrengende Arbeiten verrichteten.

Bei der Behandlung der Krankheit war vor Allem eine genaue Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse nöthig, namentlich die genaueste Aufmerksamkeit auf die Art der bevorstehenden kritischen Entscheidungen. Wenn sich Trevisius bei diesen nicht Hippokratischen Grundsätzen sehr glücklicher Erfolge rühmen konnte<sup>2)</sup>, so scheint in dem entgegengesetzten Verfahren der meisten andern Aerzte ein Hauptgrund der durch die Krankheit herbeigeführten bedeutenden Sterblichkeit gelegen zu haben. Denn alle Streitigkeiten über die Behandlungsart der Krankheit, über die Zulässigkeit der Blutentziehungen, der Schwitzmittel u. s. w. kehrten zu Gallarato wieder, und bewiesen von Neuem, dass die seit fast einem Jahrhundert niedergelegten Erfahrungen eines Fracastori, Valeroliola, Fernelius, Ingrassias, Massaria und so vieler

1) In ähnlicher Weise beobachtete Euboretus einige Jahre später (S. unt. S. 182.) dass bei Syphilitischen der Tod statt Obdormition und Convulsionen eintret.

2) Trevisius nennt sich selbst (S. 18) einen Hippokratiker. Indess stehen Galenische Sätze bei ihm in nicht geringem Ansehen. Ueberhaupt ist die Erkenntniss des Trevisius nur der Heilkraft der Natur um so achtenswerther, als sie zu seiner Zeit eine nicht eben sehr häufige Zierde der Aerzte war. Zum Belege folgende Stellen: „*Natura Nobilis Medicamentis, quibus non deest provisio pro perfectissima medicina (astrucivallus, qui dolerius multo laboravit, quoniam pauperes, quibus in selectis medicamentis defectum illucis nonnulli notant, per artificia convalescentia arte et temperationem suam perturbata et reperta, ita curata sunt, ut sanas in multo melius (sunt) facti et transierint) sanam salubrem, itaque commodam sicut olimque appetant et exerceant.*“ (p. 13.) — „*Si vitium fuerit leve, minus argutis medicamentis curare illi, qui partem naturae suam revocare. Illi, qui medicamentis curantur (sunt) ex medicamentis continuantibusque arte (sunt) modis continuando asperare. Ita illi sunt Pauperes enim, qui tam per insipiam, et voluptatem et dilectum nec dolentem capi; morbum non curant, medicum non ita sublimiter, multo facilius et melius non raro morbi malignitatem curare, aut resolutis viribus, non non habere, unde resistentior, reliqui ab ipso eum — perierint, non quia natura appetant et legibus naturae superant.*“ (p. 27.)



[1587.]

Anderer amonst gemacht werden waren. Solchergestalt kam es vor, dass diejenigen Kranken, denen ihr Arzt, wie es nach einem in der Lombardei eingeführten Misbranche in der Regel geschah <sup>1)</sup>, nach dem 10ten Tage oder noch später ein Abführmittel gereicht hatte, starben, oder doch eine sehr langwierige Krankheit zu überleben hatten, indem jenes Verfahren die am 10ten, 17ten oder 21sten Tage eintretenden Haut- und anderseitigen Krisen unabweisbar stützte. Während ferner die meisten übrigen Aerzte den Aderlass, nach einem eingewurzelten Vorurtheil von der zur Kochung der rohen Krankheitsstoffe nöthigen Zeit von 7—14 Tagen, erst nach dieser Zeit mit schlechtem Erfolge vornahmen, öffnete Trevisius gleich zu Anfang der Krankheit eine Vene, während er zugleich häufig gelinde Klystiere verordnete, und beobachtete bei diesem Verfahren den reichlichen Ausbruch kritischer Petechien <sup>2)</sup>. Ja zuweilen wurde bei plethorischen Personen selbst ein zweiter Aderlass, Blutegel u. s. w. nöthig; häufig indess wurde auch der Aderlass mit demselben Erfolge durch Schröpfköpfe ersetzt. Wir sind nicht im Stande zu bestimmen, ob diese günstigen Erfolge nicht auch ohne Anwendung der Blutentziehungen eingetreten seyn würden, oder ob vielleicht, wie allerdings aus einigen Andeutungen über den Charakter der Epidemie hervorzugehen scheint, damals, wie jetzt, eine antiphlogistische Behandlung in Oberitalien eher als anderswo am Platze war.

Den Gebrauch der damals allgemein beliebten Pflanzensäuren verwirft Trevisio im Allgemeinen, weil dieselben, den Essig ausgenommen, die Hautkrise hinderten, und ein Gefühl von Spannung in den Hypochondrien hervorbrachten. Das Volk habe sich ihrer nicht bedient, und dennoch sey bei diesem der Verlauf der Krankheit leichter und einfacher gewesen. — Die von Heracles Saxonia, Roboretus und Andern im *Petechialtypus* so sehr gerühmten Vesicatores erwähnt Trevisius nicht.

1) Trevi, p. 18.

2) *Ibid.* p. 18.

1588 — 1590. *Erysipelaceen.*

Für die folgenden Jahre (1588—1590) findet sich in den Jahrbüchern der Geschichte über Volkskrankheiten Wenig aufgezeichnet. Indess mag nicht unerwähnt bleiben, dass zu Brixen, im J. 1589, bei grosser Wärme bössartige Blattern epidemisch herrschten, nachdem im Winter die Masern vorgegangen waren<sup>1)</sup>, und dass, nicht ohne Andeutung eines inneren constitutionellen Zusammenhangs dieser Erscheinungen, in demselben Jahre auf Sicilien der Rothlauf epidemisch verbreitet war<sup>2)</sup>.

Desto zahlreicher, wenn auch mit wenigen Ausnahmen fragmentarisch, sind die Angaben, welche sich über die Krankheiten des Jahres 1591 finden, dessen Sommer-Witterung mit der Kälte des Winters 1590 in auffallendem Contraste stand; Verhältnisse, unter denen sich namentlich der Petechialtyphus häufig zu erzeugen scheint, und zu welchen sich auch hier wieder Theuring gesellte. — Die genannte Krankheit wird für dieses Jahr zwar vorzüglich von italienischen Aerzten beschrieben und erwähnt<sup>3)</sup>, scheint aber auch in geringeren oder bedeutenderen Modificationen weiter verbreitet gewesen zu sein.

1591. *Petechialtyphus. Truncosinus. Reborctes.*

Nach den sehr werthvollen, der Epidemie zu Tridoni entlehnten, Angaben von Reborctus trat die Krankheit im Allgemeinen mit einem gelinderen Charakter auf. Anfangs waren die Beschwerden gering, auf ein leichtes Frieseln folgte mässige Wärme, Kopfschmerz, am 6ten bis 7ten Tage Schlaflosigkeit, Sopor, Delirien und Ausbruch von Petechien, welche ihre Gürtartigkeit durch ihre in der Regel röthe, selten livide und

1) Bétérak. (S. d. Schellhammer.)

2) Columba, *Apologiae per Fr. Almo, pestemodica. Hertzog*, 1589. (Vergl. Haller, *Gall.med. pr.* II, p. 285.)

3) Sacco (191), L. p. 128. „E frons essentia la memoria dell' uisappale in fremita e mortali per tutta l'Italia nel 1591.“

[1891.]

violette Farbe verriethen. Noch seltner gestaltete sich das Exanthem pustulös und Blattern-ähnlich, wobei es indess nicht in Eiterung überging<sup>1)</sup>. Diese Pusteln brachen vorzüglich auf dem Rücken und der Brust aus, und waren nur dann von kritischer Bedeutung, wenn sie auf der Höhe der Krankheit und in Begleitung der übrigen kritischen Erscheinungen auftraten; zu Anfang der Krankheit waren sie, ebenfalls ein Umstand, der für die geringe Bösartigkeit der Epidemie spricht, fast bedeutungslos. Ausserdem beobachtete Roboretus anginöse Beschwerden, Ulcerationen im Schlunde<sup>2)</sup>, Husten, Stimmlosigkeit, trockne Zunge, gallige, nicht colligative Stühle, Würmer, heftiges Nasenbluten und kritische Parotidenschwellen. Sehr häufig wurden auch am 7ten bis 9ten Tage Urinkrisen beobachtet, bei denen der Harn übertrieben, oft mit einer Fetthaut bedeckt erschien<sup>3)</sup>. Die Krankheit ergriff vorzüglich Kräftigere, Vollblütige und Verheiratete, die Sterblichkeit betrug  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{10}$ . Am gefährlichsten war das Uebel Syphilitischen oder sonst Geschwächten. Der Tod erfolgte meistens unter Convulsionen, die nach Roboretus zuweilen wohl von Gehirnentzündung abhängig seyn mochten<sup>4)</sup>, und unter Erstickungsanfällen. Die Genesenen blieben meistens längere Zeit taub oder halb blödsinnig, und es fielen ihnen die Haare aus.

Roboretus behandelte die Krankheit vorzüglich mit zeitig angewendeten Aderlässen, für welche er im Ganzen recht gute Indicationen aufstellt. Er selbst schreibt seine eigne Genesung von der Krankheit vorzüglich dem Aderlass zu, und behauptet,

1) Roboretus, p. 188. Brauchen wir hierbei daran zu erinnern, dass Thurydides von *ἄλυσθ' ἑώρακ' ἰσίδου, καὶ ἐκ λ' ἡμέρ' ἀπέχθ'.* und dass neuerdings englische Aerzte von einer ganz ähnlichen Gestaltung des Exanthems bei dem Abdominaltyphus in England, im Gegensatz zu ihren Beobachtungen in Frankreich reden? — Rosenbaum (Hecker's Annalen Bd. 29. S. 26.) will hier eine Frisidcomplication sehen, wozu wir denselben indess nicht beistimmen können.

2) Roboretus, p. 165.

3) Ders., p. 169.

4) Ders., p. 165.



die Verabreichung desselben sey häufig tödtlich gewesen. Neuere italienische Aerzte haben auf diesen schlecht verstandenen Ausspruch des Roboretus und des Cagnatus kein Bedenken getragen, den Aderlass selbst unter Umständen zu empfehlen, die von denen dieser Epidemie wesentlich verschieden waren. — Ausserdem sog Roboretus Abführmittel und den gewöhnlichen Apparat der Cordialia in Anwendung, gegen einzelne Zufälle, z. B. die Delirien, sehr energisch, z. B. mit Eröffnung der *vena frontalis*, gegen Sopor mit dem im Nacken applicirten Glüh Eisen zu Felde ziehend<sup>1)</sup>. Ganz besonders aber rühmt er den Gebrauch der in den Nacken und auf den abgeschornen Kopf gelegten Vesicator, vorzüglich bei heftiger Hirnaffection, Delirien, Sopor, Convulsionen, bei trockner kalter Haut und innerer Hitze.

Fast ganz mit denen des Roboretus übereinstimmend sind die Berichte des Trunconius über die von Letzterem zu Florenz beobachtete Epidemie. Hier trat sie, wahrscheinlich durch epidemische Verhältnisse in dieser Weise modificirt, unter der Form einer *Tertiana duplex spuria* auf, verband sich mit äusserster Schwäche, und erzeugte häufig Geschwürchen im Schlund. Auch hier bildete sich die Krisis vorzugsweise durch den Stuhl und noch mehr durch den Urin. Gänzlich abweichend indess von dem des Roboretus ist das Kurverfahren des Trunconius, welcher, neben nicht zu magerer Kost, selbst den mässigen Gebrauch des Weins zuliess, woran in Verbindung mit den übrigen Umständen hervorgeht, dass zu Florenz der adynamische Charakter der Krankheit vorherrschte, wenn auch die Vermuthung nicht zurückgewiesen werden kann, dass die von Trunconius eingeschlagene Behandlung (= Aderlass nach dem Ausbruch der Petechien, Wiederholung der Abführmittel am 14ten Tage =) nicht sowohl durch den Verlauf der Krankheit, als durch starres Festhalten an Galenischen Dogmen, bestimmt wurde.

1) Roboretus, p. 224, 225.

## Camillus und Ader.

Von geringerer Bedeutung sind die Mittheilungen zweier anderer Beobachter, Camillus <sup>1)</sup> und Ader <sup>2)</sup>, deren Schriften uns nur aus Haller <sup>3)</sup> bekannt sind. Nach dem Ersteren blieben alle Diejenigen von dem Fleckfieber verschont, welche sich der anlinischen Quellen von Nocera bedienten. Das Volk vertraute dem so oft erprobten Schutze der Einreibungen von Scorpionsöl u. s. w.

Ader's Angaben beziehen sich auf die Epidemie in der Narbonne, die sich durch die gleichzeitigen Verhältnisse zum Kriegstypus steigerte, und mit ruhrartigen Zufällen verbunden war. Ozanam gedenkt der Beschreibung in einer Schrift: „*Mercurius Gallobelgicus*,“ aus welcher ebenfalls die weite Verbreitung dieser Krankheiten hervorgeht. Vorzüglich wurden Umbrien, Rom und die Lombardie ergriffen. Zu Rom erlagen ihr in einem Jahre (vom August 1590 bis dahin 1591) über 60,000 Menschen. Und dennoch rechnet Ozanam diese Epidemie zum Kitzerkalfieber <sup>4)</sup>.

In den Krankheitserscheinungen der letztgenannten Jahre tritt ein gewisser gemeinschaftlicher Charakter derselben so deutlich hervor, dass die Unterlassung des Versuchs, diesen näher zu bestimmen, so deutlich redenden Thatsachen gegenüber kaum entschuldigt werden könnte. Fassen wir zunächst die typhösen Pneumonien ins Auge, von welchen Oethaens berichtet, so ergibt sich, wie wir schon oben andeuteten (S. 94.), auf den ersten Blick die völlige Identität derselben mit dem von Guggenbühl kürzlich so naturgetreu beschriebenen Alpenstich. Der Alpenstich aber ist nach den vortrefflichen

1) Camillus, Haanik., *De peste et febri putrescente descriptis*. Paris. 1598. 8.

2) Ader, Gall., *De peste cognoscenda, praevisione et remediis praeservationis et sanationis Tullianorum*. Tübing. 1628. 8.

3) Haller, *ibid.* u. p. II, 401. — 402.

4) Ozanam, I. 312.

Nachweisungen des eben Genannten wesentlich von erysipelatöser Grundlage.

Treffen wir zu dieser mittheilend erysipelatösen Lungenaffection die Nachrichten Betera's von einer auf die Massen folgenden Blatternepidemie, die kurze Notiz über gleichzeitiges epidemisches Erysipelas in Sicilien bei Columba, endlich die Angaben von Rohoretus über manche Erscheinungen des von ihm beobachteten Petechialtyphus (das Exanthem, die Angina, die Delirien, die Rohoretus selbst von einer entzündlichen Gehirnaffectiön abzuheilen geneigt ist, die große Heilbarkeit der Vesicatore, u. s. w.), der, wie jene Erkrankungen insgesamt, unter Witterungsverhältnissen (plötzliches Thauwetter) eintrat, welche unerkannter Massen die Entstehung und Verbreitung erysipelatöser Krankheitsformen begünstigen<sup>1)</sup>, so wird eine gemeinsame Beziehung aller dieser Krankheitsformen auf einen Mittelpunkt, auf eine erysipelatöse Krankheitsconstitution der Jahre 1589 — 1591 höchst wahrscheinlich.

Die Vorsicht, welche dem Geschichtsforscher verleiht, ein Feld zu betreten, welches dem Nosologen ohne Mühe sich öffnet, nöthigt uns, uns auf diese Andeutungen zu beschränken. Später aber wird die Veranlassung, zu diesen Betrachtungen zurückzukehren, sich nicht weniger dringend wiederfinden.

**Pest zu Hamburg. — a Castro: in Spanien. — Bocanagelini: zu Leyden. — Heurnius. — Biederperg.**

Unter den Krankheiten der nächsten Jahre würde neben der Pest<sup>2)</sup> und der Ruhr (in Thüringen 1595 und 1596 bei

1) „Die erysipelatöse Constitution, so viel wir sie jetzt kennen, hat folgenden Eigenthümlichen. Große Wärmegrade bei Tage, kühle Nächte; viel freie Elektricität in der Luft, durch Wasserbildung sich ausgleichend. Erysipelaceen sahen sich daher vorzugsweise bei feuchter, warmer Witterung, wo die Tage schnell und kühn sind, und gegen Abend regelmäßige Gewitter eintraten und normale Abkühlung zur Folge hatten.“ Rehnlein.

2) Dass die wahre Pest in dieser Zeit häufig herrschte, ist nach der Menge der aus dieser Zeit herrührenden Verordnungen, Verfügungen u. s. w. eben so



[1394.]

überaus raukalter Witterung)<sup>1)</sup>, die grosse Epidemie der Kriebelkrankheit vom J. 1595 unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen, wenn die Geschichte dieses Uebels nicht bereits von Meisterhard bearbeitet vorläge<sup>2)</sup>.

Für die grösste Verbreitung der vermittelnden Momente dieses Uebels spricht auch die Epidemie des Petechialtypus, welcher im J. 1594 nach einer Hungersnoth in Sicilien und Italien verbreitet war, und dessen Columba<sup>3)</sup> erwähnt. Diese Epidemie, bei welcher nach dem genotzten Beobachter in der Regel kritische Stühle wichtiger waren als Haut- und Nierenkrisen, gab zu den Streitigkeiten über die Anwendung der Vesicatorie Statt, welcher damals vorzüglich zu Padua von Hercules Saxonia gegen Massaria nicht ohne Hülfe geführt wurde. Zur richtigen Beurtheilung dieses Streites muss bemerkt werden, dass man die Zuggläster (in der Regel aus Canthariden und Esphorhium bereitet) an verschiedenen Körperstellen zugleich, vorzüglich auf den Extremitäten anzuwenden pflegte, und dass hiernach die Vorwürfe Massaria's und Columba's, die sich auf die durch dieselben herbeigeführte Erhitzung und die Störung der so häufig wichtigen Darmkrisen beziehen, nicht ganz unbegründet erscheinen.

Das ganze letzte Jahrzehend des 16ten Jahrhunderts zeichnete sich durch eine überaus anse Witterungsbeschaffenheit aus, in deren Gefolge weitverbreitete Seuchen nie zu fehlen pflegen.

Unter ihnen nimmt der im J. 1598 zum erstenmal erwähnte Garotillo die Hauptstelle ein. Wenn es auf die Nachweisung des Krankheitscharakters dieser Zeit ankommt, und nach dem, was über die Beziehung dieses Uebels zur Babernpest als fest-

wenig zweifelhaft, als dass man, vorzüglich in Deutschland, die Kriebelkrankheit ebenfalls auch als Pest bezeichnete. Vergl. Rehmstöver, Trausacke, Lisch, Chronik.

1) Feb. Wittich, von der rathen Ruhe, Jena 1695. (Vollkornkriß.)

2) Hecker, Gesch. d. newen Holkande. 8. 417.

3) S. des Schiffsverzeichnisses.

stehend betrachtet werden muss<sup>1)</sup>, so bedarf es hier kaum der Andeutung, dass die im folgenden Jahre importirte Pest, wenn sie einer vorbereitenden Krankheitsconstitution zu ihrer Ausbreitung bedurfte, kaum auf eine begünstigendere hätte stossen können. Die Pest aber herrschte in Constantinopel, England, Portugal und an andern Orten.

Die Pest des Jahres 1596 zu Hamburg gab unter Andern einem dazulicht lebenden Arzte Roderico a Castro Veranlassung zu einer Pestschrift, welche, vorzüglich in Bezug auf die Aufstellung geläuterter prophylaktischer Principien, zu den werthvollsten gehört. Für die äussere Geschichte dieser Hamburger Epidemie indes erhält dieselbe wenig Angaben, zumal sie gleich zu Anfang derselben abgefaßt wurde. Die ersten Fälle kamen auf dem Steinwege (— „*platea lapidea*“) vor, wo sich die meisten Gasthöfe befanden. Zu Anfang wurden vorzüglich Kinder und Frauen ergriffen; Castro fürchtet, dass mit der steigenden Kraft der Epidemie auch das männliche Alter von ihr nicht verschont bleiben werde. — Leider steht die zu wenig beschränkte Empfehlung des Aderlasses in unerfreulichem Gegensatz zu dem übrigen Ausgesprochenen des Verfassers. — Die Pest des Jahres 1599 aber in Spanien fand ihren Geschichtsschreiber an Boccangelini.

Dieselbe wurde, wie durch unzweifelhafte Aussagen feststand, durch Kleider aus Flandern nach der spanischen Hafenstadt Santander am cantabrischen Meere eingeschleppt, und verbreitete sich von hier aus über das ganze Land<sup>2)</sup>, bei einer Witterungsbeschaffenheit, die jeden Gedanken an eine andre als contagöse Entstehungsweise ausschloss<sup>3)</sup>. Indessen bewirkte der Umstand, dass bei dieser Pest häufig statt der Hu-

1) Vrech, *Hist.-pathol. Univers. Th. 2. S. 272 ff.*, Beckey, *Gesch. d. neuer. Heilkunde. 8. 229 ff.*

2) Boccangelini, p. 10 u. 14.

3) L. p. 32. „*Ex diebus corripit, utrum in hac constitutione nullum esset traxione habere in substantia aut qualitatem, sed ex coniugatione corporis et aliis periculis morbi patientis incrementis.*“

[1593.]

konnen sich Kränkeln erzeugten, die Wiederkehr der alten Streitigkeiten, ob die Krankheit die Pest sey oder nicht <sup>1)</sup>.

Boccangelini's Schrift, wenn auch der in ihr herrschende Mangel an Ordnung einen Schluss auf die geistige Unklarheit ihres im Uebrigen kenntnißreichen Verfassers erlaubt, zeigt dafür, dass sich klarere Einsichten über die Natur der Pest immer mehr verbreiteten, und dass man sich immer mehr von der ängstlichen Aabhängigkeit an Galenische Dogmen losangte, ja selbst die alte Definition von der Pest modificirte, nachdem man durch zu zahlreiche Erfahrungen belehrt worden war, auch vereinzelte Krankheitsfälle als der Pest zugehörig zu erkennen, sobald sie nur die charakteristischen Zufälle derselben darboten <sup>2)</sup>. Wir haben oben gesehen, welche ungeheure Opfer der ungedeutete Irrwahn der Stadt Venedig kostete <sup>3)</sup>. — Nichts desto weniger leidet Boccangelini's Schrift noch immer an Fehlern ihrer Zeit, welche schon von aufgeklärteren Ärzten vor ihm erkannt und vermieden worden waren <sup>4)</sup>, noch öfter wird astralischen Einflüssen, Sonnen- und Mondfinsternissen, Kometen u. s. w. in der Aetiologie der Epidemie von ihm eine Hauptrolle zuertheilt, wenn auch der alte Wahnglaube an die Luftverderbniss immer mehr zurück tritt und der Antheil der letzteren auf einzelne Epidemien eingeschränkt wird. Für die Pest des Jahres 1592 spricht es Boccangelini deutlich aus, dass ihre Entstehung in Aethiopien zu suchen sey, und dass die hohe Temperatur des Jahres nur ein ihre Verbreitung begünstigendes Moment gebildet habe <sup>5)</sup>. In Syrien dagegen, Constantinspel und andern Städten des osmanischen Reichs

1) Schaeffer nach Villalba.

2) Boccangelini, p. 20. „*Pinge, quod in tota ciuitate unicus domus reperiatur, in qua vero proleuerit morbi causa reperiatur.* — *Nulli dubium, quod ex domo proleuerit morbus et peste laboraret.*“

3) S. oben S. 87.

4) Landau. Vergl. oben S. 23.

5) Boccangel., p. 32. „*Ex his locis etiam existit, taborem tantum facit tantum quod aethiopia; et discipula vero contagia et corporum imperitas praeterea.*“



entstehe die Pest allerdings häufig originär<sup>1)</sup>. Deshalb seyen auch sehr viele Orte in Spanien, z. B. Valencia, für welche dieselben Witterungsverhältnisse, wie für die andern Stadt fanden, von der Seuche frei geblieben. Madrid dagegen sey vorzüglich hart befallen worden, weil in dieser Stadt viele Einflüsse sich vereinigt hätten, um dem Contagium eine ungeheure Wirksamkeit zu verschaffen. So z. B. der beständige Zufluss von Fremden aus inficirten Orten, von denen Viele die Krankheit, an welcher sie bereits litten, verheimlichten, ferner die Unreinlichkeit der Strassen, die Lage des Pesthospitals in der Mitte der Stadt u. s. w.

Interessant ist eine Bemerkung Bozzangellini's, welche eine früher und später häufig gemachte Erfahrung bestätigt, und vor Allem geeignet ist, auf die hohe Gesetzmäßigkeit in dem Verlaufe der Epidemien hinzuweisen. Im Sommer 1599 nämlich kamen bei Kindern mit und ohne Fieber Geschwülste am Hals und den Ohren vor, die bei einer bloß diätetischen Behandlung günstig verliefen. So wenig diese gutartigen Parotidengeschwülste im eigentlichen Sinne als pestartig betrachtet werden können, so sehr erinnern sie doch an die Leichtigkeit, mit welcher die allgemeinen constitutionellen Krankheitsverhältnisse, „ohne welche selbst die Pest nicht gedeiht“ (Sydenham) schon dann den kindlichen Lebensprocess ergreifen, wenn sich noch keine Spur ihrer Entwicklung auf Erwachsene wahrnehmen läßt<sup>2)</sup>. Indessen mag auch die Möglichkeit nicht in Abrede gestellt werden, daß jene Parotiden vielleicht als der Nachhall des Garotillo des vorhergegangenen Jahres zu betrachten sind. Uebrigens wurden auch in dieser Pest mehr Frauen als Männer, und unter jenen vorzüglich Schwangere und mündbare Jungfrauen ergriffen.

Auch zu Leyden kamen in derselben Zeit Sporen der Pest vor, durch welche Heurnius zur Abfassung seiner Schrift veranlaßt wurde, welche indess ihrem Geiste nach (wenn übers-

1) Bozzangellini, p. 28.

2) Eb., p. 42.

[1598.]

kaupt von Geist bei einem so dürftigen Produkte die Rede seyn kann) in das 15te Jahrhundert gehört, und auch in historischer Beziehung völlig werthlos ist. —

Die Nachrichten über die in derselben Zeit sich verbreitende Rinderpest hat bereits Kanold<sup>1)</sup> zusammengestellt. Aus der bei ihm erwähnten Verordnung der österreichischen Regierung geht aber hervor, dass man das Contagium derselben kannte und medicinal-polizeilich zu würdigen verstand. — In derselben Zeit verbot der Senat zu Venedig den Genuss des Rindfleisches, des Käses und der Butter<sup>2)</sup>.

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse einer sorgsamsten Durchforschung der epidemiographischen Literatur des 16ten Jahrhunderts in Bezug auf die Geschichte der Pest und der zunächst verwandten Krankheiten. Am Schlusse haben wir noch die Titel mehrerer von uns nicht benutzten Schriften verzeichnet, ohne indees damit ein auch nur einigermaßen vollständiges Verzeichniss geben zu wollen. — Später aber wird sich wiederholt Veranlassung finden, auf die eben betrachtete Periode zurückzukommen, und in ihr die Anfänge von Bildungen zu verfolgen, die sich erst in späterer Zeit zur vollen Klarheit ihrer Formen entwickeln.

Fassen wir aber in einem Blicke noch einmal diesen ganzen Zeitraum zusammen, so berechtigt uns Alles, die gesamte Krankheitsconstitution des 16ten Jahrhunderts als eine typhöse zu bezeichnen. Denn wenn auch nicht geleugnet werden darf, dass die feineren Nuancen dieses Krankheitscharakters uns entgehen müssen, theils wegen der Unzugänglichkeit der unendlich reichen Quellen, welche aus dem belebten Schoosse der Wissenschaft in diesem Jahrhundert der Instauracion hervorsprudeln, theils wegen der sehr erklärlichen Befangenheit der meisten Aerzte in den Fesseln des Galenischen Jochs, welche man jetzt erst zu fühlen, aber zugleich auch abzuschütteln anfang, so steht doch unwidersprechlich fest, dass der genannte

1) Kanold, Ueb. die Pestilenz des Hornviehes, p. 71 ff.

2) Handschriftl. Nachricht bei Hamann (61) de pestilentialibus etc. p. 26.

typhösen Charakter sich im Allgemeinen als der vorherrschende nachweisbar zu erkennen gilt. Wir wollen nicht darauf Rücksicht nehmen, dass die Pest das ganze Jahrhundert hindurch in den weitesten Kreisen wüthete, indem der grösste Antheil ihrer Verheerungen menschlicher Unkenntniss und Sorglosigkeit zugeschrieben werden muss, wir wollen selbst übersehen, dass Syphilis, Scorbut und Schweinfieber an der Wiege des Jahrhunderts uns entgegentreten und mit ihrer Herrschaft weit in dasselbe hineinragen, wir wollen nicht daran erinnern, dass wir früher <sup>1)</sup> die innigen Beziehungen dieser Trias zum Petechialtyphus bewiesen zu haben glauben. Die ausgedehnte Herrschaft des letzteren allein würde diesen Satz auf das Unwiderleglichste darthun. Derselbe ist auch bereits von anderen Forschern in seiner vollen Wahrheit erkannt und namentlich von Hecker bei verschiedenen Gelegenheiten hervorgehoben worden. Nichts desto weniger kann es dem aufmerksameren Beobachter der Schwüngen im kranken Leben der Völker nicht entgehen, dass sich gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts der Uebergang zu einem neuen Krankheitscharakter vorbereitete, dessen voller Ausbildung wir erst später, ja ganz deutlich erst zu Ende des 17ten Jahrhunderts begegnen, dem erysipelätösen, einem Krankheitscharakter, dessen ganze Bedeutung nur auf dem historischen Wege ergriffen werden kann, und zu dessen voller Würdigung auf diesem Wege beizutragen, der letzte Zweck der nun folgenden Betrachtungen ist.

de Carmona, J., *Tractatus de peste et febris cum punctatis, vulgo Yncardillo*. Sevilla, 1581. 8.

Lopez, Alph. (de Corella), *De morbo pestilente*. Valen. 1581. 4. — Saragosa, 1584. 4.

Poupart, Olivier, *Conseil divin touchant la maladie diverse de la peste en la ville de Rochelle*. Rochelle, 1583. 12.

1) *Histor.-pathol. Untersuchungen* I. 8. Asselst die Abschnitte über die Syphilis, den Scorbut, den englischen Schweiss und den Petechialtyphus.



(Vielleicht theologischen Inhalts, obgleich der Verf. Arzt war, denn er schrieb auch über den Aderlass.)

Alexander, Franc., *Trattato della peste e febre pestilenti. Terzio*, 1588. 4.

Wittich, Joh., Kurzer Bericht vom hitzigen vergifteten epidemischen Fieber. Leipz., 1592.

Graevius, Lud., *Theses medicæ continentes explicationem et curatiivam febris pestilentis epidemicæ patriæ per Germaniam, vulgo sudamina, pleuritides, ardoris linguae aut doloris capitis gravatis. Heidelberg*, 1593. 4.

Dornkrell, Tob., Von der Pestilenz dieses 96. Jahres kurzer und gründlicher Bericht. Hamb., 1596. 4.

Wittich, Joh., Ein vielfältiger Bericht von der giftigen Ruhr. Mühlhausen, 1596. (Eine der unzähligen Volksschriften, welche diese Ruhr hervorstief.)

## IV.

### Das siebzehnte Jahrhundert.

Nicht günstiger waren die Auspicien, unter denen das so ereignisvolle und unglückseligere siebzehnte Jahrhundert über Europa heraufzog; — gleich an seiner Pforte begegneten wir allgemeinem Mangel, der vorzüglich in Russland und Lithauen eine furchtbare Hölle erreichte <sup>1)</sup>; Erdbeben, vulkanischen Eruptionen, weitverbreiteten Krankheiten jeder Art; ausser der Pest vorzüglich dem Petechialtyphus und dem ganzen Geschlechte der ihm verwandten Uebel.

**1602. Typhöse Pneumonien in Italien. Codronchi, Laelius a Fonte, Joh. Colle, Chioechi, — Tosius (1615.)**

Nach dem Anfangs strengen, dann sehr gelinden Winter des Jahres 1601 verheereten sich im Fröhlinge, besonders im März und April, über ganz Italien und die benachbarten Länder Krankheiten, die wir nach den sehr werthvollen Nachrichten der genannten Aerzte nur für Epidemien des „Alpenstichs“ halten können, obschon Guggenbühl desselben für die Schweiz in diesem Jahre nicht erwähnt.

Codronchi beobachtete diese Krankheiten („*Pleuritides, angine et hancrice*“) zu Imola. Er spricht von der grossen Verwirrung der über dieselben von Aerzten und Laien geläus-

<sup>1)</sup> Rzeczynsky: *Ausbeut. Abt. auf. Polonie*, p. 466. Lithuanien 1612. In Liffland war die Noth so gross, dass man selbst den Gassen menschlichen Leichen nicht schaute!

[1682.]

serten Meinungen, und besonders stellt er sich die Aufgabe, die Ansicht von der des Wärmern in dieser Krankheit zutheilten Wichtigkeit gänzlich zurückzuweisen. Er rechnet die Krankheit zu den bösartigen Lungenentzündungen, von denen Italien in älterer und neuerer Zeit so häufig heimgesucht worden sey, leugnet aber, besonders gestützt auf die mangelnde Contagiosität der Krankheit, den eigentlich pestartigen Charakter derselben. Im Uebrigen enthält seine Schrift weder etwas über die näheren Erscheinungen noch über die Behandlung der Krankheit.

Ähnlicher Art waren die von Laelina a Fonte in der Umgegend von Urbino und Pesaro beobachteten Krankheiten. Neben Anginen und Parotiden bildeten typhöse Brustentzündungen (im März und April) die hervorstechendste Erscheinung. Die Beschreibung des genannten Arztes ist nur kurz, sie erhält aber einiges Interesse durch die Angabe, dass sich in den Lungen Abscesse mit einer jauchigen eitrigen Materie fanden.

Ueber dieselbe Epidemie findet sich auch eine kurze Notiz bei Joh. Colfe, die wir auch Baronius mittheilen <sup>1)</sup>.

Dieselben Krankheiten werden von Chiocchi für die Gegend von Verona ausführlicher geschildert. Derselbe nennt „*Pleuritides, anginae, destillativa, contumaces, febris mali moris, pulmoniae complures acutiores et maligniores*.“ Vorzüglich wurde das Volk ergriffen; Würmer kamen sehr häufig vor. Uebrigens schließt Chiocchi die „*Pleuritis*“ streng von der „*Pulmonia*“, und sieht besonders den Uebergang der ersten in die zweite als gefährlich an. Mit heissender Ironie urtheilt er sich, dass so Viele schon am 4ten Tage starben, denen doch „die besten Aerzte“ gleich am ersten Tage einen Aderlass und Abführmit-

1) Baronius, *de pleuripneumonia*, p. 17. (Der Anfang der Stelle bezieht sich auf das J. 1583.) „*Haece epidemica constitutio est pleuritidis et pneumoniae permixtae intermixtae explevit Joh. Colfe in suis Conceptibus Medicois* N. 1. — *Malaria pleuritica et peripneumonica, quae fecerunt perniciem et interitum Civitatem et Castellum ab insana humo-estivatione et intarant jam destituta et prosterelia abluantur epidemici interfecti etiam perniciem moris 1601 quare pleuritica, Utiat, Pleuresi, Encepae ratiunt morte propter sunt frigida, Annidum et vitium constitutum et subyugentem Aquilunarem demutavit.*“



tel verordnet hatten, und dass die Meisten den 11ten und 14ten Tag überstanden und durchkamen, welche diese Hälfte verkümmerten, oder denen nur Schröpfköpfe gesetzt wurden, welchen Chiocchi eine die Krankheit auf die Haut übertragende Kraft beimißt. Hauptsächlich war aber der günstige Ausgang von reichlichen Schweissen abhängig, welche schon durch Frictionsen des Körpers hervorgerufen werden konnten. Aehnliche Einfachheit zeichnet auch das übrige Verfahren dieses Hippokratikers aus; er achtete so sehr auf die Aufrechterhaltung der Kräfte, dass er seinen Kranken, und zwar mit dem besten Erfolge, Wein gab.

Hierher gehört, wenn auch nicht der Zeit, doch der ganzen Eigenthümlichkeit der Krankheitserscheinungen nach, die von Toxicus im J. 1613 zu Gualda beobachtete epidemische Pneumonie. Der Winter dieses Jahres zeichnete sich durch seine sehr bedeutende Kälte aus, und dieser schreibt Toxicus einen um so grösseren Antheil an der Ätiologie des Uebels, an welchem viele Kranken schon am 4ten bis 5ten Tage starben, zu, als der vorausgegangene Sommer durch grosse Hitze und Nässe ausgezeichnet gewesen war<sup>1)</sup>. Es dürfte wohl einigen von dem genannten Arzte mitgetheilten Krankengeschichten kaum bezweifelt werden können, dass diese Pneumonie, welche vorzüglich Frauen, Greise, Schwächliche und Recuperascenten befiel, eine sogenannte typhöse war; Toxicus selbst trennt sie scharf von der gewöhnlichen Pneumonie, und nennt sie sogar geradezu ein Erysipelaa der Lungen, ja er benutzt selbst die Ergebnisse der Leichenöffnungen<sup>2)</sup> zum Beweise jener Verschiedenheit. Nicht uninteressant sind die günstigen Erfolge, welche er von dem Gebrauche des Eisess und Schnees, welche die Kranken unangestzt im Munde behielten, beob-

1) Schwarrer führt die von Toxicus beobachtete Epidemie unter dem Jahre 1609 auf.

2) Toxicus, (p. 4.) „*Dissectis cadaveribus pulmones nigrescentes et solutissimi, laevi atque sibi invicem appaerentes, nullo sanguine peram constat.*“  
Es ist von dieser am 4ten Tage der Krankheit gestorbenen Frau die Rede.

[1663.]

achtete; die Krankheit nahm bei diesem, von ihm mit allen Hülfsmitteln der Theorie seiner Zeit geschützten Verfahren in der Regel unter kritischen Stühlen (= gallige Complication pflegte nie zu fehlen =) einen günstigen Ausgang.

1605 — 1611. Pest, Garotillo, Ruhr. — Plater, Potel, Labadie, Thevet. — Die spanischen Aerzte. — Paschettus, Fontannus.

Wir kehren zu der Geschichte der Pest zurück. — Die Jahre 1603 — 1605 zeichneten sich durch sehr strenge Winter und trockne heiße Sommer aus; an vielen Orten herrschte die wirkliche Pest (z. B. in Danzig, London)<sup>1)</sup>, oder doch pestartige Krankheiten. In dieser ganzen Periode aber erhob sich in Spanien der Garotillo, dem wir zu Ende des vorigen Jahrhunderts als Genossen des Petechialtyphus begegneten, zu einer Höhe und Verbreitung, wie sie früher und später ohne Beispiel sind. Das J. 1613 vorzüglich war durch solche Verheerungen bezeichnet, dass es noch lange nachher das Garotillo-Jahr (*„año de los garotillos“*) hieß<sup>2)</sup>. Er verbreitete sich bis nach Neapel und Malta, und war noch zu Ende des 17ten Jahrhunderts nicht ganz verschwunden.

Im J. 1605 wurde Russland von der Pest heimgesucht, und in demselben Jahre schon kamen Sporen derselben in Thüringen vor<sup>3)</sup>; in den folgenden Jahren aber war sie über ganz Deutschland allgemein verbreitet und rief überall populäre Pestschritten ins Leben. Augsburg wurde im J. 1607 verheert<sup>4)</sup>. Zu Basel, wo sie von 1609 bis 1611 herrschte, beobachtete sie Felix Plater; sie war so bösartig, dass nicht einmal die Hälfte der Erkrankten gerettet werden konnte, (von 6408 starben 3958.)

1) Lelkewaldt.

2) Vergl. Becker, Gesch. d. neuer. Heilkunde, S. 241 ff., woselbst sich auch die sehr ausführliche Literatur erschließen lässt.

3) S. Willik, J., *Dysenterie epidemica*.

4) Vgl. Casarellus, *Tract. de peste*, Argent. 1608, S. Eine deswegen gleichzeitige wichtige Schrift.

Zu den werthvolleren gehören die Angaben dreier Wandärzte, Potel zu Paris, Labadie zu Toulouse und Thevet zu Poitiers. Potel und Labadie hatten die Pest in den Jahren 1597 und 1606—1608 beobachtet. Im J. 1606 wurde Paris so heftig ergriffen, dass selbst alle Aerzte, Potel ausgenommen, die Stadt verliessen. Nach ihm wurden 15—20,000 Menschen befallen; von der Pest ergriffene Schwangere waren unfehlbar verloren. Potel verliess sich auf die gewöhnlichen Mittel, vorzüglich den Theriak, dessen schweisstreibende Wirkung er hervorhob.

Labadie betrachtete die Pest gegen die allgemeine Ansicht seiner Zeit vom solidar-pathologischen Standpunkte, und richtete sein ganzes Augenmerk auf die Erhaltung der Kräfte. Ehrend muss des Muthes gedacht werden, mit welchem er zahlreiche Leichenöffnungen vornahm. — Thevet hob vorzüglich das Auftreten von Bubonen bei intercurrenten Krankheiten hervor, und suchte den Glauben an die absolute Contagiosität des Uebels zu beschränken.

Diese ganze Pestperiode, ausgezeichnet durch eine Fluth von Volkschriften, erhält durch die gleichzeitige allgemeine Verbreitung der Ruhr noch besonderes Interesse. Vorzüglich herrschte dieselbe in Thüringen, besonders zu Erfurt und der Umgegend. Noch mehr scheint sich die Ruhr im Sommer 1603 verbreitet zu haben, der sich durch äusserste Hitze und Fruchtbarkeit eben so sehr als der ihm vorangegangene Winter durch eine Strenge auszeichnete, welcher erst die des Jahres 1709 wieder gleichkam.

Paschettus beobachtete diese Ruhr im J. 1601 zu Genua zu Ende des Sommers nach einer sehr warmen und feuchten Witterung. Wir theilen in der Anmerkung seine ganze Beschreibung mit <sup>1)</sup>.

1) Paschettus, *de diarrhoeis, catharris vulgo dictis, liber III. Liber* 1615. 4. p. 112 sp. „*Præsentibus anni 1601 extremis aestate et principibus autumnus gravitate sunt diarrhoeis, quales ab Hippocrate describuntur lib. de vice ac et sap. et 2. aphor. 17. evacuationes illas quibus debent fieri ex bile et pituita calida et*





wahrscheinlich auf die Ruhr des Jahres 1608 beziehen. Dieser Arzt schreidet die Ruhren in kritische und symptomatische, und führt unter den letzteren diejenige mit auf, welche ihren Grund in Dickdarmgeschwüren findet. Diese aber beschreibt er so ganz mit neueren Darstellungen übereinstimmend, dass man sich auch hier des Unwillens kaum erwehren kann, dass eine höchst wichtige, schon von Hippokrat es <sup>1)</sup> angedeutete Thatsache nach mehr als 200jähriger Vergessenheit von Neuem hervorgehoben und festgestellt werden musste. Die Therapie des Fontanus übrigens bietet nichts Besonderes dar.

### Der dreissigjährige Krieg.

Der glühende Funken der Zwietracht, des Hasses und der Verfolgung, der seit hundert Jahren Deutschland, ja Europa zerriss, loderte noch einmal zur furchtbaren Wuth des verheerendsten Brandes auf, welcher je Europa und vorzüglich wieder das unglückliche Deutschland durchlief. Noch jetzt erblicken wir rings um uns viel stumme aber furchtbare Zeugen jener Zeit, manch öde Stelle bezeichnet nur durch ihren Namen den Ort, wo einst ein betriebsames Geschlecht friedlich hauste, manch einsamer Denkstein bezeichnet noch jetzt dem Wanderer die Stätte, wo in blutigem Kampfe ein tapferer Arm erlag; — aber keine Spur erinnert mehr an die Tausende, die dem würgenden Todesengel auf rathlosen Krankenlager zum Opfer fielen.

### Lagerfieber.

Überall erblicken wir im Gefolge des dreissigjährigen Krieges Seuchen jeder Art, vorzüglich die gewöhnlichen Lagerfieber, aber zu einer fast beispiellosen Wuth entwickelt, und zu noch grösserer Höhe theils durch die übrige grenzenlose

<sup>1)</sup> Hippocr. *Aphor.* sect. II. 26. *He uno dicterragice (phlogi) lous ologas; imazogémati, ovolóngas.* —

[1521.]

Bedrängnis der Kranken, theils durch die eben so masslose Unwissenheit der Feldärzte und Feldchirurgen gesteigert, in deren gewissenlosen Hände das Schicksal des Kernes der Nationen gelegt war. Eben so häufig finden wir die Ruhr, die eigentliche Pest, und neben ihr den Mark-verzehrenden Scorbut verbreitet, und kaum vermögen wir uns zu erklären, wie in so allgemeiner Entfesselung alles Uebels die Menschheit nicht gänzlich vernichtet wurde <sup>1)</sup>.

**1621. In der Pfalz. Fonseca. Rhumelius. — In Sachsen. Burser.**

Wir brauchen, um der Geschichte der Volkskrankheiten des dreissigjährigen Kriegs folgen zu können, nur die politischen Ereignisse und namentlich die Züge der Heere im Auge zu behalten. Am frühesten begegnet uns dem Petechialtyphus als Lagerfieber in der Pfalz, wo im J. 1621 österreichische und spanische Truppen das durch die Achtserklärung Churfürst Friedrich's, des unglücklichen Königs von Böhmen, herrenlose Land besetzten. (Einnahme von Heidelberg am 6ten Sept. 1622.) — Die Schrift eines portugiesischen Arztes, Antonio Fonseca, schildert diese Feldkrankheiten als den ausgebildeten Kriegstypus; dieselbe ist aber so vorwiegend theoretischer Art, dass sie für unsern Zweck eigentlich keine Ambiente gibt.

Ferner gehört hieher die merkwürdige Schrift eines gewissen Rhumelius, deren seltsamer Titel schon den Sonderzug verräth <sup>2)</sup>. Sie schildert den Beginn und die Verbreitung der Lagerfieber der Jahre 1621 und der folgenden, welche bei grosser Sommerhitze im Lager bei Weidhausen entstanden, und von herumstreifenden Soldaten im September desselben Jahres, in welchem man eine auffallende Menge von Fliegen, Schmetterlingen und Spinnen bemerken wollte, so verbreitet

1) Venzl. Hecker, Rede zur Feier des hiesigen Stichtages des Friedrich-Wilhelms-Instituts. (Ueber die Feldkrankheiten.) Berl. 1823. 2.

2) 8. des Schriftenverzeichnisses.



wurden, dass sie im nächsten Frühling in der ganzen Oberpfalz und Baiern allgemein herrschten; — so wahrscheinlich es ist, dass das Uebel mehreren der in jener Zeit des allgemeinen Krieges nur zu häufig dargebotenen Heerde entspross.

Die Beschreibung des Rhumelius, eines fanatisch-verirrten Paracelsiden, ist leider sehr ungeniessbar, indem sich der Verfasser fortwährend auf die unerträglichste Weise um die von ihm angenommene mercurialische Natur der Krankheit bewegt, die er *lyxypetoriosis* heisst, und durchaus nicht für heberlastig gehalten wissen will, weil das Fieber nicht ein Erzeugniß des Mercurius, sondern des Sulphur sey! So spurlos sind an diesen verdrehten Köpfen zu allen Zeiten die mühsam erworbenen Erfahrungen des Besseren vorbeigegangen. — Indess geht aus den Angaben des Rhumelius doch hervor, dass die Epidemie sehr verbreitet und sehr hässlich war, dass sie besonders mit Brustaffectionen, Beklemmung, Bluthusten u. s. w. auftrat, und dass Nasenbluten sehr heilsam zu seyn pflegte, ob schon es, wie auch andere Blutungen, z. B. bei Frauen aus den Genitalien, eine bedeutende Schwäche zurückzulassen pflegte. Zuweilen will Rhumelius eine Geschwulst (*tumor*) auf der Brust beobachtet haben; vielleicht jene rothhäutartige Affection, die bei dem Brusttyphus so häufig ist. — Wärme erzeugten sich in ungeheuren Mengen. — Als Nothkrankheit entstand oft Blindheit, und häufig bildeten sich schon während der Krankheit auf der Cornea Pusteln aus. — Ausser den Petechien erwähnt Rhumelius noch papulöse Ausschläge von der Grösse einer Linse oder halben Erbsen, welche zuweilen Eiter ergossen; eine Erscheinung, welche den heftigeren Formen des Petechialtyphus (und des Abdominaltyphus) niemals fremd gewesen ist. Zu Ende der Krankheit trat häufig eine trockne sowohl als nässende „Schabies“ ein; erstere vorzüglich dann, wenn die Krankheit sich nicht gehörig durch Schreisse entschieden hatte.

Auch bei dieser Epidemie suchte die unbeschreibliche Unwissenheit der Feldärzte und Militärchirurgen alles Heil im

[1621.]

Aberlaaze, welcher jedesmal mit tödtlichem Erfolge angestellt wurde. Erfahrungen der Art wurden täglich gemacht und täglich von Neuem vergessen, denn je geringer der Umfang der Kenntnisse ist, welche der Beschränktheit zu Gebote stehen, desto fester vertraut sie denselben, und ein günstiger Zufall macht tausend Misgriffe vergessen.

Abführ- und Brechmittel hatten begreiflicher Weise eben so schlechte Erfolge; nach den letzteren blieb leicht bedeutendere Taubheit und Gesichtsschwäche zurück, wobei indess bemerkt werden muss, dass man sich damals noch vorzugsweise mineralischer Brechmittel, z. B. des Kernes, des Kupfervitriols, selbst arsenikalischer Präparate bediente, indem die Ipecacuanha erst später allgemein bekannt wurde. — Eben so unzulässig war die Anwendung des Weins; wahrscheinlich weil man die Umstände, unter denen er allein zu nützen vermag, nicht so scharf, als Riverius in einer gleichzeitigen Epilemie<sup>1)</sup> zu beurtheilen vermochte. — Die heilsamste Krise waren nach hier Schweisse, die sich häufig von selbst einstellten.

Von geringerer Bedeutung ist die Schrift Joachim Burser's, Arztes zu Annaberg; indess beweist sie doch, dass auch in Sachsen die Krankheit schon sehr früh allgemein war, und sich nicht bloss auf die Heere beschränkte.

### 1625. Montpellier. — Riverius.

So beobachtete Riverius im J. 1623 eine ausserordentlich böartige Epilemie des Petechialtyphus zu Montpellier, bei welcher nach des Beobachters eigener Aeusserung nur die Bahnen fehlten, um die Krankheit, welche nur kurz beschrieben wird, als Pest erscheinen zu lassen. Es starb die Hälfte der Kranken, und vorzüglich amüsös waren Parotiden, nach Riverius kritische, aber ungenügende Ausbreitungen der Natur zur Genesung, welche er durch sehr kleine Blutentziehungen und gelinde Abführungen, angeblich mit grossem Erfolge, zu

1) S. die gleich folgende Rakok.

ergänzen suchte<sup>1)</sup>. Indess steht diese Angabe bewährten Erfahrungen und der eigenen Schilderung der Krankheit von Riverius, als einer ausgebildeten adynamischen, so scharf entgegen, dass es vergönnt ist, mehr an die guten Erfolge des von Riverius in derselben Epidemie unter geeigneten Umständen verordneten Weins, als an die der Antiphlogose zu glauben.

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die besprochenen Uebel in dieser ganzen Zeit nirgends ganz verschwanden; indess finden wir eine brauchbare Beschreibung erst wieder im J. 1629, über eine Epidemie, in welcher man irrig den Friesel hat finden wollen, dessen erste constatirte Epidemie für Deutschland in das J. 1652 fällt<sup>2)</sup>.

#### 1629. Lüttich. — Meer.

Nach einer zehnjährigen im Allgemeinen kalten Witterung zeichnete sich der Sommer 1629, zu Lüttich wenigstens, durch eine ausserordentliche Hitze aus, deren Einfluss Meer die nun folgende Epidemie des Petechialtyphus zuschreiben geneigt ist. Derselbe ergriff besonders Männer, wesentlich Weintrinker, und von den Frauen vorzugsweise diejenigen, auf welche ein damals entstandener Volkstummel einen heftigen Eindruck gemacht hatte. In den ersten vier Tagen klagten die Kranken über wenig mehr als allgemeine Abgeschlagenheit und Uebelseyn, dann über stellten sich heftige Kopfschmerzen, am siebenten Tage meist Delirien ein. Erbrechen war bei Wenigen, bei den Meisten Verstopfung, vor dem Tode bei Einigen Meteorismus zugegen. Bei Vielen brachen bald nach dem Anfange, bei Andern auf der Höhe, und bei noch Andern zu Ende der Krankheit Petechien aus, ohne dass sich indess weder an diese Erscheinung für sich, noch an die Periode ihres Eintretens irgend eine prognostische Bedeutung geknüpft hätte. Der Tod erfolgte am 7ten, 9ten oder 20sten Tage unter Convulsionen.

1) In n. Riverius, *opp. Ab. XI*, p. 452, 468, ed. Gower. 1727. Fol.

2) S. unten den Abschnitt vom Friesel.



1632.]

— So verderblich diese Krankheit den höheren Ständen war, so leicht verlief sie bei dem Volke, welches sich an reichliches Trinken von Wasser oder Mosten hielt. Uebrigens war dieselbe kaum ausbrechend zu nennen. Heer wandte zu ihrer Bekämpfung vorzüglich frische Kräuteraufgüsse an.

**1632. Nürnberg. — Lagerfieber, Scorbüt. — Roetenbeck, Horn.**

Derselben Art waren die Krankheiten, welche das heldenmüthige Heer der Schweden während der Belagerung von Nürnberg im J. 1632 bedrängten, und tausend tapfern Kriegern einen ruhmlosen Untergang bereiteten. Noch furchtbarer aber mussten die Verheerungen durch den gleichzeitig ausbrechenden Scorbüt werden; jene Krankheit, welche in das Leben der Völker dieser Zeit so verderblich eingriff, und in den Grenzen, den Entbehrungen und der Noth eines verheerenden Kriegs nur zu reichliche Nahrung fand <sup>1)</sup>.

Mit der Wendung des letzteren nach Schwaben finden wir auch in diesem Lande, vorzüglich seit der für die Schweden so unheilvollen Schlacht bei Nördlingen (24. Aug. 1634.) dieselben Krankheiten allgemein verbreitet, und wir sehen die Noth jener geeigneten Gegenden mit dem Ausbruche der Pest aufs Höchste steigen, so dass von dem Jahre 1634 bis 1641 die Einwohnerzahl Württembergs von 313,002 auf 48,000 herabsank <sup>2)</sup>.

**1640. Marburg. — Lotichius.**

Fernere Nachrichten betreffen die im J. 1640 und 1641 zu Marburg, gleich nach einem in der Nähe zwischen dem kaiserlichen und dem schwedisch-französischen Heere Statt gehaltenen Treffen, herrschenden Lagerfieber. Der Beschreiber dersel-

1) Vergl. die Schriften von Roetenbeck und Horn. — 5. auch Nat.-pöthol. Unterr. I. S. 176 ff.

2) Schnurrer, II, 177 ff.

ben, Lotichius, bewährt sich, trotz mancher mystischen Ansicht, als einen sehr hippokratischen Arzt. Wenn er von den Nachtheilen der Drastica, namentlich der Mercurialmittel spricht, so glaubt man ihn zu manchem noch Lebenden reden zu hören <sup>1)</sup>. Er bezeichnet die Anwendung derselben mit den härtesten Ausdrücken <sup>2)</sup>, und stellt von seinem physiatrischen Standpunkte aus die Hauptaufgabe der Behandlung mit vollem Rechte in die Erzeugung peripherischer Krisen. Eben so verwirft er den Gebrauch der Narcotica und Opiate, und für den zur selten angewandten Aderlass gibt er die richtigsten Indicationen.

#### 1645. Kriegstyphus in England. — Willis.

Die Beschreibung, welche Willis <sup>3)</sup> von den im J. 1643 in England herrschenden Lagerfebern gibt, verdient wegen der in ihnen sich offenbarenden Beziehung der Krankheit zur Bubonenpest ebenfalls eine Stelle.

Diese Lagerfeber verbreiteten sich im Anfange des sehr massen Frühlings des genannten Jahres, als das Heer des Parlaments unter Graf Essex das durch eine königliche Besatzung vertheidigte Reading belagerte, unter beiden Herresabtheilungen. Als später Essex nach Thama, der König (Carl II.) nach Oxford zog, so verbreitete sich dies contagiöse Uebel mit größter Heftigkeit in beiden Orten, und von da aus in der ganzen Umgegend. Vornehmlich gefährlich war dasselbe bejählten Personen, ja Willis sagt, dass auf diese Weise an vielen Orten die Eintretung alter Rechte und Sitten gänzlich ausgestor-

1) Lotichius, p. 118. „*defensabile, impotens Mercurialis et horribili effectu, quem cum duntaxat manifesta eius diutius in malis exhiberent, aera, horrenda fugitadineque, compertum est.*“ — Kann diese Erklärung sein, zu erklären, dass wie in den von Lotichius ausgesprochenen Tadel der Mercurialien war dann einstimmen, wenn von ihrer Anwendung in den gewöhnlichen Fällen, nicht aber, wenn bei dem Abdominaltyphus von der in Scrophellen die Rede ist.

2) Hall, „*Temerarius, tyronicum, trepidum.*“

3) Willis, *de febre*, p. 166.

[1622.]

ben sey. — Die Erscheinungen der Krankheit waren die des ausgebildetsten Kriegstypus, unter denen, ausser dem Ausbruch von Petöchien, die Entstehung von Bubonen „wie in der Pest“ hervorgehoben werden muss. Aderlässe waren schädlich. Dagegen rühmte man das „*Poudre constituée de Kent*“, Willis vorzüglich ein aus eingesalzenen, dann mit Wein gewaschenen, und zuletzt leicht calcinirten Kröten bereitetes Pulver<sup>1)</sup>. — Gegen den Winter hörte die alljährig milder gewordenen Epidemie gänzlich auf.

Alle diese Nachrichten sind dürftig genug, und besonders entbehrt die Nosologie der geschilderten Krankheiten fast jeder Hindeutung auf bestimmte vorzugsweise befallene Organe, namentlich aber auch die anatomischen Veränderungen in den Leichen. So wird ein sicheres Urtheil unmöglich. Nichtsdestoweniger ist die Vermuthung erlaubt, dass diese Lagerfieber, hier und da mit dem Geschlecht der Wechselfieber innig verbunden, häufig genug mit unserm Typhus identisch waren, der ja ebenfalls einen so grossen Spielraum der Erscheinungen und besonders der örtlichen Affectionen nach Art und Abstufung darbietet, dass seine Endglieder hier fast mit dem Katarrh, dort mit der Pest zusammen fallen.

Wir beschränken uns auf diese Andeutungen, deren Ausführung in einer historischen Schrift, welche sich begnügt, der Nosologie einen Theil ihres Materials zu liefern, am unreechten Orte seyn würde.

## R u h r.

### 1625. 1e Pels. (Piso.)

Die nächste Stelle nach den geschilderten Uebeln gebührt unstreitig der Ruhr, welche fast fortwährend in dieser Zeit in grosser Verbreitung herrschte. Auch hier ist indess die Zahl der Volksschriften ungleich grösser als die der wissenschaftli-

1) Vgl. Loh. Dienterbrack's ausgegrenzte Erfahrungen.



chen Betrachtungen, und unter diesen gebührt *dones* von Charles le Pois (Piso), einem lothringischen Arzte, nach Zeit und zum Theil auch nach Werth die erste Stelle. Er beschreibt die rothe Ruhr sehr genau nach ihren Stadien, in denen der Secretion wässeriger Stoffe allmählig consistentere, zuletzt blätige und eiterige Massen folgen. Aus dem häufigen Erbrechen galliger Stoffe, die auch mit dem Stuhle abgingen, aus dem Schluchzen, den Respirationsbeschwerden, dem zweifigen Icterus, schliesst er auf das vorwiegende Leberleiden. Der Tod erfolge durch äetliche Zerstörung im Darmkanale oder durch Erschöpfung, namentlich bei dem häufig vorkommenden chronischen Verlaufe, stets aber bei völliger Integrität der geistigen Functionen. Ansteckend sey die Krankheit nicht. Ihre Ursache findet Piso in allgemeinen Witterungsverhältnissen, namentlich der Sommerhitze, mit Ausschluss der gewöhnlich beschuldigten dätetischen Schädlichkeiten. Stets sey die Krankheit von Fieber begleitet, und dieses Fieber bilde den Mittelpunkt des Leidens. — Aus allen diesen Bemerkungen geht hervor, dass die von Piso beobachtete Epidemie zu den leichteren gehörte. — Seiner pathologischen Ansicht gemäss bildete unserm Beobachter die Hebung des Fiebers die Hauptaufgabe, die er durch Aderlässe, selbst bei Kindern, zu erreichen suchte. Ausserdem suchte er die Bemühungen der Natur, den Krankheitsstoff auszuschleiden, durch Purganzen zu ergänzen; von der Rhubarber beobachtete er eine hervorsteckende dürrliche Wirkung. Von Adstringentien machte er nur bei colliquativen Zuständen, von Opium nur bei heftigen Schmerzen Gebrauch.

#### 1624. Gent. — Hermann von der Heyde.

Diese Bemerkungen werden im Ganzen durch die Beobachtungen Hermanns von der Heyde, eines vortrefflichen Genter Arztes, bestätigt. Schon Haller erteilt der Schrift desselben das grosse Lob ihres Ursprungs aus der Beobachtung der Natur <sup>1)</sup>, und mit diesem Charakter steht auch die grosse Ein-

1) „Novae thesauri naturae, sed et ipsa natura.“

[1623.]

fachheit, welche von der Heyde bei der Behandlung der Ruhr des Jahres 1624 befolgte, im Einklange. Das Hauptmittel waren ihm die Molken, die er auch in Klystieren anwendete, und bei Schwächezuständen zuweilen mit Essig versetzte. Zuweilen gab er auch Rotherwein und bei drohendem Hydrops das Spa-Wasser, welches damals den höchsten Gipfel seines Ruhms erreicht hatte. Den Gebrauch des Opiums billigt er nur für die chronischen Formen der Krankheit, welche ebenfalls, wie aus Allem offenbar wird, eine weniger heftige war.

### 1623. Lyon. — Lamonière.

Ganz ähnlich ist die Epidemie, welche Lamonière im feuchtwarmen Sommer des folgenden Jahres zu Lyon beobachtete <sup>1)</sup>. Die Epidemie begann zu Ende Juli und dauerte bis zum November. Einen grossen Antheil an ihrer Entstehung hatte offenbar die Ansteckung durch aus dem italienischen Feldzuge zurückkehrende Soldaten, welche fast sämtlich an der Ruhr litten, und sie wenigstens auf alle na andere Krankheiten im Spitalе Behandelten verbreiteten <sup>2)</sup>. Lamonière selbst nennt die Krankheit eine ruhrartige, da sie sich weniger durch blutige, als schleimig-wässerige Stühle auszeichnete. Zudem war sie meist von heftigem, ja „bösartigem“ Fieber begleitet, und ganz vorzüglich dürfte die grosse Neigung des Uebels zur Intermittenz (*Tertianus duplex*) die Meinung unterstützen, dass ein allgemeiner Krankheitsprocess die ruhrartigen Symptome erzeugte. Am gefährlichsten war die Krankheit Uternachosen, besonders männlichen Geschlechts <sup>3)</sup>; Gröbten war sie fast stets tödtlich. Höchst interessant ist die Bemerkung, dass dem Fieber und den Durchfällen Kopfschmerzen, Hitze, Kitzeln und Rauhigkeit im Schlende (*francum titillatio et asperitas*) und bisweilen eine leichte und vorübergehende An-

1) Im J. 1607 hatte eine ähnliche, noch bösartigere Krankheit geherrscht, in welcher vorzüglich Geschwüre des Dickdarms vorkamen. — Lamonière.

2) Das. p. 28.

3) Das. p. 2. 22.

schwellung des Gesichts und Halses vorwuzugen. Fast bei allen Kranken war ein fixer Schmerz im linken Hypogastrium und Hypochondrium zugegen <sup>1)</sup>. An einer Stelle werden auch „*syphilis in variis corporibus eruptentes*“ erwähnt <sup>2)</sup>. Uebrigens starb kaum einer von 10 Kranken, und von den Gestorbenen hatte kaum der 20ste ärztliche Hülfe gesucht; auf manche chronische, namentlich epileptische Uebel wirkte die Krankheit selbst günstig ein <sup>3)</sup>.

In einer Leiche fanden sich sphacellöse Zerstörungen der Leber, Entzündung des Netzes, des Pylorus und der Dünndärme, brandige Zerstörung des Dickdarms; in einem andern, vernachlässigten Falle ein Abscess der Leber und des Mesenteriums. Die Krankheit war nasserordentlich contagios; vorzüglich leicht befiel sie Solche, die wegen Syphilis Quecksilberrmittel gebrauchten. — Lamonière behandelte dieselbe vorzüglich mit Abführungen aus Rheum; im Anfang leisteten Brechmittel sehr häufig gute Dienste, so wie auch Aderlässe und Blutegel die heftigen Kolikschmerzen, das heftige Brennen im Unterleibe beseitigten. Ausserdem gab er Schwitzmittel und bei heftigem Tenesmus war das bittere Mandelöl in Einspritzungen von vorzüglichem Erfolge. Uebrigens vertraute er, besonders bei chronischem Verlaufe den Adstringentien, unter ihnen vorzüglich den Stahlmolken, während er Narkotika vermied. Sehr häufig folgte der Ruhr eine eigenthümliche Lähmung, welche Haller dem Gebrauche von Wasser, welches durch kleine Röhren geleitet wurde, zuschreiben geneigt ist. — Interessant ist noch die Bemerkung, dass in einem Falle nach Unterdrückung der Ruhr Angina, in vielen andern Tertianfieber sich entwickelten <sup>4)</sup>; eine Erscheinung, die für die Enthaltung des Weizens dieser Ruhrformen von Wichtigkeit ist. — Denn dass diese Ruhren unter dem Einflusse einer allgemeiner verbreiteten Krankheits-

1) Lamonière, p. 22.

2) Das. p. 26.

3) Das.

4) Das. p. 221.



[1623.]

constitution standen, geht ausser den Witterungsverhältnissen, die sich vorzüglich durch schnellen Wechsel und grosse Luftfeuchtigkeit auszeichneten, (im Februar des Jahres 1626 gab es überall grosse Ueberschneemungen) und ausser den oben angegebenen, den Beginn der Krankheit begleitenden Erscheinungen, auch aus der gleichzeitigen ersten Erwähnung einer constatirten Schulschachepidemie hervor. (Düring zu Breslau 1628 <sup>1)</sup>). Verhältnisse, denen wir später eine genauere Betrachtung nicht entziehen werden.

Aus allen diesen Bemerkungen, denen wir noch eine grosse Zahl über die specielleren Erscheinungen des Verlaufs hängen hinzufügen können, möchte sich ergeben, dass die Schrift Lamière's einen höchst ehrenvollen Platz einnimmt, und dass sie noch jetzt für die im Ganzen noch so wenig aufgeklärte Nosologie der Ruhr von Wichtigkeit ist.

### Allgemeine Verbreitung der Pest in den Jahren 1624 — 1630.

Es bedurfte in dieser Zeit des Elends und der Noth nur noch der eigentlichen Pest, um den höchsten Grad der Bedrängnis herbeizuführen. Vergebens müht sich die Geschichte, den Faden zu erkennen, durch welchen sich die einzelnen Epidemien dieser letzteren an einander reihen. Wir finden sie zugleich an allen Orten. Gleichmässig kamste sie in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien, allwärts durch den regellosen Krieg und durch die Haufen irrender Flüchtlinge verbreitet, die nur zu häufig dem Tode entgegenliefen, dem sie zu entfliehen meinten.

Die allgemeine Verwirrung aller Lebensverhältnisse in Deutschland erklärt es eben so sehr, als die noch ziemlich ge-

1) Bei dieser Gelegenheit haben wir eine Irrth. Angabe in dem ersten Theile dieser Schrift (S. 111) nach Angabe des Obigen zu verbessern. Vergl. Hür, med. Frensch. p. 162.

ringe Stufe wissenschaftlicher Ausbildung der deutschen Aerzte, daas dieses Land uns auch über die Pesten dieser Zeit fast keine brauchbaren Nachrichten hinterlassen hat<sup>1)</sup>, während französische und holländische, vor Allem aber Nachrichten aus Italien sehr reichlich vorhanden sind, obgleich uns leider die Benutzung dieser letzteren fast gänzlich versagt war<sup>2)</sup>.

### 1625. Pest zu Breda. — van der Nye.

Wenige Länder Europa's waren seit hundert Jahren durch alle Schrecken eines blutigen und langwierigen Bürgerkrieges und durch das ganze Heer der Gnoel, des Jammers und der verzweiflungsvollen Noth so wie die unglücklichen Niederlande erschüttert worden. In den Zeitraum weniger Jahre sahen wir den Untergang der blühendsten Städte der damaligen Zeit zusammengeedrängt, und wen das finstre Loos des Krieges nicht auf dem offenen Schlachtfelde ereilte, der musste einen schmachvollen Untergange hinter den Mauern der belagerten Städte, verzweiflungsvollerem Verderben durch den kalten Athem des Hungers und der Krankheit sich aufbewahrt glauben.

Nach 15jährigem Waffenstillstande erneuerte Philipp IV. im J. 1621 im Bunde mit Oesterreich und den katholischen Fürsten Deutschlands den Unterjochungskrieg, aus dem doch zuletzt die Niederlande frei und mächtig hervorgingen. Ihnen standen Frankreich, der Herzog von Braunschweig und Graf Mansfeld zu. Das Geschick der Verbündeten auf dem festen Lande war eben so unglücklich, als die Erfolge ihrer Flotten ewig glorreich. Antwerpen wurde vergeblich gestürmt, das feste Breda aber erlag nach langer schrecklicher Belagerung, am 26. Juli 1625, einem Geschieße, in welchem sich die Scenen von Harlem, Delft und Leyden, denen wir früher<sup>3)</sup> einige

1) Schumacher (II, 187) nennt Walwich, Horky und Hering als Beschreiber der Pestepidemien zu Copenhagen und Rostock; Das Schreiben auf aber Nichts als Pestbeschreibungen.

2) Am Ende dieses Abschnitts finden sich die Titel der hierhergehörigen Schriften verzeichnet.

3) S. oben S. 13, 52, 8.

[1622.]

Hülfe zuwenden mussten, zu erneuen schienen. Hier wie dort erlag die dem Schwerte des Feindes unbezwingbare Tapferkeit schmachlich den im Finstern würgenden Dämonen des Hungers, und der Seuche<sup>1)</sup>. Die Witterung des Jahres 1625 zeichnete sich im Sommer durch Hitze, im Herbst und Winter durch Gelindigkeit und Nässe aus. Unter ihrem und dem gewiss eben so bedeutenden Einflusse des entsetzlichen Mangels (= sieben Monate lang trübten die Bewohner mit Brod und Wasser ihr trauriges Leben<sup>2)</sup>), brachen in der eingeschlossenen Stadt bald blutartige Fieber, Pleuresien und in seltneren Fällen Peripneumonien aus. Zugleich herrschten gutartige Anginen. Aber seine furchtbarste Höhe sollte das allgemeine Elend, wie vordem zu Harlem und Delft, durch den Ausbruch der Pest erreichen, die von Holland her eingeschleppt wurde, und um so furchtbarer wüthete, als zu Anfang der Epidemie nur sehr selten Babonen ausbrachen. Im Herbst erst zeigten sie sich, vorzüglich am Hals und unter den Achseln, häufiger: oft zum Heile der Kranken.

Als aber in schauerhafter Verbrüderung der Hunger sich der Pest gesellte, da zeigte sich die gänzliche Lebensschwäche der Befallenen in der innersten Gefährlichkeit nicht nur des einfachsten eröffnenden Mittel, sondern selbst der sonst so heilsamen Schweisse, die aber jetzt häufig nur den verglimmenden Funken durch gänzliche Erschöpfung völlig verlöschen machten. — Bei Frauen stellten sich häufig dysenterische Zustände ein; Würmer erzeugten sich bei ihnen und Kindern; bei den Soldaten äusserte sich das Darniederliegen der Lebenskraft in den ekelhaftesten Productionen einer krankhaften Hautmetamorphose. — Mit Eintritt der Kälte hörte endlich die Pest, nachdem sie in

1) Grewer's Ausgabe der Schrift von Van der Mye erhält durch die beigefügten Anmerkungen, namentlich die Notizen aus der Schrift Hugo's: *Obstetio Brevis circa Philippum II., impetriti Infantem, ducto Jure, Spemque perfectam*, 1627, — einen vorzüglichen Werth.

2) Ein Pfand Butter kostete 1/2, ein 37 Tage altes Kalb 48, ein Schwein 115, ein Pfand Tabak, dem man als Prophylaktikum gegen Pest und Socken vertratete, 160 Gulden. — Hugo, p. 134.



Gemeinschaft mit dem Hunger zwei Drittel der Einwohner gestödtet, fast gänzlich auf. Während derselben waren viertägige Wechselfieber selten, dreitägige nicht häufig vorgekommen, nie aber waren diese in die Pest übergegangen <sup>1)</sup>.

Quarantafieber indess arteten nach van der Myc's Ansicht sehr leicht in die Pest aus. Leider fehlt eine Angabe, welchen Einfluss diese Fieber auf den Verlauf der Pest hatten, oder ob sie vielleicht, wie es fast scheint, gänzlich durch diese unterdrückt wurden <sup>2)</sup>.

Noch schrecklicher aber war das Loos derer, welche die Pest nur verschont zu haben schien, um sie dem Scorbut zur Beute werden zu lassen; einem Uebel, welches, von je her an den Küsten der Niederlande heimisch, durch ähnliche Drangsale als die über das unglückliche Breda verhängten, auch anderwärts würde entstanden seyn. Hier war es die nächste Folge des Hungers, weniger wohl des Genusses eines Korns, welches in der Stadt seit 30 Jahren für die Tage der Noth aufbewahrt wurde. Ausserdem bestand der Hauptvorrath der Lebensmittel in altem Käse und getrockneten Fischen <sup>3)</sup>. Von der Besetzung allein wurden 1608 Mann vom Scorbut ergriffen <sup>4)</sup>. Bei Manchen erzeugte derselbe Fäulnis des Zahnfleisches, Andere wurden von lividen Hautausschlägen befallen, Alle aber zeigten die grösste Schwäche und einen stinkenden Athem. Bei Manchen äusserte sich das Uebel in den Krampfornen der Kriechkrankheit, und bei Vielen, namentlich Solchen, die, wie es oft vorkam, an Herzklopfen litten, trat jährlings der Tod ein.

1) Van der Myc, (ed. Gronov), p. 32. „*quartana tertiana, quae nascentur, quod comperi, degenerant in pestem.*“ — Diese Stelle hat man so deuten wollen, als habe van der Myc dem Wechselfieber eine Schutzkraft gegen die Pest zugeschrieben, während sie nur durch eine spätere Stelle zu erklären ist, in welcher v. d. Myc den Uebergang des Quarantafiebers in die Pest behauptet. — Aus Schreibern's Beobachtungen geht allerdings hervor, dass ein gleichzeitiges Quarantafieber neben der Pest vorkommen und den Verlauf derselben sehr mildern kann. — 6. waren die Pest in der Ukraine vom J. 1776.

2) V. d. Myc, p. 25.

3) p. 72.

4) p. 69.

[1622.]

Am häufigsten aber waren rathartige Zustände, Durchfälle u. s. w., und selbst von den Geretteten wurden Viele noch durch nachfolgende Cachexie, Lienterie und Wassersucht aufgerieben. Am heftigsten ergriff der Scorbut die trügen Engländer, welche gleich zu Anfang der Hungersnoth Hundsfleisch verzehrten, und zu einem sehr feuchten Platze einquartiert waren, seltner die Flandrer und Wallonen, welche trübsiger lebten, sehr selten die Franzosen, deren leichter Sinn sich selbst in den Tagen der größten Noth durch Körperübungen und fröhlichen Gesang aufheiterte. — Aber das Mass der Leiden für die unglückliche Stadt war noch nicht voll; die Pest, welche, wie so oft, im Winter geschlummert hatte, erschien von Neuem in ihrer Furchtbarsten Wuth. Von hundert Befallenen wurde kaum Einer gerettet, und Viele unterlagen später noch dem wiederholten Anfälle der Krankheit.

Eben so vortreflich als van der Mye's Schilderung der Krankheiten ist seine Durchführung der Therapie, und wir erblicken auch hier das rege Bestreben, sich von den Fesseln der Zeit frei zu machen. Noch immer spielten, namentlich in der Therapie der Pest, albernhafte und unnütze Mittel, Edelsteine, Bezoardica die Hauptrolle. Van der Mye, so sehr er auch noch im dem Anschein des Galen festhält, scheut sich nicht, die ersteren lächerlich zu machen und den zweiten nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen einige Wirksamkeit zuzugestehen. Indessen fehlte es nur zu bald auch an Arzneien, und nur mit Mühe konnte eine Mesterei der Truppen unterdrückt werden, die sich auch so dem unfehlbaren Untergange durch den Scorbut Preis gegeben sahen. Von einer Quantität Tropfen, die kaum für zwei Kranke ausgereicht haben würden, gab man jedem Kranken unter Angreißung ihrer Wunderkraft einige wenige, und erreichte durch diesen Betrug glücklicherweise Alles, was nur geüßacht werden durfte. So konnte, man auch hier sehen, wie das ererbte Verstummen selbst ein Nichts unwirksam macht 3).

3) v. d. Mye, p. 116.

Während der achtmönatlichen Dauer der Belagerung waren über 7000 Menschen diesen Bedrängnissen erlegen; im spanischen Lager dagegen, welches mit Allem wohl versehen war, war nach nicht eine Spur der Uebel zu bemerken, deren volles Maass sich über die Belagerten ergoss.

### 1628—1630. Pest in Frankreich.

#### 1628. Lyon. Châlons sur Saône. — Morel.

Kaum weniger furchtbar waren die Schreckensscenen, welche die Pest wenige Jahre später in Frankreich erneuerte. Mehrere Schriftsteller nennen Lyon als den Herd, von dem aus sich die Pest dieser Jahre über dieses Land hinwälzte. So namentlich Morel, der die Epidemie beobachtete, welche von Ostern 1628 an Châlons sur Saône verüdete, und deren erste Fälle höchstwahrscheinlich auf directer Verschleppung von Lyon beruhten. Uebrigens vermengt Morel, wie schon aus dem Titel seiner Schrift hervorgeht, noch durchgehends die Pest mit dem Petechialtypus<sup>1)</sup>.

#### 1629. Pest zu Digne. — Lautaret. Gassendi.

Ergreifend ist die Schilderung, welche Gassendi<sup>2)</sup> von den Verwüstungen entwirft, welche die Pest des Jahres 1629 zu Digne in der Provence anrichtete. Gassendi<sup>2)</sup>, erster Geistlicher dieser Stadt, hielt sich zwar während der Epidemie in Holland auf, erhielt aber die folgenden Angaben von Lautaret, einem Arzte zu Digne, welcher die Herausgabe einer eignen Schrift über dieselbe beabsichtigte, die indessen nicht erschie-

1) Bei Morel findet sich auch die weitläufige Beschreibung einer Ephemie, welche Ornam (III, 135.) unzulänglich mittheilt und irrig für die Art der Typhus angibt, da Morel der Verf. ist.

2) Gassendus, *Petr., Notulae rebus Dignensis*, Paris, 1654, 4. p. 32 ff. Vergl. auch Papon, *de la peste*, I, p. 225 seq., der aber nicht immer ganz genau ist.



[1622.]

nen zu seyn scheint <sup>1)</sup>. Die Krankheit begann in den ersten Tagen des Juni, höchstwahrscheinlich von durchziehenden nach Italien bestimmten Truppen eingeschleppt, indem nicht nur zu Lyon, sondern auch in mehreren Orten der Dauphiné und der Provence, namentlich zu Aix <sup>2)</sup>, gleichzeitig die Pest herrschte. Das Wetter war während der ganzen Epidemie trübe, neblig, und reich an Gewittern. Wie gewöhnlich wurde behauptet, es habe sich während der Seuche nirgends ein Vogel sehen lassen. Uebrigens waren die Erscheinungen des Uebels ganz die gewöhnlichen. Sehr häufig kamen phrenitische Erscheinungen so wie Schremsd vor. Die ungeheuren Verheerungen der Seuche erklärten sich theils aus dem Mangel an ärztlicher Hilfe (die von beinahe 10,000 Einwohnern nur 500 zu Theil wurde), theils aus dem mit Androhung der Todesstrafe eingeschränkten Verbot des Parlaments, die Stadt zu verlassen, zu dessen sicherer Erfüllung ganz Digne von Truppen eingeschlossen wurde. Entsetzen und Ahasen erregend sind die Schändlichkeiten der Befehlshaber dieser Truppen, welche die der unglücklichen Stadt zufließenden Lebensmittel entweder für sich behielten, oder zu ungeheuren Preisen verkauften; ja ihre Grausamkeit ging so weit, dass sie beschlossen, die ganze Stadt mit ihren Bewohnern den Flammen Preis zu geben, als die Krankheit ihre höchste Höhe erreicht, und über 1500 unbegrabte Leichen die Luft derselben so verpestet hatten, dass man eine weitere Verbreitung der Seuche fürchtete. Ein Entschluss, dessen Ausführung man unterliess, als die Nachricht eintraf, dass die Pest in einigen nahe gelegenen Städten ebenfalls ausgebrochen sey. Nichts desto weniger wurde eine Villa vor der Stadt sammt ihren Bewohnern den Flammen Preis gegeben. Die Geschichte der Pest dürfte kaum ein zweites Beispiel ähnlichen Grauels, ähnlicher verzweiflungsvoller Bedrängnis aufweisen. In der Stadt selbst herrschten alle Schrecken

1) Von diesem Orte ist uns Nichts bekannt, als eine Beschreibung der Heilquellen zu Digne. S. Sprungel, S. 324.

2) Borsl, Samml. Vira. 15. S. 135.

des Todes, der Verwirrung, der Anarchie. Das Spital konnte bald die Kranken nicht mehr fassen, es fehlte, trotzdem dass man den Gefangenen, für den gefährlichen Preis die Bestattung der Gestorbenen zu übernehmen, die Freiheit schenkte, an Todtengräbern, die Stadt war ohne Behörde, ohne Richter, und selbst die Verhörung des Höchsten war verschwunden. Die Zeit hatte kein Mass mehr, da es an Seelen fehlte, welche die Uhren in Ordnung erhalten konnten, ähnliche Ursachen machten die Brunnen versiegen und die Getriebe der Mühlen still stehen. Alle Bande des Bluts und der Freundschaft waren gelöst, alle Begierden wurden ungestört und ungestraft erfüllt, denn Nichts hatte mehr einen Werth. — Endlich liess im September, October und November die Wuth der Seuche nach, und das Bedürfnis der Ordnung wurde mit ihrer wiederkehrenden Möglichkeit fühlbarer. Aber erst zu Ostern des folgenden Jahres (Ende April) wurde der Stadt der Verkehr wieder frei gegeben; vielleicht zur Strafe der Verjagung ihrer Wache, deren anmassende Frechheit sich täglich vermehrte. Die Zählung der Uebriggebliebenen ergab nicht mehr als 1500 Einwohner, meistens Greise und Frauen; — 8500 waren der Pest zum Opfer gefallen! Aber selbst unter den Ueberlebenden waren kaum 5 bis 6, welche die Krankheit gänzlich verschont hatte. Niemals ist das unglückliche Digne später wieder zu seiner früheren Bedeutung gelangt. — Schon noch einem halben Jahre brach die Pest von Neuem aus, aber diesmal sicherte sich der grösste Theil der Einwohner durch die Flucht, und es starben nur 100 Personen an derselben, grösstentheils neue Bürger, indem auch hier das früher überstandene Uebel vor neuem Erkranken zu schützen schien.

#### 1629 und 1630. Pest zu Montpellier. — Rauchin.

Die Geschichte der Pest zu Montpellier<sup>1)</sup> in den Jahren 1629 und 1630 wiederholt die so oft dagesagte Folge des

1) Raucklin nennt als bedestrafte Pestjahre für seine Vaterstadt 1242 — 1143 (schwarzer Tod), 1244, 1374 (vom 25sten April bis zu Johanne 1275), 1480.

[1629.]

einfachen Anfangs, der Verkennung und Sorglosigkeit, der allgemeinen Verbreitung. — Sie gelangte in diese Stadt von Toulouae aus durch einen Capuciner, trotz aller Vorsicht, welche man seit mehreren Jahren gegen den in der nächsten Nähe hausenden Feind angewendet hatte. Der genannte erste Pestfall wurde Ranchin, der zugleich Professor der Medicin und Bürgermeister war, am 6ten Juli 1629 angezeigt, aber von dem angestellten Pestsirger (genannt „le grand Jenu“) nicht als solcher erkannt, obgleich der Kranke vier Karbunkeln und einen Aehschlubo hatte. Indess wurde der Letztere, da andre Aerzte durchaus entgegengegesetzter Meinung waren, sorgfältig abgesperrt, stark aber bald darauf. Wenige Tage nachher kam ein andrer eben so unabweisbarer, schnell tödtlicher Pestfall in der Stadt vor, dessen zunehmende Verbindungslosigkeit mit dem ersten sich gar bald aufklärte, als constatirt wurde, dass schon vor dem des Capuciners mehr als 20 vermeintliche oder verkante Pestfälle vorgekommen waren. Diese schlimmen Umstände wurden noch durch die Pflichtvergessenheit gesteigert, mit welcher diejenigen Aerzte, deren Behauptung von der Abwesenheit der Pest widersprochen worden war, den Behörden Herrschsucht und die Absicht Schuld gaben, den König, der nach Beendigung der Belagerung von Alex nach Montpellier kommen wollte, von der Stadt fern zu halten <sup>1)</sup>. Wirklich kam statt des Königs der Cardinal Richelieu auf 8 Tage in die Stadt, durch welche bald darauf die ganze Armee hindurchzog. Seit dieser Zeit verbreitete sich die Pest immer mehr, und erreichte im October mit einer Sterblichkeit von mehr als 1000, unter denen sich sehr viele Aerzte und Chirurgen befanden, ihre Höhe, ihr Ende aber erst im April des nächsten Jah-

— Wir haben noch eine zweite Schrift Basseville's vor uns: „*Traictat des pestes, de leur cause, de leur traitement, de leur cure et de leur prevention. II. de purification des lieux infectez par pestilence.*“ (Lugd. 1632, 8.) („Non inutilis Mollus“ Walley, *hist. med. p. II*, 346.) (Vgl. Etkin.)

1) Vermuthlich tritt in Jensei Zeit der von Joubert XIII. gegen die Kalkülanten gelübte Verrückungsgang.



res. Der gesammte Menschenverlust betrug 4 = 5000, d. h. die Hälfte der zurückgebliebenen Einwohner <sup>1)</sup>).

### **Pest in Deutschland und in der Schweiz.**

Zu derselben Zeit wurde auch Danzig und gewiss noch viele andere Orte Deutschlands von der Pest heimgesucht. In der genannten Stadt soll die Krankheit durch Schwedische und Polnische Kriegsvölker eingeschleppt worden seyn <sup>2)</sup>. Häufig indess wurde wohl die Pest mit dem Petschialtypus verwechselt. Ueberall zeigte sich das Uebel in den wohlbekannten, häufig genug zur größten Bösartigkeit gesteigerten Formen; fast überall gingen ihm andere Krankheiten, besonders die oben geschilderten Typhen und die Ruhr zur Seite.

Handschriftliche Nachrichten von Fabricius Hildanus über die Berner, so wie von Aegidius Tonsor über die Schaffhauser Pest bewahrt die Berner Bibliothek <sup>3)</sup>. Zu Bern starb der vierte Theil der Bevölkerung; prophylaktische Fontanelle wurden mit Erfolg angewendet. Zu Schaffhausen richteten die erhitzenen Arzneien der Paracelsisten viel Unheil an.

### **1630. Die Pest in Italien.**

Nach allen Nachrichten über die Pest dieser Jahre hat niemals eine Epidemie derselben in weiteren Kreisen geherrscht, als diese. Dieselben Kriegerunruhen aber, welche ihr erlaubten, fast ungehindert ganz Europa zu verheeren, sind auch die Ursache, dass es uns an genauen Nachrichten über den Verlauf der einzelnen Epidemien fast gänzlich fehlt. Vorzüglich haben wir zu beklagen, dass uns für die Verhütung dieser Pest in Italien, aller Nachforschungen ungeschädet, keine der zahlreichen Quellen zu Gebote steht, deren Titel wir am Schlusse

1) Vergl. auch Pappe, *de la peste*, S. p. 156-157.

2) Weylmann, p. 64.

3) Haller, *ibid.*, *med. pr.* II, p. 376.

[1626.]

dieses Abschnitts verzeichnet haben. Oxanam hat nur die Schrift von Tadini benutzt, und noch viel dürftiger sind die Nachrichten bei Schwaner.

Es ergiebt sich indessen aus den Titeln jener Schriften, (Polittius, Alaynan, Bergat), dass auch diesmal Sicilien, namentlich das unglückliche Palermo, die Schrecken der Pest mehrere Jahre früher als Italien empfand. Wie und in welcher Zeitfolge sie sich aber über die einzelnen Städte des letzteren Landes ausbreitete, darüber fehlt es an jeder Aufklärung. Indess scheint man diesmal die Contagiosität des Uebels fester im Auge behalten zu haben, obgleich es selbst noch in dieser Pest nicht an Leugnern desselben fehlte. So wiederholt sich z. B. bei Occhi Rizetti Alles, was jemals Abgeschmacktes für die neumantische Verbreitung des Uebels vorgebracht worden ist <sup>1)</sup>.

#### Die Pest zu Verona. — Pona. (Ragioniere.)

Etwas gewinnere Nachrichten können wir über die Epidemie zu Verona besitzen, über welche erst kürzlich Ragioniere (pseudonym) mit vorzugsweiser Benutzung einer im J. 1727 erschienenen uns ebenfalls unbekannten Schrift Pona's Einiges veröffentlichte.

Ragioniere hebt zunächst die allgemeine Verbreitung der Pest dieser Jahre über Oestreich, Flandern, England, Steyermark und Kärthen, so wie für das nun befallene Italien ihr Zusammentreffen mit grosser Nahrungs- und Kriegesnoth hervor <sup>2)</sup>. Man behauptete selbst nicht ohne Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Keime des Uebels mit den französischen Truppen in das Land gekommen seyen. — Zuerst verbreitete sich die Seuche im Gebiete von Brescia; nach Verona gelangte sie durch unentzweifelte Verschleppung. Bald war sie das schreckliche Gemüth Aller, aber die höchste Höhe erreichte die Be-

1) Occhi Rizetti: *Breviario, De pestilentia et eorumque morbis etc.* ff. 1727, 1659, 4. (Erlang.) II, f. cap. XIIII.

2) Herrng: *Essai sur la peste de Mantoue*, auf dessen Besitz er nach dem Tode Herrngs Vincenz B. Ansprüche macht.

drängniß durch die Ankunft der venetianischen Truppen, die sich nach der für die Franzosen siegreichen Schlacht bei Villabona (d. 29ten Mai) nach Verona flüchteten. Seitdem erst erreichte die Seuche den höchsten Gipfel ihrer Wuth, und erst im October hörte sie mit dem Wiedererscheinen von Tertianfebern auf, nachdem ihr 32,895 Opfer gefallen waren <sup>1)</sup>.

Schriften über die Pest der Jahre 1624 — 1630.

- † Beckher, Dan., Fünfechen Fragen von der zehnjährigen Pest in Preusslachen. Königsberg. 1630. 4.
- Pauw, Petr., *Tractatus de peste, cum Henrici Florentii ad singula ejusdem tractatus capita additamentis*, Lugd. 1630. 16.
- van der Mye, Fried., *Delfensis, praesidi Bredani medici regii, de morbis et symptomatibus popularibus Bredensis temporis obidionis et eorum immutationibus pro anni vicis atque diversitate, deque medicamentis in summa rerum copia adhibitis, tractatus duo*, Antv. 1627. 4.  
— *Iter. edid. Gruner. Jen. 1792. 4.*
- † *Actis solitaire contre la maladie épidémique et pestilentielle de la ville de Lyon. Lyon 1628. 12.*
- † Robin, Vincent, *Actis sur la peste, reconnue en quelques endroits de Bourgogne etc. Dijon 1628. 12.*
- † Grillot, *Lugdunum lae affectum et reffectum a. 1628 et 1629. Lugd. 1629. 8. — Liva affligé de la contagion. — 1629. 8. (Bei Senac, traité de la peste, p. 29.)*
- † de Moulaxaar (Montausier), Durand, *Manifeste sur ce qui s'est passé en la peste de Villefranche en Rouergue, avec quelques questions curieuses sur cette maladie. Toulouse, 1629. 12. (8.)*

1) Während der Pest (im Jten Juli) verordnete eine Feuersbrunst den „Monti di Pietà“, das Archiv der Stadt. Ein Pestkranker hatte im Bekleidungs-Kasten einen Rest angelassen. — Vergl. übrigens unsere Bemerkung zu dieser Schrift und ihre Entgegnung im Schrifttumsverzeichnisse im letzten Alachatte.



[1630.]

Ranchin, Franc., *L'histoire de la peste qui affligea Montpellier en années 1629 et 1630.* (In *opuscules ou Traictés divers et curieux en médecine.* Lyon, 1640. 8.) (600.)

† Tadini, Alessandro, *Ragguglio dell' origine e giornali successi della grave peste nell' anno 1629, 1630, 1631.* Milano, 1648. 4.

† Politius, Anton., *De febrilibus pestilentialibus pestis ac me nominatis cum bubonicis, carbunculis et aliis praeis symptomatibus gravantibus Panormi a. 1624 consultiis.* Panormi, 1625. 4.

† Alaymo, Marco Ant., *Discorso intorno alla presentazione del morbo contagioso e mortale, che regna in Palermo ed in altre città di Sicilia.* Palermo, 1625. 4.

† Borgat, Bernard., *Commentarius de crudeli lux et contagioso morbo circa Panormum et alias Siciliae urbes gravante.* Messan., 1626.

† Cardosus, Ferd. Franc., *De febre syacopoli, contraversis, historia, observationibus referta.* Madrid., 1634. 4.

† Taurellus, Andr., *De peste italica libri II.* Bonon. 1630. 4.

† Fabiani, Franc., *De origine et cursu pestilentia morbi a. 1630 Italiam defecantis.* Bonon., 1631. 4.

† Imperialis, Joh., *Pestis anni 1630 descriptio historico-medica.* Vicent. 1631. 4.

† Grosvius, Th., *Quaestio unica, an morbi qui in Italia et potissimum in Gallia cunctis hoc anno erogauntur sub nomine pestis an vera sint febris pestilentialis numerari debeant, etc.* Frust. 1631. 4.

† Galerius, Barth., *Epistola super morbo hoc tempore gravante.* Bonon. 1630. 4.

† Fiocchetto, G. Fr., *Traictado della peste e pestifero contagio di Torino.* Torino 1631. 8.

- † Rota, M. A., *De peste Veneta a. 1634.* 4.
- † Vignanti, Giov. Ant., *Raccolta d'avvertimenti e ricordi per cavarre la peste, per guarirsi e preservarsi, mandata alla stampa per ordine del magistrato della sanità.* Venet., 1630. 4.
- † Ripamonti, Silr., *L' de peste, quae fuit anno 1630 in urbe Mediolanensi.* Mediol. 1641. 4.
- † Rondinelli, Franc., *Relazione del contagio stato in Firenze l'anno 1630 e 1633.* Firenz. 1634. 4.
- † Richus, Alex., *Historia contagiosi morbi, qui Florentinus populariter fuit a. 1630.* Florent. 1633. 4.
- † Tirelli, Maur., *Della peste della Abbazia del Polatino.* Rotig., 1631. 4.
- † Ponticelli, Dom., *Trattato sopra il male della peste.* Biacciana, 1631. 8.
- † Langetto, Troilo, *Di pestilenza commea a brati e di contagio mortale del uomo, con dialogo attinente alla mistione di sangue, al taglio della vena, un altro dialogo del faimento naturale del contagio.* Venet. 1632. Fol.
- † Valetta, David, *Legalejo aphoristico o vero prontuario metodico di preservazione e curazione contro la peste.* Venet. 1636. 4.
- † Galesius, Barth., *Epistola super morbo hac tempore grassante.* Boana. 1630. 4.
- Ragioniere, Ruoxi Luigi, *La pestilenza accesa in Verona l'anno 1630.* Verona 1838. 8. (Faut antholox. Compilation aus Boaccio und Poma.)
- Avvertimenti del medico Francesco Poma all' Educatore della nuova storia della pestilenza accesa l'anno 1630 in Verona.* Verona 1837. 8. (Weist nach, dass die Schrift von Ragioniere eine collimire Compilation aus Poma ist.)

1655. Typhöse Pneumonien in Oberitalien.  
Baronius.

Zwei Jahre nach dieser Pest beobachtete Vincentius Baronius zu Forlì eine Epidemie, die er als Pleuripneumonia bezeichnet, die aber offenbar als typhöse Pneumonie betrachtet werden muss, und deren Beschreibung hier eine Stelle finden mag, da die Beobachtungen dieses Arztes theils wegen ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit, theils wegen der Seltenheit der Schrift selbst, zu den werthvollsten über eine auch jetzt noch nicht genau gekannte Krankheit gehören, deren gegenwärtiger Name selbst (*Pneumonia typhosa*) nur die geringe Kenntniss der Aerzte von ihrem Wesen bezeichnet. — Sie brach zu Anfang Februar aus, und ergriff vorzüglich die Gegenden Italiens, welche die vorhergegangene Pest verschont hatte. Ueber die Beschaffenheit der vorausgegangenen und gleichzeitigen Witterung sagt Baronius nur, dass Südwinde vorherrschend haben <sup>1)</sup>. Zuerst bildeten sich Geschwüre in der Mundhöhle, zu denen sich bald eine so heftige Angina gesellte, dass, wenn nicht schleimige Hülfe geleistet wurde, der Tod durch Erstickung eintrat. Hierauf stellten sich an verschiedenen Stellen der Brust stechende Schmerzen mit Husten, Schwerathmigkeit, Röthe einer oder beider Wangen, Durst und Fieber ein. Diese Schmerzen wechselten zuweilen ihre Stelle, am häufigsten kamen sie im untern Theile des Thorax vor; zuweilen, namentlich wenn ein Aderlass vorhergegangen war, traten sie erst am 2ten bis 4ten Tage ein, in der Regel aber verschwanden sie am 4ten bis 7ten Tage. Viele Kranken konnten nicht auf der kranken Seite liegen; bei Manchen fehlte der Schmerz, nicht aber der Husten und die Athemnoth, bei Manchen wurde er nur durch den Husten hervorgerufen. Dieser war Anfangs trocken, später wurden durch ihn rothe, blättrige, zuweilen safranfarbige, rostfarbene, schleimige

1) Baronius, p. 3, imp. Vergl. Haller, *Médec. physiq.* II, 515.

2) Baronius, p. 144.



Spata ausgeworfen. Zugleich fanden beträchtliches Fieber, un-  
erträglicher Durst, Appetitlosigkeit, heftige Leibesmerzen,  
Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, auf der Höhe der Krankheit De-  
lirien bei schwarz belegter Zunge Statt. Sehr häufig gingen  
Würmer ab, und bei Kindern und Frauen brachen nicht selten  
Petechien aus. Zu Florenz und in andern Orten von Italien  
sollen sich nach Baronius häufig Bubones, Carbunkeln und  
Petechien zu dieser Pneumonie gesellt haben <sup>1)</sup>. Leider ist  
diese Angabe nur kurz; indess könnte diese Erscheinung doch  
mit der vorhergegangenen Pest in Verbindung gewesen seyn.  
Die Krankheit entschied sich gewöhnlich am 7ten, 11ten oder  
14ten Tage; am günstigsten durch frühzeitigen und reichlichen  
Schleimauwurf.

Zur richtigen Beurtheilung des Charakters dieser Epidemie  
darf nicht übersehen werden, dass gleichzeitig die Blattern und  
Masern vorzüglich unter den Kindern in grosser Allgemeinheit  
herrschten, und dass zugleich sehr häufig Wurmaffectionen vor-  
kamen <sup>2)</sup>. Baronius selbst erkannte die Verbindung dieser  
Krankheiten <sup>3)</sup>, wenn er gleich irrig nicht der Luft, sondern  
der Lebensweise, namentlich dem Weingenuß, ihre Entstehung  
beimist.

Einen besondern Werth erhalten Baronius Beobachtungen  
durch die hinzugefügten Sectionsbefunde, in denen am constan-  
testen Adhäsionen der Pleura <sup>4)</sup>, Wasserguss in den Säcken  
derselben, und Anfüllung der livid gefärbten Lungen mit zähem  
Schleim vorkommen <sup>5)</sup>.

1) Baronius, p. 175.

2) Die Würmer spielen bekanntlich bei dem Peterblattyphus eine sehr  
grosse Rolle; hier mag noch angedeutet werden, dass sie bei der ersten Ruhr fast  
niemals fehlen.

3) „*Ita morbi nostri sunt velut veritatis constitutionalis formae ef-  
fuerunt.*“

4) Nach immer wurde in dieser Zeit der Streit über den Sitz der Pleuritis  
und ihren Unterschied von der Pneumonie mit grösster Lebhaftigkeit geführt.  
Baronius gehört zu denen, welche die Wahrheit erkannten, und sein Werk  
diente in dieser, unserer Aufgabe formelles, Beistand einer der wichtigsten says.  
Sprachforschungen vornehmlich.

5) Baronius, p. 5.

[1633.]

Unser Beobachter behandelte die Krankheit mit zeitigen, zuweilen sehr bedeutenden Aderlässen, selbst bei Schwächlichen und bei gestunkenen Kräften, indem wie es scheint, nicht ohne Widerspruch, indem er selbst anführt, dass die Aerzte zu Venedig und Padua bei Kindern, wo er ebenfalls den Aderlass nicht scheute, denselben mit ungünstigem Erfolge vorgenommen hätten. Er nimmt aber an, dass dort die Krankheit einen bösartigen Charakter gehabt habe <sup>1)</sup>. Ferner empfiehlt er Vesicatorien. Dagegen verwirft er im Allgemeinen den Gebrauch der Abführmittel, indem sie die äetlichen Lungenkrisen, auf welche er den grössten Werth legt, stören. Diese letzteren und die allgemeine Schweisskrise beförderte er sehr zweckmässig und mit dem besten Erfolge durch reichliches Trinken von warmen Wasser.

#### 1635 und 1637. Pest zu Nymwegen. — Diemerbroeck.

Schwerlich ist irgend eine Schrift über die Pest so viel gelesen worden, als Diemerbroeck's vier Bücher über diese Krankheit, denen zunächst die Thatsachen zu Grunde liegen, welche dieser damals erst 26 Jahr alte Arzt in der Nymwegener Pest der Jahre 1635 und 1637 mit einer Genauigkeit und Schärfe des Urtheils beobachtete, und mit einer Klarheit wiederzugeben verstand, wie sie bei wenigen älteren Aerzten angetroffen wird, obschon das Uebergewicht dieser Vorzüge durch ein zu ängstliches Festhalten an manchen längst heseitigten Sätzen der Schule nicht wenig gehemmt wird.

Der Frühling des Jahres 1635 war warm und mässig feucht, der Sommer überaus trocken und heiss. Das Jahr war reich an Metoren, Südwinden, Insekten u. s. w. In vielen Häusern starben die Singvögel in den Käfigen, wonach oft der Ausbruch der Pest unter den Bewohnern folgte. Andere der Furcht der Beobachter entsprungene Angaben, legen auf das Todtenspiel der Knaben, bei welchem sie Leichenzüge und Todtengesänge aufführten, einen übergläubischen Werth.

<sup>1)</sup> Baranisk, p. 8.

Im Juni des genannten Jahres brach zu Nymwegen und an vielen andern Orten Hollands ein bösaartiges Fieber aus, welches an Gefahr und Verbreitung ausserordentlich zunahm, als das vereinigte Heer der Franzosen und Holländer auch der Belagerung von Löwen, welche Ludwig XIV. wegen Mangel an Zufuhr aufheben musste, sich nach Nymwegen zurückzog. Diese Fieber rafften in zwei Monaten zu Nymwegen mehr als 3000 Menschen dahin, und in ähnlicher Verbreitung herrschten sie unter den Truppen, welche das Fort Schenk bloquirten. Localen Einflüssen verdankten diese Krankheiten in ihrem Beginn einen gewissen Wechselfieberanstrich, der sich aber mit dem 7ten Tage zu einem ausgebildeten typhösen Zustande umgestaltete. Auffallend ist die Bemerkung über die erfolgreiche Anwendung des Aderlasses, der selbst drei- bis viermal wiederholt werden musste. Ausserdem bewiesen sich gelinde Schwitz- und Abführmittel hilfreich.

In Leyden raffte die Pest in diesem Jahre 20,000 Menschen dahin. In grosser Verbreitung herrschte sie gleichzeitig in Deutschland und an den Ufern des Rheins<sup>1)</sup>. Zu Nymwegen brach dieselbe schon im November 1635 aus, blieb aber den ziemlich gelinden Winter hindurch bis zum Januar 1636 wenig verbreitet; von da aber in raschen Verhältnissen zunehmend erreichte sie im April eine Höhe, auf welcher sie, kein Haus verschonend, sich bis zum October erhielt, auch da erst bei der geringen Strenge des Winters so langsam abnehmend, dass erst im März des Jahres 1637 ihr völliges Erlöschen angenommen werden konnte, zu welchem nach Diemerbroeck der plötzliche Eintritt einer heftigen Kälte im Februar wesentlich beitrug. Die lange Dauer der Pest beruhte nach diesem Beobachter auf ihrem Eintritt im Winter, was allerdings die Erfahrung für sich hat, und sich aus der langsameren Verbreitung der Epidemie in ihrem Anfange und Ende, so wie ihrer lange anhaltenden Höhe mitten im Sommer, leicht erklärt. In

1) Diemerbroeck, p. 217.



[1825.]

der Umgegend von Nymwegen aber, namentlich zu Montfort, Diemerbroeck's Geburtsorte, verbreitete sie sich erst in dem letztgenannten Jahre, mit einer Wuth, die kaum die Hälfte der Einwohner am Leben liess.

Die Hauptursache dieser Nymwegener Pest war ebenfalls, wie Diemerbroeck selbst vermutet, das eingeschleppte Contagium, welches um so mehr Wurzel fassen konnte, als von Seiten der Behörden, welche von den übrigen öffentlichen Angelegenheiten des Landes viel zu sehr bedrängt waren, als dass sie auf die Pestangelegenheit die gehörige Rücksicht hätten nehmen können, Nichts geschah, um dem Uebel Einhalt zu thun. Unter Andern klagt Diemerbroeck über die Sorglosigkeit, mit welcher man in öffentlichen Versteigerungen mit dem Nachlass der an der Pest Gestorbenen umgegangen sey. Erst spät befohl der Magistrat einen Aufschub von 3 Monaten für diese Verkäufe, eine Massregel, die natürlich ebenfalls erfolglos war.<sup>1)</sup>

Zu den Besonderheiten, welche Diemerbroeck beobachtete, gehört, ausser der auffallenden Immunität des Greisalters, vor Allem der Einfluss der Mondphasen auf die Intensität und Extensität der Krankheit. Einige Tage vor und nach dem Neumonde, so wie vor und nach dem Vollmonde kamen immer die meisten und heftigsten Erkrankungen vor, von denen viele schon nach einigen Stunden, oft ohne dass ein bedeutenderes Unwohlseyn sich bemerklich gemacht hätte, plötzlich tödtlich wurden. Ähnliche Beobachtungen hatten schon früher Mehrere gemacht. Diemerbroeck äussert sich bei dieser Gelegenheit sehr verständig über den Einfluss des Mondwechsels auf manche Erscheinungen des organischen Lebens, und erkennt für beide eine gemeinsame Grundursache. Neuere Schriftsteller sind beinahe allgemein geneigt, diese auch von L. Frank bestätigte Erscheinung mit Modificationen der atmosphärischen Electricität in Verbindung zu setzen, eine Ansicht, welche, obschon ihr directer

<sup>1)</sup> Diemerbroeck, p. 77 sq.

Beweis ziemlich schwer zu führen seyn dürfte, sehr viel für sich hat. — Vorzüglich gefährlich war die Krankheit Schwangeren, die entweder abortirten, oder nach der zur rechten Zeit eingetretenen Geburt sammt ihrem Kinde ergriffen wurden. In Fällen der Art starb in der Regel das Kind sehr bald. Bei- laufs der Ausmugung der Milch liess Diemerbroeck junge Kindchen anlegen, welche er in dieser Beziehung sehr empfiehlt, und beobachtete stets den laudigen Tod dieser Thiere <sup>1)</sup>. Eben so wurden Ammenkinder und Neugeborene in der Regel sehr häufig befallen. Viele überlebten den ersten Tag nicht, Andere starben im 3ten bis 7ten Tage; war dieser letzte indess über- strichen, so konnte mit einiger, obschon durchaus nicht absolu- ter Sicherheit auf einen günstigen Ausgang gerechnet werden, indem Manche noch in der 3ten und 4ten Woche starben. — Ein gleich zu Anfang gereichtes Schwitzmittel schnitt oft den Verlauf der Krankheit plötzlich ab oder machte sie doch viel gelinder. — Uebrigens traten auch hier alle übrigen Krankhei- ten vor der Pest zurück, deren einzelne Zufälle von den ge- wöhnlichen in Nichts abwichen.

Die erste und vorzüglichste Ursache der Pest ist nach Die- merbroeck der göttliche Zorn, welchen er auch im Özeir des Hippocrates wiederfindet. Die zweite, vermittelnde, der Pesthuch, welcher vom Himmel aus die sündige Erde berührt; die dritte das Contagium, welches sich aus der spontan entstan- denen Krankheit entwickelt. — Es bedarf keines Wortes wei- ter, um zu zeigen, wie bedeutende Rückschritte man in einer Lehre gethan hatte, welche mehr als 50 Jahre früher weit ge- hiefterer und naturgemässer vorgetragen worden war. In der That, man muss Bedenken tragen, in das außerordentliche Lob einzustimmen, welches dem Arzte von Nymwegen von den Nachfolgern gespendet worden ist, wenn man sieht, dass die Lectüre eines Massaria, Boecangelini, Landus u. s. w. für die Gestaltung seiner Grundansichten weniger Einfluss ge-

[1643.]

habe hatte, als die von den bessern Köpfen längst belächelten Trümmereien des 15ten Jahrhunderts. Nur die grosse Klarheit der Sprache und die Leichtigkeit der Consequenzen einer bequem handzuhabenden Hypothese von der Vergiftung der Luft, als der gemeinsamen Ursache aller Erscheinungen, welche dem Ausbruche der Pest vorherzugehen und sie zu begleiten pflegen, haben in Verbindung mit dem Reichthum der Thatsachen Diemerbroeck's Schrift bei Mit- und Nachwelt einen so grossen Ruhm verschafft. Die Wahl des Beispiels, womit er die Vergiftung der Luft ohne wahrnehmbare Veränderung derselben zu bezeugen sucht, das des Weins, welcher durch längere Berührung mit dem Spiesglanz Brechen-erregende Eigenschaften erhält, ohne sich sonst wahrnehmbar verändert zu haben, zeugt von grosser Gewandtheit, und konnte allerdings wohl Kurzsichtiger leicht bestochen<sup>1)</sup>. Naturgemäss trennt Diemerbroeck den der Pest zu Grunde liegenden Krankheitsprocess von dem Fieber, welches er theils für symptomatisch theils für reactiv hält, und als dessen Folge er theils die symptomatischen theils die kritischen Erscheinungen der Pest betrachtet<sup>2)</sup>. Bei der den Ansichten der damaligen Zeit gemässen Erklärung der einzelnen Symptome der Pest ist übrigens die Rücksicht erfreulich, welche Diemerbroeck auf die damals kaum bekannt gewordene Lehre des grossen Harvey vom Kreisläufe nimmt.

Unter den 40 prognostischen Sätzen Diemerbroeck's enthalten einige Beobachtungen, welche von andern Schriftstellern weniger hervorgehoben werden, z. B. die grosse Gefahr des Kranken bei einem ohne alle wahrnehmbare Veränderung auftretenden Schmerz im Schlauche<sup>3)</sup>. Ebenso waren die pneumonischen („pleuritischen“) Zufälle, welche die Pest sehr häufig begleiteten, stets tödtlich. — Schnelles Vertrocknen der Fontanelle, welche Viele als Prophylacticum und zwar mit dem be-

1) Diemerbroeck, *de c. de peste*, p. 44.

2) *Id.* p. 57 seq.

3) *Id.* l. c. p. 68.



sten Erfolge trugen <sup>1)</sup>), war stets ein höchst ungünstiges Zeichen. — Fast Alle starben, bei denen die Bubonen, vorzüglich solche, die in den Achseln oder im Schenkel ausbrachen, können 12 bis 20 Stunden sehr anschwellen und weich wurden, während dagegen anfängliche Härte der Bubonen weit günstiger war. — Zeitiger Ausbruch von Karbunkeln an muskulösen Theilen war ein günstiges, an den Händen, Füßen und im Rücken ein sehr ungünstiges Zeichen.

Die Prophylaxis Diemerbroeck's bietet Nichts Besonderes dar; übrigens verurtheilt er Aderlass und Purganzen, von denen namentlich der erstere sehr häufig von der Unwissenheit und Gewinnsucht der Chirurgen eingeführt wurde <sup>2)</sup>), gänzlich, ebenso die sehr gebräuchlichen Ansätze aus Arsenik und Quecksilber. Er selbst suchte sich durch starkes Tabakrauchen zu schützen <sup>3)</sup>.

Für die Behandlung verurtheilt Diemerbroeck den Aderlass völlig, selbst bei den während der Pest intercurrirenden Krankheiten, bei denen er sonst angezeigt ist, welche er aber nach dem Aderlass leicht in die Pest übergehen sah. Er verurtheilt selbst Blatigel und Schröpfköpfe <sup>4)</sup>. Ebenso Abführmittel und Brechmittel, erstere, weil sie den Krankheitsprocess von der Peripherie auf das Centrum versetzen <sup>5)</sup>, letztere, weil er von ihnen eine zu grosse Aufregung befürchtete. Wenigstens beobachtete er von letzteren stets eine Verschlimmerung des Zustandes, ohne indess ihre Heilsamkeit in anderen Epideniën

1) Hicetiusk, p. 164.

2) p. 209.

3) „*Fumus tabacianus herbarum bonum quantum communi*“ H. p. 123. Der Tabak wurde in jener Zeit seines ersten Bekanntwerdens schon als ein heilsames Mittel als Tabak überliefert. Vergl. Hicetiusk, p. 198. Diemerbroeck wollte wenigstens eine relative Immunität der Tabakraucher vor der Pest bemerkt haben. Der karbolische Geruch eines Tabakchutzes war bei Salbaten u. s. w. nicht ungenüßlich; bildete aber was sehr selten die vollständige Heilung. Vergl. p. 234. Uebigens zog sich Diemerbroeck später (1645) beim Besuche eines Priesteren einen hebräen Catholik auf der Hand zu, der durch ähnliche Mittel glücklich geholt wurde.

4) H. p. 320.

5) „*Fructus a peripheria ad centrum transit*“ p. 124.

[1632.]

zu leugnen. Selbst durch die anhaltendste Verstopfung liess sich Diemerbroeck nicht zum Gebrauch der Abführmittel bewegen. Deste mehr vertraute er den Alexipharmacis, vorzüglich den Schweisstreibenden, an denen bekanntlich die Pharmacopöen jener Zeit unendlich reich waren, und unter denen der Theriak noch immer, der Erinnerungen Forest's ungeachtet, die Hauptrolle spielte <sup>1)</sup>. Diemerbroeck hatte des Theriaks wegen einen lebhaften Briefwechsel mit Guido Patinus zu Paris, welcher dieses Arzneymittel sehr heftig angriff. Ein Theil dieser nicht uninteressanten Correspondenz ist bei Diemerbroeck abgedruckt <sup>2)</sup>. Indessen redet der Letztere dem übermäßigen schweisstreibenden Verhalten durchaus nicht das Wort, sondern er versetzt selbst die Diaphoretica mit gelinden Pflanzensäuren. —

Gegen die einzelnen Zufälle der Pest wandte er die bekannten symptomatischen Heilmethoden an. Die grosse Gefahr aller Blutungen suchte er durch Adstringentien zu heben, welche indess oft keinen Erfolg hatten; gegen Blutspucken indess wurde gar Nichts unternommen, da es jedesmal, einen einzigen Fall ausgenommen, in der kürzesten Zeit tödlich wurde. Diemerbroeck hielt Carbunkel in der Lunge für die Ursache dieses Zufalls, ohne indess anzugeben, ob er sich von ihrer Existenz durch Sectionen, welche er wohl schwerlich anstellte, überzeugt habe. Bei einem unter heftigem Erbrechen gestorbenen Kranken erklärte ein Chirurg nach seinen Erfahrungen eine carbunkulöse Affection des Magens für die Ursache jenes Zufalls, und erbot sich, Diemerbroeck durch die Section davon zu überzeugen, zu deren Anstellung dieser indess keine Lust hatte <sup>3)</sup>. Eben so gefährlich war Blutharnen; ein sehr häufiger

1) S. oben S. 35.

2) p. 424 seq. Baselhof findet sich nach einer ansehnlichen Menge von Recepten zur Bereitung dieses umständlichen Mittels, von denen eine 127 Ingedienzien enthält!

3) „Perum vobis non placuit, irritare vulnera, et aperte ulcera exserte, rursusq. pericula nos exasperare. Quod credidit quodam saltem malum.“

Zufall, dem das Volk die „Blutpest“ nannte<sup>1)</sup>, und tödtige Stühle<sup>2)</sup>. — Die Bubonen suchte er durch Vesicatorie, welche unterhalb derselben so gelegt wurden, dass sie die sich bildende Hürte berührten, zum Ausbruch, und durch warme reizende Cataplasmen, (auf welche er sich bei den Bubonen am Halse und an den Schläfen beschränkte), zur Eiterung zu bringen. Dem Eiter wurde durch die Lanzette ein Ausweg verschafft, und alsdann mit Digestivsalben verbunden. Aetzmittel und Glühreisen wandte Diemerbroeck eben so wenig als zerstörende Mittel an, obschon sich die Bubonen nicht selten ohne Nachtheil unter allgemeinen Krisen von selbst zertheilten<sup>3)</sup>. Bei den Carbunkeln kam Alles darauf an, sie durch Mittel, welche in ihrem Umkreise Eiterung erregten, loszustossen. Dazu eigneten sich aber die gelindesten Mittel am Besten<sup>4)</sup>. Sehr gefährlich waren unter andern Carbunkeln an den Fingern und Zehen<sup>5)</sup>, schlagend das alte Dogma von der um so grössern Gefahr der Carbunkel, je näher sie dem Herzen seyen, widerlegend. Ohne Rettung aber waren solche Kranke verloren, bei denen in den Emunctorien statt der Bubonen Carbunkel erschienen<sup>6)</sup>. — In einem Falle beobachtete Diemerbroeck einen tödtlichen Anthrax in einer nicht penetrierenden Stichwunde bei einem Soldaten<sup>7)</sup>, in einem andern eine pestartige Verderbniss einer durch eine zersprungene Muskete verursachten Wunde der Hand, die unter allgemeinen Pestzufällen tödtlich wurde<sup>8)</sup>.

Diemerbroeck's Angaben werden von Barbotte, der gleichfalls diese Pest als Augenzeuge beobachtete, bestätigt. Indess finden sich bei dem Letztgenannten nur kurze Notizen.

1) p. 213, 264.

2) p. 223.

3) Id. p. 176 seq.

4) Id. p. 184.

5) p. 242, 245.

6) p. 189.

7) p. 199, 221. Vergl. oben S. 85.

8) p. 246. — Vergl. auch Orziani IV. S. 19 ff.



## 1635. Pest zu Leyden. — Florentius.

Dasselbe ist in der Schrift Paauw's und in den von Florentius ihr hinzugefügten Anmerkungen über die Leydener Pest des Jahres 1635 der Fall. Florentius stellt diese Pest mit der des Jahres 1624 zusammen, und findet die letztere ungleich bösartiger. Im J. 1624 bewirkten Vesicatore, die in die Nähe der Bubonen gelegt wurden, Zurücktreten derselben, im J. 1635 heilsame Eiterung. Damals war der Eintritt der Menstruation bei Frauen absolut tödtlich, jetzt meist heilsam<sup>1)</sup>. Eine gleich verschiedene Prognose knüpfte sich in beiden Epidemien an den Ausbruch der Petechien. — Als das früheste und sicherste Zeichen der Pest nennt Florentius eine äusserst trockne und unheilvoll belegte Zunge. Im Uebrigen zeigt sich derselbe als einen tüchtigen und erfahrenen Arzt, und ohne seine Anmerkungen würde Paauw's Schrift völlig werthlos seyn.

### Ausserordentliche Verbreitung der Pest in den Jahren 1654 — 1657.

Die epidemischen Ereignisse in den letzten Jahren des dreissigjährigen Kriegs sind zum Theil schon von uns besprochen worden, zum Theil müssen wir dieselben deshalb unberührt lassen, weil uns genauere Nachrichten nicht zu Gebote stehen. In den Jahren 1647 — 1650 litt vorzüglich Spanien an der Pest<sup>2)</sup>; dem mittleren Europa waren dieselben Verheerungen auf die Jahre 1654 — 1657 aufgespart, und nach nur zu kurzer Zeit trug die von Neuem in das Herz Deutschlands geschleuderte Kriegsfackel dazu bei, die vollen Flammen des kaum überstandenen Unheils wieder aufzuleben zu lassen. Von Moskau, Neapel, London und Lappland sind Nachrichten

1) Paauw, p. 47.

2) Schmorler, II. 186 ff.

vorhanden, die alle in der Klage über das gleiche Elend zusammenstießen.

Schon im J. 1654 wird der Verheerungen gedacht, welche das nur zu wohl bekannte Uebel in der Türkei, in Ungarn, Moskau und Dänemark anrichtete.

**1654. Pest zu Copenhagen. Bartholinus. — Kriegstypus an der Ostsee.**

Die Copenhagener Pest des Jahres 1654 fand zwar ihre nächste Ursache in der Verschleppung des Contagiums, aber dieses stieß doch auch diesmal wieder auf eine dem Pestcharakter ziemlich verwandte Krankheitsconstitution, die theils in dieser Beziehung, theils an sich selbst einer näheren Betrachtung nicht unwerth ist.

Zunächst muss bemerkt werden, dass das J. 1652 das der ersten Bekanntwerdung des Friesels ist, welchem wir unten eine nähere Betrachtung widmen werden. Zu Copenhagen aber herrschte in dem außerordentlich heißen und trocknen Sommer dieses Jahres ein sehr verheerendes und blutiges Tertianfieber<sup>1)</sup>. Die Zufälle desselben waren sehr verschieden, am häufigsten heftiger Schmerz des Kopfes, vorzüglich des Hinterkopfes, der Leuten und des Rückens, brennende Hitze, gelbes Erbrechen, Durst, Unruhe, zuweilen Delirien und Pöechien, welche mit der Intermission verschwanden und im Paroxysmus zurückkehrten. Bei den Meisten entschied sich die Krankheit nach dem vierten Anfalle durch Schweiß, bei andern durch Abscess und Entzündungen am Halse, durch Bubonen, oder Fußgeschwülste und Hydrops, bei sehr Vielen durch Diarrhoe und Ruhr, bei Manchen durch Decubitus, ohne sonstige Krisis. Viele litten noch lange nach überstandener Krankheit an habituellem Erbrechen; Viele, namentlich Solche bei denen Pöechien ausbrachen, starben, die Reconvalescentia

1) Th. Bartholinus; *Historiae continuatae retractatae*. Hafn. 1658. 12. *vol. II. lib. 56.*

(1554.)

aber zog sich durch mehrere Monate hin. Bartholin selbst wurde mit seiner ganzen Familie befallen, und rühmt vorzüglich den Gebrauch der Schwitzmittel und Alexipharmaca, wosent-  
lich das Unicorni Grosslandicum (phosphorsaurer Kalk,  
welcher bekanntlich früher in vielen Formen als Antifebril im  
Gebrauch war.)

Der genannte Beobachter sagt nicht, ob diese Intermittens  
in die Petechialfieber überging, welche im Winter 16½ der  
Babonespest vorhergingen; indess ist dies sehr wahrscheinlich.  
Die Pest dieses Jahres gelangte durch holländische Schiffe  
welche zu Danzig Getraide, Hanf und Lein geladen und sich  
vor englischen Kreuzern nach Copenhagen geflüchtet hatten, in  
diese Stadt. Die ersten Fälle betrafen Individuen, die mit der  
Mannschaft der Schiffe oder ihrem Gerath in Berührung gekom-  
men waren. Es starben an dieser Pest über 1000 Personen <sup>1)</sup>.  
Uebrigens bieten die sehr kurzen Nachrichten des Bartholinus  
kein besonderes Interesse dar.

Zu diesen Verheerungen gesellte sich ein nicht viel ge-  
minderes Uebel, der Kriegstypbus, welcher in dem schwedi-  
schen Heere unter Carl Gustav schon in Polen geherrscht  
hatte, nun aber bei dem Zuge desselben nach Thorn sich in  
dieser Stadt sowohl als in der Umgegend mit furchtbarer Wuth  
verbreitete <sup>2)</sup>.

In Copenhagen folgte der Pest eine äusserst hässliche  
Blatternepidemie, die sowohl Kinder als Erwachsene, vorzüg-  
lich heftig auch die Wüchseranten ergriß. Später verlor die-  
selbe zwar an Bösartigkeit, nicht aber an Extensität <sup>3)</sup>.  
Aus einigen von Barbotte mitgetheilten Krankheitsgeschichten  
geht auch die Anwesenheit der Pest in Leyden für das J. 1655  
hervor <sup>4)</sup>.

1) Bartholinus, *l. c. Cent. III. lib. 58.*

2) Scheffelin Rybow, *N. C. Dec. I. ann. 2. obs. 111 et 145.*

3) Thom. Bartholinus; *riba med. Hefn. p. 229.*

4) Barlotte, *Acetat. de prat.*



1656. Pest in Italien. — Neapel: Castro. — Rom:  
P. Zacchias.

Nähere Nachrichten lassen uns die Pest in Neapel erblicken, woha sie von Sardinien durch ein verpestetes Schiff gebracht worden war, und woselbst schlechte Schutzanstalten noch zu der Feier des grossen Kirchenfestes künften, welches schon früher einmal (im J. 1576) die Verhreitung der Seuche so kräftig gefördert hatte <sup>1)</sup>. Ganz Italien wurde verhöret und nur wenige Städte verweachten Etwas durch gute Polizeimeasuren auszurichten. Unter ihnen Rom, wo man zwar zu Anfang die unseligen Streitigkeiten, ob das Uebel die Pest sey oder nicht, sich erneuern sah, wo aber später höchstwahrscheinlich Zacchias Ansehen viel Segen stiftete, indem sich in seinem berühmten Werke gute Vorschläge zur Abhaltung und Beseitigung der Seuche finden <sup>2)</sup>. Die Königin Christine von Schweden verliess wegen der Seuche Rom und Italien, und ging nach Frankreich. An sie schloss sich Tudecius (später Professor in Prag) an. Letzterer aber wurde vom Petechialtyphus ergriffen, und musste deshalb im Hafen von Marseille Quarantain halten. Dort behandelte man die Krankheit mit fast stets tödtlichem Auszuge mit Aderlässen; Tudecius genas unter reichlichem von Cornix-Wein erregten Schweissen <sup>3)</sup>. Toscana soll sich völlig unbehindert erhalten haben: ein erfreulicher Fortschritt, denlich auch durch das gänzliche Schweigen aller Streitigkeiten über die Entstehung und Verhreitung der Pest sich kund gebend.

**Genoa.** — Sehr bedeutend wurde Genua ergriffen, wo man alle Vorsichtsmeasuren verabsäumte. Es sollen 60,000 Menschen durch die Pest umgekommen seyn. Hier beobachtete man sehr günstige prophylaktische Erfolge von Fontanel-

<sup>1)</sup> Castelli's Schrift stand uns nicht zu Gebote. Vergl. doch die Orzani (IV, 22) Schwarz (H. 122) und Haller (II, 14).

<sup>2)</sup> Zacchias, *Parl. Querc. medicopol. lib. III, tit. 4, parat. 4.*

<sup>3)</sup> Tudecius, *monit. epidem. Novib. 1656, p. 51.*

[1856.]

len und Vesicatorum, die aber nicht aus Canthariden, sondern aus Flammula Jovis bereitet seyn müssen<sup>2)</sup>.

**Rieto. — Colantonio.** — Den Verlauf der Pestepidemie in dem hoch- und sehr gesundgelegenen Städtchen Riето beschrieb Giuseppe Colantonio<sup>2)</sup>. Die Einwohner, wahrscheinlich auf den alten Ruhm ihrer Stadt trotzend, verheimlichten das Uebel, und sträubten sich gegen die zweckmässigsten Massregeln der Behörden, welche unter Anderem 3 Hospitäler, für die Erkrankten, Verdächtigten und Genesenen, einrichteten.

**Rom. — Guastaldi.** — Von ganz besonderer Wichtigkeit aber wurden die Beobachtungen, welche der Cardinal Hieronymus Guastaldi, päpstlicher Legat zu Bologna, über die Epidemie desselben Jahres veröffentlichte. Sein Werk<sup>3)</sup>, in welchem die Contagionstheorie zur höchsten Evidenz gebracht ist, steht als eins der wichtigsten für die Pestpolizei für alle Zeiten da, und ist bis jetzt nur von Muratori's *Governo della peste*, welches wesentlich auf Guastaldi's Forschungen beruht, übertroffen worden<sup>4)</sup>. Wir müssen uns aber auf diese Bemerkungen so sehr beschränken, als Lärinzer beide Werke ausführlich gewürdigt hat<sup>5)</sup>.

Wir fügen nachstehend die Schriften an, welche die eben besprochene Pest in Italien hervorrief:

† *Compendio breve del contagio della città di Napoli.* Napoli 1656.

1) Rectoris, *Observationes naturae*. Bologna, 1654. 12, p. 54.

2) Die oben mitgetheilten Angaben enthalten wir Haller's *hist. med. pr.* III, 78.

3) S. unten die Literatur über diese Pest.

4) Das neueste Werk über Pestpolizei — Fraxi, L. A., *Della peste e delle publiche amministrazioni sanitarie*. Ferrara, 1848. — ist von uns noch nicht in Gesicht gekommen.

5) Lärinzer, die Pest des Stiehl. S. 99.

- † Morisiano, Carlo, *Torchio delle asserazioni della peste di Napoli nell'anno 1656*. Napoli. 1659. 4.
- † *Collection of valuable and scarce pieces, relating to the plague of 1655 and account of the plague at Naples in 1656*. Lond. 1721. 8.
- † Guerra, Nic., *Racconto della peste di Napoli dell'anno 1656*. Napoli, 1668.
- † Colantonio, Giuseppe, *Ragguglio della peste scoperta nella città di Biele a. 1656*. Rom. 1658. 4.
- † Gastaldi, Hieronymus (Cardinalis), *Tractatus de aver-tenda et profliganda peste politico-legalis lucubratus, cum Laisocausisrrem primo, mox revisitis commissarius generalis fuit, peste urbem interducente, anni 1656 et 1657, ac superius Goriziam depopulante*. Roan. 1684. Fol.
- † Lorenzini, G. Andr., *Breve compendio del contagio di Roma del anno 1656*.
- † Juvellina, P. F. Bernardinus, Christianus, *Institutiones medicæ, et regulæ, consultationes et observationes. Acc. Curatissimum quinquæ centuriarum; Tr. de tot et multis reatris. De febre pestilentiali cum brevi Romani contagii narratione*. Venet. 1676. 4.
- † Bindi, J. B., *Laisographia s. Historia pestis contagionis, quæ a. 1656 in ecclesiasticam ditionem fuit illata libri V*. Roan. 1658. 4.
- † Balestra, Giuseppe, *Gli accidenti del mal contagioso osservati nel Lazaretto all'Isola e la specialità de medicamenti sperimentati*. Rom. 1657. 4.
- † Alexius, Alexius, *Preserazione e historia della peste di Kate*. Padova 1660. 4.

1657. Pest in Deutschland. Braunschweig. — Gieseler.

Gleichzeitig und noch später war die Pest auch in Deutschland verbreitet, vielleicht auf dem gewöhnlichen Wege von



[1657.]

Polen aus. Die Angaben Gieseler's über ihren Verlauf zu Braunschweig sind in einer grossen Anzahl von einzelnen Krankengeschichten zerstreut, aus denen sich ergibt, dass der erste glücklich verlaufende und noch wenig charakterisirte Pestfall am 3ten Febr. 1657 in die Behandlung des Genannten kam. (Indess beweist Sander aus den Braunschweiger Kirchenbüchern, dass schon am 25sten Januar der Schäfer Hans Engenhoff an der Pest starb <sup>1)</sup>.) Er betraf eine Frau, welche sich vorher mit dem ihr zugefallenen Erbe einer an einer unbekannten Krankheit gänzlich ausgestorbenen Familie beschäftigte, die gewisse Utensilien aus Bremen, wo die Pest ebenso, wie in Colberg, Hannover und an andern Orten herrschte, erhalten hatte. Am 8ten Febr. erkrankte die 10jährige Tochter dieser Frau unter verdächtigen Erscheinungen, zu denen sich Petechien, aber keine Blasen und Karbunkeln gesellten. Auch sie wurde wieder hergestellt. Seitdem vervielfältigten sich die Erkrankungen, hinreichend charakterisirt, so, dass zuletzt an der lange verkannten und durch Nichts in ihrer weiteren Verbreitung aufgehaltenen Pest nicht mehr gezweifelt werden konnte, obschon das Uebel nur langsame Fortschritte machte. Aus Gieseler's Beobachtungen geht hervor, dass das Uebel im September seine Höhe erreichte, und im December allmählig wieder aufhörte. Im Uebrigen bieten dieselben Nichts Besonderes dar <sup>2)</sup>. Der strengen Sperre der Stadt aber, durch welche durchaus kein Mangel an Lebensmitteln, die im Gegentheil sehr wohlfeil waren, herbeigeführt wurde, verdankte man die fortdauernde Gesundheit der Umgegend. — Nach den Kir-

1) Braunschweigisches Magazin, 1827. Des 8ten St. Die genannte Zeitschrift enthält, im 1sten — 8ten Stück des genannten Jahres eine gedruckte „chronologische Beschreibung der geographischen Verbreitung der Pest,“ mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweigischen Lande, und listet viele höchst interessante Notizen aus dem Theil sehr selten und aussergewöhnlichen Quellen dar, die wir hier aus dem Dunkel hervorzielen lassen.

2) Vergl. Haller's Auszug aus Gieseler's Schrift: *Hist. med. pr.* III. p. 138. — Von Gieseler erschien zugleich eine deutsche Volksschrift über die Pest.

chenbüchern starben an dieser Pest in Braunschweig 5420 Menschen; die Sterblichkeit des männlichen verhielt sich zu der des weiblichen Geschlechts wie 100 zu 123. Die Zahl der nach der Pest geschlossenen Ehen verhielt sich zur Normalzahl, wie 2, 7 : 1. — Später ist Braunschweig nie wieder von der Pest befallen worden.

## Die Volkskrankheiten der Jahre 1657 — 1675 in England. — Willis, Morton, Sydenham.

### 1657 — 1665. Wechselleber.

Die epidemischen Krankheitserscheinungen beinahe der ganzen zweiten Hälfte des 17ten Jahrhunderts fanden wohl nirgends aufmerksamere und geistvollere Beobachter als in England. Willis, Morton und Sydenham, Jeder hat uns Nachrichten über seine Beobachtungen der Volkskrankheiten hinterlassen, von denen die Morton's zwar den grössten Zeitraum umfassen, ohne indess dadurch den Mangel des tiefen Geistes zu ersetzen, in dessen Achtung Sydenham's Name nie ohne die dankbarste und ehrfurchtsvollste Erinnerung an einen der grössten Aerzte aller Zeiten genannt wird. So reich der hier sich darbietende, aber auch nie ganz auszubeutende Stoff ist, so sehr macht Jahn's „Sydenham“ <sup>1)</sup> jede ausführlichere Darstellung überflüssig.

Die Betrachtung dieser Krankheiten erhält aber ein ganz besonderes Interesse durch die Schärfe, mit der in ihnen das Verhältniss des intermittirenden zum typhösen Krankheitsprocesse hervortritt, welches für die richtige Auffassung vieler Volkskrankheiten nicht allein, sondern selbst für die nosologische Systematik von der grössten Wichtigkeit ist.

<sup>1)</sup> Sydenham, Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Medicin, Von F. Jahn. Fries, 1848. 8. — N. verz. S. 55 ff. 118 ff. 208 ff.

## Willis.

Willis 1) eröffnet die Reihe mit Bemerkungen über das epidemische Fieber des heissen Sommers 1657, dessen Sommer sich durch eine ausserordentliche Hitze auszeichnete. Er schildert dasselbe als ein unregelmässiges, nicht den Tertiantypus mit sehr unvollkommenen Intermissionen haltendes Wechselfieber, mit Erbrechen, Durchfällen, Schmeissen, deren Unterdrückung vorzüglich typhöse Symptome, Lethargus, Convulsionen u. s. w. folgten. Häufig ging der intermittirende sehr bald in den anhaltenden Typus über. Die Epidemie war überall, vorzüglich aber auf dem Lande verbreitet, „ganz England glich einem grossen Krankenbette,“ (Morton) war aber durchaus nicht tödtlich, indem von 1000 Kranken kaum einer starb. Zumeilen kamen noch dysenterische Erscheinungen vor. Dagegen nahmen diese Fieber in den folgenden Jahren allerdings einen sehr ernsthaften Charakter an. (Morton, Sydenham).

Uebrigens stimmen die von Willis vorgetragenen therapeutischen Grundsätze fast ganz mit denen Sydenham's überein, von denen unten die Rede seyn wird.

Der grossen Sommerhitze dieses Jahres folgte eine entsprechende Winterkälte; Niemand konnte sich eines in ähnlicher Schärfe hervortretenden Contrastes erinnern. Selbst bis zum Anfang des Juni schienen sich Winter und Frühling die Herrschaft streitig zu machen 2). Der Gesundheitszustand des Winters war indess, die häufigen Nachwehen der Herbstquartanen abgerechnet, sehr gut, und erst im Frühling fingen die Tertianfieber sich wieder zu verbreiten an, denen bald die Influenza dieses Jahres folgte, von welcher uns eben nur Willis und Timaeus 3) Nachrichten hinterlassen haben, und welche in England kaum 14 Tage (Anfang Mai) dauerte. Nach den Hundstagen aber verbreitete sich wieder, zuerst und vorzüglich

1) WILLIS, *opere omnia*. De febribus, cap. XVI.

2) „Ja Rom leb im Februar 1658 eine grössere Menge Schone, als mit Jahr vorher.“ Aehnlich in Deutschland. (S. KORTZ.)

3) RALPH TIMAEUS VAN GULDESCHEE, *Epidemice et contagio*. Lips. 1665. 1. p. 33. Vergl. GIEGE. De febribus, S. 64.



auf dem Lande und in den kleineren Städten, ein anhaltendes Fieber, welches, fast ganz dem des vorigen Jahres entsprechend, Anfangs mit unregelmäßigem intermittirendem Typus auftrat, und vorzüglich durch nervöse Zufälle, Kopfschmerz, Ohrensausen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Sopor und Delirien ausgezeichnet war. Bei Einigen brachen schon am ersten oder zweiten Tage der Krankheit Pestechnien aus, die aber bald wieder verschwanden, während das Fieber und die Hinaffectionen beträchtlich zunahmen, bis sich zuletzt die ominösesten Erscheinungen des Typhus ausgebildeten. Kräftigere und jüngere Personen gemessen häufig, Greisen war die Krankheit fast stets tödtlich. Das Fieber hatte, wie gesagt, in der Regel einen unregelmäßigen Tertius- oder Quartantypus, mit sehr unvollständigen Remissionen. — Therapeutisch erproben sich außer Aderlässen, unter den bekannten sehr eingeschränkten Bedingungen der Periode der Krankheit und der Individualität der Kranken, vorzüglich Brechmittel und gelinde Abführmittel, namentlich nach Vesicatorie, ausserdem kühlende Salze (*Cremor Tartari, Nitrum, Potas. Riccati febrifuga*)<sup>1)</sup>, Pflanzensäften u. s. w. Gegen Sopor, Krämpfe, dumpfe Delirien u. s. w. zeigten sich hauptsächlich Vesicatorie und die Präparate des Blistigen Längemalzes hilfreich, während Opiate in der Regel tiefen Lethargus zur Folge hatten<sup>2)</sup>.

Bei der Uebersicht dieser zwei Jahre ergibt sich übrigens ganz deutlich eine Steigerung der Intensität der beschriebenen Wechselfieber, die in den folgenden Jahren noch weit bedeutender hervortritt, und einigermassen Morton's Irrthum ent-

1) Die *Potas. Riccati febrifuga* besteht aus *Ap. Carbei, Gl. Sulphur.* und *Sal. Abynth.* oder *Roe. Cremor. Tart. Sal. Abynth. Soss. Urlic.* *an.* *scrup. 1.* *Dos.* *in doses. Radix. Accur.*

2) Eisenmann bezieht in seiner neuesten Schrift die Krankheit auf den Typhus, S. 385, die von Willis geschilderten Epidemien als „Kephalytypus“ ein Ausdruck, den man nach dem Satze der *Armeniae septentrionalis* lauten kann, ohne vergessen zu dürfen, dass der Name die strengste Trennung der Systematiker findet.

[1841.]

schuldig, welcher die Pest des Jahres 1665 als die Akme dieser Krankheitsconstitution zu betrachten geneigt ist.

### Witterungsverhältnisse von 1661 — 1664. Erkrankungen der Thierwelt.

Ehe wir über zu dem übergehen, was uns Sydenham's unerlöschlicher Griffel über die von ihm in den Jahren 1661 — 1675 beobachteten Volkskrankheiten Englands überlassen hat, mag ein kurzer Hinblick auf die gleichzeitigen Erscheinungen im Leben der Atmosphäre und ihre nächsten Begleiter nicht unterlassen werden. Nicht als ob uns ein solcher auf dem eigentlichen Zusammenhang jener Störungen mit diesen Erkrankungen führte, welchen wir wohl zu ahnen, nicht aber zu begreifen vermögen, sondern um dem zu entwerfenden Bilde keinen der Züge zu entziehen, durch welche es einigermaßen vollständig erscheinen könnte.

Der Witterungsverhältnisse der Jahre 1664 bis 1660 haben wir bereits gedacht.

Das J. 1661 zeichnete sich durch eine in Deutschland sowohl als Nordamerika bemerkte ausserordentliche Trockenheit, der ein milder Winter und regnerischer Frühling vorausgegangen war, der Sommer des Jahres 1663 durch eine sehr grosse Nässe aus. Im ersteren Jahre aber herrschte nicht nur auf der Nordküste von Afrika, sondern auch in Griechenland und den Dar-ämonen die Pest, während sich gleichzeitig mit den intermittirenden Fiebern und andern Krankheiten dieser Jahre (— in Tübingen war 1660 die Ruhr verbreitet —) <sup>1)</sup> Erkrankungen der Thiere überall beobachten liessen. Im Erzgebirge bißete man eine unter den Schafen, dem Rindvieh und dem Wild verbreitete Seuche von der Verderbniss der Weideplätze durch Spinnen und Würmer ab; in England litt im J. 1663 das Hornvieh sehr an der Egelkrankheit <sup>2)</sup>, ebenso im Coburgischen

1) Hakenreiter, Sam., Diss. de dysenteria maligna epidemica, Tub. 1668, 4.

2) Schwaner.

die Schafe und Hirsche<sup>1)</sup>, und auch unter den Pferden war im J. 1662 eine nicht näher beschriebene Seuche allgemein verbreitet<sup>2)</sup>. Dieselbe Allgemeinheit der Viehseuchen im Verein mit Missernachs und nasser Witterung wird für Nordamerika angegeben; ferner fehlte es nicht an Erdbeben, Meteoriten u. s. w. und als das gewichtigste von allen diesen Zeichen kann vielleicht das kleinste gelten, — es fällt in das J. 1664 das Minimum der seit 1580 schon in stetigem Abnehmen begriffenen östlichen Declination der Magnetnadel.

### Sydenham.

Wenn irgend jemals ein Arzt mit einem in die innerste Tiefe der Natur eindringenden Blicke das gegenseitige Verhältniss der epidemischen Krankheitserscheinungen auffasste, so war es Sydenham<sup>3)</sup>. Mit einer Einfachheit, die nur der Wahrheit eigen ist, schildert er die von ihm in den Jahren 1661 bis 1664 beobachtete Aufeinanderfolge der epidemischen Ereignisse, mit sicherem Blicke den Anfang zugleich und das Ende der Kette erfassend. Indem er beobachtete, wie sich aus den zahlreichen dreitägigen und den seltneren viertägigen Fiebern des Frühlings und Herbstes der genannten Jahre im Winter anhaltende Fieber entwickelten, so erkannte er auch, dass eine Veränderung nur in dem Typus, nicht in dem Wesen dieser Glieder der grossen Reihe eingetreten war. Mit Meisterhand entwirft er in einfachen Zügen das lebendige Bild der Erscheinungen, und stille Bewunderung erfüllt uns, wenn wir einen solchen Geist überall von der tiefsten Verehrung der Naturheilskraft erfüllt sehen. Ohne den alten Dogmen von der Präexistenz

1) *Hist. nat. cur. Dec. J. d. 6. p. 2. oct. 166.*

2) Böttcher.

3) Der Fehler Sprengel's, an die Erscheinungen der Geschichte des Mannes seiner Zeit, ja seines eignen Individualität zu legen, hebt auch in seiner Darstellung Sydenham's wieder, die nicht immer das lebendige historische Treiben verliert. Nichts darf die von uns wiedergegebenen Züge aus dem Bilde dieses Geistes der Natur eben so wohl kommen, als jener Geist selbst der Natur sich anzuordnen wusste.



[1881.]

verderbter Säfte, durch deren krankhaften Reiz das Fieber erzeugt werde, zu heiligen, verkannte er doch durchaus nicht die qualitativen Veränderungen, welche das Wesen jener Krankheiten bildeten, ebenso wenig als er die rein reactive, obgleich häufig der Regulirung bedürftige Eigenthümlichkeit der Fiebertbewegungen über sah<sup>1)</sup>. Ansichten, denen wir bei den besten Aerzten aller Zeiten wieder begegnen, weil sie auf dem festen Grunde der einfachen Naturbeobachtung ruhen, und die noch stets die Namen ihrer Verfechter unsterblich gemacht haben.

Die Wechselstücher dieser Jahre waren wie gewöhnlich im Frühluge sehr leichte Tertänen, im Herbste schwerere Quartänen. Die nahe Verwandtschaft der letzteren mit den anhaltenden Fiebern würde sich auch einem flacheren Geiste leicht durch die anfängliche Remittenz des Fiebers, das erst später zur Intermission sich umbildete, aufgedrungen haben. Sydenham konnte zwischen beiden nur einen Formunterschied finden, insofern bei jenen die Kochung und Krise in einem stetigen, bei diesen in einem unterbrochenen Zuge erfolge<sup>2)</sup>. Er suchte

1) Sydenham, *op. cit.*, Genes. 1723, 4, p. 79 seq. — Von vielen nur das Verdichtete, 8, 25. „Necesse ita utrum regis, indicantur veris de grandibus, quae in hoc morbo contingunt, et certum, ut tempus exspectatio intra modum inferius propolis sanguinem sistat; et sinistra celsione, ut per hoc plus neque gloriis, unde periculosus symptomata insuper valent, nec illius status verpent, qui peris vel interitus manifestum praevalens impediretur, vel sanguis in unum iterum effectibus beneficariatur eumque. Adhuc ut sic materies detragatur (erit), nec erant res aures mollesci fides utra debuerit, indicatio atrobique eodem relata. Hinc prout fundamentis Theropie methodus iudicio.“

2) p. 33. „Alia peris fundamentis utrum non est, et illa utra obiam mollesci methodum imperitiam, quoniam quae te felices constant ad dispositionem delictum apud sic perfectum edibitum videtur: cum utrumque illud a potestate nulla divergitur de iugentur, et utrumque apertis, qui natura rationem materiam e quibus talis, utitur per effectum utrumque in periodo comprehensum. Erit quid utrumque apertis atque utrumque peripetiam utitur, illud ut utrumque, et ut utrumque plurius differre non diffinit. Itaque vel methodum, quae in natura utitur ab hoc modo talis, tanto talibusque utitur talibus iudicio iugentur, qui frons utrumque utitur utitur, atque ita ad utrumque utitur peripetiam vel ut utrumque utitur utitur peripetiam, danda est utitur, ut utitur utitur ut utitur utitur utitur utitur. Ab utrumque utitur“



[1861.]

Es ist hier nicht der Ort, der specifischen und entgiftenden Heilmethode, die durch vorschnelle und hypothetische Ausführungen bei Vielen in einen Miscredit gekommen ist, den sie an sich nicht verdient, eine Lobrede zu halten, aber so gewiss Sydenham selbst noch den Triumph der China über das Weichseifieber und den Dogmatismus der Galenisten erlebte, so gewiss wird die Zeit kommen, wo ähnliche, schon jetzt vorbereitete Entdeckungen dem längst wankenden Gebäude der Fieberlehre den Todesstoß geben werden. —

Sollte es uns fallen, in einer historischen Schrift auf dergleichen Anfechtungen zu stoßen, welche Manchem, der sich in behaglicher Selbstgenügsamkeit in dem altererhiten Kreise verführter Schulansichten bewegt, müßig und nutzlos erscheinen, nun so möge Ramazzini's Ausspruch unsern Gedanken die vernünftigste historische Bedeutung geben: „*Profecto postquam hujus remedi usus innatus, et praeminis justis purgationibus, non semel tentum, ut olim, sed plures ad dies exhibere coepit, donec febrile mirum fuerit penitus exanthetum, talem circa febrium doctrinam ac illam curandi methodum factam fuisse fieri oportet, qualem in re militari post inventum pulverem pyriem vixit narrant. — In hujus divini remedi laudes non effundat, cum se ipsum aetia commendat. Hariolari tamen licet ex admiranda hujus corticis virtute, febris naturam medullitas aliquando errata iri. — Quod si usquam favore nimium et commiseratione qua solet in res humanas aliud majoris energiae febrifugum reperire daretur, quod eodem occurrat, quae pervicaci cortex periodice inquit, reliquis febres, quae synochae et continuae vocant, vixitoli facultate pelleret, jam illius, quod Hippocrates in votis habuit, essentis campotes, nimirum quod invenire aliquid eorum, quae vixitem inventa sunt, et quod notum quam occultum esse praeitat, ut scientiae opus et votum 1).*“ Möge diese Abschweifung mit dem Wunsche entschuldigt werden, den Standpunkt anzudeuten, von wel-



chem allein Sydenham's Stellung richtig beurtheilt werden kann <sup>1)</sup>.

Mit der größten Sicherheit finden wir bei Sydenham nach diesen Ansichten, bei der Behandlung der anhaltenden Fieber (die der Wechselfieber dürfen wir füglich übergehen) die Indicationen des Aderlasses aufgestellt, der ihm nie durch sich selbst, stets nur durch die Veränderungen, welche dieses unendliche Mittel zu bewirken vermag, verwerflich oder unentbehrlich erscheint. Nur die deutlichsten Winke der Natur veranlassen ihn zur Verordnung der Brechnittel, die in der Regel der Entstehung der so gefährlichen Durchfälle Einhalt thun <sup>2)</sup>, welche, einmal entstanden, fruchtlos mit Adstringentien und dem ganzen Apparate der symptomatischen Heilmittel bekämpft werden <sup>3)</sup>. Der Nutzen jener Brechnittel <sup>4)</sup> war aber vorzüglich in der angenehmen Milderung des übrigen Krankheitsverlaufs ersichtlich, wobei Sydenham nach einer leicht zu entschuldigenden Einseitigkeit vorzüglich auf die Entfernung der *materia peccans* Rücksicht nimmt. Die Erfahrung hatte ihn die Vortheile derselben so sehr kennen gelehrt, dass er selbst in sehr vorgerückten Zeiträumen der Krankheit, wenn nur die Kräfte einigermaßen es erlaubten, zu dem Brechnittel griff, dem er ein leichtes Opium folgen zu lassen pflegte, um die nachfolgende Aufregung in etwas zu dämpfen. Nachdem nahm Sydenham, ganz im Einklange mit den Vorschriften der Natur und der besten Aerzte der neuesten Zeit, bei der ferneren Behandlung auf den normalen, den hypersthenischen oder asthenischen Zustand des Fiebers Rücksicht <sup>5)</sup>, und verordnete bei

1) Vergl. meine Bemerkungen über diesen Gegenstand in HALLER's Archiv f. d. ges. Med. 1846. Heft 3.

2) Wie wenig man Sydenham von der Wichtigkeit der wahren Ursache dieser Durchfälle entsetzt! „*Intestina*“, sagt er, „*sunt ubi humor ex hoc in intermacha finit perpetuo ventriculo inquit edo excrementis, et non possit non intergari diarrhoea*.“ (p. 35.)

3) Sydenham, p. 37.

4) „*Croc. metellor. dr. 8. Oly. succ. squillo. Symp. Scabell. an. mrr. ʒ. ʒ.*“ — Die Ipecacuanha fing erst 1586 bekannt zu werden an.

5) „*Novendi crumlece regata, illud morum alteret digestore rubra, utrum*



ner und, ausnahmelloste Fälle ausgenommen, leichter auftreten. Die Phrenitis bekämpft er mit dem antiphlogistischen Heilaparate, ohne deshalb zum Vauvyr zu werden, viel von den marcolischen Mitteln denen er gewöhnlich ein leichtes Laxans vorausschickte, nach der Krise der Krankheit, erwartend. Wenn Sydenham ferner bei den in Rede stehenden Fiebern häufig durch den ganzen Verlauf der Krankheit leichte Brustaffectionen, Husten, reichliche Schleimsecretion u. s. w. beobachtete, gegen welche er vorzüglich das *Oleum amygdolavum dulcium* anwandte, welcher aufmerksame Beobachter erkennt nicht auch in diesem Zuge ein häufig gesehenes Bild wieder?

Das sind die Hauptgrundsätze der Fiebertherapie eines Arztes, auf dessen Auctorität sich nicht selten die verblendeten Verfechter einer unbeschränkten Antiphlogose berufen zu können glückten, wahrscheinlich ohne den Schriften dieses mehr gelobten als gelehrten Mannes eine gehörige Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. —

Nichtdestoweniger bleibt es immer sehr auffallend, von Morton eine von der Sydenham'schen sehr abweichende, namentlich erlitzendere Behandlungsweise in ebendenselben Krankheiten empfohlen, und diese Empfehlung ebenfalls durch Thatsachen unterstützt zu sehen. Diese Differenz gleicht sich aber sogleich aus, wenn wir von Fothergill erfahren, dass ähnliche Differenzen auch später, namentlich bei den Epidemien des Garotillo zwischen den Aerzten vorkamen, welche, wie Sydenham, ihre Praxis vorzüglich in den freisten und offesten Theilen der Stadt beschäftigte, und zwischen denen, welche, wie Morton, in den engeren und viel ungesunderen Theilen der Stadt wirkten<sup>1)</sup>.

Mit einem Worte, die Natur selbst ließ ihren begünstigten Liebling den Griffel zur Entwerfung eines Genbildes, welches, sollten auch einzelne Züge im Laufe der Zeit verblühen,

1) Latham, G., Beschreibung der epidemischen Blasse nebst ihrer Behandlung. A. 4. Engl. Beth. u. Strö. 1782, S. 31. — Diese Uebers. aber wackelnde Schrift bezieht sich auf die Garotillo Epidemie des Jahres 1777.



[1661.]

andere vor dem geschärfsten Auge jüngerer Beobachter deutlicher hervorgetreten seyn, in seinen Grundlinien zu allen Zeiten unverändert erscheinen wird, und bei dessen ehrfurchtsvoller Betrachtung einige Augenblicke verweilt zu haben dem Verfasser um so eher nachgesehen werden mag, als ihm in diesem Augenblicke das ganze Bild Sydenham's täglich in der Natur vor Augen tritt.

### Morton.

Morton <sup>1)</sup> stellt an die Spitze der epidemischen Krankheitserscheinungen der Jahre 1658 bis 1661 die *febris continua*; wenn schon er bezeugt, dass sie in der Regel sich aus einem Wechselfieber entwickelt und vorzüglich deshalb sich hartnäckig gezeigt habe, weil der Gebrauch der China den Aerzten noch nicht geläufig gewesen sey. Seine sehr kurzen Angaben bestätigen im Ganzen die Schilderung Sydenham's; zur Beurtheilung aber der wahren Stellung, die er jenen gegenüber einnimmt, genügt die Bemerkung, dass er selbst die Pest des Jahres 1663 als eine Frucht dieser Fieberconstitution betrachtet, ohne die wahre Ursache desselben im geringsten zu berühren. Er ist zufolge seiner Annahme selbst geneigt, von dem Gebrauche der China in der Pest günstige Erfolge zu erwarten. — Nach Morton's Angabe starb an dieser Epidemie auch Oliver Cromwell, gleichzeitig mit Morton's Vater.

### Wechselfieber in Italien. — Borelli.

Offenbar indess beschränkte sich die ausgebildete Wechselfieberconstitution dieser Jahre nicht auf England allein; fast ganz überwindend beschreibt Alphons Borelli, der berühmte Stifter der mechanischen Medicin, die gastrischen Fieber des Jahres 1661 zu Pisa <sup>2)</sup>, welche Anfangs mit dem Tertianus auftraten, am 7ten Tage aber in den zehntägigen Typus

1) Morton, opera omnia. Graev. 1722. De putridissimi febris continuatae causa. p. 128 seq.

2) Malpighi, opera postuma, auctores. 1769, p. 21 seq.

übergingen, und mit dem 12ten Tage die Zeichen der Bösartigkeit entwickelten. Adelslässe waren unbedingt nachtheilig. Die Genesung erfolgte unter galligen Durchfällen, welche, wo sie fehlten, fast stets zum Heile des Kranken durch Abführmittel herbeigeführt wurden. Anderer Krisen erwähnt Borelli nicht. Dagegen schildert er ziemlich genau die Ergebnisse des Leichenbefundes. In den Lungen fand sich, eine gewisse Trockenheit derselben (*ariditas*) ausgenommen, welche für Folge des Fiebers erklärt wird, Nichts Abnormes, eben so wenig in der Leber und Milz. Dagegen strotzte die Gallenblase von Gallo, die sich auch in bedeutenden Mengen im Magen ergossen vorfand, und zuweilen auch die innere Fläche des Gedärms tingirte. — Bei dieser Gelegenheit erwähnt Borelli auch kurz einer andern Epidemie im J. 1648 und 1654, bei welcher die Lungen sich von „Gangrän und Tabes“ verzehrt zeigten. Damals waren Purganzen höchst nachtheilig <sup>1)</sup>.

Auch in Frankreich herrschte eine an die *Troense* gelaute erinnernde Krankheit, von welcher grade die Kräftigsten hinweggerafft wurden <sup>2)</sup>.

So erblicken wir während eines ganzen Decenniums die Wechselfieber an der Spitze der epidemischen Krankheitsverhältnisse, und wenn wir neben ihnen wiederholt typhösen Erkrankungen begegnen, so haben wir mit diesem Worte Nichts, als einen geheimnißvollen Namen für eine noch geheimnißvollere Sache.

Niemals war ein Wechsel der Krankheitsconstitution deutlicher, als der mit der Winterkälte des Jahres 1665 eintretende, in dessen Beginn wir zuerst Pneumonien, Brustfellentzündungen, Anginen begegnen. Niemals hatte sie Sydenham häufiger beobachtet, als in dieser dem Ausbruche der Pest vorher-

1) Borelli schilderte diese Epidemie, — höchstwahrscheinlich eine typhöse Paranasitis — in einer besondern Schrift: „*Trulla sapientie de febre maxime de Sydenhami*“ anno 1647. 1648. Coroneo 1649. 12.“ welche wir nicht kennen konnten.

2) Fournier, Vt., *chronologie pestilentielle*.

[1662.]

gehenden Periode <sup>1)</sup>. Gleichzeitig herrschten anhaltende Fieber, von denen der vorigen Jahre durch die stärkere Kopdallection, die Durchfälle, welche durch Brechmittel nicht gestillt, sondern gesteigert wurden, durch den entzündlicheren und deshalb für Blutentziehungen zugänglicheren Charakter, sowie durch den früheren Eintritt der auch hier kritischen Schwäche öftlich unterschieden. Der Schluss dieses grossen Drama's aber ist durch eine Pest bezeichnet, die ihren gänzlichen Abschied von England (— diese Insel ist später nie wieder von der Pest heimgesucht worden —) durch eine um so fürchterlichere Wuth veranlassen zu wollen schien.

#### 1663 und 1664. Pest zu Amsterdam. — Cardilucius.

Mit der grössten Wahrscheinlichkeit kann Holland und namentlich Amsterdam als der Boden betrachtet werden, auf welchem das grässige Schauspiel eingeübt wurde <sup>2)</sup>. Dort nämlich herrschte die Pest vom Spätherbst des Jahres 1663 bis gegen das Ende des Jahres 1664. Man glaubte in Amsterdam allgemein an die direkte Verschleppung der Seuche aus dem Orient durch ein von dorthier gekommenes Schiff, dessen Mannschaft zwar gesund blieb, aber dennoch augenscheinlich die Krankheit verbreitete. Nach Hodges <sup>3)</sup> verbreitete sie sich durch die inficirte Baumwolle, mit welcher jenes Schiff befrachtet war. Den Winter aber blieben die Pestfälle ziemlich vereinzelte; im Frühlinge aber und Sommer des Jahres 1664 verbreitete sich das Uebel mit um so grösserer Wuth, und raffte gar bald 50,000 Menschen dahin. Nach dem 21. Stücken von Amsterdam eröffneten Städtchen Woxep, wo sich Cardilucius, dem wir diese Notizen verdanken, damals aufhielt, verbreitete sie sich indess nicht; auch der Ansicht des Genannten

1) Sydenham, p. 61.

2) Schwaezer und Götze haben diese Amsterdamer Pest mit Stillenköpfer, der Letztere erzählt nicht einmal die grosse Londoner Pest des folgenden Jahres.

3) Hodges, p. 26.



deshalb, weil sie vor den durch die starke Schweinezeit des Stüdtchens erzeugten Miasmen nicht aufkommen konnte <sup>1)</sup>.

### 1665 und 1666. Pest zu London. — Hodges.

Trotz der strengen Quarantainen Englands fand die Pest im J. 1665 einen Weg in diese Insel, die sie weit und breit verödete, während das Wetter fortwährend überaus schön und fruchtbar blieb, und die von der Pest Versöhnten sich nie gesunder fühlten, als gerade jetzt <sup>2)</sup>. Vorzüglich heftig ergriff sie die Hauptstadt; in dieser erreichte sie im Herbst ihre Höhe, auf welcher sie ungefähr wenigstens 8000 (nach Hodges 12,000) Menschen daharraffte, obschon höchstens ein Drittel der Einwohner zurückgeblieben war. Selbst Sydenham hatte mit der Mehrzahl der Aerzte die Stadt verlassen, entzog sich aber auf dem Lande der Behandlung der Pestkranken durchaus nicht <sup>3)</sup>. Morton erwähnt, wie wir oben sahen, diese Pest nur kurz, Willis gar nicht, so dass es scheint, dass auch sie sich durch die Flucht ihrer Pflicht entzogen. Willis empfiehlt auch irgendwo geradezu die Flucht als das sicherste Mittel. Im Winter und Frühling des folgenden Jahres kamen nur noch einzelne Fälle vor, aber ein „epidemisches Fieber“ herrschte noch bis zum Frühling des Jahres 1666.

Eine klassische Beschreibung dieser Pest hat uns der muthige Hodges hinterlassen, welchem die Pestangelegenheit vorzugsweise oblag, und der einen Pflichteifer entfaltete, der wohl nie von einem Arzte übertroffen worden ist. — Nach ihm kamen die ersten Pestfälle zu Ende des Jahres 1665 <sup>4)</sup> in Westminster vor, welches damals noch eine besondere Stadt bil-

1) Cardellus in der Zuschrift weiss im Schicksalvertrieben, gestirnten Buchen.

2) Sydenham, p. 42.

3) Id. p. 68.

4) Nach alten Styl im J. 1664. Die Engländer behielten bekanntlich auch lange nach der Einführung des Gregorianischen Kalenders die alte Chronologie bei. Wir haben durchgängig die Jahreszahlen des neuen Styls substituiert.

\* [1666.]

dete; von wo sie aber bald nach London gelangte, und sich nach den bekannten Gesetzen schnell verbreitete. Unzweifelhafte Zeugnisse machten die Einschleppung des ersten Zunders der Krankheit von Holland aus höchst wahrscheinlich. Das Elend, welches die Seuche, gegen welche man Sperrmassregeln als Werk zu setzen unterliess, überallhin vertheilte, ward nach durch eine dreitägige grosse Feuersbrunst vermehrt, welche einen grossen Theil der Stadt in Asche legte, „und welche weder die Thürnen der Bürger, noch die Fluthen der Themse zu bemeistern vermochten.“ Ein alter Glaube, welcher die Pest alle 20 Jahre (nach Sydenham alle 30—40 Jahre) in England wiederkehren liess, trug wesentlich zur Vermehrung der Furcht bei, die nach der Erfahrung aller Zeiten die krankhafte Empfänglichkeit so ausserordentlich steigert, und täglich konnte man sich von dem nachtheiligen Einflusse ähnlichen Aberglaubens an das unheilvolle Walten feindlicher Constellationen überzeugen. Indess machte die Krankheit bei der strengen Winterkälte 3 Monate lang verhältnissmässig nur geringe Fortschritte<sup>1)</sup>, so dass die gewöhnlichen Sperrmassregeln von den Behörden erst mit dem allfällend verstärkten Umsichgreifen der Seuche benutzt wurden. Diese Anordnungen indess verfehlten nicht allein ihren Zweck gänzlich, sondern sie trugen offenbar dazu bei, die Ausbreitung des Uebels noch mehr zu steigern, indem man vergass, dass nur solchen Massregeln die volle Billigung und Befolgung zu Theil wird, welche zugleich zweckmässig und möglichst wenig lästig sind. Statt nach dem Muster der italienischen Städte Besuchsanstalten und Hospitäler einzurichten, (für welche sich Hodges unbedingt erklärt), schreckte man die Bewohner eines verpesteten Hauses und die Vorübergehenden mit einem grossen Kreuze von rother Farbe, unter

1) Es ist eine alte Erfahrung, dass die Winterkälte der Verbreitung ansteckender Krankheiten nicht günstig ist. Es erweckt uns indess einseitig, wenn man zur Erklärung dieser Erscheinung nur auf die allein organischen Lebensfeindlichkeit, und nicht auch auf den geringeren geistigen Verkehr in der kalten Jahreszeit Rücksicht nimmt.

dem die Wette „*Domine miserere nostris!*“ angebracht waren, und durch einen Wächter, welcher die Bewohner 40 Tage lang von aller Gemeinschaft mit der Welt abschloss. Ja, häufig dauerte diese Absperrung noch weit länger, wenn mehrere Bewohner nach einander in längeren Zwischenräumen erkrankten<sup>1)</sup>. Alle Bande der Freundschaft und des Blutes wurden durch widersinnige Anordnungen dieser und ähnlicher Art zerrissen. Aberglauben, Quacksalberei und Bosheit trugen dazu bei, das Elend zu steigern, und vorzüglich hart verklagt Hodges das sinnlose Treiben betrügerischer und räuberischer Hebsaamen, die sich selbst einer aus Pestseiter hergestellten Tinctur bei der Behandlung der sich ihnen Anvertrauenden bedienten, die aber nie geschäftiger waren, als wenn es die Uebervortheilung der Lebenden und die Beraubung der Todten galt. Es kamen Fälle vor, wo Todtgegebne sich bei ihrem Wiedererwachen durch jene Weiber aller Kleidungsstücke beraubt sahen.

So bald die Aussicht, das baldige Ende der Seuche erreicht zu sehen, vor der offenkundigen Steigerung derselben im Mai und Juni zu verschwinden anfing, suchte Jeder, den nicht die dringendsten Verhältnisse an die Stadt fesselten, sein Heil in der Flucht, und bald waren selbst die breitesten Straßen nicht geräumig genug, die Zahl der Davoneilenden zu fassen. Die Pest allein blieb zurück, und schien sich an dem Reste der Einwohner ein so fürchterlicher sättigen zu wollen. In den Handtagen starben während einer Woche 809; der Magistrat verordnete Gebete, Fasten und ähnliche Uebungen frommer Andacht, aber trotz des fortwährend schönen Wetters fuhr die Seuche unerbittlich fort, ihre Opfer, vorzüglich unter den ärmeren Volksklassen, zu fordern, so wenig diese auch gerade, zufolge reicher Unterstützungen, irgend Noth litten. Erst jetzt trat das Collegium der Aerzte, zufolge königlicher Aufforderung ins Mittel, und seinem Gutachten gemäss wurden Hodges und

1) Die königliche Versammlung führte den Titel: „*Directions for the care of the plague, by the college of Physicians; and orders by the Lord Mayor and Aldermen of London, published 1665.*“ (*Mem.* p. 29.)



[1665.]

noch ein anderer (ungenannter) Arzt als öffentliche Pestärzte angestellt. Neben ihnen nahmen sich indess noch viele Andere mit grossem Eifer der Kranken an, unter ihnen vorzüglich FRANK GLISSON, NATHAN PAGET, THOMAS WHARTON, PETER BARWICK, HUMPHRY BROOKE. Acht Andere, unter ihnen WILHELM CONYERS, wurden ein Opfer ihrer Pflicht <sup>1)</sup>.

Die Epilemie erreichte im September ihre Höhe; ergreifend ist die Schilderung des unermesslichen Elends, des endlosen Jammers, der furchtbaren Verwüsthung während dieser Schreckenzeit, welche HODGES in grausigen, aber gewiss nur zu wahren Zügen entwirft <sup>2)</sup>, und doch wird die Trauer bei dem Anblick so vieler Trübsal kaum über den nur zu gerechten Unnützen mächtig, welcher durch den Gedanken erregt wird, dass menschliche Sorglosigkeit allein der furchtbaren Schuld geziehen werden muss. Wahrlich! wenn der Geschichte der Seuchen auch nur die unerschütterliche Feststellung des einen Punktes, der Contagiosität der Pest, zu verdanken wäre, ein Verdienst, welches nur die verblendeteste Karesichtigkeit leugnen kann, — sie könnte auf die erste Stellung Anspruch machen! Wie viele Hunderttausende, ja Millionen von Opfern

1) Hiernech ist die völlig was der holl gegriffene Angulo SAKMAREN's, der sie auf Tres und Glanzen aus Sprengel aufgenommen hat, zu berücksichtigen, dass von allen Aerzten Hodges ganz allein mit einem Chirurgen in der Stadt zurückgeblieben sey.

2) HODGES, p. 20. „Morsibus Augusti et Septembris, non, ut prius, cunctantur et languida praesentant lani, sed rerum potius et rerum aut jura facta et rediens oppida freit, quibus laboribus tria, quatuor, quinque, sex et septem mille hominum letalissimum fata tollere. Quis elidem horum intus? quis fides et plures quoniam graves frigus? Ingenui velis Britannicus velis primarius tam luctum fidei comperta? Sedet in domibus plerique aut cubere jacebant respectum novissima expulsiorem, aut languentem derambulant in Ora fuerit heri eulteri; hoc in cubiliis audire erat alba et pluvium respiria, illi menses inestantur dilectum sacrificiorum; non penes aberant convulsant et imiles, non aliter quam sua fata praesentant universis rebus pluvium. Mors perperis novissimae erat pro Lucius, et tam illi ab ubi in tumulum non ab in omni collegi. Quam non miserrime infestam, mundi candidissimam, ubi defausteram matrem vitantes et arde ingratum? aut furi gravia eadem morte et Mphilem intelli, cum totum implerique prius in fide fata solerant!”

sind gefallen, weil man diese ewig wahre Fühlerin von sich stieß! —

Auf der Höhe der Krankheit starben wöchentlich mehr als 12,400 Menschen. Trotz der kräftigsten Abmahnungen der Aerzte ergriff man ein in ähnlicher Noth häufig benutztes Mittel, die Ausübung grosser Feuer in den Strassen, obwohl sie durch Regengüsse bald wieder gelöscht wurden. In dieser Zeit starben einmal in einer Nacht 4000 Personen! Die Verwirrung stieg aufs Höchste; die Aerzte wurden sogar genöthigt, ein von hohen Personen empfohlenes Arkanum zu versuchen: — Alle, die es gebrauchten, starben. Ja man beschätzte selbst die schamlosen Betrügereien der Aelterzte und Geheimmittelverkäufer, indem man bei allgemeiner Noth Jedem, hilffreich zu seyn, vergelten zu müssen glaubte. Diese Verkennung der ersten, einfachsten Grundsätze scheint sehr feste Wurzeln geschlagen zu haben, da Hodges es für nöthig hält, die Verderblichkeit einer solchen Nachsicht ausführlich darzulegen.

Langsam und unmerklich in Bezug auf die Menge der Erkrankungen, deutlich aber in Bezug auf ihre Intensität, trat die Epidemie nach jenen Gesetzen, die selbst zu ahnen der schwache Menscheng Geist nicht vermag, ihren Rückweg an. Allmählig traten die während ihrer Herrschaft gänzlich verschwundenen Krankheiten, Rothlauf, Anginen, Rahren, Blattern, Masern u. s. w. wieder hervor, um zuletzt allein das so lange von einem mächtigeren Genossen behauptete Feld wieder einzunehmen. Die Gesamtzahl der während der Pest in London und Westminster Gestorbenen betrug, so weit die öffentlichen Berichte Auskunft gaben, 97,306, von denen 68,596 auf Rechnung der Pest kommen <sup>1)</sup>. Bestätigend aber für eine in der Geschichte der Pest sehr häufige und immer noch sehr räthselhafte Erscheinung ist die Bemerkung, dass nach der Pest, welche zu Anfang des Jahres 1666 als verloschen betrachtet werden konnte, der Gesundheitszustand auffallend günstig war, dass unge-

1) S. die der Schrift von Hodges beigelegte Tabelle.

[1666.]

köstlich viel Ehen geschlossen wurden, dass eine auffallende Fruchtbarkeit der Frauen herrschte, und dass Viele derselben jetzt zum erstenmale concipirten, so dass nach einigen Monaten (1 — wahrscheinlich Jahren) der durch die Epidemie verursachte Verlust von 100,000 Menschen, fast ausgeglichen war. Nach Will. Petty kamen in den nächsten Jahren 7000 Todesfälle auf 10,000 Geburten<sup>1)</sup>. Man hat bekanntlich diese Beobachtung durch die mit dem wiedergewonnenen Lebensgefühl gesteigerte Energie des Zeugungsaktes erklären zu können geglaubt, es scheint aber der Grund dieser Erscheinung tiefer zu liegen, da sie nicht bei allen Seuchen, z. B. nicht bei der Cholera, Statt findet, auch weder auch bei Solchen, die die Krankheit nicht hatten, eine gewisse Schwäche des Genitalsystems vorkommen soll.

Von einem so aufklärten Arzte, als Hodges, kann es nicht befremden, wenn wir ihn als strengen Contagionisten erblicken. Fast scheint es, dass er nur um dem Vorwurf des Atheismus zu entgehen, als letzte Ursache der Pest den göttlichen Willen erkennt. Einem Arzte ziemt es, ohne die größte Beleidigung der Kunst und der Vernunft, nicht, zu übernatürlichen Einflüssen seine Zuflucht zu nehmen, wo natürliche Ursachen sich so leicht darbieten. Ein freimüthiger Verfechter der Wahrheit bekämpft er Alles, was nur auf hypothetische Annahmen sich gründet, selbst Sätze, die noch in neuester Zeit als Thatsachen hingestellt werden<sup>2)</sup>, ohne sich indess von der Annahme einer besonderen miasmatischen Verberbung der Luft an den Urzeugungsorten der Pest, und einer entsprechenden Beschaffenheit ihres Contagiums, so wie von allen Consequenzen, welche die chemistische Schule auf diese Annahme baute, frei halten zu können.

In der Regel waren in der Londoner Epidemie die Erkrankungen von Fieber begleitet, doch starben auch Solche sehr

1) Petty, Will., *Essay concerning the multiplication of Mankind and the growth of the city of London*. 1682.

2) v. R. den angelischen Mählern: *Geruch des Pestcontagiums* u. s. w.



schnell, bei denen Nichts erschien, als einige Petechien an einzelnen Körpertheilen. Das Fieber hatte in der Regel, vorzüglich zu Anfang der Krankheit, einen mehr oder weniger ausgeprägten intermittirenden, doch meistens unregelmäßigen Typus<sup>1)</sup>. — Zahlreich waren die Complicationen der Pest mit andern Krankheiten<sup>2)</sup>. Ein alter Wahn, welcher Syphilitische für vor der Pest geschützt erklärt, vermochte Viele zu absichtlicher Befriedigung ihrer wilden Lust bei den verurtheiltesten Dienerinnen des Lasters; sie wurden heftiger als Alle von der Pest ergriffen. Häufig nahmen syphilitische Babonen den Pestcharakter an. Höchst interessant ist aber die Bemerkung, dass bei Kranken dieser Art mit den Schweissen des Reactionsfiebers sehr häufig ein copioser kräftiger Speichelfluss eintrat, eine unsers Wissens sonst nirgends gemachte Beobachtung. Aehnliche Veränderungen machte die Pest mit dem Scorbut, und in einzelnen Fällen auch mit Tubex, Scropheln, Arthritis, in welchen letzteren sie, wenn die Kranken davon kranken, sehr häufig einen auffallend günstigen Einfluss auf die ursprüngliche Krankheit insorte<sup>3)</sup>.

Die Erscheinungen selbst waren die gewöhnlichen und hinreichend bekannten. Den Sopor zu Anfang derselben ist Hodges, mit den Annahmen angesehenener neuerer Aerzte merkwürdig zurechnend, einer narkotischen Eigenschaft des Krankheitsgiftes zuschreiben genügt, ohne sich diese Eigenschaft erklären zu können<sup>4)</sup>. Uebrigens gehörte Sopor zu den üblehsten Symptomen. Das aus der Ader gelassene Blut der Pestkranken (Hodges verwirft den Aderlass durchs) zeigte eine ungewöhnliche hellrothe Farbe: „es schien über die Unwissenheit derer zu erröthen, welche in seiner Verderbniss die

1) Hodges, p. 119.

2) p. 85 seq.

3) p. 52.

4) „*Qua natura parte erat pestibus illis viribus narkoticis adscribitur, non vult in penitus explere: ne arbitretur ratione ipsius sensum*“ — Hodges, p. 108.

[1865.]

Quelle der Krankheit suchten<sup>1)</sup>.<sup>2)</sup> Ein sehr häufiges Symptom war heftiges Herzklopfen; die symptomatischen Schweisse zeigten bald eine citronengelbe, bald eine purpurrothe, grüne, schwarze oder bläuliche Farbe, und häufig diente die durch sie verursachte Färbung der Wäsche dem Laien zu einem ziemlich sichern prognostischen Anhaltspunkte. Diese Schweisse brachen oft noch nach dem Tode aus. Bei Manchen, selbst übrigens anscheinend Gesunden, wurden kleine gangränöse Flecken („Tafeln“<sup>3)</sup>) beobachtet, welche eine bis auf die Knochen gehende locale Zerstörung bewirkten. — Die wichtigste Krise bildeten die Bubonen, über welche das Bekannte in vollständiger Ordnung, mit einiger Polemik gegen manche Ansichten der damaligen Zeit, vorgetragen wird. In einem Falle zerstörte ein Parotidenabscess die Halagegend beider Seiten so, dass die Jugularvenen, die Carotiden, der Vagus, die Muskeln und der Oesophagus wie präparirt offen da lagen; dennoch trat vollständige Heilung ein<sup>2)</sup>.

Eben so der Erfahrung der besten Beobachter entsprechend sind die in kurzen aphoristischen Sätzen niedergelegten Resultate der Prognostik und der Behandlung, welche letztere eben so sehr den Aderlass, (— Hodges kannte nur einen nicht tödlich abgelaufenen Fall, in welchem eine Vene geöffnet worden war<sup>2)</sup> —), den uneingeschränkten Gebrauch der Brech- und Purgemittel ausschliesst, als auf die Zeitigung der Bubonen durch Vesicantien und vorzüglich durch Kataplasmen, hauptsächlich auf die Erzeugung kritischer Schweisse Rücksicht nimmt. In letzterer Beziehung rühmt Hodges vorzüglich die *Contryerva* und den *Ingwer*, ohne indess den alten Apparat

1) Hodges, p. 115.

2) p. 126.

3) Sydenham empfahl schamlos, durch seine Hypothese von der Färbung der Harnmasse, noch hoch über durch die angeblichen absolut günstigen Erfolge eines Chinurgens verfeinert, in der Pest, welche er wohl nur selten beobachtete, den Aderlass unbedingte. Einem andern Fehler Sydenham's, die Annahme nämlich einer bestimmten Periode sich voraussetzenden Wiederkehr der Pest haben schon Mead, Forcellii u. Andre gerügt.

der Bezoardien und anderer, zum Theil abergläubischer, zum Theil aberthöuslicher Mittel zu vernachlässigen<sup>1)</sup>. —

Gleichzeitig oder noch später wurde der grösste Theil der übrigen Städte Englands von der Pest heimgesucht<sup>2)</sup>, und in nicht geringerer Verbreitung wüthete sie, wie zum Theil auch aus der grossen Menge der Volkschriften und polizeilichen Verordnungen aus dieser Zeit hervorgeht, auch auf dem festen Lande von Europa. Cardilucius z. B. erwähnt seine am Rhein angestellten Beobachtungen. In Spanien aber herrschte eine der ausgebreitetsten Epidemien des Garotillo.

### 1668. Pest in der Schweiz. — Esslinger.

Zu den eingetragenen brauchbaren Nachrichten über die fernere Ausbreitung der Pest auf dem Festlande gehört das bei Muralt<sup>3)</sup> von Joh. Casp. Esslinger, Wundarzt zu Zürich, aber die Pest zu Uster in der Schweiz im J. 1668, Mitgetheilte, den wir schon oben<sup>4)</sup> als Beobachter der Lagersuchen in Ungarn und Spanien haben kennen lernen. Die Krankheit ergriff in dem kleinen Orte mehr als 400 Personen; Esslinger stellte von seinen Kranken mehr als die Hälfte wieder her, so ungünstig auch die durch die geringe Bildung, Arnoth der Bewohner u. s. u. gegebenen Verhältnisse waren.

### England. Die Volkskrankheiten der Jahre 1667 — 1675. Blattern, Blatternfleher, Ruhr.

Schon während dieser Pestepidemie waren vereinzelte Blatternkrankungen vorgekommen; zur wirklichen Epidemie wur-

1) Er rühmt z. B. Trochiskien aus dem Fleisch der Klapperschlange als am meisten wirksam.

2) Fast hundert Jahre später fand diese Pest noch eine zweite Beschreibung, die wir indes nicht benutzen konnten. Ihr Titel ist: *The history of the great plague in London in the year 1665 / by a Citizen that lived the whole time in London*, Lond. 1666, 1754.

3) Feh. v. Muralt, *Schriften von der Wundtztzuel*, Basel 1711, S. 571 ff.

4) S. oben S. 58.



[1667.]

den sie in jedem Sommer der Jahre 1667, 1668 und 1669, während im Winter an ihre Stelle jedesmal ein „neues“ Fieber trat, welches, das Exanthem ausgenommen, fast alle Erscheinungen der Blattern erzeugte, und deshalb von Sydenham als *Febbris variolosa* bezeichnet wird. Dieser variolösen Constitution aber folgte eine ausgebildete Ruhrépidemie.

Die Blatternépidemie der genannten Jahre zeichnete sich durch eine eben so grosse Extensivität, als geringe Intensivität aus; nur Wenige starben bei der naturgemässen, im Ganzen kühlen Behandlung, welche Sydenham, weniger weil er das Wesen der Krankheit für entzündlich hielt <sup>1)</sup>, als weil er es in der Regel für nützlich fand, die stürmischen Reactionen zu beschwichtigen, so dringend empfahl, und welche später von allen denkenden Aerzten adoptirt wurde <sup>2)</sup>. Die Beschreibung derselben aber erscheint in jeder Beziehung als vollendet.

Noch grösseres Interesse hat die Beschreibung des mit den Blattern abwechselnden Fiebers, welches mit dem Eintritt der Blatternconstitution kam, stand und fiel <sup>3)</sup>. Die Kranken klagten über einen bei äusserem Drucke zunehmenden Schmerz in der Magengegend, wie ihn Sydenham sonst nie beobachtet hatte, über Kopfschmerz, Hitze des ganzen Körpers, welcher der Ausbruch von Petechien folgte. Der Durst war mässig, die Zunge bot häufig Nichts Besonderes dar; zuweilen war sie weisslich, niemals schwarz belegt, und sehr selten trocken. Vorzüglich auffallend aber waren die profusen Schweisse zu

1) „*Quodis vero sit locus ubi visus ab naturalibus et communibus rationibus reliquis animabus intellectus defectum accipere possit ut fiant. Verumtamen praedicta spontanea protrusio trahente illis videtur inducere, inflammationem in eum visum, in eodem tamen inflammationem specie differentem tam languidam, tam reliquam sanguinem etc.*“ — Sydenham, p. 86.

2) Hierdurch wird auch, den im Früheren ausgesprochenen Bemerkungen mag beizugehen werden, mit welchem Rechte Sprengel (Gesch. d. Med. IV. S. 581) sagt: Man wird allgemein müssen, dass Sydenham's Theorie nicht einmal mit seiner Methode übereinstimmt. Denn wenn die Natur in der Bewährung der Natur, das Schicksal der Natur streifen bröckelt, so sind Adressen und kühnere Wege gewiss nicht die zuverlässigsten Mittel, um den Gang der Natur zu befördern.“ —

3) Sydenham, p. 78 seq.

Anfang der Krankheit, welche durchaus von keiner Erleichterung begleitet waren, und deren Steigerung durch erhaltendes Verhalten sehr leicht Himsymptome („*Phrenitis*“), Vermehrung der Petechien, und viele andere üble Symptome hervorrief. Eben so wenig war auf die scheinbare kritische Beschaffenheit des Urins zu bauen, welche sich schon zu Anfang der Krankheit vorstellte. Bei anpassender (erhaltender) Behandlung dauerte die Krankheit unter heftigen Zufällen 6—8 Wochen, wenn ihr nicht der Tod früher ein Ende machte. Vorzüglich kritisch war Speichelfluss, welcher sowohl bei kühlem als erhaltendem Verhalten eintrat. Dieselben Erscheinungen waren aber auch bei den Blättern regelmäßig vorgekommen.

Noch war diese *Febris variolosa* nicht ganz verschwunden, als sich im J. 1668 eine epidemische Diarrhöe ausbildete, welche Sydenham wiederum für Nichts als eine Formumänderung der bisherigen Krankheiten, und für den Uebergang zu der ungebildeten Ruhrepidemie des folgenden Jahres hält. Wie beim Blatternfieber ging auch diesem Durchfall stets ein leichter Frost voraus, dem aber keine oder nur mässige Hitze folgte, „weil alsbaldige Ausscheidung der Krankheitsstoffe auf der Darmschleimhaut das Fieber abschneidet.“<sup>1)</sup> Uebrigens klagten die Kranken über denselben Druck in der Magenregion, wie bei den Blättern und der *Febris variolosa*, ja zuweilen war selbst die *regio epigastrica* entzündlich aufgetrieben, zuweilen selbst tödtliche Abscesse nach sich ziehend<sup>2)</sup>.

In seiner Meinung von der wesentlichen Identität dieser Diarrhöe mit den vorhergegangenen epidemischen Erscheinungen wurde Sydenham noch mehr durch die auch hier äusserst günstigen Erfolge seiner bei jenen erprobten Behandlungsweise (Venisection, kühlende Arzneyen, Diät und Verhalten) bestärkt. Mit weit ungünstigerem Erfolge wandten andere

1) Sydenham sagt nicht ganz deutlich: „*Idem illius dolor, atque eadem curatio, quae in febribus peripneumonia externa in epigastricam protrahitur, immo, quam etiam inflammabile, quae in apertiore atque nigri melle demum terminatur.*“ (p. 193.)

[1668.]

Ärzte, dem Dogma von der Nothwendigkeit, die *materia peccans* fortzuschaffen, huldigend, die Rhabarber und andere Abführmittel, Andere, andern Voraussetzungen zu Folge, Adstringentien an. Die tägliche Beobachtung aber nicht allein, auch die sehr umfangreichen Todtenlisten dieses Jahres gaben über den Erfolg dieser Methoden einen hinreichenden Aufschluss.

Auch als ferner im August des Jahres 1669 die „*Cholera asariva*“ und heftige Koliken („*Termina vestriv*“) in einer bis dahin noch nicht beobachteten Häufigkeit herrschten, und als ihnen eine ausgebildete Ruhrerpidemie folgte (— die Ruhr war seit 10 Jahren nicht vorgekommen —) konnte Sydenham den Zusammenhang dieser Erscheinungen unter sich und mit den vorhergegangenen nicht verkennen. Jene Cholera und Kolik, welche letztere in sehr leichtem Grade selbst viele übrigen, bis auf leichte Erhebenbewegungen und Neigung zu flüssigen Stühlen oder Verstopfung, Gesunde ergriff, betrachtete Sydenham nur als Vorläufer, als Entwicklungsstufen der Ruhr, welche im Herbst des genannten Jahres zur Herrschaft gelangte, im Winter aber vor einer „*Febris dysenterica*“ zurücktrat, welcher von allen Erscheinungen der Ruhr nur die Durchfälle und die von diesen abhängigen Symptome mangelten. Die angegebene Bedeutung jener als Vorläufer der Ruhr betrachteten Erscheinung gab sich auch dadurch zu erkennen, dass sie, als in den folgenden Jahren Ruhr und Ruhrfieber sich erneuerten, gänzlich fehlten. — Uebrigens kamen in dieser Zeit hier und da auch die Blattern vor.

Während dieser Ruhrconstitution herrschte vom Anfang des Jahres 1670 bis zum Juli eine unaserordentlich verbreitete Masernerpidemie, die im folgenden Jahre nur in einzelnen seltenen Fällen ihr Andenken erneuerte, im dritten aber gar nicht beobachtet wurde. Ihnen folgten, weniger allgemein verbreitet, im Sommer „anomale Blattern“ diesen im Herbste die ausgebildete Ruhr, dieser im Winter das Ruhrfieber und die Blattern. — Beide Krankheiten wurden jedoch auffallend seltener, als im Februar 1671 dreitägige Wechselieber sich sehr zu



verbreiten anfangen, obwohl sie bei Weitem nicht so häufig waren, als während der oben beschriebenen Wechselstieberconstitution. Ihnen folgten mit dem Anfang des Juli wieder die Ruhrstieber, im Spätherbste die eigentliche Ruhr, die aber durch ihre geringere Intensität und Externität deutlich zu erkennen gab, dass sie ihre Akme bereits überschritten habe; der Beschluss des Jahres aber wurde wiederum durch Ruhrstieber und Blattern bezeichnet.

Dieser allgemeinen Uebersicht lässt Sydenham die anfallsweise Betrachtung der einzelnen Glieder der Kette folgen, vorzüglich um die Indicationen und die auf diese gestützten Grundsätze der Kurmethode zu entwickeln, welche er bei denselben befolgen zu müssen glaubte. Diese Grundsätze haben Sydenham's Namen für alle Zeiten unsterblich gemacht, sie sind das Eigenthum der Wissenschaft selbst geworden, und es bedarf deshalb hier nur kurzer Andeutungen, um an die ganze Bedeutung eines Arztes zu erinnern, dessen Grösse da am herrlichsten strahlt, wo wir ihn in stiller Verehrung der Natur versinken sehen!

Ihre Zwecke glaubte aber Sydenham weder mit Abführungen, noch mit Abstringentien und anarkotischen Mitteln bei dem von ihm als *Cholera morbus* bezeichneten, mit unserer *Cholera spastica* oder *euroyca* zusammenfallenden, und von dem Schreckbild des 19ten Jahrhunderts himmelweit verschiedenen Zustande erreichen zu können. Er verordnete deshalb sehr leichte Hühnerbrühe, Klystiere und schleimiges Getränk, später eine leichte Gabe seines Laudanna, auf welches er sich in den vernachlässigten und vorgeschrittenen Fällen des Uebels beschränkte.

Die nähere Beschreibung der Ruhr der folgenden Jahre (1669 — 1672) entspricht derjenigen, welche kürzlich ein geistreicher und genauer Beobachter derselben entworfen hat <sup>1)</sup>. Kolikschmerzen, schleimige, später bläsig-schleimige, zuletzt

1) Siehe rt, Zur Genetik und Therapeutik der rothen Ruhr und ihr Verhältniss zum Erysipelas. Rastatt 1829. 8. Vergl. H. Haase's Besprechung dieser Schrift in Schtjoff's Jahrbüchern L. d. ges. Med. Bd. XXV. S. 262.

1169.7

rein blutige Stühle, Tetanus, Gangrän des Darmkanals, grösste Schwäche, Kälte der Extremitäten, Aphthen, Tod, das war die Reihenfolge der bedeutendsten Symptome. Auffallend ist indess die geringe Gefahr, welche die Ruhr, im Gegensatz zu den von ihr befallenen Erwachsenen, bei Kindern hatte, bei denen sie oft Monate lang anhält, ohne tödtlich zu enden, sobald man sie nur der Natur überliess<sup>1)</sup>. Ausdrücklich versichert Sydenham, dass diese Ruhr von andern Epidemien verschieden gewesen sey, und dass dieser ewige Wechsel der unendlichen Natur die Verpflichtung, diese in ihr selbst zu erforschen, täglich erneuere<sup>2)</sup>. Die Bemerkung der strengen

1) Sydenham, p. 110.

2) „Nepos est, ex his naturae laus in te testipere discedunt, cum in confusum opus omnes sit, quod quo profundius in contrarius naturae opera per-  
solvimus, ex luciditate nobis affluens sapientiae omnia, et divinae prae-  
sertim operationum ejus, quae sapientiam nostram longissime exsuperat. Alia  
ut quaedam illi fuerit, quae in se recipit haec omnia vultu suavitatis, et multifa-  
rinas naturae operationes una quaeque indagare, partim singula ex se excipiat, ne-  
que nisi per omnia compes reddat: cunctis interit, (si quid judicanda valet)  
pro reprobis vel utilissimis quam fecit gerente, cetera cunctis illi medendo  
praestet, idque cum tantum ab omnino, quod prius fecit.

Porro obiterandum est, quid ex illis morbis, ubi primam et naturam suam emergunt exaltantque, quantum ex eorum placamento licet conquire, principis magis spiritibus ac subtili virtute insisteret, quam ubi jam magis adhaerent, quique magis ad materiam vergunt, et magis in dies crassi atque humorescenti: etiam quales quales demum fuerint invenire licet particulares, quos nec intus primitus exaltatione ac epidermice in faciem splendimus, omnia potest esse, et tandem magis agendi potentia per ea tempora polere et inclinandi, quibus primum stupescit, quos postquam carnis aera fuerit refracta. Ita primi morbilli, quibus grandaeque pectus, nullo fere mo die ejus contagio effudit, cum in triduo crescerent, suspensius extenuant, nihil prorsus modo penetrantes, cum, ubi morbus magis adhaerent, acutius, nisi febre aliquotum symptomata precedentibus, unquam protrahit: ex quo abunde conficitur, morbum hunc in quibus immutata magis effertum atque aratum fuisse, quam post principia, licet pauciores prius aut ingrederent, octo jam se habuit in humore erysipelas. In dysenteria etiam porro, de quibus jam agimus, omnia tuncque apophorismi atrociori sub primi morbi ingreſſu comparabant, et licet, si ad egrorum numerum reverterent, furis in dies melius videretur, deinde tandem ad statum praesentem, in quo ex contrariis plures interibant, quos jamque morbo: symptomata tunc sub initio continebant magis quam in statu, ut multo citius magis quam in declinatione, et tuncque partibus plures per egrorum cuncta. Eodem supplicio frangens sui culpa quoniam. Adde quod quo statim perpetuatur morbus, et magis damoralis esse videtur: et. e. prius quoque

Gesetzmässigkeit im Verlaufe der ganzen Epidemie gibt ihm zu einer der schönsten Stellen Veranlassung, in welcher er darauf hinweist, dass im Anfange jeder Epidemie, gerade wie bei jedem einzelnen Krankheitsfalle, das Ergriffenwoyn des Nervensystems am stärksten hervortrete, und sehr stürmische Erscheinungen bedinge, während sich im spätern Verlaufe und auf der Höhe der Krankheit ein vorzugewiesenes Leiden der Säfte bei weit geringeren Stunne und doch grösserer Gefahr der Erscheinungen offenbare, während ganz zuletzt wieder ebenfalls weniger materielle als dynamische Symptome sich kund geben. So seyen in der Ruhr, sowohl in dem einzelnen Falle als in der ganzen Epidemie, den Krämpfen zuerst normale, aber flüssige, schleimige, dann blätige, zuletzt wie der schleimige, und zuletzt wieder normal flüssige Ausleerungen gefolgt <sup>1)</sup>.

Die geschichtliche Wahrheit verlangt es, einzugestehen, dass die Theorie Sydenham's von der Ruhr nicht ohne hypothetische Grundlage war, und demgemäss auch auf die Anordnung der Kurethode einen bedeutenden Einfluss ausübte. Deshalb aber werden Diejenigen nicht mit ihm rechnen, denen erinnerlich ist, dass Sydenham mitten unter den Verkehrttheiten der Chemistrierer sich von denselben rein erhielt, dass viele unsere Ansichten über das Wesen der Ruhr nicht im Entferntesten zu dem tiefen Sinne sich erheben, der in Sydenham's Hypothese verschlossen liegt, und dass wohl kein früheres Arzt

*ut quiescent, quoniam plerumque nulla novitas dejectionibus insitabatur, terminantur vero quod ipsas utroque febrem intensissimam, tabulam siccam praeterierunt, aliisque symptomata interquiescentium numerum diuturnius longo intervallo post se reliquit. Quoniam dysenteriae cum dejectionibus, quae prius incurrebant, principis magis spiritibus ac multum edebantur calere, quam quae illis sequentibus. Etiam in prima dysenteria et remittet et ad densandum irritata majores erant, tum etiam frequentiores; ipsae vero dejectiones, terribiles praeteritis, et minores, et magis insistentes. Quibus autem gradibus morbus in genus se permoveat, eodem etiam immutabatur terminat. Dejectiones vero magis terribiles erant, donec tandem felicitate epidemia hoc constitutionis terminum se precipere, dejectiones terribiles magis cessant, quam minores.* — p. 110 seq.

1) Sydenham, p. 110.





unterschied sich von dieser selbst, wie gesagt, nur durch den Mangel der örtlichen Affectionen. Höchstens fanden leichte Koliken, etwas bläuer oder auch verstopfter Stuhlgang Statt. Die grosse Neigung zu colliquativen Schreissen, welche das Blatternfieber der vorhergegangenen Periode ausgezeichnet hatte, fehlte, ebenso der dort so häufige Speichelfluss, dagegen war hier, vorzüglich bei erhitzennderem Verhalten, eine ausserordentlich grosse Neigung zu Aphthenbildung zugegen.

Sydenham behandelte das Ruhrfieber nach denselben Grundsätzen als die Ruhr selbst, mit Aderlässen und vorzüglich mit Abführmitteln, welche letztere ihm hier um so nützlicher zu seyn schienen, als die Bemühungen der Natur, sich der Krankheitsstoffe durch den Darmkanal zu entledigen, nur gering waren. Aus diesem Grunde enthielt er sich aber beim Ruhrfieber der Opiate gänzlich, und verordnete sie nur zuweilen gegen die grosse Schwäche der Reconvalescenten, namentlich der hysterischen Frauen. — Bei jüngeren, zuweilen aber auch bei älteren Personen stellten sich, zumal bei erhitzennder, auf die Erzwungung von Schweißen gerichteter Behandlung, nicht selten dumpfe Delirien ein, gegen welche er mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln Nichts ausgerichtet zu haben versichert.

Die Masern zu Anfang des Jahres 1679 waren ziemlich leicht, die Beschreibung der Krankheit ist ganz Sydenham's würdig. Nicht so die Behandlung, bei welcher nebst schleimigen Mitteln leichte Narkotika und Aderlässe, welche Sydenham selbst bei dem zartesten Kindern mit dem besten Erfolge angestellt haben will, die Hauptrolle spielen.

Den Masern folgten anomale Blattern, und diese wiederholten sich, im Gegensatz zu den ersteren, in jedem Sommer, selbst im Herbste der beschriebenen Ruhrconstitution in solcher Allgemeinheit, dass sie der Ruhr die Oberhand streitig zu machen schienen. Die Unregelmässigkeit dieser Blattern gab sich nach Sydenham vorzüglich zu Anfang der Epidemie zu erkennen, in welchem es oft schwer war, sie wegen der erysipelatösen Röthe, auf welcher sie sich langwieriger als die norma-

[1873.]

len Blättern bildeten, von den Masern zu unterscheiden. Ferner entstanden, vorzüglich im ersten Jahre der Epidemie, bei diesen Blättern häufig grosse Pityriaden an einzelnen Theilen, unter denen sich splachelöse Zerstörungen bildeten. Die Blättern selbst aber confluirten zwar nicht sehr häufig, oft brachen selbst nur wenige aus, aber sie nahmen oft schnell ein schlimmes, lrides und schwarzes Aussehen an, und hinterliessen beträchtliche Narben. Der auch bei ihnen kritische Speichelfluss war stärker als es sonst der Fall zu seyn pflegt. Aus Allem diesem folgt Sydenham vorzüglich genug eine bedeutendere entzündliche Natur derselben, welcher Hypothese gemäss er auch seine Behandlung einleitet. In den zwei letzten Ruhrjahren indess näherten sich diese Blättern am Vieles dem normalen Charakter.

Endlich kamen während dieser Ruhrconstitution sehr häufig „gallige Koliken“ vor, welche Sydenham seinen Ansichten über ihr Wesen gemäss mit Aderlässen, Abführmitteln und reichlichen Dosen der Narkotika bekämpfte.

Mit dem Jahre 1673 liess Sydenham eine neue bis zum Jahre 1675 dauernde epidemische Constitution beginnen; wir werden unten näher untersuchen, mit welchem Rechte. — Im November 1673 waren die Ruhren fast ganz verschwunden, und die noch einmal wiederkehrende grössere Häufigkeit derselben um Weihnachten, nach einigen Tagen heftiger, aber bald wieder nachlassender Kälte, konnte nur mit dem letzten Aufblühen einer erlöschenden Flamme verglichen werden. — Mit dem Jahre 1674 verbreitete sich wieder eine bis zum Beginn des Sommers dauernde Masernepidemie, ihr folgten wieder die Blättern in der ganzen Eigenthümlichkeit und Bösartigkeit des Jahres 1670, bis in den auffallend gelinden Winter anhaltend. — Schon im Frühlinge 1675 hatte das früher beschriebene Fieber, welches bald mit Ruhr-artigen, bald mit einfachen Durchfällen, bald ohne dieselben auftrat, aufgefangen; mit dem Juli dieses Jahres trat es, nachdem es die Blättern gänzlich verdrängt, an die Spitze der epidemischen Krankheitserschei-



nungen, bald von vorherrschenden Affectionen des Kopfs, bald des Unterleibes begleitet. Mit dem Eintritt mässiger Witterung zu Anfang Octobers wurde der Krankheitscharakter auffallend katarrhalisch, und Pneumonien und Brustfellentzündungen traten an die Stelle der vorher genannten örtlichen Affectionen. Später aber traten wieder die Blattern auf, obwohl, da die Epidemie bereits im Rückschreiten begriffen war, weit gelinder als im vorigen Jahre.

Sydenham schildert die obengenannte und von ihm als *Febrix contagiosa* bezeichnete Krankheit, als ein leichtes typhöses Fieber, mit vorherrschender Neigung zu leichtem Somno, selten zu Delirien. Ein Exanthem wird nicht, wohl aber „Seitenschmerzen,“ erwähnt. Das aus der Ader gelassene Blut zeigte eine Speckhaut. Die örtlichen Affectionen bei demselben wechselten, wie gesagt, nach der intercurrenten Umgestaltung der epidemischen Constitution, und waren demgemäss zu Anfang des Herbstes vorzüglich Durchfälle und ruhrartige Erscheinungen, später Brustaffectionen. — Anfangs war Sydenham geneigt, auch dieses Fieber für ein entzündliches zu halten, der schlechte Erfolg aber, welchen er bei der Anordnung des Aderlasses (das Blut zeigte bei dem zweiten Aderlasse keine Speckhaut mehr) und der Abführmittel beobachtete, brachte einen ziemlich vollständigen Sieg der Erfahrung über die Hypothese zuwege, und Sydenham beschränkte sich auf ein innerliches kühlendes Verhalten, auf Klystiere und Vesicatore. Es ist wirklich auffallend, und ein Beweis der Herrschaft des Vorurtheils selbst über die grössten Geister, dass Sydenham nicht zu den Brechmitteln griff, die ihm früher so wesentliche Dienste geleistet hatten, zu deren Verordung ihn aber Irthum vorzüglich das Dogma von der damals ausgezeichneten *materia peccans* geführt hatte.

#### Morton.

Wir sind dem grossen Beobachter der Epidemien des Decenniums von 1661—1673 gefolgt, ohne einen Blick auf die

[1696.]

Beobachtungen Anderer zu werfen, von denen nichtsolestoweniger die Morton's der nächsten Stelle würdig sind. Das Thatsächliche stimmt bei Diesem mit den Berichten Sydenham's überein; die Auffassung ist nicht selten wesentlich verschieden. Entschieden aber ist Morton's Vorrang über seinen berühmten Kollegen, wenn er die Ruhr dieser Periode, namentlich die des Jahres 1666 für die symptomatische Erscheinung eines Wechselfiebers hält, und demgemäß mit der Perurinde, welcher etwas Laudanum beigelegt ist, mit dem überraschendsten Erfolge behandelt. Morton kam auf diesen glücklichen Gedanken theils durch seine Annahme der allen epidemischen Erscheinungen dieser Periode zu Grunde liegenden *Febris continua* <sup>1)</sup>, theils und vorzüglich durch die Beobachtungen von Ruhrs mit dem ausgebildeten Tertiantypus, und es war, da diese der China bei der 5ten bis 6ten Gabe leicht und sicher, ohne alle Folgen, wichen, nur ein kleiner Schritt, die gleiche Theorie und das gleiche Verfahren auch auf die übrigen Ruhrfälle zu übertragen. — Die China war damals den meisten Aerzten noch unbekannt, und selbst Sydenham kannte sie noch so wenig, dass er sich scheute, sie beim Wechselfieber anzuwenden. Deute dreister verordneten sie Quackadler und Wiskelkürzte, deren einer, ein gewisser Tabor, damals in London grosses Aufsehen machte <sup>2)</sup>. — Uebrigens hat es auch später nicht an mehr oder weniger ausgebildeten intermittirenden Ruhr epidemien gefehlt, so z. B. 1691 in Holland (Deckers), 1695 in Rom (Lancisi), 1805 in Bordeaux (Comtancenn), 1825 in Narbonne (Martins) <sup>3)</sup>.

1) S. oben S. 172.

2) Morton, l. c. p. 161. — Wenn dieser Tabor mit dem damals in London lebenden Joh. Tabor identisch ist, so verdient er freilich die ihm von Morton ertheilten Pflückens nicht. Vergl. Sydenham, V, 8. 232. 245.

3) Vergl. Eisenmann, die Krankheitsfamilie Typhus, p. 327 ff. welcher die „Colotypus“ als eine besondere Species der „Wechselfieber“ aufstellt.

## Willis.

Einfach und natürlich, aber ohne den grossen Ueberblick des inneren Zusammenhanges ist, Willis Auffassung der Volkskrankheiten dieser Zeit<sup>1)</sup>. Ihm sind die unblutige Ruhr des Jahres 1670 und die eigentliche Dysenterie, so wie die Wechselfieber des folgenden Jahres, streng geschiedene Erscheinungen. In jener beobachtete er Erbrechen, heftige Schmerzen des Unterleibes, grosse Schwäche und sehr schnellen Verlauf; die Verhretung der Krankheit war von contagiöser Mitwirkung frei und beschränkte sich auf London. Dem Gebrauch der Aderlässe, der Brech- und Purgirmittel erklärt Willis für schädlich, dagegen bewährte sich häufig ein allgemein gebrauchtes Volksmittel, Zucker mit Weingeist abgekocht, („*revelense quare epidemica*“) in dieser, nicht so in der rothen Ruhr. Willis gab den Theriak mit aromatischem Wässern, Laudanum, verordnete Umschläge u. s. w. Unter den innerlichen Mitteln kommt noch ein „*Spiritus fuliginis*“ vor.

Die rothe Ruhr herrschte im Herbst des eben so durch äusserste Strenge des Winters als grosse Sommerhitze ausgezeichneten Jahres 1671, auf London beschränkt. Auf dem Lande herrschten Quotidian- und Tertianfieber mit undeutlicher Apyrexis und soporösen Zuständen, Vielen noch später durch Uebergang in Phthisis verderblich. — Mit der rothen Ruhr verbanden sich sehr heftige Kolikschmerzen, aber selten Tod, trotz des oft sehr starken und langwierigen Blutverlustes, bedeutende Schwäche Statt. Apathie, Delirien u. s. w. brachen gewöhnlich nur nach unvorsichtiger Hemmung der Durchfälle aus. Die Abgänge selbst beschreibt Willis sehr genau<sup>2)</sup>. Therapeutisch verordnete derselbe den Adstringentien, vor Allem der Contrayerva, der *rustia eboris*, dem Theriak, dem flüssi-

1) Willis, *opp. anon. de medicamentis operationibus*, p. 28 seq.

2) „*Defectum in his Equilibrio et sanguine dilata tuncque, guttae hincque caruium, in alia crassiora, tuncque intusque ne itaque non aliter et non (non membrum fructu deficiente fuerit)*“



(1667.)

gen Laudanum u. s. w. mit aromatischen Wässern — Einiges Exanthema erwähnt Willis ebenfalls nicht.

## 1660 — 1680. Allgemeine Verbreitung der Wechselfieber, Ruhren und Petechialfieber auf dem Continent.

Aber nicht auf England allein beschränkten sich diese Gestaltungen des epidemischen Krankheitscharakters. Ueberall fast herrschten ähnliche Krankheiten; in den heißen Sommern der sechs- und siebenziger Jahre, besonders die Ruhr, und eine Fluth größtentheils werthloser Volksschriften deuten auf die allgemeine Furcht vor der Bösartigkeit der Krankheit. Uns beschäftigen nur die durch Bedeutung der Krankheit und Trefflichkeit der Beschreibung hervorragendsten dieser Uebel.

### 1667 und 1669. Wechselfieber zu Leyden. — Sylvius. Fanois.

Zu Leyden beobachtete Sylvius im heißen Sommer des Jahres 1667 sehr verbreitete, aber wenig bösartige, wenn auch äußerst hartnäckige Wechselfieber, welche in der Regel zu Anfange den Tertian-, später den Quotidianotypus darboten, zuletzt aber gar nicht mehr intermittirten<sup>1)</sup>. Sylvius erklärt indess die Krankheit, des letzteren Umstandes ungeachtet, doch für Wechselfieber, indem er ganz richtig das Wesen derselben nicht in ihrem Typus, sondern in einem besonders anderweitigen Leiden der Säfte sucht. Wenn man nun auch seiner Theorie, nach welcher allen Wechselfiebern eine Obstruction der Kanäle des Pankreas zu Grunde liegt, natürlich nicht beistimmen kann, so ist doch ersichtlich, dass Sylvius der Wahrheit weit näher kam, als viele unsere Vorgänger. Mit jener Ordnung und Klarheit, die an dem Einflusse dieses Arztes auf

1) Syllivius, opera medica. Amstel. 1688. 4. p. 794 seq.

seine Schüler so grossen Antheil hatten, beschreibt er die Zufälle der Krankheit. Die ersten, wie gesagt, deutlich intermittirenden, Paroxysmen waren vorzüglich durch einen heftigen Druck in der Magengegend und sehr grosse Herzensangst, Uebelkeit, Erbrechen galliger Stoffe, heftiges Aufstossen, Aphthen im Munde, die sehr häufig in kleine oberflächliche Geschwüre übergingen, grossen Durst, trockne, belegte Zunge, ähnen Geschmack u. s. w., ausgezeichnet. Hierzu gesellten sich heftiger Kopfschmerz, Schlaflosigkeit oder auch comatöse Zustände, Stuhlverstopfung oder Durchfälle, selbst dysenterische Erscheinungen, dumpfe Schmerzen in den Hypochondrien. Sylvius behandelte die Krankheit, die er für scharfen alkalischen Wesens hielt, mit gelinden Pflanzensäuren, zuweilen mit dem Aderlass, und mit den für die einzelnen Symptome angezeigt scheinenden Mitteln; der China geschieht keine Erwähnung.

Gleichen Wesens war auch Sylvius die äusserst bösartige Wechsellieberepidemie, welche im Sommer 1669 zu Leyden ausbrach, zu Anfang vorzüglich die höheren Stände in grösster Allgemeinheit betraf, und namentlich, erwachsenen und älteren Personen äusserst verderblich war. Sylvius betrachtet die Kälte des Frühlings dieses Jahres und die ihm folgende trockne Sommerhitze als die Ursache des Uebels. Viele nahegelegene Städte seyen weniger hart ergriffen worden, weil es ihnen nicht an Regen fehlte.

Interessant erscheint, wegen der Bestätigung, die sie einer kürzlich ausgesprochenen Ansicht über eine sehr häufige Ursache der Wechsellieber gewährt<sup>1)</sup>, die Bemerkung, dass die Epidemie zum Theil auch durch die Amdünstungen der salzhaltigen Wassermassen entstanden sey, welche nach der einige Jahre vorher Statt gefundenen Überschwemmung des Meeres zurückgeblieben seyen. Der unten genannte Vertheidiger der elektrischen Natur der Wechsellieberursachen macht aber be-

1) KIRCHMANN, die Krankheitsfamille Typhus. Zürich 1829.

[1663.]

sonders darauf aufmerksam, dass flache salzhaltige Wassertschichten mehr als grosse Ueberfluthungen Wechselfieber zu erzeugen pflegen.

Nach Funck's<sup>1)</sup> Angaben herrschten dieselben Fieber in ganz Holland und Westfriesland, vorzüglich auch zu Harlem. Die Krankheit trat mit allen Symptomen der Epidemie des J. 1667 auf, wurde aber theils durch die zur höchsten Höhe gediehene Steigerung dieser Symptome, theils durch die jetzt sich hinzugesellende Anwesenheit neuer weit verderblicher. Jetzt fand nur im Anfang Stahlverhaltung Statt, bald traten Durchfälle auf, welche die ohnehin äusserst bedeutende Niederlage der Kräfte noch vermehrten, dabei quälte die Kranken der furchtbarste Kopfschmerz, Schwangere abortirten, Andere bekamen Convulsionen, bei Manchen zeigten sich scarlatinische Flecken, bei Andern stellten sich Blutungen aus der Nase und dem After ein. Selbst der Eintritt des Winters setzte dem Uebel keine Schranken, obschon es seinen Charakter bestlich veränderte, und nun häufiger auch die Respirationsorgane ergriff. Sehr oft war es von erysipelatösen Affectionen, des Gesichts, des Schindens u. s. w. begleitet, die sich sehr leicht und zum grössten Verderben des Kranken auf das Gehirn versetzten. Bei Vielen bildeten sich Ödeme der Füsse, des Gesichts, Anasarca und Ascites. Ausserordentlich gross war die Genügsamkeit des Uebels zu Recidiven und zu Erzeugung langwieriger Nachkrankheiten. Sylvius kam dem Tode nahe. Er verlor in dieser Epidemie auch seine 22jährige Gattin, mit welcher er erst seit 2 Jahren verheirathet war, und seine einzige, kaum einjährige Tochter. — Ausserdem verlor die Universität Leyden mehrere ihrer berühmtesten Lehrer, den Theologen Coccejus, den Juristen van Thienen, den Naturforscher Schuyt, den Anatom van Horne, Sylvius Schüler, den Philosoph Stuart (der in Paris starb) u. a. m. — Am wenigsten ahnte wohl Sylvius, als er in der Rede, die er nach der Niederle-

1) N. d. Schriftensätze.



gang seines Beethorats hielt, welches in diese Zeit gefallen war, der Entschlafenen erwähnte, dass der Universität der grösste Verlust, — durch seinen eigenen Tod, — noch bevorstand. Er starb im J. 1672 nach längerer Kränklichkeit, einer Nachwehe jenes Uebels, an einem kösartigen Fieber <sup>1)</sup>. Die Sterblichkeit aber betrug in den höheren Ständen zwei Drittel der Erkrankten. Nach Fanois starben während dieser Epidemie, deren Sterblichkeit die des Jahres 1667 um das Sechsfache übertraf, zu Harlema wöchentlich 90, zu Leyden wöchentlich 300—400, im Ganzen 7000 Menschen und man würde das Uebel nicht allein wegen seiner Verheerungen, sondern auch wegen seiner Erscheinungen, für die Pest, mit welcher es selbst die Contagiositättheilte, haben halten müssen, wenn nicht Bubonen, Karbunkeln und Exantheme gefehlt hätten.

Die Angaben des letztgenannten Arztes, welchem die Sorge für die Armen übertragen war, erhalten theils durch die sehr genaue Schilderung der Krankheit, theils und vorzüglich durch den einfach natürlichen Charakter der durch keine haltlose Systematik geblendeten therapeutischen Grundsätze einen unfehlbaren Vorrang vor denen des Chemistrikers. Fanois war ebenfalls von der Wechselstiebernatur der Krankheit überzeugt, aber ein grosser Theil der von Sylvius für symptomatisch gehaltenen Zufälle, namentlich die Brechneigung u. s. w., galten ihm für Andeutungen des Weges, den die Natur selbst einzuschlagen zu unvernünftig war. Er begann deshalb die Kur fast stets mit einem Brechmittel, welches in der Regel sehr schnelle Hilfe brachte, und namentlich Fanois selbst, der ebenfalls von der Krankheit ergriffen wurde, die wesentlichsten Dienste leistete. Später verordnete er (geniss unethischer Weise, und nicht eben zum Vortheil der Kranken), Aderlässe und Schwitzmittel, bei welcher Behandlung er von 2000 Kranken 12 verlor zu haben versichert. Ein überaus günstiges Resultat, zu welchem indess vielleicht die nach Sylvius ge-

1) S. Schacht; *novus de ulcero Syphil. Syph. opp. med.* p. 922 seq.

[1672]

größere Ähnlichkeit der Krankheit bei den ärmeren Klassen einigen Antheil hatte.

### 1672. Ruhr in Thüringen. — Wedel, Loner.

Für die Ruhr dieser Zeit wollen wir nur noch auf die Angaben Wedel's und Loner's aufmerksam machen. Der Erstere<sup>1)</sup> beobachtete die Ruhr im J. 1669 zu Gotha und der Umgegend. Absonderlich tödtlich waren die Fälle, in welchen gleich Anfangs ohne alle sonstigen Beschwerden reines Blut abging, während Kranke mit vorzüglichen heftigen Koliken u. s. w. leicht genesen. — Loner's genauere Beschreibung betrifft die Ruhrépidemie des Jahres 1672 zu Weimar. Es waren ihr anhaltende Südwinde und sehr warme, mit Regen wechselnde Witterung vorausgegangen. Sie verscheute kein Haus, und an der meistmöglichen Verbreitung gesellte sich ein offenkundiges Contagium. Unter den allgemeinen Zufällen wurden Mattigkeit, Herzklopfen, Angst, Ohnmachten hervorgehoben, zu denen sich zuweilen Kopfschmerz gesellte. Vorzüglich interessant aber ist, wegen der aus ihr hervorgehenden erysipelatösen Natur des Uebels, die Erwähnung von Erythemen, welche kritisch waren, wenn sich Schweisse zu ihnen gesellten, und sie nicht zurücktraten, wozu sie sehr geneigt waren<sup>2)</sup>. Abgang von fäuligen Stoffen und „Karunkeln“ machte den Zustand hoffnungslos. — Dieselbe Epidemie war gleichzeitig auch im Gothaischen und Eisenachischen verbreitet.

### 1677. Ruhr in Dänemark. — Brand, Olaus Borrichius, Erasm. Bartholinus.

Aus einem Consilium der Copenhagener Facultät<sup>3)</sup> und den kurzen Angaben einiger dänischen Aerzte geht hervor, dass

1) Wedel, *Wollg., Act. Medicae. II.* 44. 45.

2) „Musculi valens in manibus ubique duri sunt non infansum maxime signum est salutis.“

3) Th. Bartholinus, *acta med. Medicae. ann. 1671—1673. III.* p. 189.

im J. 1677 die Ruhr zu Copenhagen und auf vielen andern Plätzen des Landes verbreitet war. Brand, welcher selbst erkrankte, wollte bemerkt haben, dass die Darmaufgänge sehr viele kleine Würmer enthielten, welche er, in Uebereinstimmung mit der damals beliebten *Pathologia animata* Kircher's, für die Ursache der Krankheit zu halten geneigt war <sup>1)</sup>. Wichtiger ist die Bemerkung von Olaus Borrichius, dass die Ruhr des Jahres 1679, dessen Sommer durch grosse Hitze und Trockenheit ausgezeichnet war, in Verbindung mit sehr verbreiteten Quartanfebern auftrat, welche sehr leicht in den anhaltenden Typus übergingen. Erasmus Bartholinus erprobte an sich selbst in dieser Epidemie die überaus günstigen Wirkungen der kürzlich von Willis, noch früher aber, im J. 1655, von Honoratus Fabri (pseudonym Antimus Conyginus,) einem römischen Arzte in einer eigenen Schrift empfohlenen Chinarinde <sup>2)</sup>.

**1672. Petechialfieber am Rhein. — Donckers, Cardilucius, Scherf.**

Wichtiger sind die im J. 1671 und den folgenden am Rhein verbreiteten hässlichen Petechialfieber, höchstwahrscheinlich zufolge der Ansteckung durch die französischen Truppen, welche nach Beendigung des Feldzugs in Holland unter Turenne sich in Köln sammelten, wo ein Theil der französischen Armee schon den Winter des Jahres 1671 eingebracht hatte. Die Erscheinungen der Krankheit waren die gewöhnlichen des Lagertypus; Delirien und Petechien fehlten niemals, und Ansteckung bildete, wie gesagt, die vorzüglichste Vermittelung der Weiterverbreitung. So umfänglich aber wie Doncker's Schrift durch die ausführliche und höchst ermüdende Ausführung aller einzelnen Beziehungen der Krankheit ist, so gering ist im Ganzen ihr Werth für die Förderung der

1) Paul Brand, *ibid.* III, p. 56. — Brand war als Feldarzt thätig.

2) Die Schrift Fabri's finden wir nirgends erwähnt.



[1673.]

Kenntnis und Behandlung des Uebels, bei welcher letzteren Abführmittel, Venisectionen und Alexipharmaka eine Rolle spielen, welche, trotz der Einschränkungen in Bezug auf erstere, zu den weit geläufigeren Grundsätzen anderer Aerzte der damaligen Zeit in einem nicht sehr vortheilhaften Gegensatz steht.

Dieselbe Krankheit beschreibt Cardilmeins unter dem Namen der ungarischen Hauptschwachheit. Natingenässer und erfolgreicher behandelte er dieselbe mit seinem „*Centaurium minerale*“ einem Brechen erregenden Antimonialpräparate.

Schief beobachtete diesen Petechialtypus zu Strassburg<sup>1)</sup>. Aus dem von Ozannus aus seiner aus nicht zu Gehote stehenden Schrift mittheilt, geht eine besondere Eigentümlichkeit dieser Epidemie nicht hervor<sup>2)</sup>.

Die weite Verbreitung aber der diese Erkrankungen bedingenden constitutionellen Verhältnisse (— das J. 1673 war durch Ueberschwemmungen ausgezeichnet —) ergibt sich auch aus der Allgemeinheit desselben Uebels zu Kopenhagen, wo es nach Küllien<sup>3)</sup> vorzüglich mit Brustaffektionen auftrat, welche häufig Phthisis nach sich zogen. Der Aderlass war unbedingt schädlich. Ganz besonders aber geschieht in dieser Zeit des „Wundstiebers“ Erwähnung, einer Varietät des Typhus, wie sie zu allen Zeiten mehr oder weniger vorkommen pflegt, bei welcher man aber stets auch ein häufig ganz bedeutungsloses Krankheitsprodukt mit der Krankheitsursache zu verwechseln geneigt war. Mehrerer solcher Epidemien erwähnt Bonetus, der einen als eines im J. 1659 bei der Belagerung von Kopenhagen<sup>4)</sup> herrschenden löstartigen Petechialfieber, bei dem die Kranken unter grossen Magen- und

1) Scherf, Math., *De febre petentiali: quae ante biennium Argentorati et cunctis infestata*. Argent. 1676. 4.

2) Ozannus, III, 146.

3) Küllien, Casp., *Petrix febrium acut. Hafniae frequentia*. In Th. Bartholinus *act. med. Hafniae*, v. 1671—1679. II, p. 285 seq.

4) HENRIQUE, *opusc. script. med. lib. IV*, p. 1193. (*De phthisica Hafniae*) übertrifft Ozannus: *pendant le siège de Hano*.<sup>24</sup> (I).

Darnachmerzen Wärmer erbrachen und gesund wurden. Eine Nachricht erzählt im J. 1676 ähnlicher Fieber auch für die Gegend von Coburg, wo sich zu dem Bedrängnisse des Krieges Hunger und Elend jeglicher Art gesellte <sup>1)</sup>.

### 1675 — 1684. Pest auf der Nordküste von Afrika, in Spanien, Ungarn, Oesterreich, Deutschland.

Mit dem J. 1677 wiederholt sich von Neuem eine Epidemie der Pest, die an Ausbreitung nur von wenigen übertroffen worden ist, und bei welcher die rein contagiöse Verschleppung wieder nicht dem geringsten Zweifel unterliegt. Schon im J. 1676 hatte sie zu Algier und Marocco die furchtbarsten Verheerungen angerichtet, und bald sollte auch das durch einheimisches Uebel schon genug bedrängte Europa von zwei Seiten her ihre ganze Wuth fühlen <sup>2)</sup>. Denn fast gleichzeitig brach sie über Spanien, Galizien, Ungarn und Oesterreich herein. In Syrien war Malaga der erste nachweislich durch contagiöse Vermittelung ergriffene Punkt. Durch Vernachlässigung der Sperre gelangte dieselbe bald auch nach Antequera, Murcia, Carthagena, Granada, Velez, Ronda u. s. w. Mit grossem Erfolge bediente man sich in dieser über ein Jahr andauernden Epidemie des Limonenanflusses <sup>3)</sup>.

Ueber die Verbreitung der Krankheit nach Ungarn und Oesterreich von der türkischen Grenze aus stehen uns, ausser denen der Lehenwäldt'schen Chronik, nähere Nachrichten nicht zu Gebote. Sorhait bemerkt nur, dass sie seit dem J. 1675 in der Türkei und in Polen geherrscht habe.

1) Basilius, *De morbis epidemics et febre pestilenti*. Cöln 1676. 8. (Popular.)

2) Cressner, (Marocco, Vol. II, p. 166.) gibt die Zahl der Ungelkommenen auf 4 Millionen an!

3) Cressner, *Descriptio morbi dybolic*, p. 1659.

1679. Pest zu Wien. — Sorbait, Abraham a  
Santa Clara.

Schrecklich blühte vor Allen die reichbevölkerte Kaiserstadt für die unverantwortliche Sorglosigkeit ihrer Behörden, die um so unverzeihlicher erscheint, als Sorbait schon bei den ersten verheimlichten, vorzüglich das gemeine Volk betreffenden <sup>1)</sup> Pestfällen in der Leopoldstadt, welche die Scheu, sich die nahende Gefahr einzugestehen, nicht als solche gelten lassen wollte, dringend zur Anordnung der strengsten Massregeln rief, und sich auf das Beispiel Venedig's berief, welches hundert Jahre zuvor für einen ähnlichen Fehler nur zu grausam bestraft worden sey <sup>2)</sup>. Unnoth! man vernahmte jede Vorsicht, an irgend eine Sperrre war nicht zu denken, gar bald überschritt die Krankheit den Danubium und erst als sie nicht mehr gebädigt werden konnte, dachte man daran, ihr einen schurzen Widerstand entgegenzusetzen. Aber auch da noch fehlte es an Allen, an Aerzten, Krankenkütern u. s. w., selbst an Wagen zur Bestattung der Todten, indem ein grosser Theil der Einwohner die Stadt, welche ausser der Krankheit noch von Theuerung bedrängt wurde, verlassen hatte. In einem Gebäude brachte man die Kranken sowohl als die Verdächtigen und Genesenden unter, und erst spät errichtete man in dem sogenannten Beckenhäusel eine Reconvalescentenanstalt.

So gross die Verdienste Sorbait's sind, so wenig war es doch von Vorurtheilen und selbst von Aberglauben frei. In furchtsamer Beschränktheit erklärt er die Untersuchung der Pestleichen für unnütz, weil an dem Charakter der Krankheit doch nicht zu zweifeln sey; im Glauben an eine Verpestung der Luft, deren Zeichen er in australischen Conjunctionen, in dem Hinwegziehen der Vögel, in dem Sterben der Katzen, Kanarienvögel und in der grossen Menge der Kröten entdecken wollte, rief er, obschon erfolglos, zur Anzündung grosser

1) Abrah. a St. Clara, Merk's Wien, S. 69.

2) de Sorbait, Freundsliches Gespräch u. s. w.



Feuer und zum Abbrennen der Kanonen. — Im Anfange der Epidemie bemerkte man sehr häufig Abgang von Wärmern; die Krankheit trat häufig mit einem intermittirenden Typus auf, und die Bahonen bildeten sich häufig sehr langsam und unvollständig, woran offenbar das zu starke schweisstreibende Verfahren der Aerzte Schuld war. Taubheit war zu Anfang der Krankheit ein eben so ungünstiges Zeichen, als ihr Eintritt nach der Krisis Genesung hoffen liess. Uebrigens bestätigt Sorhait die häufig gemachte Beobachtung, dass nach Genesung über ziehende Schmerzen in den Achseln und Weichen klagten.

Die Sterblichkeit in dieser Epidemie war furchtbar. Dieselbe betrug nach Einigen 190,000. Beintema<sup>1)</sup> gibt die Zahl derselben officiell auf 76,921 an, sagt aber selbst, dass dieselbe um die Hälfte zu klein sey<sup>2)</sup>. Auf der Höhe der Epidemie starben einige Monate lang je 25,000, trotzdem dass der Hof und ein grosser Theil der Einwohner gedehet war<sup>3)</sup>. Am furchtbarsten wüthete sie im September. Beintema macht diese Bemerkung bei Gelegenheit der Pest des Jahres 1710, in welcher der Einfluss der, obgleich immer noch sehr unvollkommenen Spermaaregeln, sich so vorthellhaft herausstellte, dass wöchentlich nur 200—400 starben, obgleich Niemand die Stadt verliess.

Der berühmte Abraham a Santa Clara schildert diese Schreckenzeit mit der ihm so eigenthümlichen Originalität in seinem „Merk's Wien!“ Einzelne Angaben sind auch historisch nicht uninteressant. Mehrere hundert Priester starben, augenscheinlich in der Öärzubeckthe zugesteckt, indem sich sonst die Klöster sehr gut zu verwalten wussten. Abraham führt eine grosse Zahl derselben namentlich an. Auffallend war die grosse Sterblichkeit der Frauen, namentlich der den Einkauf der Lebensmittel besorgenden Dienstmädchen, deren Tod-

1) Beintema, p. 21.

2) Abrah. a St. Clara beschreibt als auf 50,000.

3) Der Hof wandte sich zuerst nach Maria Theresienstadt, einem berühmten Wallfahrtsort, dann nach Prag. — Abrah. a St. Clara, Merk's Wien

[1678.]

tenzahl Abraham auf 7000 angibt. Von der grossen Zahl der Aerzte (Abraham führt 27 der thätigsten namentlich an) starben nur sechs.

#### Wienerisch-Neustadt. Grätz. Prag.

Von Wien aus verbreitete sich die Pest nicht allein über den grössten Theil der Monarchie, sondern auch fast über ganz Deutschland. Wienerisch-Neustadt wurde das Schicksal der Hauptstadt getheilt haben, wenn ihm nicht in dem Cardinal Graf Leopold Kallanitsch, Bischof der Stadt, der schon früher als Malteserritter eine Pest auf Malta erlebt hatte, ein Retter geworden wäre. Durch seine Fürsorge gelang es, die Zahl der Erkrankenden auf 200 zu beschränken, von denen sechszig starben<sup>1)</sup>.

Steyrermark und namentlich Grätz wurde erst im December 1679, und zwar auf unwidersprechlich contagiösen Wege ergriffen. Die günstige Lage der Stadt verhinderte die so wichtige strenge Grenzinsicht, und so kam es, dass trotz der besten Massregeln 2340 starben. Die Regierung sah sich der Bedrängten auf das väterlichste an; Beskmann rühmt bei Lehenwaldt ganz besonders den Eifer des Ober-Pest-Commissarius Georg Siegfried Graf von Dietrichstein, so wie des Oberarztes Bevilacqua. Indessen wurde Grätz, wo die Pest erst im März 1681 völlig erlosch, und ganz Steyermark schon im J. 1683 wieder befallen.

Von der Geschichte der Pest zu Prag ist uns Nichts bekannt, als dass sie in den Monaten Mai, Juni und Juli des Jahres 1680 83,010 Menschen tödtete<sup>2)</sup>.

#### 1680. Pest zu Leipzig. — Bornkrenn, Rivinus.

Die ältesten Nachrichten zeigen uns das gefährliche aber trotz der Erneuerung sanitätpolizeilicher Vorschriften und zahl-

1) Vergl. die zu Ende dieses Abschnitts genannte Schrift Hakeransch's.

2) Heilich, (s. unten).

loser Volksbelehrungen <sup>1)</sup> wohl selten energisch genug abgehaltene Uebel im Herzen Deutschlands. Die Krankheitsconstitution dieser Zeit, mochte sie nun einen Einfluss auf die Verberberung haben oder nicht, war jedenfalls geeignet, die Heftigkeit der individuellen Erkrankungen zu steigern.

Die Nachrichten über die Leipziger Epidemie rühren von einem Ungenannten und von Rivinus her. Der Erstere <sup>2)</sup> bewährt sich als ein durchaus tüchtiger Arzt und als strenger Contagionist. Schon seit zwei Jahren hatten Quotidian-, Tertian- und Quartanfieber, so wie bösartige Petechialfieber geherrscht, und kaum ein Haus war von diesen Uebeln frei geblieben. Vorzüglich litten die ärmeren Klassen, Weiber mehr als Männer. Die Wechselfieber schienen selbst contagios zu seyn, und verlangten zu ihrer Heilung die doppelte Dosis der Fiebermittel; trotzdem aber machten sie häufige Recidive und Uebergänge in Geschwülste aller Art, Wassersucht und Schwinducht. Neben diesen heftigeren Uebeln waren katarrhalische Fieber sehr verbreitet, die ebenfalls sehr leicht einen bösartigen Charakter annahmen, und sich durch ihre geringe Neigung zu Schweisakrisen auszeichneten.

Die Witterung des Jahres 1680 war unbeständig; es gab viel Regen und sogenannte Neffen, Diarrhöen und Ruhren waren an der Tagesordnung. Die Petechialfieber wurden häufiger und oft schon nach wenigen Tagen tödtlich. Vorzüglich interessant ist die schon häufig gemachte Beobachtung, dass sich, vorzüglich bei Kindern und jungen Leuten, Buhenen zu denselben gesellten, die aber durch Schweißmittel, erweichende Umschläge und Vesicatorie leicht gehoben wurden. Im August endlich stellte sich die wahre Pest in der „durch

1) Unter den „Belehrungsanordnungen“ nimmt sich vorzüglich die Sekelschicks vom J. 1686 an, an deren Abfassung Crato von Krautheim, Bekker und Ruckmann Theil hatten. Sie wurde im J. 1719 erneuert.

2) Leipziger Pöschke und Göttingerode. — Auf unserer Ausgabe ist kein Verfasser genannt. Dagegen existirt eine andere (Altenb. 1686.) wo als solcher Dürckrell angegeben ist.



[1688.]

Verwahrlosung<sup>1)</sup> eingesteckten Stadt ein, und wurde im Anfange häufig mit den Wechseljahren verwechselt. Die Frauen traten bei derselben oft zurück, zumal wenn sich Blut- und Bauchflüsse einstellten. Einzelne stürzten plötzlich apoplektisch auf der Strasse nieder. — Uebrigens bestätigt der Verf. die in dieser Epidemie allgemein beobachtete rasche Steigerung des Geschlechtstriebes.

Die Schrift von Rivinus verdient die grössere Bekanntheit, welche ihr zu Theil wurde, vorzüglich wegen der Vorurtheillosigkeit ihres Verfassers in Bezug auf Punkte, die damals noch bei der Mehrzahl der deutschen Aerzte ein grosses Gewicht behaupteten. Zur äusseren Geschichte der Leipziger Epidemie enthält dieselbe Nichts; desto schätzbarer sind ihre nosographischen Bemerkungen. Vor Allem ist rühmend hervorzuheben, dass Rivinus, als strenger Contagionist, die Meinung von einer besonderen, die Entstehung der Pest begünstigenden Luftbeschaffenheit, von dem Einfluss häufig beobachteter Insekten, Kometen u. s. w. (im November 1681 erschien der Halley'sche Komet —), für völlig grundlos und von jeder Causalbeziehung entblösst erklärt. Eben so erklärt er das Tragen von Amuleten, zu denen man sich in dieser Zeit am häufigsten des regulinischen Quecksilbers in einer Federspule, oder des Arseniks, am Habes getragen, statt der früher gebräuchlichen Edelsteine bediente, für sinnlos. Auf Gemüthsaffekte dagegen legt er ein bedeutendes ätiologisches Gewicht.

Aus den besonderen Erscheinungen bei der Leipziger Pest könnte man fast auf einen gewissen Einfluss der kurz vorher beobachteten Frieselconstitution<sup>2)</sup> zu schliessen genügt seyn, indem Rivinus bemerkt, dass dem Ausbruche der Pest nicht allein bei Vielen grosse Mattigkeit, Kopfschmerz, Herzensangst, Reizen in den Gliedern, Convulsionen vorausgingen, sondern auch zuweilen als sehr stürmisches Symptom der Ausbruch einer „*Purpura sibilans*“ beobachtet worden wäre. Zu Anfang der Epi-

1) Hoyer, S. S. 259.

2) S. unten den Abschnitt über den Friesel.

denne war der Eintritt kritischer Schweisse die Hauptbedingung der Genesung, und auch später bewährten sie neben den örtlichen Krisen ihre bekannte Bedeutung. Dagegen waren Durchfälle höchst ungünstig. Sectionen wurden nicht angestellt.

Der brave Rivinus nahm sich der Erkrankten mit der grössten Unerachtheiligkeit an, und vernahm vor Allem jede Andeutung einer Furcht vor einer gefahrvollen Krankheit<sup>1)</sup>. Wie sehr contrastiren damit die abgeschmackten und feigen Mummereien der Marseiller Aerzte in der vierzig Jahre späteren Pestepidemie! — Bei seiner höchst einfachen Behandlungsweise schwebte ihm stets das Beispiel von der Mye's vor, der in der Pest von Breda (eigentlich spricht indess der Genannte vom Scorbut<sup>2)</sup>), Viele mit destillirtem Wasser heilte. — Niemals wandte Rivinus den Aderlass an, und erklärte selbst günstige Erfolge desselben durch die Energie der Naturheilkraft. Ebenso verwirft er, im Allgemeinen wohl mit geringerem Rechte, die Brechmittel, „weil Niemand bei einer mit Durchfall oder Blutungen anfangenden Krankheit diese Ausleerungen befördere.“ Eben so wenig hält er von Mercurialsalben, Einreibungen von Scorpion- und Krötenöl u. s. w.

#### 1684 — 1684. Pest in Thüringen, im Braunschweigischen u. s. w.

Bei der lebhaften und bedeutenden Verbindung Leipzig's mit dem übrigen Deutschland konnte es nicht fehlen, dass die Pest, die zudem schon im J. 1679 Baiern, Schlesien, Schwaben, Sachsen und Brandenburg befallen hatte<sup>3)</sup>, gar bald fast überall verbreitet war. Speciellere Erwähnung geschieht

1) Rivinus, p. 29. „*Atque cum, si fieri potest, animum (per discipulos) detulit, ut saltem ejus periculum, non tantum a medico, sed ab omnibus reliquis. Quid potest pestis ingrum, si medicus cum cunctis plane detinet, sed si accedens in limine cubitali haeret, aut post ingressum in alium aliquem narca obtorcet, palam sibi alligatus audit, plerumque vixit oblongius brevisque exultat exultans curae.*“

2) S. oben S. 134.

3) Sander, (S. unten.)

[1681.]

für Magdeburg, Halle (welches erst im J. 1682 ergriffen wurde), Halberstadt, des Braunschweigische, Erfurt und Mühlhansen<sup>1)</sup>. Mehrere Stülte, wie z. B. Weissenfels und Langensalza blieben „durch gute Veranstaltung“ frei. Auch Jena wurde nicht befallen. Wenigstens verwahrte sich der akademische Senat durch einen Erlaß vom 25ten September 1683 vor einem derartigen Gerüchte.

### 1681 und 1682. Pest zu Magdeburg und Halle<sup>2)</sup>.

„Die Pest war schon seit einem halben Jahre in den Baracken der Stadt herumgeschlichen, die auch deshalb abgebrannt worden waren, als sie sich im Mai 1681 zum ersten Male in der Stadt selbst, in einem Hause am breiten Wege, zeigte. Nun verbreitete sie sich lothd überall, und selten kam in den Häusern, wo sie einkohete, einer mit dem Leben davon. Anfangs liess der Magistrat das Augustinerkloster zum Lazareth einrichten, nachher aber, als das Uebel überhand nahm, musste es einem jeden Bürger überlassen werden, seinen Kranken selbst Hülfe zu schaffen. Uebrigens geschahen alle Verkehungen, die man nur nöthig achtete. Die Garnison ward theils auf dem Marsch und in die äusserste Schanze (die jetzige Friedrichsstadt), theils in die Graben der Festung abgeführt. Die Thore wurden gesperrt und ohne Pass des Vice-Gouverneurs Niemand aus der Stadt gelassen, und die Wege um die Stadt wurden von Dragonern besetzt. Vom Magistrate wurden Leichenträger und Wärter und Wärterinnen angestellt, und gewöhnlich solche Leute dazu genommen, die die Pest überstanden hatten, und die angesteckten Häuser wurden mit Kreuzen bezeichnet.

1) Meyer, Joh. G., Ausführliche Darlegung des ansteckenden pestilenzialischen Senehen, welche öftliche Jahre hier in Europa geriret. Gotha, 1718 S. (Uebrigens bebiutungslos.)

2) Wir benutten hier, vollständig wörtlich, Magdeburgisch-Hallerscheische Klätter, herausgeg. von Barkhausen und Jacob, Fehmer und Jahn 1801, in deren Druck wir durch die Güte des Hr. Reg.-Med.-Raths Dr. Andree zu Magdeburg gelangt sind.



Die Krämer mussten ihre Buden auf dem Marsche aufschlagen, und der Markt ward vor das Sudenburger Thor, und als die Sudenburg ebenfalls der Pest verdächtig ward, vor das Ulrichsthor verlegt. Geld und Waare reichete man einander mit langen Stangen zu. Theuerung herrschte übrigens nicht. Im September nahm die Pest sehr überhand. Die Kirchhöfe wurden zu eng, und man musste ein Stück Land vor den Thoren dazu kaufen. Das meiste Sterben war unter den Armen und unter den jungen Eheleuten. — — Trotz der schrecklichen Vorstellungen, die man sich von einer strafenden, rächenden Gottheit machte, trotz des Schandhaften der Plage, sollen auch nach gleichzeitigen Zeugnissen die Immoralität und Nachlässigkeit der Leute, Unmässigkeit, Schwelgerei, Hareerei, unbeschreiblich gross gewesen seyn, und besonders Dieberei während der Pest sehr zugenommen haben.

Mit dem neuen Jahre endlich begann die Pest abzunehmen, und im Frühling hörte sie auf. Die Freude darüber war, wie sich denken lässt, ungemein gross. In wenigen Wochen geschahen 163 Trauungen, und damit der Abgang der Menschen baldigst ersetzt werde, verging kein Tag ohne Hochzeitsfeier. Das Militair ward, um die übriggebliebenen Bürger mit doppelter Einquartierung zu versehen, indem viele Häuser ganz leer geworden waren, erst am 8ten December 1682 in die Stadt zurückgeführt.

Die Anzahl der vom Junius bis zum December 1681 in der Stadt und den Vorstädten an der Pest Verstorbenen wird auf 4224 angegeben. Mit Einschluss der im J. 1680, im eigentlichen Pestjahre, vor dem Junius und im Frühjahre 1682 an der Pest Verstorbenen kann die Totalsumme leicht zwischen 6—8000 betragen haben, wie man sie hin und wieder angegeben findet.

In Halle brach die Pest auffallender Weise erst im J. 1682 aus, so wenig man auch die eigentlich wirksamen Vorsichtsmaxregeln in Thätigkeit gesetzt hatte. „Ein Paar Kinder immer Leute auf der sogenannten Brauns-Warte starben plötz-

[1661.]

sich dahin, und man gab Auswärtigen, welche sich deshalb schriftlich erkundigten, zur Antwort: die Krankheit, woran die Kinder gestorben wären, sey nur ein gemeines Fleckfieber und keineswegs die Pest. Der Wundarzt, welcher die todtten Körper besichtigte, gab ein schwankendes Gutachten, und darauf gründete der Magistrat seine Berathungen. Es entstand ein Gerücht, dass ein Seifensieder aus Halle durch alte Kleidungen, welche er aus Eisen gebolt, die Seuche eingebracht habe. Man untersuchte die Sache, konnte aber nichts Gewisses herausbringen, und der Magistrat blieb bei seinen Versicherungen, dass sich nichts Verdächtiges finde. Verschiedene, welche in ihren Briefen an Auswärtige das Gegentheil äusserten, wurden mit Gefängniß bestraft, oder doch nachdrücklich damit bedrohet, wenn sie sich ferner unterständen, die Stadt zum Nachtheil ihres Gewerkes in bösen Ruf zu bringen, kurz, die gegenseitigen Beschuldigungen und die Versicherungen der Reinigkeit nahmen kein Ende. Unter Andern findet sich in den Akten ein Schreiben der Universität Leipzig an den Rath zu Halle, worin jene sich beklagt, dass dem Vernehmen nach ein Uebelgesinnter aus Leipzig nach Halle gemeldet habe, die Pest sey zwar dort nicht mehr, aber dagegen äussere sich die *læta venerea*, welches grundlose Gerücht der Universität leicht nachtheilig werden könne; diese bittet daher, den Diffamanten zu erforschen und nachdrücklich zu bestrafen.

Der Magistrat zu Halle that indessen Alles, was in seiner Macht war, um nicht nur das Gerücht der eingeschlichenen Seuche zu unterdrücken, sondern auch die fernere Verbreitung des Uebels so möglich zu verhüten. Die verdächtigen Häuser wurden gesperrt, arme erkrankte Personen in's Lazareth gebracht, öffentliche Aufzüge verhindert, und einige geringe Leute, welche an dem sogenannten Fleckfieber gestorben waren, mitten des Nachts heimlich und ohne Aufsicht begraben werden. Die Geizlichkeit beschwerte sich zwar über diese ihren Einkünften nachtheilige Nothwendigkeit, und die Regierung und das Consistorium gab dem Magistrat einen Verweis, dass er sich

zumasse Verfügungen zu machen, welche zu den Episcopalrechten gehörten; der Magistrat aber vertheidigte sich mit dem, was gute Polizei und öffentliche Vorsorge, zumal unter damaligen Umständen, erfordern. Dabei blieb es denn nicht nur diesmal, sondern in der Folge, bei überhand nehmender Contagion, wurden alle Leichen des Nachts ohne Ceremonieen hinausgetragen.

In den letzten Monaten des Jahres 1681 und auch im Anfange des Jahres 1682 war die Sterblichkeit in Halle nicht ausserordentlich gross, und der Charakter der bössartigen Krankheit, woran einige, zumal arme Leute starben, blieb immer noch einigermaßen zweifelhaft. Erst den 8ten Februar 1682 meldete der Pestarzt Purpius<sup>1)</sup>, dass er gedachten Tages zu dem Sohne eines Buchdruckers im goldenen Arme in der grossen Ulrichsstrasse, Namens Walther, gerufen worden sey. Bei diesem habe er einen bösartigen und noch andere Zufälle gefunden, wovon er nach seinen Erfahrungen und nach seiner geleisteten Eidespflicht bekennen müsse, dass derselbe *simpliciter* an der wahren Pest laborire. „*Nunc quocumq; o Patres,*“ setet er hinzu, „*procedite, non palant amplius portas Hannibal, sed intra moenia est<sup>a</sup> etc.*“ Der Magistrat blieb indess bei seinen bisherigen Vorkehrungen, um die Verbreitung des Uebels in der Stadt so viel als möglich zu vermindern, und bei seiner Versicherung, dass die Luft in Halle noch rein sey. Purpius bezeugte auf Erfordern schriftlich ein Gleiches nach Amt- und Eidespflicht noch unter'm 1sten März 1682, ohne Rücksicht auf seinen vorhingedachten Bericht vom 8ten Februar, in welchem er aus Amt- und Eidespflicht das Gegentheil sagte.

1) Dieser Purpius hatte schon in Leipzig das Amt eines Pestarztes versehen, und man versprach ihm kräftentlich 6 Thlr., schuld aber *flagrans moebus* wäre, 33 Thlr., und überdem sollte er von Personem, welche nicht eigentlich zu der dinstigen Klasse gehörten, noch ein billiges Honorar fordern können. — *Flagrans moebus* wurde so bestimmt: wenn die Regierung, welche damals in Halle ihren Sitz hatte, dergleichen die Besatzung die Stadt verliesse, und wenn auf den Wänden öffentlich die Seuche wegen geteilet würde.



[1682]

Endlich, da es gar nicht mehr geleugnet werden konnte, dass die Pest in Halle sey, suchte man das Uebel geringer vorzustellen. — Es wurden nun in den benachbarten Städten, von welchen einige noch nicht angesteckt, andere aber von der Seuche wieder befreit waren, bestimmierte Befehle gegeben, die Stadt Halle bei Leib- und Lebensstrafe zu meiden. Indessen war diese, übrigens sehr unzureichende, Sperrung doch auch für die Nachbarn selbst mit grossen Beschwerden verknüpft. Halle war der Ort, wo sie ihr Salz holten, und man truf daher mit dem Magistrat und der Pflünerschaft ein Abkommen dahin, dass das Salz von Halle nach der sogenannten Breithauscherke und nach Dierskau gebracht werden sollte, um dort von den Salzgästen abgeholt zu werden. Da endlich auch diese Orte angesteckt wurden, liess man offene Salzschuppen zu Niederlagen im freien Felde, und die Wochenmärkte, wohin die Landleute ihre Lebensmittel brachten, mussten ausserhalb der Stadt vor den Thoren gehalten werden.

In den ersten Monaten des Jahres 1682 war die Menge der Todten eben nicht so ausserordentlich gross, wiewohl sie die gewöhnliche Anzahl schon um das Doppelte überstieg. Im Monat Mai und Junius aber vermehrte sich die Mortalität auf eine furchterliche Weise, und deansch war sie noch gering gegen die in den Monaten Julius und August. Aus dem sehr genau geführten rathhändlichen Todtenregister ergibt sich, dass anhumals in einer einzigen Nacht einige 60 Leichen hinausgetragen wurden. — —

Es ist schwer, ohne viele einzelne Facta anzuführen, den jammervollen Zustand, worin sich die Stadt damals befand, darzustellen. Man dachte auf mancherlei Mittel, die allgemeine Niedergeschlagenheit zu vermindern, und die Aufmerksamkeit von Gegenständen abzuziehen, deren beständige Betrachtung das Uebel vermehrte. Einmal hatte man die Idee, täglich zu gewissen Zeiten vom Thurne Musik machen zu lassen, um die Einwohner aufzuheitern! —

Alle öffentliche Gewalt war in dieser Zeit aufgelöst, weil es an Mitteln fehlte, die Auctorität der Obrigkeit aufrecht zu erhalten. Die Gerichtsdienner waren zum Theil verstorben, und zum Theil versagten sie den schuldigen Gehorsam. —

In den beiden folgenden Monaten, September und October, war die Seuche beinahe noch eben so mörderisch, liess aber gegen Ende des Jahres immer mehr nach. — Im Januar des Jahres 1683 hörte sie ganz auf.

Die Anzahl aller im Todtenbuche namentlich und sehr genau verzeichneten Todten war in dem eigentlichen Pestjahre:

im Januar	61
- Februar	61
- März	72
- April	112
- Mai	197
- Juni	288
- Juli	653
- August	1190
- September	971
- October	529
- November	142
- December	78

Dazu auf dem Oberpetersberge diejenigen, deren Todestag auf dem Rathhause nicht angezeigt worden ist . . . . . 36

Mithin überhaupt 4297

Unter dieser Zahl sind aber die Todten aus den sogenannten Amtsvorstädten Neumarkt und Glaucha nicht mit begriffen, weil es an richtiger Aufzeichnung derselben und an vollständigen Archivsnotizen fehlte. Uebrigens sind auch die Todten der Judenschaft nicht unter der gedachten Summe.

Es fragt sich nun, wie sich jene Mortalität zu der damaligen Bevölkerung von Halle verhalte. — Nun waren aber zuvor gestorben:

[1682.]

im Jahre 1681	— 253
— 1680	— 343
— 1679	— 374
— 1678	— 361
— 1677	— 287
— 1676	— 385

also in sechs Jahren 2143

nithin jährlich nach einem sechsjährigen Durchschnitt 357. Multiplicirt man diese mit 30, welches ungefähr das Verhältniss der Lebenden zu den Sterbenden in Halle ist, so ergibt sich daraus eine Bevölkerung von 10,710, wovon beinahe fünfteihntausend ihr Leben einbüssten. Es gibt nur wenig Beispiele einer so heftigen Epidemie, doch muss dieselbe das Jahr zuvor in der Stadt Eisleben noch weit mörderischer gewesen seyn. In einem Schreiben des Raths zu Eisleben an den zu Halle vom 2ten August 1681 meldet jener, „dass seit Pfingsten dasselbst schon 7000 Menschen in der Stadt gestorben, und dass weder Aerzte noch Prediger mehr da wären, zumal die beiden letzten an dem Tage, an welchem der Brief abgegangen sey, sich auch gelegt hätten; dass es in der Stadt an Allem fehle, und dass das Getreide im Felde verderben müsse, weil keine Leute übrig geblieben wären, welche es einsammeln könnten.“

#### **Pest zu Halberstadt und im Braunschweigischen.**

Eine sehr specielle Darstellung der Halberstädter Epidemie nach gleichzeitigen Acten von Horn <sup>1)</sup> hat sehr geringen historischen Werth, und zeigt die grosse Unbekanntschaft ihres Verfassers mit der Geschichte der Pest überhaupt. Diese Pest rief auch dort zahllose Verordnungen, aber auch noch zahllosen Streit, Unbeholfenheit und Charlatanerie hervor.

Ueber die Verheerungen im Braunschweigischen hat Sander einige Notizen mitgetheilt <sup>2)</sup>. Der erste befallene Ort

1) S. 2. Schöffners.

2) Sander, im Braunschweig. Magazin, 1827. 2tes Stück. — Hr. Med. R.



war das Dorf Börnecke bei Blankenburg, wohin die Krankheit am 28sten Juli 1681 durch ein aus Magdeburg kommendes Dienstmädchen gebracht wurde, welches auch bald darauf starb. Die Seuche währte dazwischen bis zum 1sten April 1682, nachdem sie 137 Personen befallen hatte, von denen nur 35 genasen. Von hier aus wurde das, ebenfalls Braunschweigische, Dorf Benzingenode angesteckt, wo vom 20sten October 1681 bis zum 26sten Januar 1682 97 Personen erkrankten, von denen 34 genasen. Noch im J. 1681 ergriff die Seuche Bennekenstein, Klettenberg, Nordhausen und das Eichsfeld. Hokegeiss, 10 Meilen von Bennekenstein, blieb frei. Nordhausen verlor 3500 Einwohner, wahrscheinlich mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung. —

Ausser den von uns benutzten handeln über diese Pest noch folgende Schriften.

Der röm. kaiserl. zu Hungarn und Böhmen Königl. Majestät, Leopoldi I., Erzerzogs zu Oestreich u. s. w., neue Infectionenordnung, wie es insgemein in allerhöchster Haupt- und Residenzstadt Wien, Leopoldstadt und allen andern unliegenden Vorstädten, wie auch den ausser dem wienerschen Burgfrieden gelegenen Orten, als zu St. Ulrich, Neustift, Neuhau u. s. w., in den Infectionssachen u. s. w. zu halten. Vom 9ten Januar 1679.

Habersac, J. Car., Relation, welcher gestalten die wienersche Neustadt mit der Pest angesteckt worden. Wien 1681. 8.

Redlich, Paul, *Historia pestis Pragensis anni 1681.*

C. W., Einfältiger Discours über den jetzigen Zustand der Contagion. — 1681. 4.

*Histoire de la peste d'Allemagne, son progrès, les ravages qu'elle cause etc.* — 1680.

---

Sander hat von Karas eine ausführliche Arbeit über die Geschichte dieser Braunschweigischen Pest, namentlich über die gegen dieselbe mit Erfolg in Wirklichkeit gestatteten Schutzmassregeln, nach gleichzeitigen Acten besichtigt.

[3490.]

Ladew, Mart., *Trophaeum medicum de peste in comitatu  
Blancburgensi erectum. Halberstad. 1684. —*

# 1680 — 1684. Viehseuchen. Wechsellieber.

Neben dieser Pest fehlte es indes noch nicht an mannich-  
facher Krankheitsbedrängnis anderer Art, begleitet von Wit-  
terungsabnormalitäten und schnellem Wechsel der atmosphä-  
rischen Zustände. Hatte sich der Winter des Jahres 1680 durch  
Kälte ausgezeichnet, so war der ihm folgende Sommer durch  
Trockenheit desto auffällender, während dagegen das J. 1682  
an Ueberschwemmungen, Nebeln u. s. u. äusserst reich war.  
Nur Spanien litt durch Trockenheit.

Schon vor und während der Pest waren an vielen Orten  
böartige Krankheiten, Wechsellieber, Petechialtyphus u. s. u.  
verbreitet. Eine Wechsellieberepidemie durchzog im J. 1680  
den Norden und Kurland <sup>1)</sup>. Im J. 1681 beobachteten Frank  
und Schellhammer <sup>2)</sup> am Rhein und zu Helmstadt äusserst  
hartnäckige Quantalfieber, für deren Kur der Letztere, wie es  
scheint in Deutschland zuerst nach Peyr <sup>3)</sup>, die China an-  
wandte <sup>4)</sup>. Namentlich aber gewülten sich zu der Pest im J.  
1682 weitverbreitete Seuchen unter den Hausböden, von denen  
Kunold <sup>5)</sup> Nachricht gibt, und für deren Zusammenhang mit  
allgemeineren Vorgängen vielleicht die Nachricht von einer im  
J. 1680 im Langenselbischen und im süßen See bei  
Mannsfeld beobachteten Epizootie unter den Fischen nicht zu  
übersehen ist.

<sup>1)</sup> Rudolph Leutichius, *De febre tertiana intermittenti epidemica, proter-  
gita anno septentrionali iniqua in Curlandiam ingruente. Altorf. 1680. 12.*

<sup>2)</sup> Ephem. N. C. dec. II, ann. 2, p. 34.

<sup>3)</sup> Ibid. ann. 4, p. 291.

<sup>4)</sup> Die Geschichte der China findet sich nicht Sprengel aus vollständig-  
sten bei Eickenmann (die Krankheitsfamilie Typhus) abgehandelt.

<sup>5)</sup> Kunold, Histor. Bericht von der Pest, des Harwiches, 1683. 12.  
S. 43 ff.

## 1683. Petechialtyphus zu Wien und Pressburg.

Fackh. Löw. — Wechselstieber. Ruhr.

Theils den allgemeinen epidemischen Verhältnissen, theils den mannigfachen Schädlichkeiten einer langwierigen Belagerung<sup>1)</sup> verdankten Wien und Pressburg die heftige Epidemie des Petechialtyphus im J. 1683 und 1684. Fackh, der denselben zu Wien beobachtete, sieht die Bedrängnisse der Belagerung als die einzige Ursache an<sup>2)</sup>. Die Krankheit begann in den einzelnen Fällen meist unter der Maske der Uebel, zu denen die Kranken auch sonst disponirt waren. Gleichzeitig herrschte eine nicht näher beschriebene *Dysenteria maligna*. (Nach Fr. Hoffmann herrschte im J. 1684 in ganz Westphalen eine sehr heftige Ruhr-Epidemie). Fackh's Behandlung zeugt von tüchtiger praktischer Bildung. Bei Vollblütigen wandte er den Aderlass, nächst diesem die Ipecacuanha als Hauptmittel an; zu starke Schwitzmittel schädeten, dagegen bewiesen sich Pflanzensäuren bei Uebergang zum colligativen Charakter hilfreich. —

Nach Pressburg wurde die Krankheit im November bei feuchter, nebeliger und regnerischer Witterung durch die von der Wiener Belagerung entlassenen Soldaten eingeschleppt, und verbreitete sich bald in der ganzen Stadt mit äusserster Extensität und Intensität. Löw<sup>3)</sup> schildert dieselbe als den zu seiner grössten Höhe gesteigerten Hagymatz<sup>4)</sup> mit ausgebildeter Annäherung zu dem in dieser Zeit so sehr hervortretenden Frieselcharakter, sowohl in Bezug auf das Exanthem, als die übrigen Zufälle der Krankheit. Das erstere

1) Die Türken belagerten Wien vom 14. Juli bis zum 12. Sept. 1683. Die Hauptmasse wurde durch den König Johann Sobiesky von Polen und den Churfürst Maximilian Emanuel von Baiern entsetzt.

2) Fackh, Andr., *De febris maligna*. (Ephem. N. C. Cent. I. obs. 78, p. 142.)

3) Löw, Carl Friedr., *Epistula de morbo petechiali, quae anno 1683 epidemice Populum gravata est*. (Act. N. C. II. app. p. 25—40.)

4) S. oben den Abschnitt „Aegyrische Kruallch.“



[1687.]

bruch in getrennten Zeiträumen aus, häufig von Aphonie, Delirien und Convulsionen begleitet. Mässige Schweißse und Blutungen bewährten sich als kritisch, Aderlässe aber waren nach dem Ausbruche des Exanthems schädlich, ebenso Brech- und Abführmittel. Wir werden später Gelegenheit haben, auf die Häufigkeit dieser Zwitterformen zwischen Petechialtyphus und Erisipel ausführlich hinzuweisen.

Auch für das J. 1687, welches sich durch eine ausserordentliche Fruchtbarkeit, namentlich die Menge und Güte des Weinertrags auszeichnete <sup>1)</sup>, wird für Steyermark die grosse Häufigkeit gutartiger Wechselheber angemerkt. In Grätz allein litten an denselben über 4000 Menschen; zuweilen wurden sie anhaltend und bösartig <sup>2)</sup>.

Zu Heidelberg und in der ganzen Pfalz, wo bedeutende Regengüsse und Ueberschwennungen vorhergegangen waren, richtete die Ruhr, vorzüglich unter den Kindern, bedeutende Verheerungen an. Man wollte daselbst eine ungewöhnliche Häufigkeit von Flöhen beobachten, die vorzüglich den Kranken sehr lästig waren <sup>3)</sup>.

Abhängiger von örtlichen Verhältnissen war der Scharbot, welchen Eggerdes in diesem Jahre unter der französischen Besatzung Luxemburg's nach der Einnahme durch den Herzog von Crequi beobachtete, und welcher über 1000 Mann in kurzer Zeit hinwegraffte, während zu gleicher Zeit eine ähnliche Epizootie unter den Pferden herrschte <sup>4)</sup>.

1) Am 20ten October 1687 wurde Lima durch das grosse Erdbeben verwüstet, welches in der Geschichte dieses Naturereignisses eine so furchtbare Beschreibung hat.

2) Grunzel, *Ephem. N. C. der. H. aus.* 6. p. 105.

3) Brunner, *Ibid.* p. 385 seq. — Frank, *Ibid.* p. 115.

4) Eggerdes, *Ibid.* p. 816.

## Die Volkskrankheiten der Jahr 1690 — 1695 in Italien. — Ramazzini.

### 1690. Wechselfieber.

Wir haben bereits an mehreren Stellen dieser Schrift Gelegenheit genommen, grössere Gruppen von Erscheinungen auf dem Gebiete der Volkskrankheiten, ohne Rücksicht auf die strengere chronologische Ordnung zusammenzufassen, sobald die Darstellung derselben durch einen besonders berufenen Beobachter Veranlassung dazu darbot. Eine solche kehrt uns in Ramazzini's Schilderung der Volkskrankheiten Italiens, namentlich der Gegend von Modena in den Jahren 1690 — 1695 zurück; eine Arbeit, deren nach Form und Inhalt klassischer Werth zu allen Zeiten erkannt worden ist<sup>1)</sup>. Wir folgen ihr, so weit sie Thatsachen darbietet; diese allein haben bleibendes historischen Werth. Die theoretischen Zusätze der Schule wechseln, und ihre Geschichte hat mit der der Schicksale der Menschheit selbst wenig oder nichts gemein.

Die Jahre 1685—1690 hatten sich durch Trockenheit, aber auch durch Fruchtbarkeit und Salubrität ausgezeichnet. Den Eintritt des nun folgenden epidemischen Krankheitscyclus datirt Ramazzini von den heftigen Regengüssen um die Frühlingsnachtgleiche des Jahres 1689, die bis in den Sommer fort dauerten. Als nächste Folge dieser übermässigen Feuchtigkeits musste der Rost betrachtet werden, welcher nicht allein das Getreide, vorzüglich den Weizen, sondern auch die Hülsenfrüchte so verdarb, dass nur die reichen Erndten der vorausgegangenen Jahre vor Mangel schützen konnten<sup>2)</sup>. Jene Regengüsse dauerten noch bis gegen den Winter fort, und verursachten bedestendes Anschwellen der Ströme. Epidemische Krankheiten gab es im-

1) Ramazzini, *opra omnia. Genov.* 1716. 4. p. 113 seq. (Auch abgedruckt in der Grosse Ausgabe von S. J. Esham's sämmtl. Werken.)

2) Ähnliche Verhältnisse der Cerealien beobachtet man in Deutschland und Nordamerika. Schnurrer, II, 221.

[1699.]

dess nicht, und auch durch die sporadischen Uebel wurde die Sterblichkeit nicht vermehrt. Der folgende Winter war gelind und regnerisch, der März ruhig und trocken. Um die Frühlingszeitgleiches des Jahres 1699 aber traten so ungeheure Regengüsse und Ueberschneemengen ein, dass das ganze Land weit mehr einem Inselmeere glich. Auch im Sommer war kaum ein Tag regelos, und die Temperatur wurde durch die anhaltenden Nordwinde fortwährend eben so tief erhalten, als der Barometerstand ein ungewöhnlich hoher blieb. Von Neuem stellte sich der „Rost“ ein, diessmal zuerst an den Maulbeerbäumen, später auch an den Saaten, vorzüglich an den Bohnen; die Weisernte misserlieth völlig, und durch ähnliche Entartung wurden auch die Gartenfrüchte verderben. Der folgende Juni und August zwar waren trocken und warm, doch traten schon im September wieder mässige Regengüsse ein, die die Bestellung des ausgedörrten Bodens möglich machten. Der übrige Theil des Jahres war mild und heiter.

Unter den Krankheiten dieses Jahres behaupteten die sich im Fröling zuerst, namentlich in den überschwemmt gewesenen Gegenden, zeigenden dreitägigen Wechselfieber ein absolutes Uebergewicht. Auf dem Lande verschonten sie fast Niemand, häufig auch waren sie unter den niederen Ständen in der Stadt, indessen, trotz ihrer grossen Neigung zu Rückfällen, durchaus gefahrlos. Gegen den Herbst änderte sich der Typus in den doppelt dreitägigen um, die Apyrexie wurde kürzer; unter den im Allgemeinen vorwiegend gastrischen Erscheinungen aber wird der gute, ja häufig gesteigerte Appetit der Kranken in der fieberfreien Zeit hervorgehoben<sup>1)</sup>. Sehr häufig wurde bei Kindern und Erwachsenen Wurmcömplication beobachtet; unter den die Neigung zur Entzündungsbildung bekämpfenden Mitteln aber nahm die China die erste Stelle ein. — Das aus der Ader gelassene Blut war meistens etwas blass, dick, zuweilen gelblich, auch wenn keine sonstigen leberischen Erschei-

1) Von derselben Eigenkänlichkeit erhielt auch also im J. 1783 an 5. u. 7. ein epidemische Fiebermittel, den Namen „Hingesteter.“



ungen zugegen waren; die Stühle fest, das Erbrochene öfter säuerlich als bitter, die Hypochondrien bei Allen hart und gespannt. Bei Manchen, die lange an hartnäckigen Tertianen gelitten hatten, erschienen Parotiden, welche meistens in Eiterung übergingen, ohne indess von kritischer Bedeutung zu seyn. Ganz vorzüglich aber zeichneten sich diese Fieber durch ihre grosse Neigung zu Recidiven aus. Uebrigens leisteten Purganzen, Brechmittel, Aderlässe und selbst die China nicht allein Nichts, sondern verschlimmerten in der Regel noch den Zustand der Kranken. Quartanen aber kamen in dieser Zeit ebenso wenig als anhaltende und hitzige Fieber anderer Art vor; die Tertiana übte unter den fieberhaften Krankheiten die Alleinherrschaft. Auffallend war indess ihre Beschränkung auf die grosse Ebene zwischen dem Po und der Via Aemilia. Die Einwohner der höher gelegenen Gegenden konnten sich kaum eines so vorzüglichen Gesundheitszustandes erinnern<sup>1)</sup>. Am häufigsten und heftigsten herrschte die Krankheit in der unmittelbaren Nähe des Po, namentlich zu Ferrara und Mantua. Neben den Wechselfiebern kamen Durchfälle, Gelbuchten, Apoplexieen, Wassersuchten, Sticksässer, Dysenterieen vor. Die letzteren waren in diesem Jahre gefährlicher als die Diarrhöen. Am gefährlichsten waren diese Fieber Frauen und Kindern; von den Letzteren starben fast alle, die drei Jahre alt waren. In Finale unterlagen deren mehr als 300; ebenso in Mirandola und Novellara. Nach einigen Anfällen wurden sie gelähmt, verfielen in Zuckungen und starben. Unter den Erwachsenen blieb die Sterblichkeit verhältnissmässig gering; viele freilich gingen durch Recidive und Folgeübel zu Grunde. Gleichzeitig herrschten Epizootieen, vorzüglich unter dem Hornvieh; bei diesen brachen nach einigen Tagen, gleichsam kritisch, am Kopfe, am Halse und an den Füssen Blattern aus, welche sich ganz wie wahre Blattern verhielten; die meisten wurden blind<sup>2)</sup>; andere starben in Folge

1) RAMAZZINI, L. c. p. 135.

2) RAMAZZINI gibt den nächsten Grund des Erblickens nicht an, wahr-

[1691.]

von andauerndem Mangel an Fresslust. Die Schweine gingen vorzüglich durch Erstickung zu Grunde. Ähnlichen Einfluss hatte die Krankheitsconstitution auf Bienen, Seidenraupen und viele andere Thiere.

Sehr unbedeutend sind die directen therapeutischen Angaben Ramazzini's. Er scheint in den meisten Fällen wenig oder nichts gethan zu haben. Zuweilen leistete Weingenuss gute Dienste; das Volk wandte mit häufig gutem Erfolge Knoblauch und Zwiebeln an.

### 1691. Wechselfieber. Lungenentzündungen. Krysielaceen.

Gänzlich von seinem Vorgänger, so in Bezug auf die Verhältnisse der Witterung als der epidemischen Krankheiten verschieden war das J. 1691 <sup>1)</sup>. Weiter begann es wie das vorige geschlossen hatte; zu Ende des Januars aber brachten Nordwinde eine so heftige Kälte, dass die Flüsse fest zufroren, während die schneelosen Felder in trockenem Froste erstarrten <sup>2)</sup>. Apoplexieen, Stickflüsse, Anginen, Rothlauf, vor Allem Brustfell- und Lungenentzündungen waren die herrschenden Krankheiten. Das aus der Ader gelassene Blut zeigte eine schleimige und gerinnstoffige Beschaffenheit, in den grossen Gefässen fanden sich nach dem Tode häufig falsche Polypen. Die Lungenentzündungen kamen vorzüglich bei Greisen und mehr in der Stadt als auf dem Lande vor; wiederholte, bei Bejahrten selbst einmalige, Blutentziehungen schienen nachtheilig zu seyn. Ramazzini, auf dessen Verfahrungsweise die Grundsätze der chemischen Schule einen nicht ganz zu rechtfertigenden Einfluss übten, verliess sich vorzüglich auf Salmiakspiritus, Bächtiges Hirschhornsalz, *Sperma Ceti* und ähnliche Dinge, von denen er

scheitlich wurde die Curree durch die auch auf ihr sich bildenden Blattern verübt.

1) Ramazzini, l. c. p. 157 seq.

2) Derselbe Kälte herrschte zu Wien, in dessen Umgegend selbst Wälder vom Vortriebe kamen.

eine die übermässige Gerinnbarkeit des Bluts, die ihn als das Wesentliche dieser Krankheitsconstitution erschien, beseitigende Wirkung erwartete. —

Auf die Kälte des Winters folgte mit der Frühlingsnachtgleiche eine eben so grosse trockne Hitze, nur selten durch mässigen Regen unterbrochen. Bei dieser Witterung dauerten die erwähnten Brustkrankheiten, obschon weniger heftig als im Winter, fort, zugleich aber lingen die Tertianen sich wieder zu verbreiten an, und man beobachtete insbesondere eine noch nie dagewesene Häufigkeit von „*scabiösen*“ Hautausschlägen, unter denen allerdings die wahre Krätze sehr häufig vorgekommen zu seyn scheint. Gross auch war die Sterblichkeit im Kinder- und Schaafstorden. Ein neuer Beweis zu dem oft sich aufdringenden Satze, dass, wenn es auch zuweilen gelingt, den Anfang der Volkskrankheiten mit zufälligen Vorgängen in der Atmosphäre in ursächliche Verbindung zu bringen, die fernere Entwicklung der ersteren der Fortdauer der letzteren nicht bedarf.

Die Hitze dieses Sommers, nur vorübergehend durch regenreiche Gewitter abgekühlt, erreichte in den Hundstagen ihre Höhe und liess erst im September nach. Hunde und andere Thiere wurden toll. Immer mehr verbreiteten sich die Tertianen, vorzüglich unter der Besatzung und in den von den ärmeren Volksklassen bewohnten Stadttheilen. Das enge mit hohen Häusern besetzte Judenviertel blieb fast ganz frei, eben so das Landvolk<sup>1)</sup>. Uebrigens waren diese dreitägigen Fieber leicht, und entschieden sich meist am 7ten Tage, (wenn ein Aderlass angewendet wurde noch früher,) durch kritische Schweisse. Hartnäckiger und geneigter zum Uebergange in

1) Diese relative Immunität der aus hohen Häusern bestehenden Judenviertel erinnert an die häufig gemachte Beobachtung, dass das Weichseliebermiasma „schwerer sey als die atmosphärische Luft.“ GILLESPIE bemerkt in der sehr gefährlichen Epidemie des Jahres 1808 auf Walcheren, dass die in höheren Stockwerken wohnenden Soldaten nur selten befallen wurden; eine auch in andern Epidemien von den Einwohnern bemerkte Thatsache. In Ostindien gibt es Gegenden, die zu Fasse zu heissen gefährlich ist, während folgende fast aus dem Einfluss der Malaria entstehen u. s. w.



[1692.]

büßtigere und milderere Formen wurden sie im Herbste. In dieser Zeit nahmen sie einen so ausgebildeten entzündlichen Anstrich an, dass sie ohne Aderlässe, kaltes Wasser und Säuren selten bezungen wurden; Reizmittel aber und der ganze Apparat der Cardiaca, der im vorigen Jahre so nützlich war, verschlimmerten stets den Zustand der Kranken <sup>1)</sup>. Das Blut war schaumig und gelblich, der Urin stark tingirt. Bei Vielen der Fieberkranken, namentlich Kindern, erschienen papulöse Exantheme, gewissermaßen die Vorläufer der nun auftretenden Blattern, welche sich Anfangs ziemlich gelind zeigten, im Herbste aber Viele, vorzüglich Solche tödteten, deren Blut entzogen worden war. Sie ergriffen nicht allein Kinder, sondern auch Erwachsene und vor Allen Schwangere <sup>2)</sup>. Am sichersten war es, den Verlauf derselben nach nicht durch den mindesten Eingriff zu stören. Häufig war aber der Uebergang der Tertianen in Quartanen. Die China, die im Jahre vorher meistens geschadet hatte, wurde in diesem mit dem herrlichsten Erfolge angewendet. Die letzten Monate des Jahres waren fast gänzlich krankheitsfrei.

#### 1692 — 1695. Petechialtyphus.

Die Krankheitscharaktere der drei folgenden Jahre werden wegen ihrer Uebereinstimmung von Ramazzini zusammengefasst <sup>3)</sup>; — der Winter des Jahres 16 $\frac{1}{2}$  konnte in Bezug auf seine Witterung und die speciellsten Krankheitsformen (Katharre, Brustfellentzündungen, Rosen, Apoplexien), in denen

1) Es ist nicht zu bezagen, dass Ramazzini's Theorie sehr viel Chemistisches hat; aber die Vergleichung dieser seiner genaueren Schilderung mit Sympson's Anmerkungen (II, 278) mag lehren, mit welchem Rechte Ramazzini dazwischen erwähnten Inconsequenzen rügen werden. — Uebrigens ist es für die Streifigkeiten, in denen Ramazzini, damals Professor zu Modena, mit seinen Colleges lebte, charakteristisch, dass er die Gelehrtenmänner der von ihm verehrten Meinungen fast stets „Professores“ die der von ihm gebilligten „Medici“ nennt.

2) Ramazzini c. p. 155.

3) Ibid. p. 187 seq.

sich die Fortdauer der Krankheitsverhältnisse des vorigen Jahres deutlich zu erkennen gibt, normal genannt werden. Eben so der ganze übrige Theil des Jahres. — Desto unregelmässiger war die Witterung des Jahres 1693. Der Winter glich an Gelindigkeit dem Frühling, der Frühling dagegen schien durch Kälte, Regengüsse und Ueberschneemungen die Natur des Winters angenommen zu haben. Der Sommer war mild, aber regnerisch. Schon im Frühling hatte sich an den Maulbeerbäumen der Roß gezeigt, im Sommer machte er in wenigen Tagen die sichere Hoffnung auf eine ganz besonders reiche Erndte zu nichts. Der Herbst aber brachte bis zu Anfang des sehr gelinden Winters große und anhaltende Hitze. — Der in das J. 1694 fallende Theil des Winters dagegen war durch Kälte und Trockenheit, der Frühling durch höchste Hitze und Regengüsse, der Sommer durch anhaltende, obgleich der Vegetation nicht unzuträgliche Trockenheit ausgezeichnet.

Es gereicht unserm Beobachter zur grössten Ehre, wenn er unverhohlen bekennet, dass er es nicht zu erklären wisse, wie sich mit einem so auffallenden Wechsel der Witterungseignisse in diesen drei Jahren die ununterbrochene, stets sich gleichbleibende Fortdauer eines und desselben Krankheitsbeginns, als dessen vorzüglichste Ausprägung der Petechialtyphus erschien, zusammenreihen lasse. Ein Geständnis, was gerade die aufmerksamsten Beobachter stets am leichtesten abgelegt haben, und dessen Wahrheit sich durch die tägliche Erfahrung nur zu sehr bestätigt. Nichtsdestoweniger dürfte sich in der Aufeinanderfolge der epidemischen Erscheinungen selbst das Gesetz der allmähigen Steigerung einfacher Krankheitsmomente zu combinirten und höher entwickelteren Formen, wenn auch nicht erkennen, doch ahnen lassen, und sonach der Petechialtyphus der Jahre 1692—1694 als das letzte Glied einer Kette erscheinen, deren erste Anfänge die einfachen Tertänen des Jahres 1690, und deren mittleren Ringe die Erysipelaceen (Langenentzündungen, Blattern u. s. w.), des Jahres 1691 bilden. Wir sind in dieser Schrift an der Hand der Geschichte

[1492.]

so häufig auf ähnliche Thatsachen gestoßen, wir werden denselben in ihrem Fortgange noch so häufig begegnen, dass es überflüssig erscheinen möchte, bestätigende Beispiele zusammenzustellen.

Die Epidemie des Petechialtyphus begann im Frühlinge des Jahres 1692, Anfangs mit Petechien begleitet. Während der Sommerhitze fehlte dieses Symptom, es stellte sich aber im Herbste wieder ein, und derselbe Wechsel, der übrigens für den anderseitigen Verlauf der Krankheit ohne Einfluss war, wiederholte sich im nächsten Jahre. — An dieser Stelle <sup>1)</sup> gedenkt Ramazzini des so häufig besprochenen Einflusses, welchen die Mondphasen auf die Gefährlichkeit und Bösartigkeit der Krankheit zu haben schienen. Die letztere war während des Neumonds vorherrschend; mit dem ersten Viertel jedesmal die Krankheit gelinder. Eben so berühmt ist Ramazzini's Beobachtung über den nachtheiligen Einfluss der am 21sten Januar 1693 eintretenden Mondfinsternis auf das Befinden der Kranken geworden, welcher der Genannte das von ihm am 27sten Juni 1694 bei einer Sonnenfinsternis beobachtete plötzliche Steigen des Barometers hinzufügt <sup>2)</sup>. Neuere Schriftsteller haben bekanntlich diese und zahlreiche analoge Erfahrungen auf elektrische Spannungsverhältnisse zu beziehen versucht; eine Ansicht, die trotz ihrer hohen Wahrscheinlichkeit doch noch der scharfen Beweise zu sehr entbehrt, um hier mehr als eine Andeutung zu erfahren.

Die Hauptsymptome jenes Petechialtyphus bestanden in grösster, namentlich vom Rücken ausgehender, Abgeschlagenheit, die so pathognomonisch war, dass sie Laien, namentlich Frauen, sehr oft als sicheres diagnostisches Merkzeichen dienten; Kopfschmerz, Schwerhörigkeit, Stumpfsein, Brennen im Schlunde, Herzensangst. Die Krankheit hat im Ganzen die gewöhnli-

1) RAMAZZINI, l. c. p. 193.

2) Sehr vollständig findet sich das Vorher Gelehrte bei STARK, Allgemeine Pathologie, I. S. 205 zusammengestellt. — Vergl. oben S. 148. Die Medicuszek's Beobachtungen bei der Pest zu Nymwegen.



chen Erscheinungen, namentlich eine ausgebildete Adynamie dar; die Petechien brachen am vierten oder siebenten Tage aus, und waren, wenn sie nur die obere Körpertheile einnahmen, und sich nicht bis zu den Enden der Extremitäten verbreiteten, von der ungünstigsten Vorbedeutung <sup>1)</sup>. — Die selten fehlende angioase Schlundaffection dürfte vielleicht die Verbindung dieses Petechialtyphus mit der ihm vorausgehenden Krankheitsconstitution in ein ziemlich helles Licht setzen. Dieselbe ging auf der Höhe der Krankheit in Bildung einer weissen und geschwürigen Kruste über, welche das Schlingen beschwerlich machte, und vielen Kranken, deren Genesung bereits eingeleitet zu seyn schien, noch das Leben raubte <sup>2)</sup>. Jedenfalls gehört diese Gestaltung des örtlichen Leidens im Typhus zu den interessantesten und seltensten. Denn wenn auch ähnliche Erscheinungen in manchen Epidemien das Volk dazu veranlassten, den Petechialtyphus als „Bräune“ zu bezeichnen, so fehlt es doch gerade an genaueren ärztlichen Nachrichten, zu denen im strengsten Sinne selbst die Ramazzini's nicht gerechnet werden können. — Die einzige Krise dieser Fieber war Ausbruch gehörig beschaffener Petechien; Durchfälle, die vorzüglich im Herbst 1693 häufig eintraten, waren ein sehr gefährliches Symptom. Vielleicht wurden sie mit der höheren Steigerung der Epidemie durch Darngeschwüre erzeugt, obschon Ramazzini über diesen Punkt Nichts mittheilt; der gastrische Anstrich, den in dieser Zeit die Krankheit annahm, scheint wenigstens

1) Vergl. Schwaerer II, 321, der übrigens auszuführen vergisst, dass seine Beschreibung der Petechialfieber dieser Zeit sich nur auf Ramazzini's Beobachtungen bezieht.

2) Ramazz. I. c. 352. „*Si vera faciem arbor cum penarum relore accideret, hanc detestari clamarent (mulieres) nec amplius habitandum de febris natura, jam in faciem se prodentibus petechiis.*“ — p. 356. „*Faciem inflammationem comitem hae febris ut plurimum sibi jactare, quae inflammatio in morbi rigore in cruentum album et uberosum degenerabat, quod non minus terribilem molem foretactat, quam febris ipsa, cum inges-  
set idcirco cum cibum tum medicamentum averteretur, et nulli, qui utroqueque potius aliorum symptomatum compitate etiam crediderant, in ipso veluti peritu suffragium periret foret.*“

[1892.]

aus der gleichzeitig herrschenden „Dysenterie“ hervorzugehen, die vorzüglich die Juden ergriff, und deren Zusammenhang mit dem epidemischen Krankheitscharakter Ramazzini wenigstens andeutet<sup>1)</sup>. — Schluchzen war ein tödliches Zeichen. In einem solchen Falle fand sich der Magen mit schwarzen Flecken besetzt. Ebenso gefährlich war Abgang von Würmern zu Anfang des Uebels. —

Auf dem Lande war die Krankheit weit weniger gefährlich als in der Stadt, weil es dort, wie Ramazzini sehr bitter bemerkt, an Ärzten fehlte. — Merkwürdig war, dass auf den in der Nähe der Ebene von Modena liegenden Hügeln, z. B. der Gegend von Saxola und Scandinano, der Petechialtypus nicht erschien, während er auf den Apenninen eben so als in der Tiefe verbreitet war.

Ramazzini suchte Anfangs die peripherische Richtung des Krankheitsprocesses durch den Gebrauch der flüchtigen Alkalien einzuleiten; da aber dies Verfahren nicht zum Ziele führte, ja sogar durch Steigerung des Fiebers bedenklich erschien, so wendete er sich mit besserem Erfolge zu den Säuren, bescheiden genug, auch diesen keinen allgroßen Einfluss auf die Ausgänge der Krankheit zuzuschreiben. Ueberhaupt bewies sich ein expectatives Verfahren als das erfolgreichste. Indessen war es zuweilen, im Anfange der Krankheit und bei ausgebildeter gastrischer Complication, ersprießlich, ein leichtes Abführmittel zu geben, durch welches der so wesentliche Ausbruch der Petechien eher befördert, als gehindert wurde. Bei Kranken, bei denen sich das Uebel nicht gehörig durch Petechien entschieden hatte, und die nun an langwierigen Fiebern litten, fühlte man sich zuweilen versucht, die China zu reichen. Indess geschah dies immer mit schlechtem Erfolge, sie verfielen in Sopor und Stumpfheit<sup>2)</sup>. — Gegen die „Dysenterieen“ in

1) *Palpebrae fractae hiant — et ultra crater affluunt sabaeae petechiae*. p. 176.

2) Es ist zu bemerken, dass man zu dieser Zeit gewöhnlich die mit Wein veredelte China (a Salutaris gab.

Herbste 1692 (= es bleibt, bei dem Mangel näherer Angaben, ungenügend, ob es wahre Dysenterieen waren —), beherrschte sich vor Allem das Opium, vorzüglich durch seine diaphoretische Wirkung.

Schliesslich findet Ramazzini in der von ihm beobachteten Epidemie das vollkommene Abbild der von Fracastori im J. 1528 beschriebenen Seuche<sup>1)</sup> und in bitteren Klagen ergiesst er sich über die Sorglosigkeit, mit welcher die Aerzte, auf Kosten der fast ausschliesslich bearbeiteten pathologischen Anatomie, das Studium der Seuchengeschichte vernachlässigten, so dass man täglich längst abgethane Streitigkeiten sich fruchtlos erneuern sehe. Fürwahr! die gleiche Klage würde der wackere Ramazzini auch heute noch, nachdem anderthalb Jahrhunderte in dieser Beziehung im Allgemeinen mehr zum Rückschritt als zum Fortschritt leiteten, mit gleichem Rechte erheben können!<sup>2)</sup> —

1) S. oben S. 8.

2) Ramazz. l. c. p. 202 u. 204. „Quid mirum in multis vulgaribus (qui et plurimum ante vulgus obgratia tractari solent) immorandum illud ex Felice Hippocrate in delibere videtur, in vocem indigne potissimum ubi deinde dandum fuit; nec unquam desinam, quia Professores exhortor, ut in hunc campum potius (in. suffocant, ubi non epilepsiam, sed regem complurimum contemplationum acceperint), quod et ipse docuit, et angustia solent fulcrum alit.

Ad hoc fluxum non militare vergetur dicitur in epist. ad Ciceronem. vixit hominis, offerunt ut sit? nostra vero hoc aculeo aculeo qui genus medicum primorum in rebus, quae dicitur quidem aliquod artem, sed nullam potius ingratitibus gratitibus potius inferre, non occupatim; non enim tota sunt in minimis exploranda, ne, inquam in beneficentia ad exhortationem latenti, et videretur floribus potius opere ac ingratitibus aliquod ingratitibus dicitur perueniant, ad gloriam et nominis celebritatem occupandum totum insistant, quod ex re deducitur fuit, ut in re nullum non vixit potestatem exirendi ingenii et famae recuperandas hinc relinquit fuit. Quid si Aristophanes habet rident? quibus talibus curiam bene digressionem una perficiunt? Livet referre illas occisiones, qui in hoc potestate plus indoluit legunt, et rident; intercipitur ergo hinc ut in discipulis ut Therapiae per quamnam vixit in vixit talibus, non per superiora, ut per inferiora.

Equum alius ridentique rident  
utique dicitur dicitur dicitur utique rident  
utique dicitur dicitur dicitur utique rident  
utique dicitur dicitur dicitur utique rident  
utique dicitur dicitur dicitur utique rident



## Baglivi. Lancisi.

Segensreich war der Eindruck, den Ramazzini's Werk auf die Aerzte seiner Zeit machte; ein sehr grosser Theil der epidemischen Schriften aus den ersten Jahren des 18ten Jahrhunderts verdankte seinem Beispiele ihre Entstehung, und es lässt sich durchaus nicht verkennen, dass dieselben nicht allein an Zahl zunahmen, sondern auch an innerem Werthe gewannen.

Baglivi bestätigt Ramazzini's Angaben über die Witterungsbeschaffenheit der J. 1693 — 1695, und führt namentlich für diese Periode eine ganz besondere, wahrhaft epidemische Häufigkeit der Apoplexien an <sup>1)</sup>.

Ansführlicher sind die von Lancisi über mehrere hierher gehörige Epidemieen dieser Zeit mitgetheilten Angaben <sup>2)</sup>. Er stellt dieselben zunächst zusammen, um den Einfluss des Sumpflinns auf die Entstehung böser Fieber zu beweisen, ohne indess gleich bei der ersten der geschilderten Epidemieen der anhaltend wehenden Südwinde zu vergessen. — Zu Rom bildeten die um die Engelsburg herumgelegenen Quartiere, zu allen Zeiten durch ihre Insalubrität berüchtigt, den Mittelpunkt dieser Fieber, welche wir kurz als typho-gastrische Wechselfieber bezeichnen können. In den Leichen zeigten sich besonders die

*Major erat tunc Aëre Dies Instansquiescenti;*

*Dixit tunc laboribus calidis*

*Angustam, perpartem autem existentem quibus spiritum*

*Et sic recta in pulchrum,*

*Pulchrum exardens ad angustam adjacentem*

*Pulchrum inveni in vi spiritus.*

*Abil hinc quod anatomicum indagatum tanquam laboribus impeditum traditum; solum dolendum ceteris, quod cum spiritum hanc aëre cruentum et exultantem esse patet, quantum potius medicina erigit, minus fore qui ingenio magis prestant, in id usque ad temporis dispendium intendant, cum ad alia magis etiam futura ventum ut vires possint intendere, inter quos non postremum tunc locum meretur epidemiarum affectuum historia; qua nihil in re medica fortius magis desideratur et minus excusatur.* (RAMAZZ. l. c. p. 285.)

1) Baglivi, *opp. om.* Lugd. 1774. p. 582.

2) Lancisi, *de aëre palud. efflu. lib. arcuel. Opp. v. m.* T. II. p. 345 seq.

Leber, der Darканал und das Gehirn krankhaft verändert. Jene livid, schwarz, „sphacelös“, mit Petechien besetzt, mit „Spulwürmern“ (*Ascaris*) erfüllt, — in diesem, welches vorzüglich bei dem anhaltenden Typus ergriffen war, venöse Blutüberfüllung, wässrige Exsudate u. s. w. Die Darmpetechien beschreibt Lancisi als eckelrunde schwärzliche Flecken, in deren Mitte sich „Risse“ (*scissurae*) zeigten, seiner Meinung nach Produkt der Risse der Würmer; vielleicht beginnende Schleimhautgeschwüre. Wenigstens gibt Lancisi an einer späteren Stelle <sup>1)</sup> die durch die Sectionen ergebene „Darmgangrän“ als Ursache der tödtlichen Durchfälle an. — Im Uebrigen bieten Lancisi's Angaben keine besondere Aebnlichkeit. Leichte Abführungen, der zeitige Gebrauch der China, Vesicatorie u. s. w. waren eben so hilfreich, als Drastika, Blutentziehungen und quecksilberhaltige Wurmmittel nachtheilig <sup>2)</sup>. — Der übrigen von Lancisi an dieser Stelle erwähnten Epidemien wird später an gehöriger Stelle gedacht werden.

**Die Volkskrankheiten der Jahre 1690 — 1695 in  
Deutschland und Frankreich. — Beckers,  
Hofmann, Valentin, Panthot, Apinus,  
Hoyer.**

Ähnlich wie in Italien scheinen sich in dieser Zeit auch die epidemischen Krankheitsverhältnisse in Deutschland gestaltet zu haben; indess fehlt es leider an Nachrichten, die nur einigermaßen einen Vergleich mit Ramazzini's Berichten anstellen könnten. —

Zu Aachen bei Eisleben starben in der Nacht des 14ten März 1690 alle Hunde an einer Angina, nachdem Tags vorher ein giftiger Nebel gefallen war <sup>3)</sup>. Zahlreiche Nachrichten sprechen von unehörter Häufigkeit von Stürmen, Erdbeben und

1) Lancisi, l. c. p. 183.

2) Vergl. Orbanum, II, 59 ff.

3) Mar. N. O. Dec. III, ass. 5 et 6. p. 264.

[1693].

Ungewittern<sup>1)</sup>; Krankheiten werden kaum erwähnt. Indessen mögen die Wechselfieber, welche nach Weyfer<sup>2)</sup> im folgenden Sommer Ungarn, Krain, Steyermark, Kärnten, Tyrol, Gränzländen, die Schweiz bis an den Rhein überzogen, schon in diesem Jahre sich verbreitet haben.

Diese im J. 1691 über ganz Holland und Deutschland verbreiteten Fieber wurden auch von Deckers beschrieben. Seinen Angaben nach<sup>3)</sup> folgten dieselben auf die grosse Hitze und Dürre des Sommers, Anfangs mehr den reinen Charakter des Wechselfiebers, später den des Typhus offenbarend. Hauptscheinungen waren Cholera- und Ruhr-ähnliche Durchfälle, zuweilen „Pneumie“, Convulsionen, Delirien u. s. w. Bei Manchen, vorzüglich bei Greisen, erschien nach dem 2ten oder 3ten Anfälle ein Blattern-ähnlicher Ausbruch, der eine in der Regel sehr bedeutende Abschuppung zur Folge hatte.

Eben so ungenau sind Fr. Hofmann's kurze Nachrichten über die böartigen, zuweilen mit Petechien verbundenen Fieber, welche im J. 1692 Thüringen, Meissen und das Voigtland durchzogen, nachdem unendliche Heuschreckenschwärme die Saaten verheert hatten<sup>4)</sup>.

Zu Giessen war, nach Valentin, der Winter 1692 Anfangs regnerisch, zuletzt sehr kalt, Frühling und Sommer äusserst heiss, als im Ganzen wie zu Modena<sup>5)</sup>. Bei Jena wurden im August 1693 grosse Heuschreckenschwärme gesehen<sup>6)</sup>.

1) Vergl. Schwaner, II, 220 ff. — S. auch „Das an dem bewegten Thronen (in Kemberg) erhaltene Straß-Zeichen Gottes, von Wundlern. Leipz. 1691,“ und „Das erschütterte Meissen und Thüringen, oder eine Beschreibung des am 21sten November annoch sechsten 1693sten Jahres in Meissen und Thüringen entstandenen Erbfahren, von Nic. Büpfert. Lpz. 1691“.

2) Schwaner, II, 222.

3) Wir sind in Ermangelung des Originals gezwungen, der Darstellung Oudman's (II, 46) zu folgen.

4) Fr. Hofmann, *med. rat. syst. H. c. d. 14. p. 226.*

5) S. J. Denham, *op. l. p. 278.*

6) Lischer, C. H., *Beschreibung des unendlich grossen Heuschreckenschwarzes, welches im August 1693 bei und um Jena erschienen.* — Eine heilige erschreckliche Heer der Heuschrecken, oder Beschreibung des in diesem 1693sten Jahre in unterschiedenen, auch einigen hiesigen, Kirchensprengeln erschienenen Heuschreckenschwarzes.



Seuchen der Menschen und Thiere waren weit verbreitet. Bei dem Rindvieh war es, wie es scheint, ein dem Lungentypus nahestehendes Uebel; unter den Menschen die Ruhr und typhöse so wie dreitägige anhaltende Wechselfieber, gegen welche Brechmittel und China sehr viel leisteten. Der Winter 16 $\frac{1}{2}$  war streng, der Frühling sehr warm, mit Ausnahme einiger starken Fröste, die grossen Schaden anrichteten; der Sommer unerhört heiss, der Herbst und Winter regnerisch. Auch hier beobachteten die auf einander folgenden epidemischen Krankheitserscheinungen ziemlich dieselbe Ordnung als zu Modena, indem im Sommer zuerst die Masern, dann Pleuropneumonien, und zuletzt typhöse Fieber herrschten, welche man von den aus dem Lager in die Winterquartiere zurückkehrenden Truppen herleitete.

In Frankreich waren ähnliche Fieber allgemein verbreitet. In Lyon herrschten sie nach Panthot's Beobachtungen von 1693 bis 1695. Hauptsächlich waren Sopor, Convulsionen, Petechien.

Dieselben Lagerfieber beobachtete Apianus zu Herrbruck bei Nürnberg im J. 1694 und 1695. Sie hatten schon in den Jahren 1689 und 1690 nach dem Einfall der Franzosen in die Rheinpfalz, vorzüglich nach der Rückkehr derselben von der Mainzer Belagerung, in Bonn, im Württembergischen, in der Unterpfalz, im Hohenlohe'schen und auch zu Herrbruck geherrscht <sup>1)</sup>. Diese Lagerfieber wiederholten sich bei dem zweiten Einfall der Franzosen in's Württembergische im J. 1693. Sie hatten im Sommer 1694 fast ganz aufgehört, und es kamen nur noch leichte Wechselfieber vor, als sie mit dem Eintritt der Regengüsse dieses Jahres, die vom August bis zum December fortwährten, sich erneuerten, und bald zu einer sehr bedeutenden Epidemie sich gestalteten. Zuerst empfand das

1693. — Richter, Arn. (verm. Drmidt), *Phaenomena dentitionis, principis imperiosissimi. Jen.* 1691. —

1) Das Varus-Lager dieses J. wird überall durch die höchstschmerzlichen Verheerungen bezeugt; im J. 1694 ist bekanntlich die verheerete Wahl des von Friedrich vorgeschlagenen Kladach Eger von Fürstlich zu Strassburg aus Oberloosen von Köln.

[1694.]

kindliche Alter und das weibliche Geschlecht den verderblichen Einfluss ihrer Macht, die sie aber Anfangs unter der täuschenden Maske der gewöhnlichen Quotidianfieber verhängen, bei denen die China die besten Dienste leistete. Später wurde der Typus anhaltend, die Krankheit blieb aber noch immer sehr gutartig, und entschied sich in der Regel durch Erbrechen und Durchfall. Bei fortwährendem Regenwetter nahm die Epidemie an Ausdehnung und an Blösigkeit zu, und wie in Oberitalien verbreitete sie sich vorzüglich in den Thälern, während sie dagegen die hochgelegenen Orte, z. B. Altdorf, gänzlich verschonte, nach so ihre Wechselfiebernatur deutlich bezeugend<sup>1)</sup>. Die Krankheit war offenbar contagios. Unter den Erscheinungen wird vorzüglich der Sopor hervorgehoben, die Krisen bildeten sich besonders durch Petechien, Parotiden und

1) Vergl. Kienemann, die Krankheitsfamilie Typus, S. 333 ff. An dieser Stelle hat Kienemann die sehr geistreiche Vermuthung aufgestellt, dass zwischen dem Vorkommen der Wechselfieber in Bezug auf ihre (nördliche) Pforte und ihre Erhaltung über die Meeresfläche eine gewisse Parallele statt finde. Die Typus wüchse auf der nördlichen Halbkugel vom Äquator bis ungefähr zum 60sten Breitengrad (oder vielmehr bis zu der diesem Breitengrade entsprechenden Isothermie); setzt man nun eine Elevation über der Meeresfläche von je 100] Schuh gleich einem Breitengrad der Ebene, so lässt sich im Allgemeinen leicht herausfinden, welche Gegenden noch in die Wechselfieber-Region fallen. In allen jenen Gegenden, deren Breitengrad plus ihrer durch 100] dividirten Höhe (nach Schukow berechnet) die Zahl von 60 nicht erreichen, können die Wechselfieber auch vorkommen. Wittenberg z. B. das ist dem 50sten Grad nördlicher Breite liegt und eine Elevation von 500 Fuss hat, und dessen Formel demnach ist  $50 + \frac{500}{100} = 55$ , liegt noch weit östlich der Grenze der Intermittentes. — Umgekehrt werden die Intermittentes nach Linné's Zeugnis in nördlichen Schweden, schon in Himmelsland, nicht mehr angetroffen, Herraesand liegt aber noch schon jenseits des 60sten Breitengrads. So ist das Wechselfieber in und bei Andarsberg auf dem Harz ganz fremd; Andarsberg liegt aber ungefähr unter dem 52sten Breitengrad und hat eine Elevation von 1811 Fuss über des Meeres, nach der Formel  $52 + \frac{1811}{100} = 62$ . Eben so wird nach Sprengel's Zeugnis das Wechselfieber in Nollheim und Ular auf dem Harz vermuthet, beide haben aber eine ähnliche Lage wie Andarsberg. Und in dem nördlichen Breitengrad und 1034 Fuss über der Meeresfläche liegenden München, welchem somit die Formel:  $48 + \frac{1034}{100} = 58$  zukommt, sind die Wechselfieber schon sehr selten. Von dieser Regel gibt es natürlich einzelne durch klimatische Verhältnisse begründete Ausnahmen: so sollen z. B. in Salzburg, in Weizlar, auf dem Vorberge der guten Hoffnung, auf den Anhöhen St. Thomas und St. Croix die Intermittentes theils selten, theils gar nicht vorkommen.

Bubonen. Apinus Behandlung<sup>1)</sup> bestand in der zeitigen Anwendung von Brechmitteln, denen dann leichte Alexipharmaca und Diaphoretica folgten. Selten wurde Blut gelassen, eigentliche Antiplagistica waren nie indicirt. — Die grössere Bösartigkeit der Epidemie zu Anfang des Jahres 1695, während strenger Kälte, wurde durch die um sehr gemeinen lividen Petechien, den sehr schnell zum typhösen sich gestaltenden Charakter der Krankheit, und den seltenen Ausbruch von Parotiden bedingt. Brechmittel leisteten zwar noch immer etwas, aber vorzüglich wichtig war es jetzt, kritische Schweisse zu erzeugen. Sprachlosigkeit und Harthörigkeit bewährten sich als günstige Erscheinungen; Apinus erklärte diesen Umstand aus einer kritischen Uebertragung des Krankheitsprocesses auf periphetische Organe (*crisis ad peripheriam*)<sup>2)</sup>. Ein höchst glücklicher und von dem besten Erfolge belohnter Gedanke aber war es, nach dem Brechmittel die China (vorzüglich das Extract) zu verordnen, welche reichliche Schweisse, gelinde Durchfälle, und bei Frauen die Rückkehr des Monatsflusses, und so die Genesung herbeiführte<sup>3)</sup>. Indessen geht doch schon aus diesem Umstande die Verschiedenheit dieser Fieber von denen bei Ramazzini beschriebenen hervor, welche, wie wir gesehen haben, die China durchaus nicht vertrugen<sup>3)</sup>; wenn auch nicht übersehen werden darf, dass bei Ramazzini von der vorgängigen Anwendung der Brechmittel keine Rede ist.

Viel andere Nachrichten von verschiedenen Punkten Deutschlands enthalten die Ephemeriden der Leopoldinischen Akademie, welche in Sydenham's *Constitutio epidemica Germaniae* zusammengestellt sind.

Eine der werthvollsten dieser Beschreibungen ist die von Hoyer über die von ihm zu Mühlhausen im Eichsfelde beobachteten epidemischen Ereignisse des Jahres 1700.

1) Apinus, S. 53.

2) *Ibid.* p. 92.

3) S. oben S. 218.



[1766.]

Der den Uebergang aus dem 17ten in das 18te Jahrhundert vermittelnde Winter zeichnete sich durch eine höchst unbeständige, im Ganzen feuchte Witterungsbeschaffenheit aus, unter deren Einflusse sich zunächst ein katarrhisches Element in den Krankheiten, vorzüglich der Kinder, ausbildete, welches sich indess bald zu einer ausgebildeten, schon gelinden, Masernepidemie erhob. Unter den Erwachsenen waren rheumatische Krankheiten sehr verbreitet, später kamen auch typhöse Fieber vor, die sich indess weniger bösartig zeigten, als in den vorausgegangenen Jahren. Gegen den Sommer, der sich Anfangs durch Dürre, später aber durch eine dem Gedeihen aller Feldfrüchte, des Weins u. s. w. ausserordentlich günstige Beschaffenheit auszeichnete <sup>1)</sup>, folgten den Mauern die Blattern, anfangs gelinder, später conflirend. Dabei herrschten die bösartigen Fieber immer noch fort, und zeigten sich namentlich in der Umgegend, zu Nordhausen und auf dem Harze, ziemlich verheerend, im auffallenden Gegensatz zu der herrlichen Witterung, und im schroffsten Widerspruche zu dem alten Dogma von dem Einfluss der letzteren auf die Entstehung der Volkskrankheiten <sup>2)</sup>. Gleichzeitig fehlte es nicht an zahlreichen, ziemlich gutartigen, intermittirenden und anhaltenden Wechselfiebern. Unter den Zufällen jener Fieber hebt Hoyer heftige rheumatische Schmerzen, welche oft jede Bewegung unmöglich machten, galliges Erbrechen, hartnäckige, zuweilen blutige, Durchfälle, heftiges Nasenbluten, vorzüglich aber ausserst beträchtliche Magenschmerzen so sehr hervor, dass an den Einfluss der genannten Krankheitsconstitutions wohl erinnert werden darf. — Die Krankheit war übrigens unzweifelhaft contagios.

1) Hoyer, Joh. G., *Obis. epidemias de Malignis virulentis febribusque horum constitutione epidemica anno 1765 observata.* — Sydenham, *op.* tom. p. 767.

2) „Et la grippe est, ainsi, le temporel et atmosphérique et les épidémies constitutionnelles sont éternelles, and also circumstances sempre simul et quasi conjunctim considérandes etc.“ Hoyer, l. c. p. 778.

Hoyer bekämpfte dieselbe nicht einem kleinen Aderlasse <sup>1)</sup> mit dem Apparat der alkalischen Bezoardika, behufs der Einleitung der Hautkrise; Brech- und Abführmittel fand er wirkungslos. Die vorzüglichste Rücksicht verlangten die ästhetischen Affectionen; gegen die Delirien zeigten sich Vesicatorie, gegen die Cardialgie aromatische Dünge, vorzüglich aber Wedel's absorbirendes Pulver <sup>2)</sup>, gegen die rheumatischen Affectionen Schnütmittel, vorzüglich Opium, welche in dem „anthrithischen“ epidemischen Fieber des Jahres 1699 so schädlich gewesen waren, heilsam. — Auffallend war, dass in den Sommermonaten kein Kranker an diesem Uebel starb. Nach Ramazzini's Beispiel beschränkte Hoyer genau den Einfluss der Mondphasen auf die Kranken, konnte aber einen solchen in dieser Epidemie nicht wahrnehmen. Deutlicher war derselbe in den Jahren 1698 und 1699 gewesen, wo bei abnehmendem Monde fast Alle gestorben, bei zunehmendem die Meisten genesen waren.

Mit dem Eintritte des Herbstes wurde das Wetter plötzlich nebelig, regnerisch, kalt, und der Winter stellte sich ziemlich streng und zeitig ein. Das epidemische Fieber hörte allmählig auf, dagegen verbreitete sich eine sehr bedeutende, Kinder sowohl als Erwachsene befallende Keuchhustenepidemie; die Blattern aber erreichten den höchsten Grad der Verbreitung und Bösartigkeit, und selbst die Meisten der Genesenen wurden noch von ihren Folgeübeln, namentlich Wassersucht, hinweggerafft.

1) „Sanguis est crassus“.

2) Aus Astruc's, Sydenh'm, Polt, Tronch. Mitrour, P. Mead's perles, Crev. Crev. und Zinnaber bestehend.

## V.

### Das achtzehnte Jahrhundert.

**1700 — 1716. Weit verbreitete Seuchen, Wechsel-  
fieber, Erysipelaceen, der Priesel, Petechialtyphus,  
Bubonenpest.**

Niemals bestätigte sich wohl der bekannte Ausspruch Sydenham's, dass selbst die Pest nicht ohne eine begünstigende Krankheitsconstitution gedeihe, mehr, als während des grossen Cyklus weitverbreiteter Seuchen, denen wir in den zwei ersten Decennien des 18ten Jahrhunderts begegnet; einer Zeit der Noth und jeglichen Trübsals, wie kaum eine andere. Für die Geschichte derselben liegen aber so zahlreiche und werthvolle Materialien vor, dass die höchstwichtigen Ergebnisse die Mühe der übersichtlichen Zusammenstellung hinreichend lohnen.

Es ist schwer zu entscheiden, ob die grosse Häufigkeit der Volkskrankheiten im ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts wirklich, oder nur scheinbar deshalb stattfindet, weil für keine Periode zahlreichere und umständlichere Berichte vorliegen <sup>1)</sup>. Sydenham's mächtige Mahnung hatte die Aerzte in den Volkskrankheiten, denen man bis dahin immer nur eine untergeordnete Sorgfalt gewidmet hatte, die gewaltigen Winke der Natur selbst erkennen lassen; überall beiferteten sich die besseren Aerzte, diesen Winken zu lauschen und sie zu erfassen. Hierzu kam die Gründung zahlreicher ärztlicher Gesellschaften, in denen vereinte Kräfte sich gemeinsam der Lösung grosser Aufgaben widmeten, die Erleichterung des gelehrten Verkehrs, die

1) Schaeffer: *Überblick dieser Periode mit päpstlichem Stillschweigen.*



mit dem allgemeinsten Bedürfniss gesteigerte Thätigkeit der Presse, überhaupt Alles, was im 18ten Jahrhundert das Leben der Völker Europa's so mächtig bewegte und förderte. Vorzüglich reichhaltig in Bezug auf die Geschichte der Volkskrankheiten sind die Sammlungen einzelner ärztlichen Vereine, ins Besondere die Verhandlungen der Berliner Aerzte („*Acta Medicorum Berolinensium*“, vom J. 1716 an), und die von dem unermüdlichen Kanold gegründeten, grossentheils von ihm allein geleiteten und vom J. 1717 bis 1726 fortgeführten „Sammlungen von Natur- und Medicin-, so wie Kunst- und Literatur-Geschichten“. Die letzteren namentlich enthalten unter Vielem Unbrauchbarem eine grosse Menge äusserst gediegener Abhandlungen und Notizen, und sind schon wegen der Vollständigkeit, mit welcher sie für den genannten Zeitraum die Nachrichten aus ganz Europa in sich vereinigen, höchst werthvoll. Ihnen verdanken wir einen grossen Theil der Ergebnisse für diese äusserst reichhaltige und wichtige Krankheitsperiode.

So gross die Zahl der verschiedenen epidemischen Vorkommnisse dieser letzteren aber auch ist, so schwer es auf den Anblick auch erscheint, in dem Chaos derselben ein Gemeinsames zu entdecken, so sicher ergibt sich nach vollständiger und genauer Würdigung des Einzelnen, dass die Wechselfieber und nächst ihnen eine ausgebreitete Krankheitsconstitution, deren Grundcharakter als der erysipelatöse bezeichnet werden muss, an der Spitze aller dieser Erscheinungen stehen. Wenn sich jemals der Satz bewährte, dass die ewige Natur von den Scanderungen der Systematiker Nichts weiss, dass nur durch Uebergänge sich allmählig aus Gleichartigem das Getrennte entwickelt, und dass anscheinend Verschiedenem, ja Entgegengesetztem, ein Gemeinsames zu Grunde liegen kann, so ist es in dieser Periode der Fall. Wir selbst haben zu wiederholten Malen auf diesen Satz hingewiesen, wir haben ins Besondere wiederholt die nahe Beziehung der Wechselfieber zu den sogenannten typhösen Krankheits-

formen, wir haben die Verwandtschaft dieser mit dem erysipelatösen Krankheitscharakter erkannt, — das Alles offenbart sich niemals deutlicher, als in den epidemischen Krankheitsgestaltungen der oben genannten Jahre.

Überall finden wir während derselben die Wechselfieber, selbst an Orten, wo sie sonst und jetzt nicht vorzukommen pflegten, überall aber auch sehen wir neben ihnen und vorzüglich aus ihnen entstehend die von der Schule als gastrische, typhöse u. s. w. bezeichneten Krankheitsformen, überall endlich die Blattern, die Ruhr, Scharlach, Masern und vorzüglich den Friesel. Den erstgenannten Krankheitsformen, insbesondere den Blattern, den Masern und dem Scharlach, spricht kein denkender Arzt mehr die erysipelatöse Grundlage ihres Wesens ab; die es thäten, sie müßten Schönleins's, Eisenmann's u. A. Schriften, sie müßte vor Allem die Natur und die Geschichte eines Besseren belehren. Auch gewissen Formen der Ruhr ist in neuerer Zeit die erysipelatöse Bedeutung gewonnen worden: — weniger oder gar nicht ist bis jetzt die Beziehung des Friesels jener Periode zu dem erysipelatösen Charakter gewürdigt worden, die bei der früher und gegenwärtig allgemein angenommenen und auch wirklich Statt findenden rheumatischen Bedeutung dieser Krankheit eben so wichtig, als überraschend ist. — Die später folgende Betrachtung dieser interessantesten Krankheit mag den historischen Beweis für diese Behauptung vertreten.

Die Wechselfieber des genannten grossen Zeitraums zeichneten sich, wenn auch nicht überall durch Bösartigkeit, doch durch Langwierigkeit aus. Dieselben hatten vorzugweise, namentlich im Winter, den durch seine Hartnäckigkeit berühmten Quartantypus, der gegen den Frühling meistens in den Tertiantypus überging. Zu jeder Zeit verwandelten sich diese Fieber in anhaltende typhöse Formen (mit Delirien, gastrischen Affectionen, Petechien u. s. u.), wenn sie falsch behandelt wurden; im Sommer erfolgte dieser Uebergang häufig von selbst. Die

Sommer der genannten Jahre aber waren durch ungewöhnliche Hitze ausgezeichnet, namentlich der des Jahres 1720, welcher eben so durch die Güte seines Weins berühmt wurde, als der Winter von 1719 durch seine Kälte. Im Sommer und vorzüglich gegen den Herbst traten deshalb in allen diesen Jahren, namentlich des letzten, in welchen diese Krankheitsperiode gewissermassen ihre Akme erreichte, Ruken, sogenannte Gallenfieber, Blattern, Masern, und der damals noch von wenig Ärzten genau gekannte Scharlach, mit denen sämmtlich der Friessel theils die mannigfaltigsten Verbindungen einging, theils sich selbstständiger entwickelte. Endlich herrschte die Pest mit grösster Wuth im ganzen Bereich ihrer ursprünglichen Heimath, in Aegypten, im Orient, und sie drang selbst bis nach Siebenbürgen, Polen und Ungarn vor; ja Frankreich selbst sollte noch einmal für die Gewissenlosigkeit Weniger durch die ungezügelte Wuth dieser Furie geübt werden <sup>1)</sup>.

#### Wechselfieber, Petechialfieber, Erysipelaceen.

Wir wollen die Betrachtung des erwähnten Krankheitscharakters mit dem J. 1697 beginnen. Der Winter dieses Jahres zeichnete sich überall durch eine sehr bedeutende Kälte aus, welcher dann im Fröhlinge ausserordentliche Ueberschneemungen folgten. In manchen Gegenden, z. B. in Ungarn, waren Wechselfieber sehr häufig, aber an vielen Orten kündigte sich schon jetzt der erysipelatöse Krankheitscharakter an, der sich in den folgenden Jahren unter ähnlichen Umständen immer stärker entwickelte. Vielleicht kann hierher schon die kurze Nachricht von einer Epizootie unter den Hamsvögeln gezogen werden, die im Februar 1697 im Eisleben'schen beobachtet wurde, und bei welcher man unter den Flügeln schwärende Blattern, die Leber ganz vertracknet, und bei den, wie es scheint,

1) S. auch die Geschichte der Pest in der Pariser cc.



(1697.)

ebenfalls ergriffenen Hunden „eine grosse Galle“ fand <sup>1)</sup>. Man könnte zwar in dieser Erscheinung, so wie in der Milzbrand-epidemie im Juni desselben Jahres, welche in West-Bothnien herrschte <sup>2)</sup>, den typhösen Krankheitscharakter erblicken, wenn nicht zwischen den Typhen und Erysipelaceen eine ebenfalls von uns wiederholt besprochene und später sich noch viel deutlicher offenbarende höchst innige Verwandtschaft bestände. — Weniger werden für dieses, auch durch Misswachs ausgezeichnete, Jahr Krankheiten der Menschen erwähnt, ausser von Löw, welcher zu Pressburg im Winter katarrhalische und Brustaffectionen, im Frühling Wechselfieber, im Sommer Petechialfieber, bei denen Frieselausbruch höchst anmuthig war, zugleich aber Masern und sehr gutartigen Scharlach beobachtete, welchen sehr häufig Hautwassersucht und Icterus folgten. — Ebendieselbst beobachtete Rayger in den Jahren 1695—1697 eine gänzliche Umkehrung der Jahreszeiten. In Folge des schneereichen und harten Winters von 1695 trat im Frühling 1696 die Donau über ihre Ufer. Unter den Kindern herrschte in diesem, namentlich aber im folgenden Herbste die rothe Ruhr, und bei Erwachsenen zugleich epidemische Gelbsucht <sup>3)</sup>.

Zu Augsburg beobachtete Schröckh eine Masern- und Blattern-Epidemie. Bei Erwachsenen kamen gleichzeitig Peripneumonien, Gesichtsrosen, Parotiden, Oedeme, Augenentzündungen, sehr allgemein verbreitete Odontalgien, aber auch rheumatische Affectionen und „Brennfieber mit pustulösen und fleckigen Exanthemen“ (Scharlach <sup>4)</sup>), so wie zahlreiche Wechselfieber vor, die im Herbste in Petechialfieber mit pleuritischen Zufällen übergingen. Das ganze Jahr zeichnete sich durch eine grosse Unbeständigkeit der Witterung, schnellen und scharffen Wechsel der Temperatur u. s. w. aus. Dieselbe Witterungs- und Krankheitsconstitution herrschte im folgenden Jahre in der Gegend von Basel und St. Gallen. Dort erob

1) Hüb. N. C. det. III. n. 5 et 6, obs. 170.

2) Schenker u. H. 228.

3) Sydenham, opp. T. II. p. 729 seq.

sich die letztere zur Erzeugung der Ruhr <sup>1)</sup>. Auch dort folgten der letzteren Mägen und Blättern <sup>2)</sup>.

Weniger ausgebildet war dieser Krankheitscharakter (in Berlin <sup>3)</sup>).

### 1897. Kiel. — Schelhammer.

Selbst in der merkwürdigen Wechselsticherepidemie, welche Schelhammer in diesem Jahre zu Kiel beobachtete <sup>4)</sup>, läßt sich der Einfluss des erysipelatösen Elements nicht verkennen. Dieselbe begann im September und dauerte den Winter hindurch. Vorher hatten die Blättern eben so allgemein als gutartig geherrscht. Auch dieses Wechselsticher war so gelind, dass nur sehr wenige Kranke, und selbst diese nur bei schlechter Behandlung starben. Schelhammer selbst will dasselbe nicht als Wechselsticher gelten lassen, weil das Fieber den anhaltenden Typhus hatte; nichtsdestoweniger kann es nur für ein solches gehalten werden. Denn erstens dauerte es oft zwei, ja dreifach Monate unverändert fort, und ferner gab sich doch die Intermission deutlich genug zu erkennen <sup>5)</sup>. Die Hauptzufälle waren gänzliche Appetitlosigkeit, wobei sich die Kräfte fort-

1) In Giesen's Augenblicke, Ende October 1839, herrschte in dem Krausauer Bisthumsgebiet eine der von Sydenham beschriebenen durchaus ähnliche (erysipelatöse) Krankheitsaffection, die sich hier und da bereits in ausgebildeten Ruhr- (Darmstuhl-) und Scharlach-Epidemien (Schlesien) großemacht hat.

2) Sydenham, l. c. p. 721. Anhang, das p. 727.

3) Gakstrop vander Mullen, etc.

4) Schelhammer, Gakstrop Chr.: *De febris epidemica, quae obnoxetatae quaque alios exente mense Septembris per hunc mensem fuit febribus*. In *Epitom. N. G. Dec. III.* vol. 5 et 6, p. 335 seq.

5) „*Si quis flebat sine cibo et cum pite preputis, quod mireris, per menses integros, immo ne diutius vel ultra, nec plura deiectiones (stercus) erigebat, nisi se et moribundis talis per rationem mihi expedit, fieri febrem continens rari, sine ulla vel intermissione vel certa ac periodica remissione, et si a moribundis graves laborarent, nunquam ut feriantur, et pite et urina mihi cantarent, modo piteina apparet, undecumque in corpore sic teperat. Ut quoniam hodie perhibere habere existimetur, exstima die habere desperationem, et tamen pite die labor naturae recuperatae, bene sperare et jubere deinde etc.* — L. c. p. 336.

[1691.]

während bis nach der Krisis erhielten, anhaltende, sehr lästige, reissende Gliederschmerzen, zu Anfang Durchfälle, die häufig auch blutig waren, und die Kranken sehr erleichterten, leichter Sopor, unbedeutende Delirien in der Exacerbation u. s. w. Schellhammer behandelte das Uebel Anfangs mit Brechmitteln, Andere wollten von gelinden Abführungen sehr gute Erfolge beobachtet haben; später wandte er gelinde Aromatica u. s. w. an, oft entschied sich die Krankheit durch reichliches Nasenbluten, meistens durch kritischen Schlaf. Bismuth und erhitze Dinge schadeten; der China wird nicht erwähnt. Es ist indess mit grösster Wahrscheinlichkeit zu vermuthen, dass dieses Mittel, vielleicht in Verbindung mit Salniak, Rheum u. s. w., die besten Dienste geleistet haben würde.

Zu Jena wurde im J. 1696 eine ganz besondere Häufigkeit von Abortus und schweren Geburten bemerkt <sup>1)</sup>.

1697 — 1704. Pressburg: Petechialtyphus. Masern, Ruhr. — Löw.

Dieselbe Unbeständigkeit der Witterung zeichnete auch alle folgenden Jahrgänge bis 1704 aus. Nach Löw's Angabe waren in dieser Zeit zu Pressburg die Petechialfieber die vorwaltende epidemische Erscheinung. Sie steigerten sich im Frühjahr 1704, während der Belagerung durch die Ungarn, zu gefährlichen Lagerfiebern, für welche besonders die ausgeheilte Frieselcomplication hervorgehoben werden muss. Der erysipelatöse Krankheitscharakter aber gab sich durch die gleichzeitig herrschenden Masern, denen im Juli und August die blutige Ruhr und Rheumatismen der Extremitäten folgten, deutlich zu erkennen. Löw beobachtete bei dieser Ruhr vom Opium nur geringen Erfolg. Aehnlich verhielten sich die Jahre 1705

1) Wirtz, *De morbo acuto epidemico*. Jen. 1697. 4. ohne eigene Angaben.



und 1706, für welche wieder epidemischer Icterus angeführt wird<sup>1)</sup>).

**Fr. Hoffmann. Die Breslauer Aerzte. — Italien.  
Baglivi, Lancisi.**

Ganz entsprechend sind die Beobachtungen einer Menge Anderer, von denen wir zunächst die Fr. Hoffmann's und der Breslauer Aerzte hervorheben.

Auch zu Halle wurde das Faulfieber, wie Hoffmann die mit dem Petechialtypus zusammenfallende Krankheit nennt, durch eine auffallend gelinde Winterwitterung und durch die während derselben herrschenden Blüthen eingeleitet. Die Beschreibung Hoffmann's gehört, obwohl sie nur das Bekannte wiederholt, zu den werthvolleren.

Der mäßig kalte Winter des Jahres 1699 brachte zu Breslau sehr häufig „*Pleuritis sotta*.“ Gleichzeitig herrschten Petechialfieber, bei denen zuweilen selbst Bubonen vorkamen<sup>2)</sup>. Häufig gesellten sich zu diesen Fleckfebern Parotiden und Anginen. — Der Sommer war unfreundlich, reich an Katarrhen, Gallenfiebern und Rahren, neben denen die Blattern und Masern verbreitet waren. Charakteristisch ist die Schilderung häufig vorkommender erysipelatöser Aphthen<sup>3)</sup>, und „*Siganto*“ in der Mundhöhle, aus denen Blut ausschwitzte; eine Erscheinung, welche mit ähnlichen Vorgängen auf der Dickdarmschleimhaut bei manchen Formen der Ruhr identisch seyn dürfte.

Ähnlich beschreiben die Breslauer Aerzte die Witterungs- und Krankheitsconstitution des nächstfolgenden Jahres (1700).

1) L. v. L.

2) *Hist. medicæ, Fratrator*, p. 24. — Diese hochst werthvolle Sammlung von rationelles Deskript der nicht wissenschaftlichen Geschichtswissen der Breslauer Aerzte, wurde von einem der angesehensten derselben, von Heubrich redigirt, und später noch einmal von Haller herausgegeben. Sie kann noch jetzt als Muster einer epideimiographischen Arbeit dienen.

3) „*Filum non raris repetitionibus plagiis in superius quasi erysipelatosis cum eruptione mammarum et alijs stadiis utrisque febribus et alijsque morborum transiendis*,“ — p. 67.

[1709.]

in welchem sich der erysipelatöse Charakter noch gesteigert zu haben scheint. Vorzüglich herrschten einfacher Rothlauf, Scharlach und Friesel bei Kindern und Wüchserinnen. Das angebliche Vorkommen des Friesels bei Kindern beruht indess vielleicht auf einer Verwechslung des Scharlachfriesels, bei welchem sich, zuweilen ziemlich grosse Papeln auf dem allgemeinen erysipelatösen Grunde erheben, (eine bei Kindern sehr häufige Form), mit dem wahren Friesel, für welchen das kindliche Alter nur geringe Anlage hat. — Im J. 1701 herrschten zu Breslau keine eigentlich epidemischen Krankheiten, und die Sterblichkeit war um etwa 200 geringer als das vorhergegangene Jahr. — Aber schon im J. 1702 erneuerten die Blattern und vorzüglich die Masern ihre Herrschaft, während gleichzeitig Friesel und scabulöse Affectionen häufig waren. An die Vieldeutigkeit des letzteren Ausdrucks bei den Aerzten dieser Zeit haben wir schon wiederholt erinnert; nicht viel später (1721) bezeichnete ein Nürnberger Arzt die *Urticaria* als eine „*effectio scabulosa*.“

Jedenfalls war diese erysipelatöse Krankheitsconstitution sehr verbreitet, denn der Garotillo, der bei aller wesentlichen Verschiedenheit doch eine formelle Verwandtschaft mit dem Scharlach darbietet, herrschte nicht allein in diesem Jahre in Spanien, sondern auch auf der Insel Milo im griechischen Archipelagus<sup>1)</sup>. Zur fernerer Bestätigung der allgemeinen Verbreitung dieses Krankheitsgenius dienen auch die im J. 1701, noch mehr aber im J. 1702, welches sich durch einen nassen Frühling und Sommer auszeichnete, allgemein verbreiteten Rubren und ruhrartigen Durchfälle<sup>2)</sup>, und wie gross die Zahl der Epizootieen dieser Zeit sey, wird sich aus der unten folgenden besondern Betrachtung derselben ergeben. Zugleich waren die Blattern in den weitesten Kreisen verbreitet, und ausser Breslau werden in Bezug auf ihr Vorkommen Rom

1) Schwaner, II. 232.

2) Vergl. Wepfer's im Schiffsverzeichnisse angeführte Beschreibung über die im J. 1702 zu China herrschende Ruhr.

und Nordamerika genannt. Zu Boston herrschte gleichzeitig eine dem Scharlach ähnliche Epidemie.

Das J. 1763 bezeichnen vulkanische Eruptionen, Erdbeben, Regengüsse, Ueberschwemmungen, namentlich in Italien. Wenig bedeutend war im Ganzen der Einfluss dieser Ereignisse auf die Häufigkeit und Gestaltung der Krankheiten, nur zu Rom wird häufiger Schlagflüsse und Fehlgeburten gedacht. Bei den ersteren, die sich namentlich im J. 1765 sehr oft zeigten, fand Mistichelli die Anwendung des Glüheisens auf die Fusssohlen sehr erspriesslich. Fast scheint es indess, als seyen diese Apoplexien mehr als Symptome eines anderweitigen Leidens aufgetreten; wenigstens sagt Mistichelli, bösartige Fieber seyen oft in Apoplexie übergegangen <sup>1)</sup>. Ausserdem kann der *Fever maligna und enterica* Baglivi's <sup>2)</sup> zu Rom gedacht werden, die man für Schleimfieber gehalten hat, obschon aus den Angaben des genannten Beobachters nichts Sicheres für die Natur derselben hervorgeht. Jedenfalls indess standen sie mit den Wechselfebern in Verbindung, welche, wie gewöhnlich, auf die Ueberschwemmung der Stadt durch die Tiber am 23sten December 1762 folgten.

Mehrere solcher ausgebildeter Wechselfeberepidemien gedenkt Lancisi <sup>3)</sup>. Dieselben kamen im J. 1765 zu Orvieto <sup>4)</sup>, 1767 zu Bagnara <sup>5)</sup>, zu Pesaro <sup>6)</sup>, 1769 zu Agnani, Frosinone und Ferentino vor, und wurden überall, (und das zu beweisen ist Lancisi's Hauptaufgabe), zunächst durch lokale Einflüsse, namentlich Stürze, Haufkröten (Orvieto) u. s. w. bedingt <sup>7)</sup>; obschon der Einfluss dieser Schädlichkeiten gewiss auch durch allgemeinere Verhältnisse an Wirkbarkeit gewann.

1) Mistichelli, Dom., *Trattato dell'apoplezia, la ragione di quel male, con nuovi ed efficaci rimedii*. Rom. 1769. 4. (S. Haller, *Niss. med.* p. 11, 428.)

2) Baglivi, *opera sua*. Lugd. 1714. 4. p. 58 seq.

3) Lancisi, *de mor. pedes. efflu.* Al. 1771. p. 185.

4) Das.

5) Das., p. 202.

6) Das., p. 245.

7) Oram, B. 56 ff.



**1709. Strenger Winter. Rheumatische Krankheits-  
constitution. — Lancisi, Ramazzini, Fr. Hoffmann.**

Leicht würde es seyn, die Nachrichten für diese Periode zu häufen, wenn chronistische Vollständigkeit in unserer Absicht läge. Nur der ausgebildeten rheumatischen Krankheitsconstitution möge gedacht werden, die sich nach dem noch jetzt im Andenken des Volks lebenden furchtbaren Winter des Jahres 1709 entwickelte, und zu Rom von Lancisi, zu Venedig von Ramazzini, und zu Berlin von Fr. Hoffmann beschrieben wurde. Dieselbe Constitution war nach Lancisi auch in Frankreich und Holland verbreitet; im letzteren Lande herrschte ein Dunkirk-Rant genanntes Fieber <sup>1)</sup>. Zu Rom hatten im Anfange des Winters katarrhalische Affectionen, die sich leicht, vorzüglich bei Vernachlässigung der leichteren Formen, zu Anginen, Bronchell- und Lungenentzündungen steigerten, die Oberhand. Man bezeichnete dieselben mit dem alten Namen der Influenza, Mal di Castrone. Schweich <sup>2)</sup> betrachtet die Epidemie dieses Jahres, als Influenza, insofern trägt Gluge <sup>3)</sup> mit Recht Befenken, sie dafür unbedingt zu erklären, wenn er auch unter den Gegengründen sich fälschlich auf das gleichzeitige Befallenseyn von Rom und Berlin beruft. — Nach Lancisi wurden die Kranken zuerst von allgemeiner Abgeschlagenheit, dann von heftigem Fieber, hernachziehenden Schmerzen in der Brust, und heftigem, Anfangs trockenem Husten befallen. Der Puls war hart, der Urin fetzig, zuweilen trübe; bald wurde die Respiration brotzt, Blut ausgeworfen, die Wangen rötheten sich, und die Haut flähte sich, wie im leticus, gelb. Erscheinungen, welche, mit Ausnahm der letzteren, das rheumatisch-entzündliche Leiden deutlich darlegen.

1) Im J. 1709 herrschten zu Eufaut, wie aus einer streng kritischen Vermuthung hervorgeht, Blattern und Masern, — in Cassel'n bössartige Fieber.

2) Schweich, die Influenza, S. 79 Z.

3) Gluge, die Götze, S. 69 Z.

In die Gefängnisse der Inquisition, welche gut geheizt und vor dem Nordwind geschützt waren, drang das Uebel nicht; eben so wurden Vernehmene und Solche, die sich wärmer zu bekleiden vermochten, weit weniger heftig als die ärmeren Volksklassen befallen. Die Krankheit entschied sich günstig durch Schweiß, starkes Nasenbluten, Durchfall, starken Urinabgang, und mitunter durch gekochte Sputa. In vernachlässigten Fällen stellten sich auch wohl Delirien u. s. w. ein, nie aber zeigte die Krankheit den nach dem damaligen Wertsinne malignen, d. h. typhösen Charakter. — Da die Epidemie in die Fastenzeit fiel, so wurde durch ein besonderes päpstliches Edict (von Clemens XI.) den Bewohnern der Hauptstadt *astrucationes* der Genuss der Milch- und Eierspeisen frei gegeben, indem die Aerzte diese zur Auflösung der „Schläfen“ für geeignet erklärten<sup>1)</sup>. Denn in der Nosologie derselben spielte das „*Sed nitrax*“ die Hauptrolle, ohne indess in der Therapie auch nur im Geringsten berücksichtigt zu werden. Hier hielt sich Lancisi an den *Adeunis*, reichliches schleimiges und verdünntes Getränk, und an die Zugflaster, zu deren Anwendung eisige Fülle, in denen sich kritische Geschwülste an den Unterschenkeln bildeten, um so mehr aufzufordern schienen<sup>2)</sup>. Gelinde Abführmittel waren eben so zuträglich als Drastika nachtheilig. Bestimmungen, denen sich die übrigen Aerzte Roms in einer wegen dieser Epidemie gehaltenen Conference im Allgemeinen anschlossen.

Die Epidemie hatte bereits mit der im Februar sich einzuerhebenden Temperatur ziemlich nachgelassen, als ein neuer Schauerfall zu Anfang März, Regen und Austreten der Tiber sie wieder steigerten, bis sie endlich als rheumatisches Fieber mit dem Eintritt warmer Witterung im April ihr Ende erreichte.

Nichtsdestoweniger trat das Uebel schon im Mai, bis zum Juni anhaltend, von Neuem, und zwar in ungleich bösartigerer,

1) Lancisi, l. c., p. 831 u. 885.

2) Id. p. 442.

[1788.]

typhöser Form, welcher selbst die Petechien nicht fehlten, mit einem Worte als typhöse Pneumonie wieder hervor, vorzüglich in den ungesunden an der Tiber gelegenen Stadtvierteln. —

Zu Venedig wurde durch die unter dem Einfluss der Kälte entstandenen Krankheiten die Serblichkeit ansehnlich vermehrt<sup>1)</sup>. Auch hier waren es vorzüglich Brustaffectionen, Husten, Brustfell- und Lungenentzündungen, denen zuerst Kinder, Greise und Schwächlinge, dann aber auch kräftige Personen aus allen Ständen häufig erlagen.

Fast ebenso, obwohl etwas milder, gestaltete sich diese rheumatische Krankheitsconstitution zu Berlin, wo sie indess erst im April und Mai, mit dem Nachlass der Kälte, sich zu offenbaren begann<sup>2)</sup>. Die von Hoffmann geschilderten Zufälle haben in der That eine sehr grosse Ähnlichkeit mit der Influenza, und selbst der häufige Uebergang der Brustaffectionen in Phthisis fehlte nicht.

Wir brechen hier ab, um unsere Betrachtung einer Krankheit zuzuwenden, welche, wesentlich dem Schosse des 17ten Jahrhunderts entsprossen, gerade in dieser Zeit bereits eine Rolle zu spielen angefangen hat, deren ganze Bedeutung vielleicht erst erkennbar seyn wird, wenn auch die ungeheuren Krankheitsvorgänge unserer nächsten Vergangenheit dem unbefangenen Blicke der Geschichte zugänglich seyn werden. — Nur durch die Zusammenstellung des Friesels mit den seine Wiege und seine spätere Entwicklung umgebenden epidemischen Erscheinungen dürfte die Erkenntniss seiner wahren Natur erreichbar erscheinen. Diese Vereinigung desselben mit verwandten Erscheinungen haben wir, so viel als möglich, in der folgenden Darstellung festzuhalten versucht.

1) Ramazzini, *de frigore hyemali* ann. 1789. *Op. omnia*, et N. J. de al. opp. tom. p. 791 seq.

2) Müllergelirtalen, wenn er von gleichzeitiger Verbreitung des Epidemie in Italien und Deutschland spricht. Im Gegentheil würde aus dem späteren Befallensvertheilen von Berlin sich selbst ein Grund für die Influenzannahme derselben ergeben, welche sich bekanntlich in dieser Zeit sehr häufig von Süden nach Norden verbreitete.



## Der Friesel.

Wenn überhaupt die Geschichte der Volkskrankheiten die mannigfaltigsten und sichersten Beweise liefert, dass keine bedeutende Erscheinung in dem kranken Leben der Menschheit ihre Rolle spielt, ohne längere oder kürzere Zeit vor der Offenbarung ihrer vollen Eigenthümlichkeit in Andeutungen, mannigfachen Uebergängen und Vorläuferformen die Spuren ihrer beginnenden und fortschreitenden Ausbildung an den Tag gelegt zu haben, wenn dieselbe besonders zeigt, dass die anscheinend getrennten Formen der sich im Verlaufe der Jahrhunderte folgenden Seuchen des Menschengeschlechts in einer innigen Verbindung mit einander stehen, so ist dies mit der Geschichte des Friesels in vorzüglichem Grade der Fall. Wir haben bereits im ersten Theile dieser Schrift <sup>1)</sup> den Versuch gemacht, die Erscheinung des englischen Schweixes als die erste, wenn auch vorübergehende, doch durchaus nicht zu verkennende Andeutung der bevorstehenden Ausbildung des Friesels darzustellen, und namentlich zu beweisen gestrebt, dass der englische Schweix die Uebergangsform des Petechialtyphus zum Friesel, die Verbindung des typhösen mit dem rheumatischen Elemente bildete. Jetzt sey es versucht, die fernere Geschichte dieses letzteren insoweit aufzuleuchten, als es einerseits die Wichtigkeit einer Krankheit erfordert, die mehr wie irgend eine andere das Interesse der Gegenwart in Anspruch nimmt, und als es andererseits die Ausdehnung der uns zu Gebote stehenden Quellen möglich macht <sup>2)</sup>.

Die Frage nach dem Alter des Friesels hat die meisten Schriftsteller <sup>3)</sup> bis auf Hippokrates zurückgeführt <sup>4)</sup>, welcher

1) Th. I. S. 225 ff.

2) Vergl. Rosenhau's (unvollendeten) Versuch einer Geschichte der Frieselpestepidemien, in Becker's Annalen Bd. 28.

3) Z. B. Scip. Dion. de purpurea nocte antiqua, cap. 2. — Taillier, *exercitation de febre militari vocata hunc (terribilem)*. Opus. tom. II, p. 227 seq. — Vogel, *prophet. de regis, et curand. princip. c. 4. effect.* p. 79 seq. — Gräner, *med. milit. p. III. seq.*

4) Hippokrates *Epid. II. Sect. III. p. 192. (ed. Foix)*. „In febris ac-

ein Sommerfieber beschreibt, welches am Fraten befiehet, ohne je tödlich zu seyn. Da aber in dieser Stelle eben so wenig als in einigen andern bei Hippokrates<sup>1)</sup>, Aëtius<sup>2)</sup> und bei den Ärzten weder der kritischen Frieselschweisse, noch der dem Frieselausbruche vorhergehenden und ihn begleitenden Herzaffectionen u. s. w. gedacht wird, da ferner die Krankheit im Gegensatz zu den späteren Friesel epidemien absolut gutartig war<sup>3)</sup>, so ist kein Grund vorhanden, um nicht mit Eisenmann<sup>4)</sup> anzunehmen, dass frieselähnliche Ausschläge den Alten eben so wenig unbekannt waren, als sie noch jetzt zu verschiedenen acuten Krankheiten, namentlich exanthematischen, (Blattern, Masern, Scharlach, Petechialtyphus, Pest u. s. w.) hinzutreten, dass aber der Friesel, als eigenthümlicher und selbstständiger Krankheitsprocess, denselben unbekannt war. Ausserdem beruft sich Eisenmann darauf, dass der Friesel nach allen bisherigen Erfahrungen nur zwischen dem 40sten und 50sten Grade nördlicher Breite vorgekommen ist.

Desto zahlreicher, wenn auch Anfangs unbestimmt, sind die Nachrichten über epidemische Vorläuferformen des Friesels im 16ten Jahrhundert. — Wir haben schon im ersten Theile dieser Schrift, als eine charakteristische Eigenthümlichkeit der in den Volkskrankheiten des 16ten Jahrhunderts so auffällig sich kundgebenden Umgestaltung der epidemischen Krankheitsconstituten, den auffallenden Zug der Krisen und krisenartigen Erscheinungen nach der äussern Haut hervorgehoben, und als Beweise für diese Behauptung, ausser dem bedeutenden

*Una natura eorum festinans, utque et minus bene agere solent quodam saluberrimo, calidum mersum per stellas, quae tamen non adeo sunt periculosae, in status eorum indicantibus, et ad judicandum usque perducunt. Ac hoc quidem indicantibus illi respondit: Malle ut eis talia fierent, nulla morbo erat. Illudque minus vixit acrius et superius, quousque illud cum adfectum aliquem daret, quibus talis vixit debet. Neque tamen in totum periculosa.*<sup>5)</sup>

1) Hippocratis u. Epid. I. libr. 3. cap. 2.

2) Aëtius, Ystoria II, vers. I. cap. 323.

3) Ein Punkt, den schon Salgmann wider den Gegenstandes anführt.

4) Eisenmann, die Wundheiler u. s. w. S. 282.

ren Hervortreten des Petechialtyphus, die anfänglichen Formen der Syphilis, vorzüglich aber den englischen Schweiss benützt. Wie wir aber das enge verwandtschaftliche Verhältniß des Petechialtyphus zum englischen Schweiss dort näher bewiesen zu haben glauben, so finden wir einen ferneren Anhaltspunkt für diese Behauptung in den mannigfachen Übergängen des Petechialtyphus im 16ten, noch mehr aber im 17ten Jahrhundert in den Friesel, oder, mit andern Worten, in der Geneigtheit des ersteren, sich auf der Haut vorzugsweise durch Frieselausschlag zu entscheiden, der ihm ja, in untergeordneter Weise, und neben den ausgebildeteren Exanthenen, niemals fremd war.

Wenn man noch sicherlich zu weit gehen würde, wollte man in den zahlreichen Beobachtungen des 16ten und 17ten Jahrhunderts, wo sich neben und nach den Petechien im Petechialtyphus Friesel entwickelte — abgesehen von der leichten Verwechslung des so häufig als „*Purpura*“ bezeichneten Petechienausschlages mit dem Friesel — den wahren Friesel erblicken<sup>1)</sup>, so läßt sich doch nicht leugnen, dass die Schriftsteller dergleichen frieselartiger Ausschläge beim Petechialtyphus, zu denen sich zuweilen selbst noch andere, gerade für den Friesel sehr charakteristische Krankheitserscheinungen gesellen, in der genannten Zeit zu häufig erwähnen, als dass man nicht in einen tieferen Zusammenhang dieser Verhältnisse denken sollte. Hieher gehören vorzüglich die Stellen bei Petrus Salinus Diversus<sup>2)</sup>, Riverius<sup>3)</sup>, Diemerbroeck<sup>4)</sup>, Octavianus Roboretus<sup>5)</sup> und Andern, die Allioni<sup>6)</sup> anführt, und zu denen sein Uebersetzer<sup>7)</sup> noch mehrere hinzufügt.

1) Das ist sehr häufig geschehen. Der Brückingus vergesst (vergiß) nicht z. B. wieder bei Heer, noch bei Rivamontius, noch bei Fontana vom Friesel (Rosenkranz) sondern lediglich vom Petechialtyphus die Rede ist.

2) *De febre pestilenti*, cap. 17.

3) *Præf. med. lib. XVII. sect. III. cap. 1. de febre pestilenti*.

4) *Traicté de pest. lib. XVII. etc.*

5) *Traicté de febre pestilenti, etc. Traicté 1692. 4. p. 188.*

6) Allioni, p. 11 ff.

7) Dieser (Wigand) benützt Allioni's Schrift außer vielen Andern.



Nichts desto weniger beginnt die eigentliche Geschichte des Friesels erst da, wo er auf dem Schauplatze der Volkskrankheiten erscheint, mit der Periode seines ausgeprägten epidemischen Auftretens, obschon auch diese in eine frühere Zeit als die gewöhnlich angenommene fällt, wie die unruifelhafte, von Octavius Odoricus beschriebene Epidemie des Friesels beweist, welche im J. 1523 in Oberitalien herrschte <sup>1)</sup>. Das Auftreten dieser Epidemie dürfte aber die neuere Entstehung des Friesels um so schlagender beweisen, als seit dieser Zeit kein Land mehr als die Lombardie von demselben heimgesucht worden ist. Irrig ist deshalb die Annahme von Fantoni und Giudotti, welche den Friesel erst seit dem J. 1711 oder 1715 in Oberitalien bekannt seyn lassen <sup>2)</sup>.

Ein Zeitraum von mehr als hundert Jahren liegt zwischen dieser ersten Nachricht und der Epidemie des Jahres 1622 zu Leipzig. Die Ursachen dieses Verschwindens sind in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt, und der nicht zu fern liegende Gedanke, dass vielleicht das bedeutende Hervortreten der „ungarischen Krankheit“ in dieser Zwischenperiode dem Friesel in seiner durch den englischen Schweiss so überaus energisch eingeleiteten ferneren Ausbildung zurückgehalten habe, lässt doch noch die grosse Frage nach der Ursache eines so auffallend schnellen Wechsels der damaligen Krankheitsconstitution übrig. Die Aerzte, welche die ersten Ausbreitungen der neuen Krankheit beobachteten, liessen es nicht an zum Theil sehr sonderbaren und lächerlichen Vermuthungen fehlen, und nur Wenige versuchten sich, wie Sydenham, zu der Ansicht zu erheben,

lungen vorzüglich mit einer sehr fröhlich und mit vieler Kritik zusammengestellten Literatur des Friesels. Schon Wigand bemerkt, dass die gewöhnlich bei dem Friesel mit angeführte Schrift von Neercant, *De purpura sive agnata*, Lub. 1618, *Ercepsus*, et Lub. 1666, durchaus nicht vom Friesel handelt. An Carissus mag noch bemerkt werden, dass die von Violen angeführte Dissertation: *Columna, de Purpura, cum adstantibus Morbis*. Köln, 1573, wie wir uns aus seiner Ansicht überzeugen haben, nicht vom Friesel, sondern von der Purpura schrecke handelt.

1) S. histon.-pathol. Cytus, I. S. 163.

2) Damilano, Vireole.

dass das neue Uebel als ein durch den Entwicklungsgang der Krankheitswelt gegebenes zu betrachten sey.

So hielten Friedr. Hoffmann<sup>1)</sup>, und nach seinem Beispiele Viele Andere<sup>2)</sup>, den Friesel für eine durch die allgemeinere Einführung des Thee's und Kaffee's entstandene Krankheit. Andere wieder schrieben die Ausbreitung des Uebels einem nach Hamilton aus Indien stammenden, durch herumziehende Soldaten, namentlich Polen und Russen, Uebersiedelungen u. s. w. verschleppten Contagium zu<sup>3)</sup>.

Wir selbst mögen die Vermuthung nicht unterdrücken, dass vielleicht die Entstehung des Friesels mit der in der Mitte des 17ten Jahrhunderts allgemein, namentlich aber in Sachsen verbreiteten scorbütischen Krankheitsstimmung im Zusammenhange stand. Welsch selbst beginnt seine Schrift mit der Bemerkung, dass der Seeschiff zu seiner Zeit an der Spitze der epidemischen Krankheitsconstitution gestanden, und einen früher nie gekannten unheilvollen Antheil an der Gestaltung vieler Krankheiten genommen habe<sup>4)</sup>. Es bedarf hier nur noch der Hinweisung auf die im ersten Theile dieser Schrift von uns mitgetheilten bestätigenden Bemerkungen eines andern Leipziger Arztes aus dieser Periode, um unserer Vermuthung einen nicht unbedeutenden Grad von Wahrscheinlichkeit zu geben<sup>5)</sup>.

1) Hoffmann, *med. rat. system. II, P. I, Sect. I, c. 9.*

2) X. B. v. d. gewisser Reinhard, Physikus zu Sagan, welcher den Friesel sogar in schärflichen Heilswässern heilung? Das werden von Haller auch von Sprengel verurtheilt. Auch schreibt sündlich selten zu seyn. (S. das Schriftenverzeichniss.) Ein ähnliches Gedicht desselben Verfassers handelt „de febrilius intermittentibus speciebus seu epidemicis.“ Glogau. 1759.<sup>12</sup>

3) *Acta medicae. Brasili. Vol. II, p. 2.*

4) Welsch, *ob. cit.* — „Cujus rei veritatem vel falsam inter alios, cum attulit et erat jam nunc communis et familiaris, tractatum ferere poterit solutus; qui cum enavigavit se per transietum quidem mare fuerit, imperiosius tantum dicit, in superioribus etiam hoc mare Germaniae, cum adhuc in late conculcatus tum natus sit, ut plurimum sua tantum non lege ac contagio per se infectum exerceat, sed alio etiam modo periclitari sine implere non erubescit.“

5) DRAWITZ, Bericht vom Unterrichts von der Krankheit des schwermächtigenden Scharbuchs. Erste Aufl. Leipz. 1687. Vergl. Hahn. pathologische Entz. I. 8, 270 ff.

Unter den zahlreichen Bestätigungen dieser Behauptung, welche die ärztlichen Schriften jener Zeit darboten, kann vorzüglich die Beobachtung eines epidemischen scorbutischen Uebels hervorgehoben werden, von welchem Kbern<sup>1)</sup> Nachricht gibt. Im Anfang des 18ten Jahrhunderts wurden zu Hartberg<sup>2)</sup> alle Frauen, mit Ausnahme von denen, welche das dreissigste Jahr überschritten hatten, zu Anfang April eines nicht angegebenen Jahres von einer Krankheit ergriffen, welche mit Frost und darauffolgender Hitze begann, und mit folgenden Tage mit Nachlass der Hitze in einem Schmerz in dem linken Hypochondrium überging, mit welchem eine deutliche Auftreibung der Milzgegend verbunden war. Durch Diaphoretica und Antiscorbutica verschwand diese Anschwellung bald, statt ihrer stellten sich Zahnschmerzen und Excoriationen des Zahnfleisches ein, so dass bei der leisesten Berührung des letzteren mit der Zunge sich die Oberhaut desselben ablöste. Eine Ursache des sonderbaren Uebels liess sich durchaus nicht auffinden, noch weniger aber eine Erklärung, warum kein einziger Mann und dagegen alle Frauen von demselben befallen wurden.

Erkannte ja auch Stoll, dieser scharfsichtige Beobachter der epidemischen Krankheitsverhältnisse, den grossen Einfluss, welchen diese letzteren auf die Krankheiten der Wöchnerinnen ausüben, als er die Worte aussprach: „*Nullo febris est, quae non aliquando in puerperam cadat, ea vero praecipue, quae constitutioni praestet.*“

Wenn wir aber hier jenen denkwürdigen Antheil des Scorbut an der Gestaltung der Volkskrankheiten der genannten Zeit hervorheben, so kann es uns nicht in den Sinn kommen, diesem Antheil eine so weite Ausdehnung zuzugestehen, als sich dies viele Aerzte der damaligen Zeit erlaubten. Schon früher

1) Kbern, *Affectio scorbutica mulieribus Hartbergensibus ante aliquot annos epidemica.* (Eph. N. C. Göt. L. et II. p. 323.) Kbern theilt seine Mittheilung vom J. 1789.

2) Wie sind dieser Kunde, die Tage dieses Ortes nicht zu bestimmen.



haben wir darauf hingewiesen, dass die Aerzte aller Zeiten nur zu oft räthselhafte Erscheinungen aufgeklärt zu haben meinten, wenn sie einen Namen für dieselben gefunden hatten, und so sprachen auch die Beobachter des 17ten Jahrhunderts häufig von scorbutischen Complicationen, um die geringen Erfolge ihrer Kurmethoden bei gefährlichen Zuständen jeder Art zu entschuldigen. Sollen wir dann erinnern, wie die Sache in unsern Tagen nur den Namen gewechselt hat, und wie Arzt und Laie sich beruhigen, wenn irgend ein Uebel „nervös“ und damit notwendig menschlicher Kunst unerreicherbar warde?

Es ist höchst auffallend, dass wir, im Gegensatz zu andern ursprünglich örtlich beschränkten Epidemien, den Friesel zuerst in Leipzig erblicken, wo weder früher noch später Friesel-epidemien geherrscht haben. Nichts desto weniger drängt sich die Vermuthung auf, dass das Uebel vor der genannten Epidemie sich in jenen Gegenden zeigte, deren endemische Verhältnisse noch heute sehr häufig der Entstehung und Verbreitung des Friesels Vorschub leisten, wie z. B. Oberitalien und einige Distrikte Frankreichs.

Wenn auch aus der (sehr seltenen) Dissertation Hopp's, die im J. 1652 zu Leipzig erschien, unzweifelhaft hervorgeht, dass der Friesel den Leipziger Aerzten schon vor Welsch bekannt war, so gebührt doch dem Letztgenannten das Verdienst, die erste Beschreibung des ausgebildeten und als neu erkannten Uebels gegeben zu haben. Nichts desto weniger liefern Hopp's Angaben sehr werthvolle Fingerzeige für die Erkenntniss der allmäligen Entwicklung des Friesels, welchen die Leipziger Aerzte vor dem Zeitraume, aus welchem die Beobachtungen von Welsch herrühren, vom Scharlach, Nesselfriesel und andern exanthematischen Fiebern nicht zu unterscheiden im Stande waren. Dies geht aus den unten angeführten Worten, mit welchen die Hopp'sche Dissertation beginnt, deutlich hervor<sup>1)</sup>. Wir werden aber später Gelegenheit fin-

1) „Filiis nostris per aliquot annos Lepore interit et cum illis circumjacentibus late alio plurimum fore deficiat, ante non observato symptumate infestis-

[1652.]

den, die Entwicklung des lichten Friesels in andern Epidemien unter ähnlichen Umständen zu beobachten. Man könnte glauben, dass Hopp die Purpura mit den Petechienmischlage verwechselte, wenn er sich nicht selbst feierlich gegen eine solche Verwechslung verwahrte. Zudem erwähnt er, dass das Volk die neue Krankheit Friesel nenne, dass sie allerdings Personen jedes Alters und Geschlechts, vorzüglich aber doch Kinder und Frauen ergreife. Einer besondern Opportunität der Kindbetherinnen gedenkt Hopp nicht, obschon unter den Ursachen auch „*Lochia in puerpera retenta*“ vorkommen. Die untenstehende Beschreibung der Hauptzufälle der Krankheit wird am leichtesten das Verhältniss derselben zu dem ausgebildeten Friesel erkennen lassen <sup>1)</sup>. Dieser aber ist ex officio, ihm wir in der Schilderung von Welsch begegnen.

#### 1652. Leipzig. — Gottfr. Welsch.

Seit dem J. 1652 beobachteten die Leipziger Aerzte eine ausschliesslich Wöchnerinnen befallende Krankheit, welche sowohl durch ihre Neuheit, als durch ihre grosse Gefahr allgemeinen Schrecken verhehrete. Sie hefiel die meisten Wöchnerinnen schon am 2ten, häufig am 4ten bis 7ten Tage nach der Niederkunft, selten später, und nur in einem Falle sah Welsch den Friesel auch nach 5 Wochen entstehen. Nach einem kurzen Froste folgte bedeutende Hitze, heftige Angst,

264. *Cutis tollitur vel mollescit vel sanguis ex ea portum occupat color impendit rubens aut etiam purpureus, cum aliquot lateribus infamescentibus ut et eructat urinate, quoniam in destinatione morbi exasperant epidermidis eructa frigiditas tandem desinit etc.*<sup>1)</sup>

1) Hopp, §. 15. „*Cutis tum effervescens tum mollescit in punctis praeveniens plures sunt, quod videtur. Tunc sunt et actionibus quibus tanta cupit gravitas et dolor pulcherrime, humilitas totius corporis, ardor et urinae puriorum sub cute rite transiens, urinae per longum perit. Urinatio frequent, puriores in somno, tumores evadentes non potius, spectra phantasma rerum vulgarium et horrendissimum, delirium, insillies vel epilepticae insensibilis, pulvis oculis et frequenter de rebus, difficultas et rite respiratio, tussis libera et alia. Ex eructibus gravior humilis, turbulencia et multiplex, haemorrhagia utrina, pusillitas, diarrhoea, lacrimae lacrimositas etc.*“





[1656.]

## 1656. Augsburg. — G. Hieron. Welsch. Lucas Schroeckh.

Die nächste Nachricht über das Frieselfieber findet sich bei einem Augsburger Arzte, G. Hieron. Welsch<sup>1)</sup>, welcher im J. 1656 die neue Krankheit bei einer jungen Wöchnerin beobachtete. Dieselbe starb, und die ihr beistehenden Weiber schrieben ihren Tod, vielleicht nicht ganz ohne Grund, den kalten Umschlägen zu, welche der Arzt, des Kopfschmerzes wegen, verordnet hatte. Später scheint der Friesel in Augsburg häufig vorgekommen zu seyn, indem derselbe Welsch, welcher im J. 1677 starb, bemerkt, die Fieber der Wöchnerinnen würden mit bernardischen und schweisstreibenden Mitteln glücklich geheilt<sup>2)</sup>. Später beobachtete Lucas Schroeckh in einigen gelinderen Petechialfieberepidemien eine nicht unansehnliche Steigerung der gefährlichsten Zufälle, namentlich der Herzengangst, durch den Ausbruch des Friesels. Unter den von ihm angeführten Fällen befindet sich auch der einer Wöchnerin<sup>3)</sup>.

Nächst Sachsen würde Bayern als der früheste Schauplatz des Friesels gelten können, wenn sich Grünwald's<sup>4)</sup> Vermuthung, dass dem Friesel die bösartigen Epidemien zugehört hätten, welche im J. 1666 in mehreren Gegenden Bayerns herrschten, beweisen ließen. Es spricht indess Alles dafür, dass man im Anfange, durch die Schrift von Welsch und das neue Exanthem aufmerksam gemacht, viele Fälle des von Jekel und namentlich jetzt auch symptomatisch Friesel erzeugenden Petechialtyphus als selbstständigen Friesel bezeichnete. Demnach würde man den Aerzten jener Zeit häufig Unrecht thun, wenn man sie deshalb einer diagnostischen Ungelegenheit anklagen wölfe, indem, wie sich im Verfolge dieser Betrachtungen im-

1) Welsch, p. 13. Vergl. Altmann, p. 2.

2) *Hist. med. nat. cur. Dec. I. ann. 3 et 4. opposit.* p. 25.3) *Ibid. Dec. III. ann. 5 et 6.* p. 157.4) Grünwald, *Dei vet. curiae. Vol. VI. app.* p. 83.

mer mehr ergeben wird, Alles dafür spricht, dass sich der Friessel theils aus dem Petechialtyphus, theils aber auch aus den erysipelatösen Krankheitsformen herausbildete; welche in der Geschichte der Volkskrankheiten eine so ausgedehnte und wichtige Rolle spielen, und dass wir erst spät desselben durchgängig die ausgebildete rheumatische Natur offenbaren sehen, die ihm gegenwärtig unbestreitbar zukommt.

Bei einer anschaulichen Reihe von Epidemien ist es zuweilen wirklich schwer zu entscheiden, ob sie dem Petechialtyphus oder dem Friessel zugehören. Mit Uebergang der auch von Allioni angeführten sehr kurzen Notizen bei Rosinus Lenticulae<sup>1)</sup>, nach welchen ein sich zu dem Petechialtyphus, der im J. 1689 zu Wending und Donauwörth herrschte, hinzugesellender weißer Friessel einen unglücklichen Ausgang herbeiführte, so wie der ganz analogen Beobachtung Brunner's<sup>2)</sup>, bei einer in demselben Jahre unter der Besatzung zu Philippsburg bei Heidelberg herrschenden typhösen Pneumonie, findet sich in einer Dissertation Wedel's vom J. 1690 bereits eine vollständige Beschreibung des wahren Friessels, obschon es bei dem Mangel hinzugefügter Beobachtungen zweifelhaft bleibt, ob Wedel die Krankheit selbst gesehen habe.

Ein, freilich vereinzelter, aber sehr ausgebildeter Fall des wahren Friessels wurde von Camerarius im Jahre 1699 zu Tübingen bei einer Wäscherin beobachtet<sup>3)</sup>.

Dagegen lassen sich in Gahrlied's Beobachtungen, welche Berlin und das J. 1699 betreffen, die Verbindungen des Friesselprocesses mit typhösen Erkrankungen nicht verkennen<sup>4)</sup>, obschon derselbe erst seit dem J. 1706 in der Mark Brandenburg selbstständig wurde.

1) Rosinus Lenticulae, *Miscellanea medico-practica*. Cdm. 8598, p. 115.

— *Miscell. nat. curios. Dec. III. nov. 5 et 6. app. p. 312.*

2) Brunner, *Compt. Miscell. nat. cur. Dec. III. nov. 7 et 8. p. 342.*

3) *Miscell. nat. cur. dec. III. nov. 7 et 8. app. p. 102.*

4) *Ibid.* p. 94.

[1799.]

Aus der unten genannten, in einer überaus geschmacklosen, gespreizten und mit poetischen Citaten überladenen Schreibart abgefassten Abhandlung Lochner's<sup>1)</sup> geht hervor, dass der vor dem J. 1685 in Nürnberg unbekannte Friesel, von welchem der Verl. nicht mit Unrecht glaubt, dass er an die Stelle des ungatischen Fiebers getreten sey, im Anfangs des 18ten Jahrhunderts an der Spitze der epidemischen Krankheitsconstitution stand. Derselbe kam vorzugsweise bei Kindbetherinnen aus den höheren Ständen, bei mannbaren Jungfrauen, aber auch bei Männern vor<sup>2)</sup>, und war im Anfang seines Auftretens seltner und weit gelinder, als später, wo er meist tödtlich verlief. Lochner rühmt vorzüglich die *Radix Serpentariae* und das dieselbe enthaltende *Poleis bezoardicus anglicus compositus de Kent*<sup>3)</sup>, so wie den *Lapis Bezoar de Goa* und die *Radix Guaiac*, auf welche Mittel zuweilen Erbrechen, meist kritische Schweisse eintraten.

Sehr genau und für die sichte Natur der Krankheit zeugend sind die Angaben eines Breslauer Arztes für die Friesel-epidemie des J. 1790. Im vorhergegangenen Winter, der sich durch Gelindigkeit und Nässe auszeichnete, herrschten Petechialfieber, bei denen frieselartige Exantheme nicht selten waren, und eine Blattern-epidemie; dann wurden Erysipelas und Zahnweh als sehr häufig angegeben. Ueberhaupt scheint der Krankheitscharakter vorwiegend erysipelatös gewesen zu seyn<sup>4)</sup>. Der im Frühling bei frühwarmer Witterung sich verbreitende Friesel befiel vorzüglich Kinder und Weiber, namentlich Wöchnerinnen<sup>5)</sup>. Im Sommer folgten Wechselstieber, *Pleuritis spe-rie*, Durchfälle bei Kindern, frieselartige Ausschläge, und sehr häufig kamen, vorzüglich bei solchen Personen, die an „scorbutischen“, rothen oder lividen, fleckigen Ausschlägen litten, eb-

1) *Mém. nat. cur. cent. III.* app. p. 37 seq.

2) Unter Andern sah er ein Aem. des. F. in L.

3) Dieses lächerliche Präparat enthält außer der *Serpentaria* noch Hirschhorn, Kienstein, Perlen, Kalkstein, Eisensalz, Camomil, Rad. *Contrajerva*.

4) *Nouvel. nat. cur. Dec. II.* ann. 2 et 13, app. p. 1 seq.

5) *Ibid.* p. 17.



genthämliche Fieberformen vor, die sich durch einen höchst unregelmässigen Typus und häufigen Wechsel der Zufälle auszeichneten. Bald klagten die Kranken unter Senken und Zittern über Herzensangst, über die grösste Mattigkeit, und waren kurz darauf wieder heiter und wohl; bald stellte sich wieder allgemeine Abgeschlagenheit und ziehende, spannende Schmerzen, vorzüglich in denjenigen Theilen ein, an welchen früher jene Anschläge am stärksten gewesen waren, indem alle diese Zufälle vorzüglich dann auftraten, wenn jener „scorbutische“ Ausschlag weniger bedeutsam war. Dabei war der Puls meist voll, zumellen klein und ungleich; die Krisen pflegten durch den Urin und durch vermehrten Ausdunst jener leider nicht näher beschriebenen Flecken sich einzustellen. — Bei andern Kranken kamen larvirte Wechselfieber vor, welche unter der Form täglich zu bestimmten Stunden wiederkehrender Rheumatismen auftraten. Im December herrschten Fieber mit brennender Hitze, Schmerzen in den Hypochondrien, im Rücken, grossem Durste, serösen Exanthenen, Purpura, Pleuritis, Icterus und Schilochzen, zu denen sich leicht auch Paralyse der Zunge und gefahrlose apoplektische Anfälle gesellten \*).

Die Beziehung aller dieser Erscheinungen zu einem mehr oder weniger ausgebreiteten Mittelpunkte ergibt sich ohne Schwierigkeit. Es tritt zwar in diesen Erkrankungen, wie in allen übrigen Friscolepidemien der rein rheumatische Charakter des Uebels, wie er sich in späteren Tagen immer deutlicher entwickelt hat, noch nicht ganz scharf hervor, und im Besonderen hat sich derselbe noch nicht ganz von dem katarthaischen Elemente, so wie von dem erysipelatösen frei gemacht; aber das ist ja eben das durchgreifende Gesetz der Entstehung neuer Volkskrankheiten, dass sie „nie für sich, sondern immer nur in der Steigerung bereits vorhandener Krankheitssehwere neu sind<sup>1) 2)</sup>).

1) *Ibid.* p. 18 seq.

2) *Hockel.*

[1711.]

In diese Zeit fallen Hamilton's Beobachtungen über den Friesel, die von jeher mit Recht als die ersten gemauerten Nachrichten über diese Krankheit betrachtet worden sind. Dieselben beziehen sich auf die Jahre 1709—1709; können aber hier, da sie für die Entwicklungsgeschichte von geringerer Bedeutung sind, übergangen werden. Allioni indessen geht offenbar zu weit, wenn er die, von uns unten näher zu besprechenden, *Nervosa lentae* Huxham's, welche nach dieser Zeit in England so ausserordentlich häufig vorkamen, für „Geburten eines verhaltenen Frieselgiftes“ hält <sup>1)</sup>.

So sind wir wieder zu dem Punkte gelangt, auf welchem wir die Betrachtung der epidemischen Krankheiten zu Anfang des 18ten Jahrhunderts verlassen, und wir können nun im Folgenden dem Friesel in Gemeinschaft mit den übrigen Erscheinungen der Zeit in's Auge fassen.

**1711 — 1715. Blattern, Masern, Scharlach, Friesel, Ruhr, Petechialfieber.**

Nur auf kurze Zeit, so scheint es, konnte die so ausgebildete erysipelatös-typhöse Krankheitsconstitution des beginnenden achtzehnten Jahrhunderts durch den ausgeprägten rheumatischen Krankheitscharakter des Jahres 1709 <sup>2)</sup> zurückgedrängt werden. Gar bald schon wir die erstere wieder die Herrschaft ausüben, die sie, gerade in Erzeugung der verbreitetsten und verheerendsten Seuchen, zu aller Zeit offenbart hat. Nie aber war dies, wenn es erlaubt ist auf die Menge der Nachrichten einen Schluss zu bauen, mehr als in dieser Zeit der Fall. — Die folgenden Betrachtungen haben es nur mit den wichtigsten dieser Nachrichten, und besonders mit denjenigen zu thun, die sich auf grössere und deshalb übersichtlichere Gruppen epidemischer Ereignisse beziehen.

1) Allioni, a. a. O. S. 16.

2) Vergl. oben S. 250.

## Ungarn. — Gensel.

Zu den wichtigeren dieser Nachrichten gehören Gensel's Berichte über den epidemischen Krankheitscharakter Ungarns in den Jahren 1711 — 1713 <sup>1)</sup>. — Die nach dem strengen Winter 17 $\frac{1}{2}$  herrschenden Petechialfieber waren vorzüglich den Kindern sehr gefährlich. An den Leichen fanden sich, ausserlich sowohl als auf Lunge und Leber, schwarze und livide Flecken. Im Juni herrschten Blattern und Massern mit Parotiden, im Herbst gutartige Tertianafieber, sporadische Petechien, Dysenterieen. — Der Weintrag dieses Jahres war nicht weniger ausgezeichnet, als der seines hundert Jahre späteren Nachfolgers.

Der Winter 17 $\frac{1}{2}$  war äusserst schneereich. Viele Schwangere abortirten, andere wurden durch Apoplexie stumm, vor Allem aber erlagen viele dem Frisael. Daneben herrschten die Wechselfieber immer fort. Im regnerischen Mai traten sie als Tertianen mit unregelmässigem Typus auf. Der Juni und Juli waren sehr heiss; der August brachte reichlichen Regen und viel blos Fieber; gleichzeitig herrschte die Rinderpest und andre Epizootieen <sup>2)</sup>. Den Ueberschwemmungen des Herbstes folgten Fieber, Dysenterieen, Katarrhe, gelinde Blattern, die sich aber im äusserst kalten Winter 17 $\frac{1}{2}$  zu grosser Bösartigkeit steigerten, an der auch die nun häufiger den Quartantypus zeigenden Wechselfieber, so wie die im Februar beginnenden Petechialfieber Antheil nahmen.

Neben der Pest des Jahres 1713 kamen in Ungarn bei sehr gewitterreicher und regnerischer Witterung blos Blattern mit Petechien, Rahren, Apoplexieen und ausserordentlich viele erysipelatöse Krankheiten vor, die durchaus keine Aderlässe vertrugen. Die Unwissenheit der Chirurgen verwechselte manches Erysipelas, Scrotum und Atherom mit Peithuosen <sup>3)</sup>.

1) *Ephem. N. C. Cent. 2. et VL. opp. p. L. sup.*

2) Vergl. unten.

3) Gensel gedenkt einer von ihm herausgegebenen Dissertation „de



## 1711. Universitätsfieber zu Altdorf. — Heister.

In diese Zeit fällt auch das merkwürdige Altdorfer Universitätsfieber, über dessen Charakter indess eine Bestimmung sehr schwierig wird. Den Angaben Heister's <sup>1)</sup> zufolge war es ein sogenanntes gastrisch-nervöses Fieber von geringerer Gefährlichkeit, welches sich in der Regel durch Erbrechen, Schweisse, bei Vollblütigen durch Nasenbluten entschied, und nur selten tödtlich wurde. Petechien oder sonst ein Exanthem werden nicht erwähnt. Nach Heister wurden nur Studenten, Professoren, so wie Universitätsverwandte und deren Familien ergriffen. Es entsteht aber doch sehr leicht die Frage, ob die Krankheit nicht auch andere Personen befallen habe, deren Erkrankung bei der Gefährlosigkeit des Uebels nicht zur Kenntniss Heister's kam, der, wenigstens eine lange Zeit hindurch, der einzige Arzt in Altdorf war.

## 1712. Influenza.

Auch der Influenza des Jahres 1712 mag gedacht werden <sup>2)</sup>, obgleich es nach den gediegenen Untersuchungen Gluge's nicht unahrscheinlich ist, dass die Epidemien dieses merkwürdigen Uebels mit den bedeutenderen Erkrankungen der Völker in dem innigen Bezuge stehen, welchen sie Vielen durch ihr neuerliches Zusammenstreifen mit der Cholera zu offenbaren schienen. Zu Gluge's Angabe, dass sie im Frühling zu Jena, im August zu Augsburg, im September in Tübingen, im December in Italien herrschte, kann ergänzend bemerkt werden, dass sie Böttcher <sup>3)</sup> im Juni zu Copenhagen beobachtete.

erste anni 1712 in *Comitate Castelliferre*<sup>4)</sup> von der aus über sonst Nichts bekannt ist.

1) Heister, *Medie, chir. und anatomische Wahrnehmungen*. Kassel, 1714. L. p. 171 E. — Schwarzer's Angaben über dieses Universitätsfieber können unter andern Umständen für die unersprechliche Ungenauigkeit und Oberflächlichkeit dieses, mit welcher derselbe bei Benutzung der Quellen zu Werke ging.

2) S. Schwedich und Gluge.

3) Böttcher, *l. c.* p. 41. — Schwarzer (II, 247) berichtet, dass sich zu

## 1715. Friesel zu Mümpelgard. — Binninger.

Interessanter ist der Blick auf eine sehr gut beschriebene Frieselepidemie, um so mehr als dieselbe in der Nähe einer Gegend vorkommt, die früher und später vorzugsweise die Heimath des Friesels war, den wir aber in dieser Epidemie in jener Verbindung mit dem typhösen Element erblicken, welches für diese frühere Periode seiner Entwicklung so charakteristisch zu seyn scheint. —

Seit dem Juni des Jahres 1713 beobachtete L. E. Binninger<sup>1)</sup> bei sanguinischen und kräftigen Personen von 18 — 40 Jahren Fieber, die mit leichtem Frost, Uebelweyn, Erbrechen, Abgeschlagenheit, Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen, trockenem Husteln, Druck- und Angstgefühl, (bei Frauen hysterischen Anfällen), sehr grossem und vollem, zuweilen weichem Pulse, colligativen, höchst übelriechenden Schvissen, und copiosen, citrongelbem, zu Anfang trübem, aber keinen Bodensatz gebendem, vom dritten Tage hellem Urin auftraten. Hierauf traten hochrothe Flecken zuerst am Rücken, dann auf der Brust und am ganzen übrigen Körper aus, mit deren Erscheinung die früher weisslich belegte Zunge sich mit einem grüngelblichem Ueberzuge bedeckte. Zugleich fanden bald soporöse Erscheinungen, bald Delirien, Convulsionen, Schnosnhüpfen und dergleichen Statt; aus der Nase ergossen sich zuweilen einige Blutstropfen. Am 5ten bis 6ten Tage wurde das Gehör auffallend scharf, (ein stets tödtliches Zeichen), am 7ten bis 8ten Tage erschien eine Unzahl kleiner weisser Frieselpusteln mit lividem Grunde auf der Brust, denen wildes Delirium, Lethargus und Tod folgte.

Verrath die Infurcata dieses Jahres als katastrophische Augenentzündung gestaltet habe, und Sakwatsch sowohl als selbst Gloger (der wenigstens das Citat. — Art. N. C. F. d. s. b. (nicht p.) 41 — anführt) wiederholen diese Angabe, obwohl sich die genaueste Nachricht Lanzoni's auf das J. 1711 bezieht.

1) Nicht zu verwechseln mit Joh. Nicol. Binninger, der zu Ende des 17ten Jahrhunderts als Professor und ärztlicher Rath zu Mümpelgard lebte; wahrscheinlich der Vater des Hlgens.

[1732.]

Weniger heftig war die Krankheit im September, October und November; die Nasenblutungen wurden copióser, und waren immer kritisch. Aber eine noch bedeutendere Formänderung erlitt die Krankheit nach dem Herbstdesistium. Nach einem leichten Froste von mehreren Tagen, der vorzüglich die Unterschenkel ergriff, Appetitlosigkeit u. s. w. trat am 3ten bis 4ten Tage ein heftiger Frost, wie im Wechselfieber, ein, der die Kranken aus dem Lager zu suchen nöthigte. Ihm folgte nach einer halben Stunde brennende Hitze, heftiger Durst, Uebelkeit, Druck auf der Brust und Angstgefühl in dem Präcordien (*sensibilité cardiaque*) Kopf-, Lenden- und Gliederschmerzen, Schlaflosigkeit. Der Puls ist stark, voll und frequent, der feurige Urin zeigt eine Wolke, wie im ganzen Verlaufe der Krankheit einen Bodensatz, und unter Ohrenklingen erscheinen am 4ten bis 5ten Tage jense Purpurflecken, zu denen sich nun Delirien, Schlaflosigkeit und ein schmerzhaftes, von der Magenegend ausgehendes Angstgefühl, beständige Schweisse, sehr mässige gallige Durchfälle, (oft auch, und zwar im günstigeren Falle, Verstopfung) und galliges Erbrechen gesellen. Gegen den 9ten und 10ten Tag stellt sich eine eigenthümliche Schwere des Körpers und Neigung zum Schlaf ein, die Augen sind entzündet, trübe und thrimend, und am 12ten Tage stürzt der Kranke unter lethargischen Symptomen. Bei denen, welche diesen Tag überstehen, wird das Gehör stumpf, (ein stets günstiges Symptom), und dem Ausbruche eines Friesels folgt bald die Genesung, während welcher sich gegen den sechsten Tag nach ihrem Auftreten die Lymphe der vorher durchsichtigen Frieselbläschen verdichtet, sie selbst in Abschuppung übergehen, während die Brustaffection sich durch reichlichen Schleimwurfs, der zuweilen mit Blut gemengt ist, entscheidet.

In der ersten Periode der Epidemie zeigte sich die Anwendung von Brechmitteln und leichten Blutentziehungen vor dem Ausbruch der „Pusteln“ gänzlich erfolglos, und ohne allen Einfluss auf den Verlauf und den meistens tödtlichen Ausgang der Krankheit, während in der zweiten die Ipecacuanha und



ein kleiner Aderlass offenbar von Erfolg waren. Das Blut zeigte zuweilen eine pleuritische Kruste, in der Regel aber erschien es gleich nach dem Aderlass schwarz und wie abgestorben, („sordé“) nahm indess bald eine hochrothe Farbe und gallertartige Beschaffenheit an, und zeigte kein oder sehr wenig safrangelbes Serum. Von der Anwendung der Vesicatores beobachtete Binninger in der Regel starken, die meistens günstigen Darmkrisen beeinträchtigenden Urinabgang, nach vorhergegangener Strangurie; er wandte sie deshalb später nicht mehr an. Gegen die symptomatischen Schmerzen zeigten sich gelinde Stürze mit absorbirenden Erden, Theriakessig u. s. w. hilfreich, obwohl sie doch zuweilen den putriden Zustand zu steigern schienen. Besser bekamen Absorbentia und kalinische Mittel (*Spiritus Corae Cerej*) mit Myrrhe u. s. w. am Besten Antiscorbutica, vorzüglich die Cochlearia, unter deren Gebrauche sich in der Regel kritisches Nasenbluten einstellte, welches nur selten so copios war, dass es durch Abstriagentien gestillt werden musste.

Ferner versichert Binninger bei dem Gebrauche der Cochlearia niemals die bei der gewöhnlichen (Schweißtreibenden) Methode zurückbleibende Rheumatismen gesehen zu haben<sup>1)</sup>. Es ist wohl kaum nöthig, an die grossen Erfolge zu erinnern, welche Schönlein durch den innerlichen Gebrauch der Säuren, verbunden mit dem äusserlichen der Kalien, beim Friesel erhalten hat<sup>2)</sup>.

Wenn wir uns nun über den Charakter dieser Epidemie erklären sollen, so können wir am Besten Binninger's eigener Worte uns bedienen, welcher dieselbe als Friesel-Purpurfieber „*Fievre miliaire purpurée*“ also für eine Zwitterform des Friesels und Petechialtyphus, bezeichnet. Die erste Periode der

1) „Et jamais je n'ai vu de rhumatismes après un flux traité de la manière que je viens de dire, ou bien qu'ils les aient eus souvent, quand ils ont été traités de la manière ordinaire.“ Binninger, a. a. O. S. 82.

2) Vergl. Schönlein's spec. Pathol. u. Therapie, herausgegeben von einigen (anwachsenden und erfahrenen) Zuhörern. Hr. Aufl. 80. Gießen, 1828, II. S. 150 ff.

[1715.]

Epidemie stand offenbar dem Petechialtyphus, welcher ihr vorhergegangen war, am nächsten. Die während ihrer Dauer erscheinenden Frieselbläschen waren offenbar mehr die Folgen eines ausgebildeten adynamischen Zustandes und mehr symptomatisch; während dagegen in der zweiten Periode der Ausbruch des Friesels wesentlich und kritisch war. — Uebrigens dürften Binsinger's Beobachtungen noch dadurch an Werth gewinnen, dass in ihnen sich die Andeutungen einer Theorie des Friesels finden, die in der neuesten Zeit sehr bedeutende Vertheidiger gefunden hat, und welche, trotz ihrer so verschrobenen chemistischen Grundlage, der Wahrheit näher kommt, als die Ansicht derjenigen Aerzte, welche mit Vernachlässigung der augenscheinlichen chemischen Qualität der Krankheitsstoffe, in dem Friesel, wie in allen übrigen Exanthemen, nur eine entzündliche Beschaffenheit des Blutes erkennen.

**1715. Petechialtyphus zu Berlin. — Gahrlep van der Müllem. Gundelsheimer. Schwarz.**

Unter den entsprechenden Krankheiten dieser Zeit muss vor Allem des Petechialtyphus gedacht werden, der im J. 1715 unter der Garde zu Berlin nicht allein, sondern auch zu Greifswalde, Stralsund und auf Rügen herrschte, (angehlich in Folge der Mittheilung durch die mit Carl XII. aus der Türkei zurückkehrenden Schweden). Zu Berlin wurde die weitere Verbreitung desselben durch sorgfältige Absperrung der Kranken verhindert.

Die Krankheit zeigte, nach der Beschreibung der oben genannten Feldärzte <sup>1)</sup>, verschiedene Formen. Bei Manchen begann sie mit Frost, Kopfschmerz und mässiger Hitze; bei Andern folgten auf die Zufälle des Schnupfens pleuroperipneumonische Erscheinungen. Zu Anfang, (am ersten und zweiten Tage), waren Brechmittel aus *Tartarus stibiatus* oder *Ziacaen* *oxymeris* bisserst hilfreich; häufig schnitten sie den ferne-

1) *Acta medicor. Berolinens. J. 1. 1.*

ren Verlauf völlig ab. Alle erhitzen und schweisstreikenden Dinge, namentlich Theriak, waren eben so schädlich als Purganzen, indem nur die spontan entstehenden Durchfälle und Schweisse sich wahrhaft kritisch zeigten. Gundelsheimer rühmt den Aderlass, den Schwartz nur bei dem ausgebildeten pneumonischen Charakter für indicirt hält. Nächstens bewährte sich das zuerst von, dem später noch zu erwähnenden, Chirurg Stöckel zu Dantz empfohlenen schwefelkaste Zink in grossen, kein Erbrechen erregenden Gaben, bis zu einer Drachme auf den Tag in Auflösung.

Gundelsheimer und Schwartz erlagen selbst der Krankheit, die sie Anfangs vernachlässigt, dann mit Brechmitteln und, ihren eigenen Grundsätzen zuwider, mit wiederholten Aderlässen zu bekämpfen versucht hatten.

Gahrlied fügt hinzu, dass Blutungen die Prognose etwas verschlimmerten, dass aber viele Petechien höchst ominös waren. Bei Delirien und anginösen Zufällen bewährte sich der ausgezeichnete Nutzen der Vesicatores. Am 17ten Tage brach oft tödtlicher weisser Friesel aus, dem man durch eine Venisection am Fuss zuvorzukommen suchte. (!)

Nach dieser Epidemie herrschten im feuchten und kalten Sommer des Jahres 1716 Peripneumonien, „rheumatische Ablagerungen nach den äusseren Theilen“, *Pleuritis spuria*, während die Wechselfieber, einzelne verschleppte Quartanen angenommen, völlig verschwanden. Im Herbst folgten Apoplexien, Hemiplegien und Paralysen.

In Frankreich, England und Mailand herrschten die Blattern und vorzüglich das Scharlach mit anginöser Complication, Katarthe, „*infarctus faciei*“, und äussere Rothlauffeimen.

So weit Gahrlied. In den von ihm gegebenen Nachrichten tritt die Verbindung der beschriebenen Krankheiten mit dem allgemeinen Krankheitscharakter dieser Periode so klar hervor, dass weitere Nachweisungen überflüssig werden. Vorzüglich interessant aber sind die Angaben über die ausseror-



[1715.]

deutlichen Erfolge des schwefelkuren Zinks in grossen Gaben im Petechialtyphus. Dieses Mittel ist unsers Wissens beim Typhus in neuerer Zeit, ausser von Rademacher, nicht angewendet worden. Dieser aber theilt ihm, wie Stöckel, Gundelsheimer und Schwartz, die grössten Lobesprüche. Rademacher versichert, durch den Gebrauch dieses Mittels in grossen Gaben (zu  $1\frac{1}{2}$  Drachmen in 24 Stunden) oft ganz rasende Kranke in einem Tage zu Verstand gebracht zu haben. Zugleich sagt er, dass es die Durchfälle besser und sicherer hebe, als irgend ein anderes Mittel <sup>1)</sup>. Grund genug, dasselbe der unverdienten Vergessenheit zu entreissen, und der Beachtung der Praktiker auf das Dringendste zu empfehlen.

#### 1715. Typhus zu Toul.

Ganz bestimmt gehört hierher auch die Epidemie, deren Oxana für das J. 1715 gedenkt, und die er als *Febris verminosa* abhandelt, ohne, wie so oft, seine Quelle zu nennen <sup>2)</sup>. Diese Krankheit herrschte in der Umgegend von Toul; die meisten Ergriffenen starben schon am 2ten oder 3ten Tage. Sie zeigte sich im höchsten Grade contagiös. Ihre Erscheinungen bestanden in einem unregelmässigen Fieber, colligirten Schweißsen, herumsiehenden Schmerzen, Kopfschmerz, Gastricismus, übelriechendem Athem, trübem Urin, Harnstrenge, — Anamnose mit grosser Erweiterung der Papille, Jucken der Nase, Flockenlesen, trockenem Husten, Zähneknirschen u. s. w. In der Mundhöhle bildeten sich Aphthen, und auf der Haut eine so starke „Purpura“ dass die Epidermis lappenartig abfiel. Zeitiger Abgang von Würmern war heilsam. Man gab Rheum mit Magnesia, Calamel, *Tinct. Aine fortolae* mit Meereswiesenhonig und den destillirten Wässern der Cochlearia und des Wermuths, Valeriana und Mineralbädern.

1) Eisenmann, Krankheitsfam. Typhus, S. 255.

2) Oxana, I. 218.

### 1717. Bösartige Fieber, Wechselfieber und Ruhren auf Sardinien.

In den folgenden Jahren scheint sich diese allgemein verbreitete typhöse Krankheitsansteckung noch mehr gesteigert zu haben. — Die hinterlistige Unternehmung Spaniens auf das in Oesterreichs Besitze befindliche, aber wegen des türkischen Feldzugs schlecht vertheidigte Sardinien wurde vorzüglich durch die Krankheiten vereitelt, welche unter der am 4500 M. Fuhrvolk und 400 Reitern bestehenden Armee alsbald nach ihrer Landung vor Cagliari auszubrechen. Täglich erkrankten gleich Anfangs 20—30 an hitzigen Fiebern, Wechselfiebern und Ruhren, deren Entstehung man dem Mangel an Lebensmitteln und frischem Wasser (= man hatte geglaubt, sich der Insel sehr schnell bemächtigen zu können, und deshalb die Flotte nur mit geringem Proviant versehen =) zuschrieb <sup>1)</sup>. Anfang Septembers hatte die Armee schon 500 Tödtte und 600 Kranke, bis zur Mitte Septembers 900 Tödtte und über 2000 Kranke, welche man in die Spitäler der Toscanischen Häfen bringen musste <sup>2)</sup>.

### 1717. Finnland und Ingermannland. — Kriebelkrankheit.

Wie in Sardinien, so finden wir im J. 1717 in Finnland und Ingermannland den Feldlagern der Russen, welche den heldenmüthigen Schwedenkönig, Carl XII., aufs Neue bedrängten, nicht allein die Wechselfieber, sondern auch die Fleckfieber und die Ruhr folgen und bedeatende Niederlagen verbreiten, die durch gleichzeitige Seuchen unter den Pferden um so bedenklicher werden mussten <sup>3)</sup>. Man leitete indess die letzteren von Futtermangel ab; eine Angabe, welche durch eine gleich-

<sup>1)</sup> Sardinien ist wegen seines ungesunden Klima's, welches vorzüglich Wechselfieber erzeugt, von jeher öfters heimgesucht. Im Abentheuer schickte man selbst Verurtheilte zur Strafe nach dieser Insel.

<sup>2)</sup> Bosc. Saund. Vera. 2. S. 43 ff.

<sup>3)</sup> Bosc. Saund. Vera. 1. S. 43 ff.

[1787.]

zeitige Epidemie der Kriebelkrankheit in Holstein, Schleswig, der Lausitz, der Schweiz, der Sologne <sup>1)</sup>, an Gewicht gewinnen würde, wenn nicht zahlreiche Angaben das überall gleichzeitige Erkranken der Pflanzen-, Thier- und Menschenwelt bezeugen.

**Belgrad. — Pest in der Türkei, Ungarn, Siebenbürgen und Polen. Rinderpest und andre Epizootien.**

In ähnlicher Weise wurde das Heer der Oesterreicher, welches unter Prinz Eugen's heldenmüthiger Anführung die Stadt Belgrad belagerte, vorzüglich durch Wechselfieber, die „Hauptkrankheit“ und die Ruhr heimgesucht, welche der Armee über 4000 Krieger raubten, während eine Seuche unter den Pferden und die Pest selbst im Lager der Türken noch weit bedeutendere Verheerungen anrichtete, denen man vorzugsweise den bald darauf erfolgenden Friedensschluss zuschrieb <sup>2)</sup>. Durch die allgemeine Verbreitung der Pest in Constantinopel wurde der Sultan selbst bewogen, sich nach Adrianopel zurückzuziehen. Aber auch Siebenbürgen, Ungarn und Polen (namentlich Lemberg), ja Preussburg selbst <sup>3)</sup>, fielen von Neuem ihrer Wuth <sup>4)</sup>, welcher die Bösartigkeit der überall verbreiteten Fleckfieber, die hier und da, namentlich zu Eperies in Oberungarn, eine grosse Neigung zu intermittirendem Verlaufe entfalteten <sup>5)</sup>, wenig nachstanden <sup>6)</sup>. Zu St. Hippolit zeichneten sich diese Fieber durch den Mangel der Schweisse und Durchfälle, so wie durch den äusserst günstigen Erfolg der Brechmittel aus <sup>7)</sup>. Dazu kam die Erneuerung der in diesen Gegenden ursprünglich

1) Vergl. Hecker, *Cont. d. neuer. Heilkunde.* 8. 125.

2) *Bred. Samml. Verh.* 1. 8. 127.

3) *Das. Verh.* 2. 8. 314.

4) *Das. Verh.* 2. 8. 312.

5) *Das. Verh.* 2. 8. 24 ff.

6) *Das. Verh.* 2. 8. 26 ff.

7) *Das. Verh.* 2. 8. 361.



heimischen Rinderpest, deren kürzlich erlebte Verheerungen<sup>1)</sup> noch in zu frischem Gedächtniss waren, als dass man nicht überall die kräftigsten Massregeln zu ihrer Bekämpfung hätte ergreifen sollen. Dennoch breiteten sich dieselbe im Herbste bis nach Preussen, Baiern und die Pfalz aus<sup>2)</sup>; ihre wahre Beziehung und Verbindung aber mit den übrigen Krankheitsverläufen wurde durch gleichzeitiges Seuchen unter dem Federvieh, den Fischen, selbst unter den Bienen, die an einer ruhrartigen Krankheit litten<sup>3)</sup>, deutlich genug. Eine genaue Schilderung der Epizootie unter den Hühnern und Gänsen zu Wismar im J. 1718 findet sich an der untengenannten Stelle<sup>4)</sup>. Von der gleichzeitigen Epidemie des Petechialtyphus daselbst wird später die Rede seyn.

#### 1717. Leipzig. Petechialtyphus.

Zu Leipzig verbreitete sich im Winter des Jahres 1717 ein Petechialtyphus mit vorwiegender Hirnaffektion in solcher Ausdehnung, dass der Rath es für nöthig hielt, dem Gerüchte, die Krankheit sey die eigentliche, von ungarischen Studenten eingeschleppte Pest, in einem besondern Erlasse förmlich zu widersprechen. Die Epidemie hatte einen ausgeprägten entzündlichen Charakter, und wurde deshalb mit Aderlässen erfolgreich behandelt<sup>5)</sup>.

Diese ausserordentliche Häufigkeit der Wechselfieber und der mit ihnen zusammenhängenden typhösen Krankheiten steigerte sich in den folgenden Jahren immer mehr. Unter der grossen Zahl der Mittheilungen heben wir nur folgende hervor.

1) S. oben.

2) Boeck, Samml. Vers. 3, S. 545-597.

3) Das. Vers. 2, S. 187.

4) Das. Vers. 1, S. 1113.

5) Das. Vers. 1, S. 792 ff.

1718. **Wienmar.**

Zu Wismar war im J. 1718 eine Epidemie verheerend, welche man für einen Abdominaltyphus würde halten müssen, wenn sich zu der genauen Aufzählung der an den Kranken beobachteten Symptome die Untersuchung der Leichen und die Auffindung von Darmschwüren gesellte. Wir kommen bei einer späteren Gelegenheit <sup>1)</sup> auf die Untersuchung des zwischen dem Petechial- und Abdominaltyphus obwaltenden Verhältnisses zurück; für jetzt können wir die wesentliche Identität beider, wenigstens die Entwicklung des letzteren aus dem ersten, als wahrscheinlich hinstellen <sup>2)</sup>.

Zu Wismar herrschten gegen den Sommer dieses Jahres Fleckfieber, bei denen Durchfälle der gefährlichste Zufall waren. Sie stellten sich schon zu Anfang der Krankheit ein, und widerstanden allen Mitteln: dabei brachen nur wenige, kleine, blaue und „tief in der Haut verkoren bleibende“ Petechien hervor. Brachen dagegen rothe Petechien zeitig aus, so trat der Durchfall erst mit dem 6ten bis 7ten Tage ein, und hatte durchaus Nichts Bedenkliches. — Dem Petechialfieber folgten die Masern. Zu Anfang des Jahres 1721 aber wurden bösartige Wechselfieber, bei denen sich indess die China hilfreich erwies, allgemein.

**1718. Epidemische „Leberentzündung“ zu Pegau und Leipzig. — Fischer und Kulbel.**

Hier muss auch einer im J. 1718 zu Pegau und Leipzig herrschenden Epidemie gedacht werden, welche Fischer und Kulbel <sup>3)</sup> als Leberentzündung beschreiben, und die jedenfalls

1) Diese Gelegenheit wird sich hoffentlich im dritten Theile dieser Untersuchungen ergeben.

2) Mecker hat sich bereits in gewohnter trefflicher Weise über diese Entwicklung des Faulfiebers und des Abdominaltyphus in seiner Rede zur Feier des 41sten Stiftungstages des Königl. Friedrich-Wilhelm-Instituts, Berlin 1825 ausgesprochen.

3) S. d. Schöffnersitz.

dem Einflusse der allgemeinen Krankheitsconstitution dieser Zeit nicht entzogen war. Die genannten Aerzte selbst schrieben der Krankheit einen erysipelatösen Charakter zu<sup>1)</sup>. Sie herrschte vom Januar bis zum März 1718, und ergriff sehr viele Personen ohne Unterschied individueller Verhältnisse, mit leichtem Schauer beginnend, welchem bald beträchtliche Fiebertitze folgte. Galligem Erbrechen gesellte sich ein heftiger Schmerz im rechten Hypochondrium, ein stechender und spannender Schmerz in der Herzgrube, häufiger trockner Husten, bei Schwängern und Wöchnerinnen Anfallsen und Schlockzen. Das Athmen war sehr erschwert, in der Gegend des Zwerchfells gab sich ein Gefühl heftigen Druckes zu erkennen, welches mit dem Eintritt der Expectoration verschwand; das Gesicht war während der ganzen Dauer der Krankheit blassgelb gefärbt, der Urin dünn und sehr geröthet, nach der Krisis mit einem weissen glutinösen Bodensatz, welcher sich so fest an die Wände des Glases anlegte, dass er ohne das letztere zu zerbrechen nicht entfernt werden konnte. Der Puls war schnell, voll und weich, der Stuhl die ganze Krankheit hindurch hartnäckig verstopft. Aderlässe und andere Antiphlogistika waren unbedingt nachtheilig; ihrer Anwendung folgten Erstickungszufälle, Delirien und Verschleppung der Krankheit bis zur dritten Woche mit meist tödlichem Ausgange. Ein gelind antiphlogistisches, eröffnendes, expectorirendes Verfahren dagegen führte meist schon am vierten, höchstens am siebenten Tage die Genesung herbei. Unter den veranlassenden Momenten schienen Gemüthsbewegungen die Hauptrolle zu spielen.

Aus diesen Erscheinungen möchte sich hinreichend ergeben, mit welchem Rechte Fischer und Kulbel diese Krankheit eine „Leberentzündung“ nennen. Sectionen werden nicht erwähnt.

<sup>1)</sup> Fischer, p. 145.



[1718.]

**Gastrische Fieber zu Berlin, in der Mark, in  
Thüringen. — Fr. Hoffmann.**

Der wahre Charakter dieser Krankheit dürfte sich deutlicher aus der Beschreibung Fr. Hoffmann's ergeben, die sich auf eine gleichzeitige an den so eben genannten Punkten in grosser Allgemeinheit herrschende Epidemie bezieht<sup>1)</sup>. Sie brach nach heftigen Ueberschwehmungen und grosser Hitze vorzüglich bei denen aus, welche sich der Nachtluft aussetzten. In Berlin gab es wenige Häuser, in denen nicht einige Kranke gelegen hätten. Fieber, äusserste Mattigkeit, Kopf- und Rückenschmerz, Herzensangst, häufiges Erbrechen, Schwerathmigkeit, zuweilen Delirien, zuweilen remittirender, zuweilen intermittirender Typus, das waren die Hauptzufälle des Uebels, welches vier bis sechs Tage dauerte und mit einem Anschlage um den Mund oder freiwilligen Schweißen endigte.

**Typhöse Wechselfieber in den Jahren 1719 und 1720,  
Zeeland. de Koker.**

Eine der geliegtesten Abhandlungen über die typhösen Wechselfieber dieser Zeit ist die von de Koker, einem Schüler des grossen Boerhave, nach Beobachtungen in Zeeland im Sommer 1719, der sich durch Hitze, Windstille und Regenmangel eben so, wie der vorhergegangene Winter durch Gelindigkeit auszeichnete<sup>2)</sup>. Die Epidemie begann zu Ende Juli, in welchem Monate das Thermometer seine höchste Höhe mit

1) Hoffmann, Fr., *Med. ration. syst. T. II. cap. 4. p. 228.*

2) de Koker gibt genaue barometrische und thermometrische Beobachtungen aus Boerhave's Tagebücher. Die von Boerhave an Leyden beobachtete Regenmenge betrug

Sur das Jahr 1715 22<sup>h</sup> 4<sup>h</sup> 1<sup>h</sup> Fleiss.

1716 26<sup>h</sup> 1<sup>h</sup>

1717 21<sup>h</sup> 3<sup>h</sup>

1718 22<sup>h</sup> —

1719 26<sup>h</sup> 3<sup>h</sup>

(*Hist. d'hip. pres. P. p. 224.*)

82° (Fahrenheit) erreichte, und ergriff die ganze Bevölkerung, ob-  
 schon sie nur Wenigen tödtlich wurde. Sie wird als ein anhalten-  
 des Wechselfieber mit gastrischem Anstrich, grosser Mattigkeit,  
 beständigem Erbrechen und zeitweiligem heftigem Durchfall be-  
 schrieben. Wenn sie mit dem Quartantypus auftrat, so wurde  
 sie sehr oft durch freiwillig eintretende Durchfälle ent-  
 schieden. Sehr häufig kamen Recidive so wie Ausgänge in Hand-  
 wassersucht, heftige Rheumatismen und Gelbsucht vor. — Die  
 Epidemie liess beträchtlich nach, als im September häufigerer  
 Regen eintrat, gänzlich aber verschwand sie erst im November.  
 — Die Behandlung des Uebels wurde am zweckmässigsten mit  
 Brech- und Abführmitteln durchgeführt, während Schwitzmittel  
 schädlich waren, wahrscheinlich, weil sie den Darmkräften Ein-  
 trag thaten. Von der China wurde häufig mit Schaden Ge-  
 brauch gemacht, indem sie den mehr oder weniger anhaltenden  
 Typus in den drei- oder viertägigen umgestaltete, und Icterus,  
 Hydrops u. s. w. erzeugte. Ähnliche Nachteile brachten Ad-  
 stringentia und Diaphoretica. — Gleichzeitig waren Diarrhoeen  
 und Ruhren verbreitet.

**1720. Wechselfieber in der Pfalz. Leipzig,  
 Seehausen.**

Weit blässlicher waren die im Sommer des Jahres 1720 bis  
 in den Frühling des Jahres 1721 in der ganzen Pfalz verbei-  
 teten Wechselfieber. Zu Mannheim wurden vorzüglich die  
 bei dem Schlossbau beschäftigten Arbeiter in solcher Zahl er-  
 griffen, dass der erstere eingestellt werden musste. Diejenigen  
 aber, welche Mannheim nicht verliessen, starben, während die,  
 welche sich nach dem nahen Heidelberg begaben, von selbst  
 genasen<sup>1)</sup>. Andere Nachrichten nennen als die in der Pfalz  
 und in Baiern verbreiteten Krankheiten kürzige Fieber und  
 Ruhren<sup>2)</sup>. Ebenso herrschten zu Leipzig Petechialfieber, und

1) Bredl. Samml. Vers. 13. S. 124.

2) Das. S. 141 ff.

[1720.]

zu Seehausen bei Magdeburg beobachtete Siegenbeck ebenfalls den Uebergang der Wechselfieber in den Typhus <sup>1)</sup>.

Eben so reich ist das J. 1721 an Nachrichten dieser Art über dieselbe Anordnung und zum Theil Hartnäckigkeit der Wechselfieber, und ihren Uebergang in typhöse Krankheitsformen. Gerber zu Görlitz erkannte nach Sydenham's und Hoffmann's Vorgänge die wesentliche Identität beider, und beschrieb die letzteren sowohl als das eigentliche Fleckfieber, wie auch ein durch vorgängige rheumatische Beschwerden, leichtere und schwerere Zuckungen vor dem Ausbruche der Exantheme dem Friesel sich näherndes Uebel. Der Aderlaß war unbedingt tödtlich, dagegen hatte die einfachste diätetische Behandlung guten Erfolg <sup>2)</sup>.

### Nürnberg.

Zu Nürnberg beobachtete Götze vom Winter 1719 an die Aufeinanderfolge einer Blattern-, Masern-, Scharlach- („Friesel“) und Wechselfieberepidemie. Mit den Masern verbreitete sich der Keuchhusten allgemein; von den Wechselfiebern aber wurde fast Jedermann befallen.

### Jauer.

Zu Jauer endlich in Schlesien waren im Februar 1720 Petechialfieber mit Paratiden, Buhonen und selbst Karbunkeln sehr gemein, welche ein ungenannter Arzt mit einfachen Arzneien, ohne Schwitz-, Brech- und Abführmittel, so wie ohne Aderlässe, zwar nicht ohne grossen Widerspruch seiner Collegen, aber doch sehr glücklich behandelte. Vorzüglich leisteten ihm Vesicatores sehr gute Dienste <sup>3)</sup>.

### Die Erysipelaceen der Jahre 1716 — 1721.

Eben so zahlreich sind die kürzeren und ausführlicheren Mittheilungen der Aerzte über die akuten Exantheme dieser

1) Boenl. Samml. V. 13. S. 268 ff.

2) Das. V. 13. S. 603 ff.

3) Das. V. 14. S. 680 ff.



Periode, denen merkatotermassen ein erysipelatöser Charakter gemeinsam ist. Von diesen waren zunächst die Blattern schon früher, namentlich aber seit 1716 überall, am meisten in den nördlicheren Reichen verbreitet, und folgten sehr häufig den oben beschriebenen Wechselliefern. So rafften sie im Winter des Jahres 1716 zu Paris über 14000 Menschen hinweg, und ähnlicher Verheerungen wird für viele andere Gegenden gedacht <sup>1)</sup>.

Gleichzeitig mit den Blattern, oder auch ihnen vorhergehend, herrschten Scharlach und Masern in ähnlicher Verbreitung, ebenfalls gewöhnlich im Herbst, Winter und Frühling, während der Sommer den Wechselliefern Raum zu geben pflegte. Vorzügliche Verdienste erwarb sich bekanntlich Storch um die nähere Kenntniss des Scharlachs durch seine, einen Zeitraum von dreieundzwanzig Jahren umfassenden Beobachtungen desselben, auf welche wir, wie auf die Geschichte des Scharlachs überhaupt, schon früher aufmerksam gemacht haben <sup>2)</sup>. An der genannten Stelle versuchten wir vorzüglich auch die Nachweisung zu geben, dass dem Scharlach in dieser Periode die Beziehung zu dem Gehirn noch fremd war, welche die späteren Epidemien desselben so mörderisch gemacht hat. — Hier sey nachträglich noch folgender Beobachtungen gedacht.

#### 1717. Helmstädt. — Böttcher.

Böttcher sah im Herbste des Jahres 1717 zu Helmstädt ein gutartiges Scharlach mit anginösen Beschwerden, welchem später Blattern und Masern folgten, von denen aber diejenigen Kinder, welche vorher das Scharlach (welches Böttcher „Friesel“ nennt) überstanden hatten, nicht befallen wurden <sup>3)</sup>.

1) Ercel. Samml. V. 1. 8, 21.

2) Histor. path. Unives. 1. Th. 8, 315. Vergl. Becker, Getch. d. neuer. Heilk. 8, 223.

3) Ercel. Samml. V. 2. 8, 823.

(1719.)

**Neusohl. — Moller.**

In derselben Zeit kam zu Neusohl in Ungarn bei Kindern von 3—10 Jahren eine Epidemie vor, die offenbar mit dem Scharlach Beziehung hat, obschon eines Exanthems von Moller, dem Beobachter der Krankheit, nicht gedacht wird. Die Kranken nämlich verfielen in heftige, häufig tödtliche Convulsionen, welche nur durch die Erzeugung reichlicher Schweißse beseitigt werden konnten <sup>1)</sup>.

**Russland. Riga. — Fischer.**

Die Verbreitung der Blattern, des Scharlachs und der Masern nahm in den folgenden Jahren immer mehr zu, und es würde eben so lästig als überflüssig seyn, die einzelnen Nachrichten sämmtlich zusammenzustellen. Das Scharlach zeigte sich meist ziemlich gutartig, indess kamen doch hin und wieder bösaartige Formen, namentlich auch mit Hirnaffectionen vor. Dies war vorzüglich in der von Fischer zu Riga beobachteten Epidemie im Winter 1721 der Fall, welcher die Masern vorausgegangen waren. Das Scharlach war zu dieser Zeit über einen grossen Theil Russlands verbreitet <sup>2)</sup>; im März 1721 Wechsel- fieber <sup>3)</sup>, welche seit 1715 nicht mehr vorgekommen waren.

**F r i e s e l.****1719. Berlin. — Gahrlep von der Müllen.**

Aber nicht weniger allerbarte in dieser Zeit auch der Friesel, den wir nun immer mehr von den übrigen Krankheiten sich abtrennen sehen, seine Herrschaft. — Schon im J. 1717 war er zu Berlin bei einer „rheumatisch-katarrhalischen“ Constitution, bei Wöchnerinnen und Männern sehr häufig gewesen. Gleich-

1) Freil. Samml. V. 2. S. 829.

2) Das. V. 14. S. 81.

3) Das. S. 248.

zeitig herrschten Blattern, wenig Tertianfieber, und häufig kam Abortus vor.

Aber eine ausgebildete Frieslepidemie herrschte im J. 1719 zu Schönenflies bei Berlin<sup>1)</sup>, neben Peripneumonien mit Blutspucken, Dysenterie und rheumatisch-katarrhalischen Fiebern, die eine grosse Neigung zu Durchfällen hatten. Wenn bei diesem Friesel durch unzeitig angewendete Drastica die exanthematische Krise gestört wurde, so bildeten sich Durchfälle und Aphthen mit tödtlichem Ausgange. Eben so wenig vertrugen die im Frühlinge dieses Jahres epidemisirenden rheumatischen Fieber eine andere als gelind diaphoretische Behandlung, und nahmen insbesondere nach angewendeten Aderlässen die gewöhnliche Bösartigkeit ausgebildeter adynamischer Zustände an. Gerade aber wie im vorigen Jahre folgte dieser rheumatischen eine ausgebildete erysipelatöse Krankheitsconstitution, die sich durch das im weiten Kreisen epidemische Vorkommen „falscher Anginen“, Rosen, Blattern, Masern und zuletzt wieder durch die wahrscheinlich noch nicht ganz erloschene Ruhr zu erkennen gab, die aber in diesem Jahre weit bösartiger war, als in dem vorigen, und auf der Höhe der Krankheit wöchentlich über 140 Personen dahin raffte<sup>2)</sup>. Gahrlied, der wahrscheinliche Verfasser des sehr werthvollen Berichts in den Akten der Berliner Aerzte, schreibt dem in der Regel angewendeten fehlerhaften therapeutischen Verfahren einen sehr grossen Antheil an der durch die Ruhr herbeigeführten, vorzüglich die Kinder betreffenden, Sterblichkeit zu, und klagt namentlich, — und gewiss mit Recht, — über die sinnlose Anwendung der Adstringenzen

1) *Acta med. Berol. Vol. XL. p. 3 sep.*

2) Die gewöhnliche wöchentliche Sterblichkeit betrug (in Berlin zu jener Zeit 50 — 60, die Zahl der Geburten etwas mehr. Im J. 1719 starben 358, im J. 1720 853 mehr, als geboren wurden, und insbesondere starben an der Ruhr im J. 1719 von der Hies bis zur Zehnten Woche p. Tris. (nov.) 1578 Personen, was eine wöchentliche durchschnittliche Sterblichkeit von fast 32 (genau 32½) ergibt. — *Acta med. Berol. Vol. XL. p. 23.*



[1719.]

und Opiate<sup>1)</sup>. Er behauptet sogar, strenge Diät habe die Krankheit leichter beseitigt, als das Verfahren der Aerzte<sup>2)</sup>.

Der Verlauf dieser Ruhr hat Nichts Bemerkenswerthes dar, und eben so genügt die Bemerkung, dass man für die Therapie sich vorzüglich auf die Ipecacuana verliess. — Der Ruhr folgten Blättern in nicht sehr bedestender Ausdehnung; desto hartnäckiger zeigten sich die nach derselben sehr zahlreichen Querschnittsfeber. —

Der Krankheitscharakter dieser ganzen allgemeinen Periode wird als ein ausgebildeter rheumatischer geschildert; rheumatische und katarrhalische Fieber, erstere mit vorwiegender Neigung zu kritischen Gelenk- und Drüsenaffectionen, namentlich zur Erzeugung des sogenannten *Exema febrile criticum* an den Lippen, letztere zu Nasenblutungen, bei Kindern zu Parotiden und Ohrenflüssen, weniger zu Diarrhoeen, waren an der Tagesordnung. Wurden diese rheumatischen Fieber vernachlässigt oder schlecht behandelt, (z. B. durch Aderlässe und Abführmittel), so verwandelten sie sich sehr leicht, wozu sie freilich, da bei den gelinderen Formen schon stechende Schmerzen unter den Hypochondrien vorkamen, auch zu sich Neigung hatten, in Peritonaeumorbenen mit Blutspeien, welche bei früher Gewunden durch eine vorsichtig antiphlogistische Behandlung leicht gehoben wurden. Durch Nichts aber dürfte die grosse Verwandtschaft dieser rheumatischen Fieber mit dem Frieselproceß mehr bewiesen werden, als durch die in der Regel bei denselben Statt findende Form der Krisen, welche durch paroxysmenweis eintretende gelinde Schüsse und kritische Erscheinungen im Harn binnen 7 Tagen vollendet wurden. Unter diesen Erscheinungen genossen die Kranken, selbst ohne Arz-

1) Bild p. 22. — „Credens ergo, qui medicis instantur promittit, repolit artit accommodata methoda nullum fuit habuisse, sed tandem dicitur, quod acciderit. Quippe proceris octidaginta et opiatum numeris pequet hic et illi cum nullis curantibus perfidit, et dabitur, ut variis dicitur fuerant copiam melle regant (adipiscendum est, an potius incongruis melle uti sitis).“ —

2) Bild p. 49. — „Qui nec medico decurrant, convalescent melius, acuto regimine, quam qui sine regimine auxilio incongruis medicis adipe fuerant.“

neigebrauch, leicht und sicher. Bei einigen Kranken, namentlich Kindern und Frauen kamen noch frieseartige Exantheme vor. Diese rheumatische Krankheitsconstitution blieb die vorherrschende bis zum Herbste dieses Jahres.

Gleichzeitig beobachteten einige Aerzte, obschon in weit geringerer Häufigkeit, namentlich unter der französischen Colonie zu Berlin, erysipelatöse Krankheitsformen, namentlich sporadische Blattern und wahre rosenartige Efflorescenzen, die sich über Arme, Schenkel und Rücken ausbreiteten, ohne beträchtliches Fieber verliefen, und allmählig wieder verschwanden. Erscheinungen, deren Beziehung zu den sich nun allgemein verbreitenden ziemlich blässartigen, namentlich bedenkliche Brustaffectionen erzeugenden Miasmen klar genug ist. Ihnen folgten im Herbste Diarrhöen und eine ausgebildete Ruhrépidemie, welche Ende August begann, im October ihre Höhe erreichte, und mit dem November verschwand<sup>1)</sup>. Diese Ruhrépidemie herrschte, den darüber umlaufenden Gerüchten zufolge, auch in einigen Distrikten von Hinter-Pommern, gleichzeitig mit Petechien. In Berlin war sie ziemlich gatartig und wich in der Regel dem zeitigen Gebrauche der Ipecacuanha, welcher dann anodyne und (mit zweifelhafterem Erfolge) adstringirende Arzneien, Oleosa u. dergl. folgten. Dass diese Ruhr unter dem Einflusse einer erysipelatösen Krankheitsconstitution gestanden habe, ist mehr als wahrscheinlich, indem unter den Krankheiten der Berliner Garnison, welche die von dem Beschreiber derselben<sup>2)</sup> mitgetheilte Tabelle aufzählt, außer einer grossen Uebersahl der „*Fever acutae*“ Rosen und ödematöse Geschwülste besonders hervortreten<sup>3)</sup>. Der Charakter dieses

1) Der Sommer des Jahres 1718, noch mehr aber der des Jahres 1719 zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Hitze aus. Vergl. SCHNEIDER.

2) *Acta medic. Berol.* Vol. II, p. 149.

3) Hitzige Fieber 235, Fieber mit Seitenstechen 174, Tertianfieber 216, Quartanfieber 182, Diarrhöen 69, Ruhr 129, Scharb 21, ödematöse Geschwülste 16, Rosen 62. — Die Gesamtzahl der Kranken betrug 1891. — Noch klagter kam die Gelbsucht im Januar und Februar des folgenden Jahres vor, wozu 3, R. unter der Garnison 49 Interische befanden. Man schloß diese Nach-

[1719.]

„*Febres acutae*“ wird sehr klar, wenn man an der angeführten Stelle <sup>1)</sup> liest, dass bei den 2 ersten der besonders angeführten Kranken, Fussrosen, Delirien und Sopor, bei dem 3ten nach einander Schlangenaffectio, Delirien und tödliche Entzündung der „*pericardium et viscera*“, bei der 4ten und 5ten (Kindbettkranken) Fussödeme, bei den meisten Uebrigen kritische Blüthen um den Mund und auf der Zunge vorkamen, dass bei einem an „*Febres catarrhalis benignae*“ leidenden Manne eine metastatische Hosenentzündung sich bildete, dass im Dorfe Blankenfelde Geschlechtsrosen epidemisch auftraten <sup>2)</sup>, und dass selbst die Tertianfieber sich sehr häufig durch Paracidegeschwülste entschieden, wie ihnen auch häufig Fussödeme und Asyites folgte. —

Aus Altem diesem möchte man wohl mit Gewissheit hervorgehen, dass diese Bahren den kürzlich von Siebert so vortrefflich geschilderten erysipelatösen Charakter hatten, über welchen wir weiter unten bei Gelegenheit der Nymweger Bahrenepidemie vom J. 1737 noch Einiges Näheres anführen Gelegenheit finden werden. Höchst interessant ist indess eine hierher gehörige Nachricht über den Leichenbefund eines an der Ruhr im Januar 1720 verstorbenen Soldaten, bei welchem sich, ausser den Erscheinungen hässlicher Zerstörungen im Darmkanale, auf der Schleimhaut des Dickdarms eine grosse Menge hakenkammförmlicher warziger Auswüchse fand <sup>3)</sup>, eine Degeneration, welche Siebert und Berndt als constant schildern.

Knäuel der Ruhr dem Gesichte der Matingtation während dieser letzteren zu. (*Acta med. Berol. Vol. IX, p. 7.*)

1) *L. c.* p. 26.

2) *L. c.* p. 42.

3) *Acta medica, Berol. Vol. IX, p. 65 seq.* Dort schildert Menzel die von ihm beobachteten und abgebildeten (p. 16) Auswüchse so: „*Protrusum tubum rectum verrucosum, verrucosum, magnis crassissimum verrucosum-cristatum, capite rursus serrato.*“ — Nach der Abbildung waren es hakenkammartige, gezackte, unregelmässig gekörnte, auf einem stielartigen Basal ähnliche Excrescenzen von fast  $\frac{1}{2}$  Zoll Höhe und noch etwas grösserer Breite.



## 1720. Friesel zu Naumburg. — Gerhard.

Indessen fehlte es doch auch in dieser Periode nicht an Friesel-epidemien von ausgebildeter rheumatischer Grundlage, und als deren Repräsentant kann eiglich die Naumburger Epidemie gelten, welche Gerhard für das J. 1720 eben so ausgezeichnet beschrieb als vernunftgemäss behandelte, eine Beschreibung die uns unter der Masse der allfälligen Berichte, mit welchen die übrigens sehr werthvolle Breslauer Sammlung erfüllt ist, wahrhaft erquicklich entgegentritt, und deshalb wohl eine nähere Berücksichtigung verdient <sup>1)</sup>.

Die Krankheit, welche gleichzeitig über ganz Thüringen verbreitet war, befiel bei ihrem Anfange im April und Mai vorzüglich junge Personen von 12 — 24 Jahren von sanguinischem und cholerischem Temperament, so wie Frauen, ausserlich solche, welche spärlich menstruirt waren, unter den Erscheinungen einer „*Arthritis roga*“. Sie bekamen zuerst Frost, bald darauf Hitze, endlich Kopfweh und Schmerzen im Rücken, Krenze und den Extremitäten, welche dagegen bei Denen nicht erschienen, bei welchen sich zu Anfang der Krankheit eine starke Diarrhöe mit heftigen Kolikschmerzen einstellte, durch die der ganze Krankheitsverlauf, selbst auch, wenn jene rheumatischen Affectionen schon eingetreten waren, ohne weitere Folgen abgeschnitten wurde. Wo dieser von Gerhard mit Recht für kritisch gehaltene Durchfall fehlte, da wurden die Kranken 8—10 Tage lang von jenen rheumatischen Affectionen heftig gequält, und bekamen nach ihrem Aufhören heftig geschwollene, steife und contracte Hände und Füße, vorzüglich wenn sie viele Opiate und Narkotika erhalten hatten. Am 12ten bis 14ten Tage aber brach unter heftigem Jucken der Friesel („kleine helle Wasserbüschchen“) hervor, welcher 3—4 Tage stand, worauf Abschuppung und der freie Gebrauch der Glieder folgte. Die Krankheit dauerte in der Regel drei Wochen. Die Epidemie verursachte nur eine sehr geringe Sterb-

1) Zedl. Samml. V. 83, S. 113 B.

Haller's Väter. II.

[1729.]

lichkeit, ausser wo die Aerzte zu schützenden Mitteln griffen, welche Gerhard durchaus vermied, und dagegen mit bestem Erfolge, dem deutlichen Fingerspize der Natur folgend, ein Luxum verordnete. Brechmittel und Aderlässe waren von sehr zweideutigem Erfolge.

Später nahm die Krankheit sowohl an Verheerung als an Gefährlichkeit zu. Viele wurden zum zweitenmale von denselben Erscheinungen befallen, zu denen sich jetzt tödtliche Delirien gesellten. In diesem Zeitraume der Epidemie bewiesen sich fälschliche Reizmittel noch untheiliger; bei Vielen brachen neben dem Friesel kleine rothe Flecken aus, welche trotz alles Warmhaltens binnen 24 Stunden verschwanden und dem Leben plötzlich ein Ende machten. Gerhard betrachtete diese Petechien mit Recht als symptomatisch, und grösstentheils als künstliches Erzeugniss der fehlerhaften erhitzen Behandlung<sup>2)</sup>. Wenigstens waren sie da, wo sie in der zweiten oder dritten Woche von selbst ausbrachen, fast völlig gefahrlos. Gerhard beobachtete sie im Ganzen eben so selten als die Delirien, indem er nicht einem gelinden Purgans abschürfende Erden, Nitrum u. s. w. verordnete. Das Letztere indessen musste bei dem Ausbruche der Flecken vermieden und mit dem Gebrauche aromatischer Tincturen vermischt werden. Sehr wichtig war auch die Uriskrise am 14ten und 17ten Tage.

Auffallend ist Gerhard's Bemerkung, dass die von ihm beschriebene Krankheit in Thüringen „zu Hause sey“ und jedes Jahr verkomme, insofern als diese Behauptung, soweit es dem in Thüringen lebenden Verfasser gegenwärtiger Schrift bekannt ist, auf die Gegenwart nicht mehr passt. Wir haben seit mehreren Jahren weder selbst einen einzigen Fall des wahren Friesels gesehen, noch wird derselbe von den übrigen Aerzten Thüringens anders als selten beobachtet. In der Epidemie des Abdominaltyphus, welche im J. 1839 unter der Garnison zu Wei-

2) „Indem bekannte Flecke und auch nicht, und wenn hierinnen gar viel bei dem Miasma, ob es den Kranken nach der alten Lehre mercurium und die Flecke verschlucken wollte oder nicht“.

mar herrschte, kamen nach mündlichen Mittheilungen eines Beobachters Frieselausschläge häufig vor, und wurden auch auf einigen andern Punkten Thüringens hier und da beobachtet, aber aus der Reihe der gewöhnlichen und alltäglichen epidemischen Erscheinungen ist der Friesel für Thüringen längst verschwunden. Nur zu Anfang des Jahres 1810 kamen einige Fälle, unter ihnen ein vom Verfaasser dieser Schrift beobachteter vor, die aber als große Seltenheiten galten, und bei denen es immer zweifelhaft ist, ob der Friesel, wie in dem vom Verf. beobachteten Falle, nicht symptomatisch war. Ein solcher Wechsel der epidemisch-epidemischen Constitution wird bekanntlich häufig beobachtet, und namentlich ist die Geschichte des Friesels reich an derartigen Beispielen<sup>1)</sup>.

Dieser Epidemie des Friesels folgten Wechselieber, vorzüglich hartnäckige Quartanen, welche zu Naumburg seit 10 Jahren nicht beobachtet worden waren<sup>2)</sup>. Später wurden diese viertägigen Fieber gutartiger und gingen allmählig in leichte Tertianen über, die aber doch bei falscher Behandlung gefährlich wurden, und Friesel oder andere Exantheme erzeugten<sup>3)</sup>. Wir haben bereits oben<sup>4)</sup> auf die große Häufigkeit der Wechselieber in dieser Zeit, so wie auf die innige Beziehung derselben zu den Fleckfebern, der Ruhr u. s. w., ja zu fast allen epidemischen Ereignissen dieser Zeit hingewiesen.

#### 1720. Weimar. Wechselieber. — Müller.

Eine ähnliche Anomalie der epidemischen Erscheinungen gab sich nach Müller's Bericht in diesem Jahre für Weimar zu erkennen<sup>5)</sup>. Dort war man seit mehreren Jahren gewohnt gewesen, im Sommer die Ruhr herrschen zu sehen<sup>6)</sup>; in diesem

1) In Leipzig ist er seit dem J. 1652 nicht wieder erschienen, in der Lüneburger Gegend dagegen wurde er früher nicht beobachtet u. s. w.

2) Breßl. Samml. V. 14. S. 495.

3) Das. V. 14. S. 491.

4) Seite 218 ff.

5) Breßl. Samml. V. 11. S. 264 ff.

6) S. oben S. 285. Der Verf. dieser Schrift, in Weimar erzogen, erinnert sich



(1728.)

und dem vorigen Jahre blieb sie aus, und es herrschten statt ihrer hartnäckige Wechselieber, namentlich im Winter Quartanen, die im Frühling in einfache und doppelte Tertianen, später in den anhaltenden Typen übergingen, mit Petechien auftraten u. s. w. Sie befielen nach Müller über zwei Drittel der Einwohner, waren aber nur in ihrem Uebergange zu typhösen Formen, deren einzige günstige Krise in „Purpurartigen“ Exanthenen bestand; Aderlässe und Abführungen waren höchst nachtheilig; Recidive im Sommer sehr häufig. Müller behandelte die Wechselieber mit verschiedenen Mischungen, in denen das Croll'sche und das Sydenham'sche Fiebersmittel, zuweilen auch der Theriak, die Hauptrolle spielten. Gegen die Quartanen leisteten Anfangs gereichte Brechmittel vorzügliche Dienste. — Der Einfluss der Ruhrconstitution Weimars gab sich indess auch bei diesen Fiebern durch die Leibschmerzen, die Neigung zu Erbrechen und Durchfall zu erkennen, und unter den Folgeübeln spielten Wassersuchten, allgemeine Cachexie, so wie Leber- und Milzanschwellungen, die Hauptrolle. — Blattern dagegen und Masern wurden während dieser Krankheitsperiode nicht beobachtet.

### Die Ruhr der Jahre 1717 — 1727.

Für die im Vorigen behauptete und durch eine hinreichende Anzahl von Thatsachen bewiesene Verbindung des Friesels mit dem erysipelatösen Krankheitscharakter möchten ferner auch die Epidemien der Ruhr einen Beweis geben, welche in dieser

nicht, jenseit dort von der Ruhr, eben so wenig von einer so grossen Häufigkeit der Wechselieber geküht zu haben. In Bezug auf letztere, (vielleicht auch auf erstere), muss indess bemerkt werden, dass die Stadt Weimar seit 120 Jahren eine völlig veränderte Gestalt erhalten hat, und dass namentlich viele, zum Theil nicht unbedeutende Theile in ihrer nächsten Umgebung ausgetrocknet und garrt Strecken, die vorher wüste lagen, angebauet worden sind; Veränderungen, deren eigentliche Wirkungsreihe auseinanderzusetzen hier nicht der Ort ist, die aber jedenfalls nicht übersehen werden dürfen.

Zeit, wie überhaupt das ganze 18te Jahrhundert hindurch, in einer Häufigkeit herrschten, wie sie nur aus der Beziehung der häufigsten Form dieses Uebels zum erysipelatösen Krankheitsprocess erklärlich wird. Diese Beziehung dürfte aber gerade durch unsere Untersuchungen eine bestehende Stütze erhalten.

### 1717. Ruhr zu Schweinfurt. — Cramer.

Hierher gehört zunächst die Epidemie der Ruhr, welche Cramer im heißen, gewitterreichen Sommer des Jahres 1717 zu Schweinfurt beobachtete<sup>1)</sup>. Auch in dieser Epidemie wurden zuerst die Kinder ergriffen; bei Vielen fand mehr Verstopfung als Durchfall Statt, Alle klagten unter Anderem über heftige Herzbeklemmung; die Krankheit pflanzte zur Nachtzeit zu exacerbiren. Dieselbe war zuweilen zu Anfang fieberlos, später aber stellte sich heftiges Fieber, Aengstlichkeit und Ege um die Brust ein, bis am 7ten, in ungünstigen schlimeren Fällen schon am 4ten Tage, Petechien ausbrachen. „Bei Einigen, welche davon kamen, erzeugten sich nach den Flecken durchsichtige Blätterchen, wie von Verkeimung mit einem schwarzen Rande“, was man für den sogenannten Krystallfriesel halten könnte, wenn diesen Blätterchen nicht eine günstige prognostische Bedeutung zugesprochen, und wenn nicht angeführt würde, dass bei Andern sich auf den Petechien selbst weisse Frieselbläschen „*innumerala quodam parvula materia turgida*“ gebildet hatten. Bei Frauen, vorzüglich solchen, die an zu sparsamer Menstruation litten, so wie bei torpiden Kindern brach statt der Petechien der rothe Friesel unter den seiner Eruption eigenthümlichen Erscheinungen (wiederholten Horripilationen, Spannen in dem Rücken, Aengstlichkeit um die Brust, hysterischen Zufällen) hervor, ohne den Verlauf der Ruhr im Geringsten zu stören. Später folgte abwärts Abschuppung. Im Fortgange der Epidemie nahm der Friesel zu

1) Reisl. Samml. Verh. 2. S. 391 E. Aus des Obergrenskalen *Diab. de dysenteria cum petechiis et purpura complicata*. Hal. 1718.

[1719]

Umfang zu, an Gefahr ab. Unter den Nachkrankheiten werden Fußödeme und Ascites, so wie gichtische Beschwerden, und als deren Ursache schlechtes Verhalten und Missbrauch der Abführungen hervor gehoben. — Die Behandlung führte Cramer mit der *Tinctura benzoeacea*, *Essentia asana* des Hallischen Waisenhomes, Rhabarber, absorbirenden Erden u. s. f., vorzüglich aber mit einigen Stahl'schen Geleismitteln aus <sup>1)</sup>. Von der *Cascarille* beobachtete man leichteren Ausbruch der Petechien. Wir finden also hier den Friesel in einer doppelten Verbindung mit Krankheitserscheinungen, die ihm in andern Epidemien gänzlich fremd sind, mit der Ruhr und mit den Petechien, deren Verwandtschaft mit dem Friesel in dieser Zeit uns später noch deutlicher entgegen treten wird. So dass es also auch durch diese Epidemie gewiss wird, dass der Friesel sich annähernd aus dem Petechialtyphus und dem mit diesem ebenfalls in der innigsten Beziehung stehenden erysipelatösen Krankheitscharakter entwickelt, und erst später eine entschiedene rheumatische Eigen thümlichkeit erhalten hat.

#### 1719. Allgemeine Verbreitung der Ruhr in Ungarn.

— Reimann. — Erysipelaceen.

Die Nachrichten über die Ruhr im Sommer des Jahres 1719 finden sich bei Kanold <sup>2)</sup> sehr vollständig zusammengestellt; vorzüglich groß waren die Verheerungen, welche sie unter den Kindern anrichtete. An demselben Orte <sup>3)</sup> findet sich eine ausführliche Beschreibung der Ruherepidemie zu Ep-pesios in Ungarn von Reimann, aus welcher der erysipelatöse Charakter dieser Epidemie sich insofern klar ergibt, als theils

1) Es war zu jener Zeit sehr gewöhnlich, dass berühmte Aerzte über Art und Weise zu raten, wie die gewöhnlichen Quacksalben verfaßten, ein Handel, bei welchem, wie z. B. mit den Medicamenten des Waisenhomes zu Halle, die auch jetzt noch im Umlauf sind, oft ganze Summen verdient wurden.

2) Hist. Kanold. V. 16. S. 177 ff.

3) Das. S. 252 ff.



gleichzeitig und vorzüglich nach der Ruhr die Masern verbreitet waren <sup>1)</sup>, theils in einigen Fällen die Ruhr verschwand, nachdem ein Masernartiges Exanthem mit eiternden Parotidengeschwülsten entstand. Im Frühlinge des folgenden Jahres aber verbreitete sich zu Epyeries ein epidemischer Augenkatarth <sup>2)</sup>.

### 1719. Ruhr zu Seehausen. — Siegesbeck.

Sehr werthvoll ist auch die Beschreibung, welche Siegesbeck in einer eignen Dissertation von der epidemischen Ruhr dieses Sommers zu Seehausen im Magdeburgischen gibt <sup>3)</sup>. Dem eigentlichen Ausbruche derselben gingen eine Zeitlang Durchfälle bei Kindern vorher, welche durch den gewöhnlichen Heilapparat leicht beseitigt wurden. Bei der Ruhr war der günstliche Mangel von Fieberbewegungen auffallend, und in jenen Fällen, wo diese vorhanden waren, schloßen die Durchfälle die heikelste Krisis eines allgemeineren Leidens zu bilden, welches, mit Kopffectionen beginnend, später sich als heftige Beklemmung mit stechenden Schmerzen in der Heragegend zu erkennen gab. Mit Recht erklärt deshalb Siegesbeck die Annahme der grösseren Bösartigkeit der fieberhaften Ruhr für einseitig. Bei manchen Kranken brachen an zehningen Theilen des Körpers Furunkeln aus <sup>4)</sup>. Der Tod trat in der Regel unter allen Erscheinungen äusserster Erschöpfung, namentlich mit Lähmung des Schlundes, Aphthen u. s. w. ein; zu welchen Symptomen sich Convulsionen, Apoplexie und Lethargus gesellte, wenn Adstringentien (*arbutus adstringens*)<sup>5)</sup> gebraucht wurden. Mit der grössten Freimüthigkeit erklärt sich Siegesbeck über die Aetiologie der Krankheit, bei der er weder auf den Genius des Obstes, (welches in diesem Jahre fast gänzlich fehlte), noch auf die Hitze des Sommers allein, sondern unter Anderem vorzüglich auf die Thatsache Rücksicht nimmt, dass

1) Bresl. Samml. V. 18. S. 424 ff.

2) Das. V. 11. S. 279 ff.

3) Sie ist vollständig abgedruckt in der Bresl. Samml. V. 18. S. 428 ff.

4) A. a. O. S. 445.

[1719.]

solche Gegenden, in welchen häufige Gewitter vorgekommen waren, von der Ruhr verschont blieben <sup>1)</sup>. Freilich ist er auch sehr geneigt, der Conjunction des Mars mit der Sonne, welche in diesem Jahre Statt fand, einen grossen Einfluss auf die unersordentliche Hitze dieses Jahres zuzuschreiben. — Für die Behandlung sah Siegesbeck von der Ipecacuanha eben so wenig als von der Rhabarber, dem Nitrum und den absorbirenden Erden, den Hauptmitteln der damaligen Praktiker, einen günstigen Erfolg; diese Mittel vernachlässigten im Gegentheil die Durchfälle. Ähnlich erging es ihm mit Schwitzmitteln, mit der Cascarella und andern stopfenden Arzneien; jederzeit vernachlässigten sie die Herzengangs der Kranken. Etwas mehr leisteten Säuren und die Kampher-haltige *Tinctura benzoëdica*, so wie narkotische Umschläge. Dagegen war der innerliche Gebrauch der Narkotika jederzeit nachtheilig. Siegesbeck betrachtete die Ruhr als einen miasmatischen Vergiftungsprozess, durch welchen besonders die Galle eine eigenthümliche Schärfe erhalte, (ob saure oder alkalische, lässt er unentschieden), und demgemäss stellt er die Ausleerung der Galle als die erste Indication auf. Dieser sucht er indess mit einem Widerspruch durch die Verbindung des Rheum mit dem *Laudanum liquidum*, und vorzüglich durch seine „*Troga dysenterica*“ zu genügen, ein sehr composirtes, aus Hirschhorn, armenischem Bolus, Mastix, arabischem Gummi, Rad. Tormentill., Symplyt., Rhei, Muskatnuss und mehrligen Substanzen bestehendes Medicament <sup>2)</sup>. — Eine ähnliche Ruhrpandemie hatte im J. 1684 geherrscht. — Unmittelbar aber auf die Ruhr folgten epidemische Quartanfieber von fasserter Hartnäckigkeit, gegen welche keins der gerühmtesten Heilmittel, selbst die China nicht, Etwas leistete. Sie hörten entweder von selbst auf oder zogen Wasseranchen u. s. w. nach sich <sup>3)</sup>.

1) A. u. O. S. 444.

2) A. u. O. S. 424.

3) Boerl. Saecul. V. 12. S. 118 u.

An unzähligen andern Orten waren Blattern, (bei welchen erysipelatoſe Anschwellungen des Geſichts und ähnliche Zufälle auffallend häufig waren)<sup>1)</sup> „Gallenfieber“ und (z. B. zu Reichstadt in Böhmen) „erysipelatoſe Fieber“, Geſichtsroſen u. z. w. epidemisch<sup>2)</sup>. Gegen den Winter geſellten ſich zu dieſen Krankheiten Peterſtälſieber mit pleuriſchen Zufällen<sup>3)</sup>. — Vorzüglich löſartig herrſchten die Blattern zu Paris, wo von 10 Kranken 6 ſtarben<sup>4)</sup>. An andern Orten herrſchten Wechſelfieber, ebenfalls mit groſſer Neigung zu exanthematiſchen Eruptionen. Dieſe Wechſelfieber kamen ſelbſt da vor, wo ſie ſonſt ſelten ſind, z. B. zu Weimar. In dieſer Stadt zeichneten ſie ſich durch ihre groſſe Anomalie und Hartnäckigkeit aus<sup>5)</sup>. — Zu Wien nahm dieſe Geſtaltung des epidemischen Krankheitscharakters die Aufmerkſamkeit der Behörden um ſo mehr in Anſpruch, als ſich gleichzeitig die Peſt den Grenzen des Reiches näherte und ſie zum Theil ſchon überſchritten hatte. — Zu Nauraburg kam im Februar 1724 ſehr häufig Urticaria vor, was wir deshalb anführen, um zu zeigen, wie bereit die Aerzte in dieſer Zeit waren, den verſchiedenſten Krankheiten einen „ſcorbutischen“ Charakter beizulegen, wie es bei dieſer Neuſeelandt geſchah<sup>6)</sup>.

#### 1724 — 1727. „Magenfieber“ zu Marburg. — Arnoldi.

Noch mehrere Jahre lang finden wir die Wechſelfieber und Eryſipelaceen an der Spitze der epidemischen Krankheitsverhältniſſe. Hieher gehört zum Beiſpiel das in den Jahren 1724 — 1727 zu Marburg und in der Umgegend herrſchende

1) Vergl. Beſchl. Samml. V. 16. S. 263. (Wiſcher, Beſchreibung der Blatternepidemie in der Liptau in Ungarn.)

2) Das. S. 264 ff.

3) Das. S. 271.

4) Das. S. 283.

5) Das. S. 286, 273.

6) Das. V. 11. S. 215.



[1726.]

sogenannte „Magenfieber“, welches Arnoldi <sup>1)</sup> beschreibt, und welches Ozanam <sup>2)</sup> und Andere zum Schleimfieber <sup>3)</sup> stellen wollen, offenbar zu wohl dem Wechselfieber näher gestanden haben dürfte. Die Hauptsymptome bildeten außer dem anhaltenden, oft aber auch intermittirenden Fieber mit Hitze, Ohnmacht, Schwindel u. s. w., heftige Angst und „Cardialgie“, d. h. Anschwellung und äusserste Empfindlichkeit der Magen-gegend. Häufig steigerte sich diese letztere zum „Brande“ (— Sectionsberichte indess fehlen —), während Delirien, äusserste Schwäche u. s. w., den bösartigen Charakter des Uebels darlegten. In den Remissionen schwitzte, mit Ausnahme der Herzgrube, der ganze Körper; dem Schweise aber folgte die äusserste Schwäche. In andern Fällen war der Verlauf weit leichter. Die Krankheit ergriff Individuen jeder Art, vorzüglich aber Völlesser und Branntweintrinker, Gelehrte, Mönche und Weiber. Arnoldi begann die Kur mit einem Aderlass, dem er dann Brechmittel und die gewöhnlichen „Alterantia“ folgen liess.

#### 1726. Ruhr zu Halle. — Hass.

Eine Beobachtung von Hass <sup>4)</sup> verdient wegen ihres Interesses für die Geschichte der Kenntnisse von den Darmschwürmen aufgeführt zu werden. Der Genannte beschrieb dieselben nach einem Falle tödtlich abgelaufener Ruhr, die im Sommer 1726 zu Halle epidemisch herrschte, und wir halten es nicht für überflüssig, seine Angaben, denen eine Abbildung <sup>5)</sup> beigegeben ist, in der Anmerkung zu wiederholen. Die bei

1) Arnoldi, Henr. Wilh., *De febre stomachali epidemica abn. Norb.* 1727. (Haller's *Diagn. pref.* p. 129 seq.)

2) Ozanam, l. p. 257.

3) S. ant.

4) Hassius, Henric., *Observ. anatomico-chirurgico-medicae.* Hal. 1721. 8. p. 285.

5) L. c. tab. XI.

einer späteren Gelegenheit abzuhandelnde Geschichte des Abdominaltyphus wird uns auf dieselbe zurückführen <sup>1)</sup>.

### 1727. Friesel zu Jena. — Gieseler.

An sich interessant, vorzüglich anziehend aber für uns selbst wegen des Ortes der Beobachtung, sind Gieseler's Nachrichten über die Krankheiten des Winters 1727 zu Jena. Neben heftigen und anhaltenden Wechseln Fiebern, Blattern und Masern, Anginen und Brustentzündungen kamen epidemische anhaltende Fieber vor, bei denen bald Petechien, häufiger Friesel auftrat. Der letztere war aber, wie aus Gieseler's sehr guter Beschreibung hervorgeht, durchaus nicht symptomatisch, sondern durch alle charakteristischen Erscheinungen, namentlich die Angstaufälle im Eruptionstudium ausgezeichnet. „Uebeltrollender“ sagten, es sey die Pest. — Im J. 1707 hatten ähnliche Krankheiten, namentlich eine heftige Ruhr, geherrscht. — Ähnlich, d. h. als Typhen mit Hineinigung zum Frieselcharakter beschreibt Fr. Hoffmann eine Epidemie unter den preussischen Truppen im Herbst 1728. Ausdrücklich wird der am

1) L. v. p. 226. „Cum interitum perlatum epidemum, illam non tantum morbo contagiosum, sed et pueris attentis hanc veritatem ferens eandem diceremur exponeret, nec in hoc effendi; proinde non modo eandem modo dicitur in diffinitione loci existit. — Proinde deinde et deinde, eandem infirmis nec peripatet, cum species non morbo infirmis nec ligatum fuit, quod ad irregularitatem longitudinis per longam distansiam callet, quo interitum morbo morboque nec in competens profuit. Obvenerunt in hoc intestinum alia exulceratione, una fore tractu non teris peritum et in modum articulum autem coherentes, quarum non alterum semper ad distantiam peritum tenentis digiti, nonnullum pulicem articuli, subtrahit erat. Hanc ulcera inaequalis figurae duriusque ut callosi latius circumscripti comprehendebantur, quibus necesse fuit ad musculorum invicem trahi et exstante fuit. Plerumque glandulae Peyerlinguae in illis conspicui hic defuerunt; hinc inspicere hanc immutabilem, generalem cum exstante ulcera in eadem distantia a se invicem inquit eadem loca, qua loca peritum glandulae cohererant, illas fuisse ulceratione depastatos et corruptos, atque evanescere in eadem loca peritum peritum querendum“.

[1728.]

10ten bis 11ten Tage unter grosser Unruhe und Erstickungszufällen eintretende Frieselausbruch hervorgehoben. Wir sehen also auch hier den Friesel von Krankheiten umgeben, deren gemeinsame erysipelatöse Grundlage keinem Zweifel unterliegt. Vorzüglich wichtig aber werden Gieseler's Nachrichten, wenn wir versichern, dass zu Jena Wechselfieber, Petechialtyphus und Friesel gegenwärtig zu den grössten Seltenheiten gehören. Keiner der Jena'schen Aerzte dürfte je ein anderes als importirtes Wechselfieber beobachtet haben, und wir selbst erinnern uns seit 10 Jahren keines zu Jena originär entstandenen Wechselfiebers. Selbst sogenannte larvirte Wechselfieber sind sehr selten. Eben so haben wir wenigstens, wie bereits erwähnt, und wohl die meisten übrigen Jena'schen Aerzte, noch keinen einzigen Fall von wahren Friesel beobachtet; eben so selten aber ist zu Jena der Petechialtyphus und seine neuere Form, der *Typhus abdominalis*. Indem wir dies schreiben überzieht eine der grössten Epidemien dieses letzteren Europa von Moskau bis Lissabon. In der nächsten Nähe von Jena ist derselbe zum Theil sehr verbreitet, in Jena selbst sind bis jetzt nur einige isolirte Fälle, in denen die Verschleppung nicht nachzuweisen ist, vorgekommen.

Ganz ähnliche Verhältnisse bieten Weithrecht's unten näher zu besprechende Nachrichten über die Krankheiten des Jahres 1735 dar.

Für Holland werden im Sommer des Jahres 1727 ebenfalls Rahren, anhaltend-intermittirende Fieber mit bösen Zufällen und Exanthenen genannt. Namentlich wurden Amsterdam, Harlem, Leyden und Haag heimgesucht <sup>1)</sup>.

### 1728. Wechselfieber zu Ferrara. — Lanzoni.

Unter den äusserst zahlreichen Beobachtungen dieser Zeit über die Wechselfieber verdienen unter andern die von Lanzoni zu Ferrara eine Stelle <sup>2)</sup>. — Der September des Jahres

1) Gieseler, Joh. Henr., is der im Schriftumern. genannt. zuseh. d.

2) *Act. N. C. II.* p. 463 seq.



1728 war durch Regengüsse, grosse Häufigkeit von Fröschen, Fliegen, schlechten Weizentrag u. s. w. ausgezeichnet. Es verbreiteten sich Tertianfieber mit dem bilösen Charakter, welche durch die Anwendung des Aderlasses und der China sogleich den anhaltenden Typus annehmen, sehr bösartig und selbst ansteckend wurden. Gleichzeitig verursachten „Brennfieber“ eine bedeutende Sterblichkeit. Bei manchen Wechselfieberkranken erschienen auf der Haut Pusteln und ein krätzartiger Ausschlag. Als Nachkrankheiten Quartanen, rheumatische Fieber u. s. w. Im Frühlinge des Jahres 1729 folgte eine Epizootie unter den Seidenraupen (*Muscardine!*), die Vögel zogen weg u. s. w. Erscheinungen, welche vielleicht mit der nun folgenden grossen Influenza des Jahres 1729 in Verbindung stehen <sup>1)</sup>.

#### 1729. Breslau. — Hahn. — Influenza.

Von grosser Wichtigkeit für die Aufklärung des gegenseitigen Verhältnisses des Friesels, des Petechialfiebers und der erysipelatösen Krankheitsformen sind die Berichte Hahn's über die von ihm zu Breslau im J. 1729 beobachteten epidemischen Erscheinungen <sup>2)</sup>. Der Winter dieses Jahres zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Strenge aus, die mit reichlichen Schneefällen bis zum Frühlingsanfang anhielt. Während dieser Zeit kamen einfache Pneumonien und Bronchientzündungen, so wie hydropische Zustände äusserst häufig vor. Plötzlich eintretendes Thaumstief verursachte grosse Ueberschweamungen der Oden; der Krankheitscharakter wurde ausgebildet „katarrhalisch“ mit Neigung zur Bösartigkeit. Während dieser Witterung hatten Erysipelaceen das Uebergewicht, und selbst der nun sehr häufige Friesel hatte Anfangs mehr den erysipelatösen, später mehr den rheumatischen Charakter. Reine Frieselfälle scheinen nur selten, desto häufiger Verbindungen mit dem typhösen Elemente vorgekommen zu seyn.

1) Giese, S. 55 ff. — Schwich, S. 55 ff.

2) S. der Schiffsarztverzeichnisse.

[1723.]

Für die Verwandtschaft dieses Friesels mit den Erysipelaceen sprechen aber mehrere Thatsachen, vor Allem die grosse Neigung desselben in Oedem und Wasserschwellen überzugehen, die vorzüglich bei Kindern vorherrscht zu haben scheint. Man könnte auf den Gedanken kommen, Hahn habe den Friesel mit Scharlach, namentlich der frieseartigen Form desselben verwechselt, wenn dagegen nicht das reinere Auftreten des Friesels in der späteren Periode, so wie die nach früher nicht fehlenden rheumatischen Zufälle des Eruptionsstadiums sprechen. Offenbar liegt es näher, in diesen Erkrankungen den Kampf anzuerkennen, welcher in dieser Zeit aus bereits vorhandenen Formen, den Erysipelaceen und den Typhen, ein neues Element, den Friesel zu entwickeln strebte. Die Natur bleibt ewig dieselbe, und wir sehen sehr häufig im Individuum die Vorgänge wiederkehren, deren Durchführung für die Umgestaltung der Krankheitsconstitutionen im Grossen sich nur nach Jahrhunderten misst. Eine ähnliche Bedeutung müssen wir auch dem Petechialtyphus dieses Jahres zu Breslau zulegen, in welchem sich auf das Unwiderleglichste die schon mehrfach erwähnten Uebergänge mehrerer Krankheitslemente wiederholen, und in welchem sich namentlich ausserordentlich die Verwandtschaft dieses Uebels mit der Bubonespest darlegt. Hahn sah nämlich bei diesem Petechialtyphus neben frieseartigen Zuständen zuweilen geschwürige Hautausschläge auf der Stirn und Verschwürungen im Halse<sup>1)</sup>, ferner bei Mehreren Anthrax-ähnliche Blasen an den untern Extremitäten, welche in weit verbreitete brandige Zerstörung übergingen, Karbunkeln, vorzüglich an den Waden, die zum Heile der Kranken in Eiterung übergingen, endlich einigemal Parotiden und Buben in der Leistengegend, die in einem Falle unter Schweissen, in einem andern unter Ausbruch von Petechien sich zertheilten. Gleichzeitig herrschten Tertianen von ungewöhnlicher Hartnäckigkeit.

1) *La fruste suppurative et quasi fungus abster, collo laterali vent. crasso.*

Thatsachen solcher Art sprechen lauter als alle theoretischen Nachweisungen. — Uebrigens folgte diesen Krankheitsgestaltungen die Influenza, für welche Italien ebenfalls eine der vorzüglichsten Quellen ist <sup>1)</sup>.

#### 1729. Wien. — Influenza. Friesel. — Löw.

Die erste Erwähnung des Friesels für Wien findet sich in Löw's klassischer Beschreibung der Influenzaepidemie vom J. 1729 <sup>2)</sup>. Auch hier kamen in diesem Jahre neben der Influenza unter einer Menge anderer Krankheiten nicht allein Pestschallfeber, deren Gefahr durch den Ausbruch frieselartiger Exantheme sehr gesteigert wurde, sondern auch wahre Friesel-Feber bei Wöchnerinnen vor, die im folgenden Jahre auch bei Männern, namentlich Jünglingen häufig beobachtet wurden. Nirgends aber wird die Krankheit für eine neue ausgegeben.

Eine ganz besonders wichtige Rolle spielen in der Geschichte der Volkskrankheiten überhaupt, namentlich aber in der des Friesels die Jahre 1733 und 1734, indem sie uns auf sehr vielen Punkten Deutschlands und Frankreichs die Krankheit in einer bis dahin unbekannten Ausbildung und Heftigkeit erblicken lassen. Deutlicher als es sonst zu geschehen pflegt offenbarte sich die Beziehung, welche plötzlich eintretenden und schroffen Veränderungen der Witterung auf die Entstehung der Epidemien zugeschrieben wird, und vorzüglich ist nicht außer Acht zu lassen, dass der Krankheitsperiode dieser Jahre zwei der ausgedehntesten Influenzen, die des Jahres 1729 und 1732 — 1733, zur Einleitung diene <sup>3)</sup>. Dieser durch die Influenza herbeigeführte Krankheitscharakter wird in der Regel als der katarrhalische bezeichnet <sup>4)</sup>; er scheint

<sup>1)</sup> Vgl. Gluge.

<sup>2)</sup> S. das Seitenverz.

<sup>3)</sup> Gluge, de Influenza, S. 11 E.

<sup>4)</sup> Die Vollständigkeit des Ausbruchs „Katarrh“ bei den älteren Aerzten ist bekannt. Sie erhielt sich auch lange nach Schwedje's klassischer Abhandlung über den Haug der Selbstheilung.



[1711]

indem, genauer gesprochen, ein ausgezeichnet erysipelatöser gewesen zu seyn, wofür theils die Witterungsverhältnisse, eine bedeutende, in plötzlichem Thauwetter schnell nachlassende Winterkälte, theils und vorzüglich die überall herrschenden Knochheiten selbst sprechen. Als solche werden Rosen, Scharlach, *Angina maligna*, Keuchhusten und Maseru genannt, zu denen sich gegen Ende dieser Periode der Friesel hinzugesellte <sup>1)</sup>.

Was zunächst das Scharlach betrifft, so braucht nur auf die häufigen und namentlich mit heftiger Halsaffection verbundenen Epidemien desselben in den Jahren 1717 — 1740 in Thüringen <sup>2)</sup> und England <sup>3)</sup> aufmerksam gemacht zu werden. Die *Angina maligna* aber hat weder früher noch später in Nordamerika in solcher Ausbreitung und Heftigkeit gewüthet, als in den Jahren 1733 — 1735. Gleichzeitig mit einer Viehsenche brach dieselbe im Mai bei kühler feuchter Witterung aus, und verbreitete sich in 2 Jahren über eine Längsstrecke von 200 Meilen <sup>4)</sup>. An andern Orten, namentlich zu Nymwegen, später in ganz Holland und im Clevischen und Bergischen, herrschte eine von Degner beschriebene und als billus bezeichnete Ruhr, an deren erysipelatösem Charakter, wie sich aus ihrer unten folgenden Betrachtung ergeben wird, kaum gezweifelt werden kann.

Ganz vorzügliches Interesse aber bietet die Geschichte einer in das J. 1733 fallenden und von Grünwald beschriebenen Frieselepidemie dar.

### 1735. Friesel in Baiern. — Grünwald.

Dieselbe trat auf den Penninischen Alpen Baierns gegen Ende December 1733 auf, nachdem der vorher bei ziemlich heftiger und fortwährend steigender Kälte reichlich gefallene Schnee

1) Vergl. Schürerer, a. d. gem. J.

2) Störck, Vergl. histor.-pathol. Unters. I, S. 315.

3) Fuchs, histor. Unters. u. s. w. S. 20.

4) Hist.-path. Unters. I, S. 285 ff.

plötzlich und mit einem Male hinwegschmolz und die strenge Winterwitterung sich in das mildeste Frühlingsklima verwandelte. Die mit dieser auffallenden Katastrophe eintretende Epidemie befiel vorzüglich Kanaken, Jünglinge so wie junge Männer aus den höheren Ständen, und zeigte Anfangs nur die leichten Zufälle eines katarrhalischen Fiebers, wobei indess auffallend war, dass sich bei allen Kranken eine mehr oder weniger bedeutende anginöse Affection mit Schlingbeschwerden („*tumor anginosus, plus minus uoxus, cum deglutendi molestia*“) einstellte. Unter den übrigen Symptomen verdient nur der bei Einigen unerträgliche Geruch des Schweißes hervorgehoben zu werden. Die Beschreibung aber, welche Grünwald von dem sich einstellenden Exantheme macht, lässt bei all' ihrer Genauigkeit kaum eine sichere Bestimmung über den Charakter der Krankheit zu. Die Haut des ganzen Körpers nahm eine gefleckte Beschaffenheit an, („*corpus nigrum variegat coloris conspicuatur*“) es erhoben sich unzählige hirsekorntartige Pasteln, bald von weisser, bald von rother Farbe, ja zuweilen kamen beide bei einem und demselben Kranken nebeneinander vor; zu diesen Hautanschlägen gesellten sich aber noch andere, bald Blattern-, bald Petechien-artige, die indess keinen festen Typus und Verlauf zeigten. Mit dem Ausbruche dieser Exantheme aber liessen die anginösen Beschwerden entweder gänzlich oder zum Theil nach. Häufig gesellten sich nun zu den bisherigen unvernünftigen Symptome der grössten Bosartigkeit, Unruhe des Kranken, Herzensangst („*Præcordium angustum*“), Durchfälle, Delirien, Convulsionen, profuses Nasenbluten. Trat Genesung ein, so schuppte sich die Haut nach vorherigem Jucken ab, die Haare fielen aus, häufig schwellen die Hände und Füße an, und es blüht an den Knöcheln ein fröselartiger Herpes zurück. Bei näherer Berührung mit den Kranken pflanzte sich das Uebel, welches erst Ende Februar 1724 nachliess, auch durch Ansteckung fort.

Zu dieser Beschreibung der Krankheit fügt Grünwald im Verlaufe seiner lateren Betrachtungen noch folgende Bemerkungen:

1874.]

kürzen hinzu. Die Belästigungen und drückenden Gefühle in der Herzgegend (*angustates et pressuræ precordiales*) entstanden vorzüglich durch das, durch innere oder äussere Ursachen herbeigeführte, Zurücktreten der Exantheme, und liessen nicht eher nach, als bis sich dieselben wieder auf der Haut fixirt hatten, oder durch eine andere periphere Krise ersetzt wurden<sup>1)</sup>. Ferner wird berichtet, dass die meisten Kranken genasen. Ausbruch weissen Friesels neben rothem oder Petechien gab eine selt-, regelmässiger, allmählicher und nicht stürmischer Ausbruch der Exantheme eine günstige Prognose. Wiederholtes Nasenbluten war ohne günstige Vorbedeutung; entgegengesetzt aber verhielt sich Blutsprien, vorzüglich bei Solchen, die schon früher an denselben litten. Grosse Angst, Durchfälle, Einsinken der Exantheme und leichte Zuckungen auf der Höhe der Krankheit verkündeten den gewissen Tod.

Grünwald behandelte dieses Fieber nach den Grundsätzen der damaligen Zeit und nach symptomatischen Indicationen mit gelinden Anfangs gereichten Brech- und Purgirmitteln, mässigen Diaphoreticis, bewandischen Mitteln u. s. w. Interessant aber ist seine, wie es scheint nicht zur praktischen Ausführung gelangte Vermuthung, dass vielleicht Kalien (*„Astracida absorbentia, acidumque estolite in se continentia“*) bei der voraussetzenden nächsten Ursache der Krankheit, einer „kälzenden Säure“ das Meiste leisten würden<sup>2)</sup>. Es ist bekannt, dass Schönlein, freilich aus ganz andern Gründen als unser Chemiker, dem Friesel, wie dem Rheumatismus überhaupt, eine eigenthümliche Säurebildung zuschreibt, und dass die hierauf gegründete Behandlung des Friesels mit alkalischen Waschungen bis jetzt noch das Meiste geleistet hat. Vielleicht dass die Aerzte hundert Jahre früher dem verjährten Schlen-drian der symptomatischen Therapie bei dem Friesel entsagt hätten, wenn Grünwald des Muth gekostet hätte, seine äusserst

1) Grünwald, l. c.

2) Diss. p. 52.



glückliche Idee am Krankenbette zu prüfen, vielleicht aber auch, dass man dennoch die alte Behandlungsweise fort und fort beibehalten hätte. Denn die Macht verjährter Vorurtheile hält oft selbst den Geist der Besten zu sehr gefangen, als dass er der Stimme der Vernunft und den deutlichsten Fingerzeigen der Natur zu folgen im Stande wäre.

Die Entscheidung, ob Grünwald Scharlach oder Petechialtyphus oder Friesel beobachtet habe, ist nicht ganz leicht, da in dem Krankheitsbilde offenbar Züge aus allen enthalten sind. Für Scharlach könnte die allgemeine erysipelatöse Krankheitsconstitution, das jugendliche Alter der Kranken, welche vorzüglich dem männlichen Geschlechte angehörten, die anginösen Beschwerden, das Oedem der Genesenden, die Abschuppung: für den Petechialtyphus der Ausbruch der Petechien und einzelne Symptome, namentlich auch das Ausfallen der Haare in der Recrudescenz: für den Friesel endlich die vorwölbende Form des Exanthems, die Schwellen, die Herzaffection und einige andere untergeordnete Symptome sprechen. Grünwald selbst erklärt die Krankheit für Friesel. Offenbar aber war unsere Epidemie von der vollendeten Eigenthümlichkeit der Leipziger Seuche weit entfernt, und es dürfte deshalb dieselbe am natürlichsten als eine Zwitterform angesehen werden, in welcher sich Petechialtyphus, Scharlach und Friesel zu einem Krankheitsbilde vereinigten, und welches den in der Geschichte der Volkskrankheiten so häufig begegnenden Beweis gibt, dass die scharf ausgeprägten Formen der Krankheiten in der Natur seltener sind, als in den Systemen der Nosologen, dass dies namentlich bei dem Beginne ihrer Entwicklung der Fall ist.

#### 1755. Friesel zu Strassburg. — Salzmann.

Als ein Bestandtheil dieser allgemein verbreiteten Friesel-Constitution erscheint die von Salzmann beschriebene Epidemie des Jahres 1754 zu Strassburg und der Umgegend. Sie begann im August und September dieses Jahres, gleichzeitig

[1734.]

mit Diarrhöen, Röhren, galligen und Tertian-Fiebern. Salzmänn ist sehr geneigt, einen grossen Antheil an ihrer Entstehung den nach Strasburg und in die Umgegend verschleppten Lagersfebern zuzuschreiben, welche vorher unter den kaiserlichen Truppen am Rheine geherrscht hatten, und für welche er eine Beschreibung von Krauter erwähnt <sup>1)</sup>. Jene Truppen bezogen nämlich in Strasburg die Winterquartiere, und deutlich genug erwies sich der contagiose Charakter der von ihnen mitgebrachten Krankheiten. In früheren Epidemien hatte das Uebel mit grosser Heftigkeit vorzüglich die Kinder(erwachsenen?) ergriffen, jetzt hefiel es hauptsächlich das männliche Geschlecht, mit Ausschluss des kindlichen und des Greisenalters, und raffte gerade die Kräftigsten unter den Soldaten, vorzüglich die Rekruten, hinweg. In Bezug aber auf sein Verhältniss zu andern Krankheiten ist die Bemerkung interessant, dass während seiner Herrschaft die Petechialfieber fast gänzlich zurücktraten <sup>2)</sup>. Zu Anfang der Epidemie, welche sich bis Ende März 1735 hinzog, wurden nur Wenige, später sehr Viele, aber unter offenbar gelinderen Erscheinungen befallen. Wie in andern Epidemien ging auch hier dem Anbruch des Fiebers ansoerte Abgeschlagenheit, ziehende Schmerzen in verschiedenen Körpertheilen, namentlich die so charakteristische, in Paroxysmen wiederkehrende Herzangst, Zittern und leichte convulsivische Erschütterungen der Glieder, Kopfschmerz und gelinde Delirien, zuweilen leichter Sopor voraus, zu welchen Erscheinungen sich am 4ten bis 7ten Tage ein in der Regel kritischer, galliger, wässriger, schleimiger Durchfall gesellte. Früherer Eintritt dieses Durchfalls war von schlimmerer Bedeutung. Mit den Excretionen des Fiebers stellte sich ein bald allgemeiner, bald vorzüglich auf den Rücken, der Stirn und der Brust ausbrechender, nach dem isch oder weniger warmen Verhalten mehr oder

1) Die Titel dieser sonst längere cretischen Schrift ist: Krauter, Jak. Geo. Herz, *De morbis contagiosis* von 1711 et 1712, 28. 8. v. a. J.

2) Salzmann, bei Haller a. a. O. p. 594.

3) Das. p. 665.

weniger reichlicher, klebtiger Schweiß ein. Nasenbluten und Erbrechen war selten, ebenso ungünstige Affectionen. Wurmcomplication war in der Stadt selten, häufiger auf dem Lande und bei den Truppen bemerkbar. — Der Ausbruch des Friesels erfolgte unter den bekannten Erscheinungen, Jucken der Haut, vermehrter Fieberbewegung u. s. w., am 7ten, 9ten und 11ten Tage, selten, und hier mit schlimmerer Vorbedeutung, früher, und zwar nicht auf einmal, sondern in abwechselnd wiederholten Paroxysmen. Die Beobachtungen des Pulses entsprechen in Bezug auf die eigenthümliche Härte, Celerität und Intermitteuz desselben vor, und seine wellenförmige Beschaffenheit nach der Krisis, ganz den von allen aufmerksamen Beobachtern gemachten Erfahrungen. Ebenso die über den Urin und die Eigenthümlichkeit des aus der Ader gelassenen Blutes mitgetheilten Bemerkungen. Letzteres war von einer gewissen gelatinösen Beschaffenheit, enthielt sehr wenig, aber sehr gelbes Serum, und gerann sehr schnell in einen festen, in der Regel eine Speckhaut zeigenden Blutscheib. — Für die von Salzmann angeordnete Therapie genüge die Bemerkung, dass dieselbe nach den geläutertsten Ansichten der damaligen Therapie eingeleitet wurde, dass namentlich dem Aderlass nur mit grosser Einschränkung das Wort geredet wird, und dass die gelinde Beförderung der Hautkrisis ihre Hauptaufgabe bildete.

#### 1755. Friesel zu Petersburg. — Weithrecht.

Ganz entsprechend sind die Nachrichten über den Krankheitscharakter des Jahres 1755, welche uns Weithrecht in einer sehr gut geschriebenen Dissertation aufbewahrt hat. Hier bildete zwar der Petechialtypus den Mittelpunkt der epidemischen Erkrankungen, aber es kam doch bei Frauen sehr häufig Friesel (welcher bei Wöchnerinnen erst war) vor. Derselbe war in der Regel von Frieselangina begleitet, und gieng unter Schweissen und mässiger Diarrhöe in Genesung über. Bei Manchen indess giengen diese Fieber in langwierige Wechsel-



[1735.]

fieber über, die nach Weitbrecht sonst ebenfalls zu Petersburg sehr selten, und meist aus Polen eingeschleppt sind <sup>1)</sup>.

**1735. Friesel in Lothringen und im Elsass. —**  
**Quesnay.**

Im J. 1735 und den folgenden <sup>2)</sup> erblickten wir den Friesel in einer grossen Ausdehnung über viele Punkte Lothringen's und des Elsass verbreitet. Von der Epidemie desselben im Dorfe Frenouse bei Mante berichtet Quesnay kurz und in einer Weise, die an der Natur des übrigen ziemlich leichten Uebels nicht zweifeln lässt. Die Epidemie dauerte an dem genannten Orte zwei Monate, bedenklichere Erscheinungen kamen erst zu Ende derselben und kurz vor dem Tode vor <sup>3)</sup>.

**1737 und 1738. Friesel zu Goslar. — Triumph.**

Unter den Beobachtern des Friesels in dieser Periode nimmt ferner auch Triumph eine vorzügliche Stelle ein. Seine Beschreibung der Epidemie, welche 1737 und 1738 zu Goslar und in der Umgegend herrschte, zeugt von einer eben so scharfsichtigen Beobachtungsgabe, als ausgezeichnetem praktischen Talent. Auch in der Goslar'schen Epidemie tritt uns, wie auf den meisten Punkten Deutschlands, die noch nicht ganz streng von dem Petechialtypus gesonderte Form des Friesels hervor, der den dortigen Aerzten erst seit dem J. 1707 bekannt geworden war und seit dieser Zeit häufig in weniger bedeutenden Winter- und Frühlings-Epidemien geherrscht hatte. Triumph schreibt der hohen, kalten, und feuchten Lage Goslar's <sup>4)</sup>, des

1) Vergl. oben S. 308.

2) Vergl. die Übersicht über die Epidemien des Friesels bei Haacke, engl. Schwann, S. 210.

3) Quesnay, *L'art de guerir par la saignée* p. 335.

4) Die Menge der atmosphärischen Niederschläge betrug nach Triumph

im Jahre 1728 zu Paris — Fast 28 Zoll — Lin.

— „ — „ — „ — 20 — „ — „

— „ — „ — „ — 10 — „ — „ — „

in den genannten Jahren vorwaltenden Süd- und Westwinden einen Einfluss auf die Entstehung der Epidemie zu, die in ihrer Bösartigkeit durch die äusserst dürftige Lebensweise der Mehrzahl der Einwohner, welche vorzugsweise Bergbau betreiben, nicht wenig gesteigert wurde. Es scheint wenigstens das häufige Vorkommen der *Purpura seu febrilis* (*Purpura erythorun*) so wie die fast regelmässige Complication des Frieselfiebers mit Würmern, endlich auch der zuweilen beobachtete, mehrmals tödtliche, Ausbruch von Carbunkeln und Bubonen <sup>1)</sup> nach überstandener Krankheit zum Theil auf diesen Verhältnissen zu beruhen.

Die zu besprechende Epidemie begann im Frühling 1737 und wurde durch ein fast alle Kinder befallendes, aber höchst gelindes und in keinem Falle tödtliches Scharlach eingeleitet <sup>2)</sup>. Denn nur für dieses kann Triumph's „*Purpura benigna*“, welche bei den Meisten „Leukophtegmasie“, bei Einigen Wassersucht zurückliess, gehalten werden. Gleichzeitig epidemisirten Blattern, ebenso gutartig vor der Frieslepidemie, als gefährlich nach derselben <sup>3)</sup>. Diese aber ergriff alle erwachsenen Einwohner ohne Unterschied, wobei indess bemerkenswerth war, dass das weibliche Geschlecht heftiger ergriffen wurde, indem die Frauen entweder schon am 9ten oder 11ten Tage starben, oder doch eine sehr langsame Rectivalescenz zu überstehen hatten. Die Anzahl der Gestorbenen aber war für beide Geschlechter ziemlich dieselbe <sup>4)</sup>. Nach leichten katarrhalischen Vorboten brach in der Regel an einem kritischen Tage unter Hautjucken und gelinden Schweissen der Friesel aus. Triumph hebt ausdrücklich hervor, dass der Friesel häufig

vom Juni 1737 bis Januar 1738 zu Götter 5 Fuss 3 Zoll 5 Linien, vom Juli bis December 1738 5 Fuss 1 Zoll 2 Linien. (Triumph, p. 73.)

1) Triumph, p. 81.

2) Ders., p. 72.

3) Ders., p. 73.

4) Im J. 1728, wo doch die Krankheit gelinder war, betrug die Zahl der Geborenen 385, die der Gestorbenen 317 (Differenz = 126.) = Götter hat jetzt ungefähr 7000 Einwohner.

[1777.]

ohne warmes Verhalten und selbst ohne Arzneigebrauch erschienen sey<sup>1)</sup>. So gelind aber auch häufig die Krankheit zu seyn schien, so stürzten doch Viele plötzlich ohne anscheinende Ursache, und Viele genasen, bei denen Alles einen ungünstigen Ausgang fürchten liess, selbst ohne ärztliche Hilfe. Bei Wenigen zeigten sich pleuritische Symptome, bei sehr Vielen aber ein dumpfer, zuweilen reisender und stechender Kopfschmerz. Dem Ausbruche des Friesels gingen zuweilen, vorzüglich bei Jüngeren und Vollblütigen, epileptische Zuckungen vorher, welche indess eben so wenig zu bedeuten hatten, als die gleichen Zufälle in den späteren Zeiträumen im höchsten Grade ominös waren<sup>2)</sup>; heftiger Kopfschmerz gab eine ungünstige Prognose. Derselbe verschaffte der Krankheit bei dem Volke den Namen der „Hauptkrankheit“. Ebenso gefährlich war Angina und profuse Diarrhöe. Charakteristisch war die bekannte Herzenanngst, welche der Verf. um so lebhafter schildert, als er selbst die Krankheit zu überstehen hatte<sup>3)</sup>. Zuweilen entschied sich die Krankheit durch Nasenblutungen, einigemal durch Paratiden und in den günstigsten Fällen durch gelinde, anhaltende Schürisse. Später folgte Abschuppung.

Die Epidemie des Jahres 1737 unterschied sich von der des folgenden nur durch ihre grössere Rascartigkeit und durch die grosse Häufigkeit der Wurmcomplication. Was aber die Behandlung betrifft, so fand Triumph nur selten einen Aderlass angezeigt, desto häufiger ein Brechnmittel aus Ipecacuanha und gelinde Abführmittel, welche meistens Würmer und viel Galle entleerten; ausserdem die gebräuchlichen Beccardien. Theriak und dergl. verordnete Triumph selten. Bei zögernden Krisen sah er häufig vom Kampher ausgezeichneten Erfolg, vorzüglich in der zweiten Epidemie, und zur Beseitigung der Kopfaffectationen leisteten Vaccinere das Meiste<sup>4)</sup>. Zuletzt widerlegt

1) Triumph, p. 75.

2) Pers., p. 85.

3) Pers., p. 87.

4) Pers., p. 88.



Triumph nach die Hypothesen von der Beziehung der metallischen Exhalationen Goslar's, der Goslarischen Gase<sup>1)</sup> und des Kaffee's zur Entstehung der Krankheit<sup>2)</sup>.

Ausserdem führt Allioni noch für 1735 und die folgenden Jahre ein in Rhodanum verbreitetes tödtliches Frieselfieber an, und bezieht sich deshalb auf eine um nicht zu Gebote stehende Dissertation Jacob Smith's<sup>3)</sup>.

### Die Krankheitsconstitution der Jahre 1715 — 1754 zu York. — Wintringham.

Die im Vorigen beschriebene Eigenthümlichkeit der allgemeinen Krankheitsconstitution gibt sich auch in den klassischen Beobachtungen Wintringham's über die epidemischen Ereignisse der Jahre 1715 — 1734 zu York zu erkennen, wie sich aus einer kurzen Uebersicht derselben, die für den Vorurtheilslosen eines Commentars nicht bedarf, leicht ergeben wird. In dem kalten Winter von 1715 spielten Brustentzündungen, im folgenden Sommer Nervenfleber die Hauptrolle. Der Winter des Jahres 1717 verhielt sich wie der von 1715, der Sommer dieses Jahres, noch mehr aber der des folgenden brachte dagegen Wechselfieber und den Anfang der bösartigen Epidemie, welche im J. 1719 ihre Höhe erreichte. Der Sommer des letzteren, in welchen der Anfang der Marceller Pest fällt, zeichnete sich durch ungeheure Hitze aus<sup>4)</sup>, der in der Mitte des Juli plötzliche Kälte folgte. Schon im Mai erhob eine „*Febris putrida*“ ihr Haupt, und im Juli und August erreichte sie ihre Höhe. Hauptsymptome waren Erbrechen, Durchfälle, die, wenn sie nicht übermässig wurden, häufig kritisch waren; Blutungen; letztere vorzüglich während der eben erwähnten Kälte mitten im Sommer.

1) Ein nach Jetal benanntes Bier.

2) Triumpfi sagt, die Hälfte seiner Kranken habe den Kaffee kaus dem Geruche kach gekostet.

3) Smith, Jac., *De febri maligna*. Petersburger. 1749.

4) Nach den Beobachtungen des Faber Collet stieg das Thermometer (zu Paris) auf  $+ 77,95^{\circ}$  R.

[1724.]

Die Anwendung des Opiums gegen jene Durchfälle erhöhte die äusserste Vorsicht. Für die Beurtheilung dieser Krankheiten aber dürfte die Bemerkung von Einfluss seyn, dass gleichzeitig anhaltend-remittirende Fieber mit ähnlichen Zufällen herrschten. Ausserdem kamen viele Fälle von Manie vor.

Für das J. 1720 hebt Wintringham Wechselfieber und schleichende Nervenfieber hervor, zu denen sich im März und den folgenden Monaten des Jahres 1721 bösartige Mäxern gesellten. —

Die Witterung des Jahres 1722 war kalt und feucht; neben Tertian- und Quartanfebern herrschten Anginen, Pleuritis. Ferner wurde Wassersucht, Icterus und Phthisis häufig beobachtet. — Die Krankheitsconstitution des Jahres 1723 kam nur als eine Steigerung der vorausgegangenen betrachtet werden. Im Frühlinge desselben erschienen die Blattern, bösartige „Pleuritis“, Anginen, Rheumatismen, Husten u. s. u.. Der Aderlass konnte nur selten entbehrt werden, und das gelassene Blut hatte eine ausserordentlich starke Entzündungshaut. Noch mehr war dies im Herbste der Fall, der mit glänzlicher Kälte eintrat. Man herrschten ausser den oben erwähnten Krankheiten Unterleibsentzündungen und vorzüglich Ruhrten.

Im J. 1724, welches im Allgemeinen feucht und warm war, liess diese entzündliche Krankheitsconstitution nach; die Blattern wurden gutartig, und bei allen Krankheiten zeigte sich eine entschiedene Neigung zu kritischen Durchfällen. Indess hatten noch im Februar die intermittirenden und remittirenden Fieber einen so entzündlichen Anstrich, dass es bedenklich war, die China zu verordnen. — Im März herrschte der Keuchhusten epidemisch. (Gleichzeitig auch zu Augsburg)<sup>1)</sup>. Indess hatte die Krankheitsconstitution, die wir als die erysipelatöse zu bezeichnen gewohnt sind, noch durchaus nicht aufgehört, denn im Herbste epidemisirte eine von Ekel und Erbrechen, Hautjucken und Ausschlägen begleitete Febricula; Icterus, Fusoedeme, Peri-

1) Orban, I. 218.

pneumonien waren häufig. Kranke jeder Art klagten über Schwindel, Kopfschmerz, Schlafsucht, Schwerhörigkeit, und zuletzt erschienen Ende September die Masern. Mit Zunahme der Kälte traten „falsche Peripneumonien“ auf, denen sehr häufig Leukophlegmasie, Hydrops und Asthma, und bei unvorsichtiger Anwendung des Aderlasses exsudative Ergüsse in die Lungensubstanz folgten. Noch immer herrschten die Masern fort. — An dieser Tendenz zu Hantaffectionen nahmen noch im warmen und trocknen Frühlinge 1726 die remittirenden Fieber Antheil. Fast alle Kranken klagten über Kopfschmerz, der sehr leicht in Delirien und Phrenitis ausartete. Zugleich waren Brustfell- und Lungenentzündungen mit Blutspucken, Anginen und Augenentzündungen, gelüßes Erbrechen und Durchfälle häufig, und vielleicht erkennt man selbst in der Verschlimmerung des Zustandes Hypochondrischer und Melancholischer, so wie in der Häufigkeit der Malle den Antheil des Pfortadersystems und seine bekannte Bedeutung für den erysipelatösen Krankheitscharakter. Im Sommer herrschten die Blattern, diesmal mit einer ebenfalls nicht schwer erklärlichen besondern Neigung zu Hirnaffecten<sup>1)</sup>, denen Winterringham gegen Sydenham's Ausspruch mit derivativen Blutentziehungen zu begegnen suchte, da er sich durch die Beobachtung von den günstigen Folgen freiwillig eintretenden Nasenblutens überzeugt hatte. Ausserdem kamen bei den Blattern häufig Oedeme vor.

Vom Juli an folgten diesen Krankheiten Diarrhöen, Dysenterieen und Cholera, und diesen wieder mit der Winterkälte ein eitründlicher Krankheitscharakter. — Indess erhoben schon im März des Jahres 1727 die Blattern wieder ihr Haupt, und im Sommer folgten ihnen Wechselieber, Brustfell- und Lungenentzündungen, denen indess die ächte phlogistische Eigenschaft des Blutes abging. Diese Neigung des Krankheitscharakters zur Adynamie trat aber vorzüglich in der „*Fébris putride*“ hervor, die vom Juli an sich verbreitete, mit Friesel

1) „*Dysentia magna in caput rariata*.“



[1728,]

begleitet war, und im Sommer des folgenden Jahres von Neuem in noch heftigerer Intensität herrschend wurde, nachdem im zwischenliegenden Winter (1727) eine sehr gefährliche Pestepidemie und tödtlich tödtende Angina geherrscht hatten.

Das erwähnte Foulfever entzied sich durch Erbrechen, Durchfälle und Schweiße, gleichzeitig kamen Pestchialfleber vor. Der Winter 1727 war kalt; im Frühlinge vertheilte sich der Keuchhusten und die Influenza<sup>1)</sup>. Im folgenden gelinden Winter (1728) werden Blattern, Asthma, Furoedeme erwähnt. Die Wechselfieber aber gingen in dieser ganzen Periode niemals ganz aus.

Für die Bezeichnung des von Wintringham geschilderten Krankheitscharakters der folgenden Jahre würden wir nur das Gesagte zu wiederholen haben; es dürfte genügen, durch diese fortlaufende Reihe von Krankheitsbeschreibungen, die trotz formeller Verschiedenheiten ihre gemeinsame Eigenähnlichkeit deutlich genug verrathen, den Beweis zu vervollständigen, den wir in Bezug auf die erysipelatöse Natur des europäischen Krankheitsgenius in dieser Periode zu führen suchten, so weit unsere geringen Kräfte und der dem Geschichtsforscher zuständige Apparat der Thatsachen es vergönnen.

### Viehseuchen der Jahre 1700 — 1713.

Zu diesen Beweisen allgemein verbreiteter krankhafter Stimmungen in dieser Zeit gehören endlich auch vor Allem die Viehseuchen, für deren wichtigste, die Rinderpest, Kanold zwar ebenfalls den Antheil des contagiösen Moments nachweist, die aber auch in andern Formen anstecklicher Art nur die Zurückführung auf infektiöse Entstehung zulassen.

Die Geschichte dieser Viehseuchen hat der genannte Forscher, mit dessen grossen Verdiensten um die Geschichte der

1) Vergl. Hage und Schwertk.

Pest wir uns später ausführlich beschäftigen werden, in einer kürzeren <sup>1)</sup> und in einer ausführlichen Schrift <sup>2)</sup> mitgetheilt, von denen die letztere ziemlich unbekannt zu seyn scheint <sup>3)</sup>. Diese aber ist durch die Reichhaltigkeit der Thatsachen sowohl, die Kanold mit grosser Mühe und nicht ohne grosse Unkosten von allen Seiten her sammelte, als auch durch die Frische und Gründlichkeit der Bearbeitung von hohem Werthe, und läßt den Verlust des grossen Werkes dieses ausgezeichneten Forschers über die Meneschapest dieser Zeit nur um so mehr bedauern <sup>4)</sup>. Die folgende Uebersicht des hauptsächlichsten historischen Inhalts desselben wird deshalb wohl kaum einer Rechtfertigung bedürfen.

In Schwaben herrschte im J. 1701 in Folge der unvor-  
 ordentlichen Winterkälte und darauf folgenden Sommerhitze  
 (S. oben S. 248.) die Brustwassersucht unter dem Rindvieh all-  
 gemein. Unter dem Einflusse kalter und feuchter Witterung  
 so wie von Futtermangel verbreitete sich im Frühlinge 1702 am  
 Rhein und in der Lombardei eine Epizootie unter den Pferden,  
 die in den folgenden Jahren, und zwar weit heftiger, auch an  
 der Oder, im Elsass, in Polen und im französischen Heere  
 beobachtet wurde. Die Hauptursache war muthgedragnete  
 Fütterung mit grünem Klee u. s. w. In England verbot man  
 selbst die Einbringung von Pferden aus dem Elsass, aus (unbe-  
 gründeter) Furcht vor Ansteckung. — Auch für die folgenden  
 Jahre bis 1708 werden weitverbreitete, aber von der eigent-  
 lichen Thierpest verschiedene Viehseuchen, unter ihnen für das  
 J. 1707 im Hennebergischen und in Franken die Maul- und

1) Kanold, Falsch, histor. Relation von der Pestilenz des Rindviehes.

2) Ders., Kurze Jahreskurtzweh von den Seuchen des Viehes 1701 — 1717.  
 (S. das Schlußcapitel.)

3) Haller sah dieselbe nicht, und auch sonst finden wir darüber nicht er-  
 wähnt.

4) Die Entweichung der unter 2) genannten Schrift wurde nach Kanold's  
 eigene Angabe durch die Unentschlossenheit seines geschäftlichen Verlegers  
 sehr verzögert, das Manuscript ging also in einen andern Verlag über. Indessen  
 hätte diese Verzögerung doch das Gute, dass durch sie die Schrift um 2 Kapitel ver-  
 mehrt wurde. —

[1710.]

Klauenzerke, und für 1760 eines allgemeinen, seinen vor-  
gängigen Erscheinungen nach der Rinderpest ziemlich naheste-  
henden Sterbens unter zahmen und wilden Thieren erwähnt,  
obgleich allgemeine Ursachen hier bei weitem eine grössere  
Rolle spielten, als das sehr problematische Contagium.

### Rinderpest.

Was nun die Rinderpest selbst betrifft, so hatte diese  
schon lange vor der gegenwärtig von uns betrachteten Periode  
in Russland, vorzüglich in der Gegend von Moskau und in  
Polen, vornehmlich in der Podolischen Woiwodschafft und in  
Ungarn geherrscht. Als ihr Ausgangspunkt galt die Ukraine.

Schon im Herbst 1710 herrschte sie angeblich auf einem  
6 Meilen von Breslau entfernten Landgute, wohn sie durch  
polnische Ochsenhändler eingeschleppt worden war. Im Mai  
des folgenden Jahres war sie über viele Punkte von Schlessien  
verbreitet, wahrscheinlich in Folge der gänzlichen Vernachlässi-  
gung der auch hier einzig hilfreichen Sperrmaassregeln, indem  
man die Ursachen des Uebels in dem hitzigen Futter der Wei-  
den und dem dadurch gesteigerten Trinken der Thiere suchte.  
— Die Zeichen der Infection waren: grosse Emattung der  
Thiere, Zittern, heftiges, bis zu Wuthausbrüchen gesteigertes  
Fieber, unlöslicher und nur zum Nachtheil der Thiere gestill-  
ter Durst. Dabei ergab dieselben ein unerträglicher, vorzügli-  
ch von der Mundhöhle ausgehender Gestank, es stellte sich  
ein jächziger Ausfluss aus Nase, Augen und Ohren und  
unter blutigen Durchfällen am 2ten bis 3ten Tage der Tod ein.  
Der Harn verhielt sich in der Regel normal, zuweilen indess  
fiel Blutharnen Statt. Am Halse brachen Blasen, am übrigen  
Körper, vorzüglich am Hals, Kopfe und im Schlunde  
Blattern und grosse Gründe aus. Die Zunge bedeckte sich mit  
schwarzen Blattern, welche in Geschwüre übergingen, und in  
den Augen, Ohren und unter der Zunge erzeugten sich Wärmer.  
Im Falle der Genesung, welche vorzüglich von der Zeitigung  
der Blasen abhängig war, wurde Abschuppung der Epidermis



beobachtet. Bei trächtigen Kühen trat Abortus ein; nicht abortirende Thiere starben. Am heftigsten wurde das Mastvieh von der Krankheit befallen; die einmal überstandene Krankheit aber, welche nur das Hornvieh ergriff, auf andere Thiere aber so wenig als auf Menschen überging<sup>1)</sup>, schützte vor einem zweiten Anfall. — In den Cadavern fand sich der Darrikanal von brandiger Entzündung ergriffen, die Leber vergrößert und wie die Milz schwarz gefärbt, mit Blättern und Beulen bedeckt; das Blut schwarz und dick, in den Muskeln zahlreiche Suggillationen. Im Omentum eine steinharte Masse, die man häufig als die Ursache der Krankheit betrachtete, obgleich es sicher nur die bekannten Hantballen waren, die sich auch bei ganz gesunden Thieren finden<sup>2)</sup>; die übrigen Mägen aufgetrieben, in den Lungen Geschwüre, das Gehirn häufig von fäuliger Zerstörung ergriffen. — Wenn schon aus Allem diesem die nahe Verwandtschaft, ja die wesentliche Identität des Uebels mit der Menschenpest hervorgeht, so dient der Erfolg des therapeutischen Verfahrens noch mehr zur Bestätigung. Die häufig angewendete Venäsection zeigte sich auch hier erfolglos. Gegen die Zungengeschwüre wurden Einreibungen von Wagenthier mit Terpentinöl mit Erfolg gebraucht. Ganz vorzüglich aber bewährte sich ein, meines Wissens bei neueren Epidemien der Rinderpest nicht wieder in Anwendung gekommenes Verfahren, die Einlegung eines Stückes „Christwurze“ (nach den Angaben Anderer wahrscheinlich *Rad. Hellebori albi*) in das durch einen Einschnitt blozgelegte Zellgewebe unter dem Hals, wodurch unter den Zeichen der größten Ermattung ein kräftich heilsamer Bubo erzeugt wurde. Ein Verfahren, welches schon bei Columella ausführlich beschrieben wird<sup>3)</sup>. Ebenso wurde innerlich der Gebrauch zerschnittener Citronen getriekt. —

1) Nur aus Ungarn wurde von einer ähnlichen Seuche der Pferde berichtet. Kanold, a. a. O. S. 16.

2) Hantballen nannte sie nach Lancini (*de peste bovis* p. 116.)

3) Columella, *de re rustica*, lib. 7, c. 5. — „Cum est proflatus bovis. Ar. non tantum per mortales hantibus circumstridit, sed et monente laqueo laqueo Q. hantibus decem apparent uibulit. Hoc et interstrum et ex impetore

[1712.]

Gleichzeitig und noch mehr in den folgenden Jahren verbreitete sich das Uebel über Oesterreich, Deutschland, bis nach Schwaben und südlich bis nach Oberitalien. Die österreichische Regierung erliess nicht allein (unter dem 12. Oct. 1711) ein, wie es scheint, erfolgloses Edict, welches die strengste Sperrre empfahl, sondern setzte auch einen Preis auf die beste Behandlung der den Wohlstand des ohnehin durch Krieg, Theuerung und eigne Krankheit hart bedrückten Landmannes zerstörenden Seuche. Es ist uns aber über die Lösung der Aufgabe Nichts bekannt<sup>1)</sup>. Auch die Gothaische Regierung schenkte dem Uebel, über welches sie mehrere Verordnungen erliess, ihre thätige Aufmerksamkeit. An populären Schriften sehr verschiedenen Werthes fehlte es natürlich ebenfalls nicht<sup>2)</sup>.

Im Sommer 1711 hatte sich die Seuche schon bis nach Augsburg verbreitet<sup>3)</sup>, und trat unter denselben Erscheinungen wie anderwärts auf. Der Genuß des Fleisches der gefallenen Thiere, den man sonst nicht schädlich fand, wurde von dem Rathe der Stadt „der Vorsicht wegen“ verboten. — Im Frühjahr 1712 verbreitete sich nach der Lullsenza<sup>4)</sup> in der Umgegend von Augsburg eine Seuche, welche vorzüglich die Pferde, aber auch das Hornvieh, die Schweine, Gänse und Pfaffen, so wie die Thiere des Waldes ergriß, und bei welcher sich auf der Brust, in den Weichen und an andern Orten harte Geschwülste bildeten, die sich bald weiter ausdehnten und in kurzer Zeit den Tod herbeiführten. Schröckh leitete die Krankheit, genau

*partis antrobus non parum est, utraque pars descripti orbis autem tabula (animalium et fortis formis) praefata callosa inscribitur, quoniam cum tota plaga comprehendit, ita continet, ut claudere possit. In eam libellus descriptionis animae in verbi praefatione alius clauditur, de quo pars, quoniam tabula transscripta est, duntaxat continet, et maxima pars postea regni continetur.*<sup>5)</sup>

1) In Oesterreich blieb ungefähr  $\frac{1}{3}$  des Viehstandes übrig. Gleichzeitig versuchte eine weniger bedeutende Epizootie unter den Schafen und Schweinen. Krutsmann, p. 98.

2) Eine der besten Volksschriften ist die eines Ungenauenen: „T. B. B. Nachricht von der jetzt in unserm Reich herrschenden Seuche der Pestilenz u. s. w. Erlang 1712. 8.“ (Hess.)

3) Schröckh, in Epitom. N. C. ann. III. et IV. app. p. 33.

4) S. oben S. 246.

irriger Weise, von den Stöcken der in diesem Jahre überaus zahlreichen und sehr grossen Hornäsen ab, die sich in Scharen auf die gefallenen Thiere herabliessen. Er erzählt bei dieser Gelegenheit den Fall eines Knechtes, der einem an dieser Krankheit gefallenen Pferde ein Bein abhieb, wobei ihm etwas Flüssigkeit ins Auge spritzte, und an der hierdurch entstandenen heftigen Entzündung starb.

Nach Italien gelangte das verheerende Uebel von Ungarn und Dalmatien aus, lediglich auf dem Wege contagiöser Verbreitung, und weder in seinem Beginn noch Fortgange von Erkrankungen der Menschen begleitet<sup>1)</sup>. Durch ein kranke im Sommer 1711 von einem dalmatischen Viehhändler an den Grafen Trajan Borromaeus verkauftcs Thier wurden zunächst die Herden des Grosshutes im Vicentinischen zugesteckt, und von diesem Punkte erlangte die Epizootie eine Verbreitung, die fast kein Dorf Italiens verschonte<sup>2)</sup>. Ueber den Verlauf der Krankheit berichtet Ramazzini sehr genau und den oben angeführten Ergebnissen entsprechend: für die Behandlung schärfen Haarweile und Einlegung der Nieswurz in das lockere Zellgewebe des Halses noch das Meiste zu leisten. Interessant aber, obwohl, so viel uns bekannt, niemals versucht, und allerdings noch wohl mit ökonomischen Rücksichten nicht vereinbar, sind Ramazzini's günstige Erwartungen über den Gebrauch der China bei der Krankheit<sup>3)</sup>.

Noch genauer und umständlicher sind die Nachrichten Lancisi's, der die Verbreitung der Epizootie in der Gegend von Rom zunächst in's Auge fasste, und dessen Schrift etwas später als die Ramazzini's erschien, nachdem er vorher das Volk in einer italienischen Schrift von dem drohenden Uebel warntichet hatte, von welchem bis dahin merkwürdiger Weise das ganze

1) Für EHD erzählt Ramazzini einem „*pusillus contagiosus*“ des Getreides.

2) Ueber das Nibere der ferneran Verbreitung vergl. Knappf, von der Pest des Hornviehs. 3, 35 ff.

3) Ramazzini, *de contagiosa epizootia etc.*

Haller'si's Unken. II.



[1712.]

Latium versichert geblieben war. — Im Sommer 1713 verbreitete sich die Nachricht, dass auf einem Viehmarkte zu Frusino in Campanien sehr viel krankes Vieh verkauft werden wäre. Trotz des strengen Verbotes der päpstlichen Regierung, jenen Markt zu besuchen und Vieh von da einzuführen, gelang es doch einigen Gewinnstüchtigen, acht dergleichen Thiere nach Rom einzuschmuggeln, die nun nach allen Seiten hin das Contagium verbreiteten. Die getroffenen Ausregeln der Behörden vermochten Nichts gegen die Seuche, da man erst acht Tage nach jener Einfuhr der ersten kranken Thiere von diesem Vorfalle Kunde erhielt. Die Tödtung der Erkrankten, welche vorgeschlagen wurde, und welche sich in neueren Epizootien der Rinderpest als ein zwar hartes aber sicheres Mittel bewährt hat, wurde unterlassen, da man fortwährend ein Heilmittel des Uebels aufzufinden hoffte, um so mehr, da in nicht wenig Fällen die Genesung augenscheinlich durch die Naturhülfe eingeleitet wurde. Unterdeß suchte man durch Absperrung und zahlreiche, sehr zweckmäßige Verordnungen, welche sich sämmtlich auf die contagiöse Verbreitungsweise der Krankheit stützten, dem verderblichen Uebel Einhalt zu thun. Dazwischen fehlte es nicht an Kirchengebeten, Processionen, zu denen selbst der kranke Papst Theil nahm, Indulgenzen und Gelübden <sup>1)</sup>. — Im April 1714 erreichte die Epizootie ihr Ende, und man hatte alle Ursache sich zu einer verhältnissmäßig so kurzen Dauer desselben Glück zu wünschen, da sie naderwärts ihre Verheerungen auf einen weit längeren Zeitraum ausdehnte. Die Zahl der im römischen Gebiete gefallenen Thiere belief sich auf mehr als 30,000; — officiell waren 26,252 verzeichnet. Nach einigen historischen Bemerkungen, aus denen sich das hohe Alter der Viehseuchen ergibt, geht Lancisi zur Beschreibung der Rinderpest über, die indessen Nichts von den bisher angeführten Berichten Abweichendes ankündet. Eine Zeit lang glaubte man die Seuche von den Stücken einer *Buprestis*-Art

1) Lancisi, p. 11 uq. wo sich die hierauf betügelten Erlasse vollständig abgedruckt haben.

(Ankäufer), von Würmern u. s. w., ableiten zu müssen, — wie sich überhaupt das Volk zu allen Zeiten zur *Pathologie* zuwenden hinzuneigen pflegt, sobald die Krankheitserscheinungen einen entfernten Anlass zu einer solchen Hypothese darbieten, oder irgend ein müssiger Kopf ein Märchen der Art aussieht<sup>1)</sup>. — Lancisi selbst verglich das Uebel durchaus mit der Pest, und beachtete vor Allem die verschiedenen Arten des Todes, welche hier, durch besondere Reflectirung des Krankheitsprocesses auf einzelne Organe, namentlich die Lungen und den Schlund vorkamen. — Therapeutisch waren Blutentziehungen und Abführmittel direct nachtheilig, nützlicher Theriacalia, Aromatica, Säuren u. s. w., vorzüglich Haarseile, wie sie auch in Deutschland mit Nutzen gebraucht wurden.

Zu Ende von Lancisi's Schrift finden sich einige Nachrichten von der Pferdesesche, welche im J. 1712 mehr noch die Gegend von Neapel als die von Rom befallen hatte<sup>2)</sup>. Dieselbe traf der Zeit nach mit der schon damals beginnenden Rinderpest zusammen, obgleich sie weit gelinder war als diese, und, vorzüglich zu Anfang, nur die am sogenannten Dampf (Asthma) leidenden Pferde (ital. *Bozzi*) zu tödten pflegte.

Die akutere Form erzeugte auch heftigsten Verläufen Koliken und Entzündung irgend eines Theils des Unterleiborgans, der Gedärme, des Netzes oder Magens, welche meistens schon binnen zwei Tagen tödtete. — Im langsameren Verlaufe warf sich das Uebel mehr auf den Schlund und die Respirationsorgane, ganz die Erscheinungen der Pneumonie erzeugend. Die Genesung erfolgte durch Ausfluss von Schleim aus Nase und Mund, reichlichen Abgang übelriechenden Harns, und Geschwulst der Füsse. Ein Uebel, welches bereits Virgil beschreibt<sup>3)</sup>, und welches die alten Romsärzte *Melie* nannten. — Uebrigens war die Krankheit nicht contagiös, und zu ihrer Be-

1) Diese Ansicht findet sich schon bei den alten Landwirthen. Vergl. Columella, de re rust. lib. 8. c. 12.

2) Lancisi, l. c. p. 171 seq.

3) Virgil, Georg. III.

[1713.]

seitigang erwiesen sich in den fieberhaften Fällen Aderlässe, in den fieberlosen und nach den Blutentziehungen Theriacalia und Carduius vorzüglich hilfreich. — Das Uebrige hat zu wenig Interesse, als dass wir uns bei demselben länger aufhalten dürfen.

Diesen Mittheilungen entspricht die kurze Nachricht Lanson's über die Verbreitung der Rinderpest im Gebiete von Ferrara in den Jahren 1713 und 1714<sup>1)</sup>.

Ein sehr sorgfältiger deutscher Beobachter, Romeisen, fügt zu den oben angegebenen Erscheinungen noch hinzu, dass sich in den angesteckten Ställen vor dem Ausbruche ein finstlicher Gestank bemerken liess, und das Trüben der Augen das sicherste Vorzeichen der Krankheit bilde. Er spricht ferner von einer zähen, schleimigen Beschaffenheit des Bluts und von Zittern der Extremitäten vor dem Tode. Die Cadaver zeigten am Bauche Saggitationen, an den Eutern der Kühe blaue Strömungen und Flecken, um den After viele Pfennig-grosse erhabene Blättlein; die Gallenblase von einer wässerigen, leimlichen, stinkenden Galle erfüllt, das Netz welk und verdorben. Vorzügliches Werth aber erhält die kleine Schrift durch die dringende und durch glänzende Erfahrungen erprobte Empfehlung des Russes zum innerlichen Gebrauch, als Tinktur; ein Mittel, welches auch von neueren Beobachtern mit gebührendem Lobe bei ähnlichen Affectionen erwähnt wird<sup>2)</sup>. Des Russes und seiner grossen Wirksamkeit bei der Wuth der Thiere, wie sie im J. 1712 in Ungarn häufig vorkam, und durch Bisse auch auf Hunde und Menschen überging, gedenkt auch Gmelin. In Ungarn verhand man den Buss mit Kupfer oder Messing<sup>3)</sup>.

Wir brechen ab, um zu dem Anfang dieses Jahrhunderts und zu der Geschichte der grossen Pest überzugehen, welche in dieser Zeit, von 1700—1716 fast ganz Europa verheerte, und

1) Lanson, *Epist. N. C. Cent. III. et IV.* p. 367.

2) Vergl. Blumenbach's Anwendung des Krokots (in *Altemedicalyphoe*, Schmidt's Jahrbücher L. d. ges. Med. XX, 352.

3) Gmelin, *Epist. N. C. Cent. V. et VI.* pp. 4. seq.



theils wegen dieser weiten Verbreitung, theils wegen der zahlreichen und zum Theil äusserst werthvollen Nachrichten, die sich über dieselbe aufgezeichnet finden, einer genaueren Untersuchung vorzüglich würdig erscheint.

### Die Bubonenpest in den Jahren 1701 — 1716.

Seit dem Anfange des 18ten Jahrhunderts herrschte die eigentlich in jenen Gegenden niemals gänzlich verschwindende Bubonenpest zu Konstantinopel, und höchstwahrscheinlich auch auf vielen andern Punkten des osmanischen Reichs; häufig genug auch wohl in den christlichen Grenzländern im weiten Strömgebiete der Donau und der übrigen Elbeu des südöstlichen Europa's. Namentlich richtete sie schon im J. 1703 in der Ukraine schreckliche Verheerungen an. Als der Anfang ihrer weiteren Verbreitung im östlichen Europa kann das J. 1701 (— in diesem Jahre herrschte sie nach Raxzynsky<sup>1)</sup>, ja nach Gottwald<sup>2)</sup> schon im J. 1702 in Polen —), als die Bedingungen derselben der damals in Polen und Südrußland geführte Krieg, vielleicht auch das Zusammenreffen einer Menge von Ereignissen im Leben der Erde und der Atmosphäre und im kranken Leben der Völker, dem wir so eben unsere Blicke zuwenden, betrachtet werden, deren Einfluss man früher mit derselben Einseitigkeit ausschliesslich hervorhob, als man sie später gänzlich leugnete.

Mehrfährigen Kriegen mit den Türken hatte Peter der Grosse im J. 1699 durch den Carlowitzer Frieden ein Ende gemacht, ohne indess dem Reiche völlige Ruhe schenken zu können. Schon im folgenden Jahre wurden die Russen bei Narva von dem kriegesunmüden Carl XII. von Schweden geschlagen.

1) Raxzynsky, *Hist. natur. regni Poloniae, Soudavia*, 1721. 4.

2) Gottwald, *Tractat. philot. Nr. 337.* — (Claus von Adam.) —

[1707.]

Ähnliche Niederlagen erlitten in den folgenden Jahren die Sachsen bei Clissow und Poltowa; Carl XII. drang in Polen ein, und erhob Stanislaus Leszcynsky auf den polnischen Thron, dessen Besitz ihm selbst Churfürst August nach der unglücklichen Schlacht bei Fraustadt (13. Febr. 1706) zugesprochen wurde. Indessen wurde die Macht der Schweden schon im J. 1709 durch die Schlacht bei Poltawa (27. Jun.) wieder gebrochen, nach welcher Carl XII. sich nach Bender unter türkischen Schutz begab. — Nur zu erklärlich ist es, wenn in solcher kriegsbewegten Zeit die Pest überall den Heeren folgte, und eben so grosse Niederlagen anrichtete, als das Schwert des Feindes. So gingen in Litauen im J. 1703 6000 Mann, sammt ihrem Führer zu Grunde.

Die folgende Darstellung wird versuchen, die Geschichte der Verbreitung der Pest über Polen, die Walachei, Steyermark, Ungarn, Oestreich, Dänemark, Schweden u. s. w. und ihre Rückkehr von Oestreich nach Ungarn und Böhmen zu verfolgen, und auf die Ergebnisse hinzuweisen, welche sich in dieser Zeit für die Kenntniss der Pest und der Volkskrankheiten überhaupt in der Wissenschaft bildeten.

#### 1707. Die Pest in Krakau. — Sthaar.

Am frühesten begegnen wir der Pest in dieser Periode zu Krakau, wohin sie um den 18ten August des Jahres 1707, von Lemberg aus, wo sie schon seit zwei Jahren herrschte, durch Juden gelangte. Nach Lemberg war sie durch die Kosaken unter Oberst Palex gekommen, welcher, um dem in der Ukraine verheereten Uebel zu entgehen, nach Chwassow floh, wo er von den Polen mit Verlust zurückgeschlagen wurde. Die Schwedische Besatzung Lemberg's zog sich alsbald nach Warschau zurück<sup>1)</sup>.

1) Allw., 8. 25.

Die Beschreibung der Epidemie zu Krakau von Sthaar<sup>1)</sup> zeigt in den widrigsten Zügen die grenzenlose Sorglosigkeit und den Mangel der gewöhnlichsten Ordnung in der unglücklichen Stadt. An eine Absperrung der Kranken oder sonstige Schutzmassregeln war nicht zu denken, und auf diese Weise machte die Seuche ungehindert, vorzüglich unter dem Pöbel, die furchtbarsten Fortschritte. Im Anfange traten, wie gewöhnlich, mit dem vorwaltenden Fieber Delirien u. s. w. am häufigsten hervor; Weiber liefen in schandloser Nacktheit auf den Strassen umher, und selbst die Behörden und Aerzte flohen aus der Stadt. Den Letzteren hatte man künftighin jede Belohnung für die gefährliche Erfüllung ihrer Pflichten abgeschlagen<sup>2)</sup>, und man glaubte genug zu thun, wenn man an die Armen unentgeltlich Brech- und Purgirmittel verabreichte. Unter diesen Umständen war es kein Wunder, wenn die Krankheit in der von dem grössten Theile ihrer Bewohner verlassenen Stadt täglich über 40 Personen tödtete. — Es grenzt deshalb an das Wunderbare, wenn wir erfahren, dass die Epidemie schon mit Eintritt des Winters ihr Ende erreichte, und dass ihre letzten gelindesten Fälle im Februar in anhaltende Quotidianfieber übergingen.

Bald nach ihrem Ausbruche in Krakau erschien die Pest, durch einen Krakauer Fuhrmann eingeschleppt, auch in dem schlesischen Bezirke Georgenberg, wo sie aber durch schnelle Vorseuge unterdrückt wurde. Durch einen Braner, welcher seine an der Pest gestorbenen Verwandten in Polen besucht hatte, war dasselbe Uebel in zwei Dörfer der Herrschaft Militach gelangt<sup>3)</sup>.

1) Sthaar, Joh. Bern., *De peste Polonica. Act. eruditae.* Lips. ann. 1799. p. 215 seq.

2) „*denegatis rebus stipendiis*“.

3) L. v. Linsier, die Pest S. 9. S. 437.



## 1708. Die Pest zu Rosenberg. — Hölmann.

Im Frühsommer 1708 wurde Rosenberg, ein im Herzogthum Oppeln, 14 Meilen östlich von Breslau an der polnischen Grenze gelegenes, von 1700 bis 1800 Einwohnern bewohntes Städtchen, zugleich mit einigen Dörfern der dem Grafen Dohna gehörigen Herrschaft Wartenberg, unter denen Kojentschin namentlich aufgeführt wird, befallen <sup>1)</sup>. Die der Pest vorangehende Krankheitsconstitution bot nach GRAIS <sup>2)</sup> Nichts Besonderes dar. In geringer Verbreitung herrschten Rheumatismen, erysipelatöse Krankheitsformen, gutartiger Friesel, Wechselstöße, und vereinzelt, später ziemlich bösartige Blattern. Die erste Entstehung der Pest schrieb man der Einschleppung des Contagiums vermittelst eines mit Kleidern und anderen Geräth gefüllten Kastens aus dem früher infectirten Dorfe Oklachen zu <sup>3)</sup>. Nach Andern bildeten vorzüglich Jüdische Wollhändler die Vermittler der Ansteckung <sup>4)</sup>. Sehr bald nach dem Ausbruche des Uebels schickte die Regierung zu Breslau zwei Aerzte nach Rosenberg, Dr. Milde und Dr. Hölmann <sup>5)</sup>, welche den 1sten Juli 1708 ankamen <sup>6)</sup> und sich mit der aufopferndsten Menschlichkeit nicht allein der zahlreichen Pestkranken annahmen, sondern auch durch ihre Berichte an die Regierung, durch häufig angestellte Leichenöffnungen u. s. w. wesentlich zur näheren Kenntniß der Natur und Behandlung der Pest beitrugen. Ein anderer Arzt, Dr. Gräbel, ging auf Veranlassung des Grafen Dohna in die Herrschaft Wartenberg ab, wurde aber bald von der Pest hinweggerafft <sup>7)</sup>. — Ein bairischer Arzt dagegen, welchen ein zu Breslau wohn-

1) Wartenberg, östlich von Breslau, an der Straße nach Warichau.

2) GRAIS: *Ephem. Cent. I. et II. p. 107.*

3) KAUFL, *Hist. Medic. Siedlich. 8. 124.*

4) HELWICK, *Ephem. N. Cent. I. et II. p. 252—261.*

5) KAUFL. S. 22. Hölmann ging später aus diesem Amte auch nach Frankau. *Ibid. S. 21.*

6) HELWICK.

7) KAUFL. S. 61.

nender Polnischer Edelmann auf Helwich's Empfehlung nach Rosenberg schickte, war schändlich genug, die ihm mitgegebenen Arzneien zu hohen Preisen zu verkaufen und dann zu entweichen.

In dem unglücklichen Städtchen Rosenberg vereinten sich alle Verhältnisse, welche jemals die Wuth einer verderblichen Epidemie zu steigern vermochten; Böhmheit der Einwohner, Mangel an Lebensmitteln und an Obdach, und, im Anfange wenigstens, gänzlich fehlende und selbst später noch in unzulänglicher Verblendung häufig verschmähte ärztliche Hülfe. Glücklicherweise erlankte die, übrigens sehr unbedeutende, hald regnichte, bald windige, bald heisse Jahreszeit die Unterbringung vieler Kranken in einer die Stelle eines Lazareths verretirenden Bretterhude <sup>1)</sup>. In Uebereinstimmung mit andern Erfahrungen verliefen die ersten Pestfälle in 24 — 48 Stunden, später in 3 — 6 Tagen tödtlich. In den Hundstagen wüthete die Krankheit am Meisten und erzeugte die bedenklichsten Zufälle, namentlich Delirien, Rauserei, Petechien u. s. w., an deren Entstehung indess, wie es scheint, die unzweckmäßige Behandlung von Seiten Ununterrichteter grossen Antheil hatte. Die Akute der Epidemie fiel mit einer 19 betragenden täglichen Todtenzahl in den August, und die ganze Epidemie forderte 860 Opfer, also wenigstens die Hälfte der Einwohner <sup>2)</sup>. Eine so ungeheure Sterblichkeit wird nur durch die Vernachlässigung aller Vorsichtsmaassregeln erklärlich, welcher die Ermahnungen der Aerzte einen Damm entgegen zu setzen nicht vermochten. Indess beschuldigten die Dauliger Aerzte, vielleicht nicht mit Unrecht, auch die zu Rosenberg gewöhnliche übermässig Schussias-treibende Behandlung. Häufig wurde der günstige Erfolg freiwillig eintretenden Erbrechens beobachtet; Hülmann selbst verhütete durch künstlich erzeugtes Erbrechen mehrmals bei sich selbst die Folgen der bereits Statt gefundenen Ansteckung.

1) Knauff, S. 22. In dieser sehr schlecht eingerichteten Anstalt gestarben doch Viele ohne eine andre Krise, als Rubens. Knauff, 127.

2) Das., S. 125.

[1799.]

Nach der Pest epidemisirten noch eine Zeitlang Diarrhöen und hässliche Ruhren.

### Warschau, Thorn u. s. w.

Gleichzeitig wurden Warschau, Kalisch, Posen, Grätz und Kosten befallen. Zu Warschau verstarben *die Petres missionarii* 100 vermalte Kinder, unter ihnen 79 Säuglinge, welche letzteren aber bei einem plötzlichen Platzregen in den zu ihrer Aufnahme errichteten und fortgeschwemmten Baden ertranken (!). Der gleichzeitige Ausbruch der Pest zu Thorn wurde vorzüglich für Danzig, welches zunächst von dieser Stadt aus angesteckt wurde, unheilvoll. Eine Beschreibung der Thurner Epidemie gab Joh. Balth. Wief, die uns aber leider nicht zu Gesicht gekommen ist. Einige kurze Notizen über dieselbe finden sich bei Stückel, auf dessen Angaben für die ebenfalls von ihm beobachtete Danziger Epidemie wir zurückkommen werden. — In Thorn begann die Pest schon im August und September 1798; man zählte nicht über 4000 Tode, aber die Krankheit war für sich weit heftiger als in Danzig, sie verursachte deshalb auch eine weit grössere Bestürzung, welche durch die abschreckenden Ceremonien, unter welchen die Todten bestattet wurden, durch die weissen Bänder, welche die Chirurgen als Abzeichen auf ihren Hüften trugen u. s. w., noch bedeutend vermehrt werden musste.

### 1799. Pest zu Fraustadt. — Lauterbach. Hölmann.

In Fraustadt begann die Pest am 1ten Juni 1799, offenbar von Posen eingeschleppt, wo die schwedische Garnison 2), in

1) Lauterbach.

2) In vielen Pöhlischen Städten befanden sich damals Schwedische Truppen, zufolge des Bündnisses Stanislaus Leszczyński's mit Carl XII., dessen Einfluss indessen schon im J. 1709 nach der unglücklichen Schlacht bei Poltawa (10. Juli) und der Rückkehr August's von Sachsen seine Endesherrschaft erreichte. Welchen Einfluss diese Niederlage auf die Verbreitung der Pest hatte, ist von Läringer nach gleichzeitigen Documenten nachgewiesen worden. S. dessen Pest des Orients, S. 257 ff.



der Absicht, die Anwesenheit des Uebels zu verheimlichen, alle Communication freiließ<sup>1)</sup>. Die Besatzung des nahen Fraustadt aber zog klüglich ab, als die ersten verdächtigen Todesfälle bekannt geworden waren. Der langsame Fortgang im Anfange der Epidemie (im Juni zählte man nur 6 Pestfälle, im Juli schon 26) verführte auch hier zu trügerischen Hoffnungen, und vereitelte nicht allein alle Sperrmaassregeln, sondern brachte selbst eine unendliche Verwirrung und völlige Rathlosigkeit zu Wege, als das Uebel in zunehmenden Verhältnissen um sich griff. Man veranstaltete ausserordentliche Kirchenfeierlichkeiten, Communenen<sup>2)</sup> u. s. w., und glaubte mit diesen und der Vertreibung der Juden genug gethan zu haben. Aerzte und Chirurgen weigerten sich die Kranken zu besuchen, obgleich sie auch so die Meisten derselben dem Tode nicht entgingen, und harte Klagen wurden über den masslosen Ueßig der Todtengräber geführt. Eine um so grössere Wohlthat war deshalb die Ankunft des erfahrenen Dr. Hölmann, der auch über diese Pest einen werthvollen Bericht verfasste<sup>3)</sup>. Am stärksten herrschte die Pest bei gutem Wetter; die Akme erreichte im October mit einer Sterblichkeit von 756. Erst mit Eintritt des regnerischen Winters liess sie etwas nach; der letzte Pestfall aber kam erst den 8ten Februar 1710 vor. Die Todtenzahl betrug

im Juni	6	im Nov.	586
- Juli	26	- Dec.	307
- Aug.	112	- Jan. 1710.	147
- Sept.	120	- Febr.	17
- Oct.	756		

Zusammen 2377

1) Lauterbäch.

2) Hölmann versichert, dass Viele nach dem Genuss des Abendmahls erkrankten. Karschl u. s. O. S. 128.

3) Karschl u. s. O. S. 124 E.

## 1700. Die Pest zu Danzig. — Kalmus, Stücker.

Wenn auch die Geschichte der Pest reich an Beispielen solcher Epidemien ist, welche in einer durchaus von andern Krankheiten freien Zeit entstanden, so fehlt es doch auch nicht an zahlreichen Belegen für die Behauptung der Mitwirkung und Unterstützung begünstigender constitutioneller Verhältnisse, denen es ja häufig genug gelang, einzelne, der Pest nah verwandte Formen, ja unter besonders begünstigenden Einflüssen der Oertlichkeit, die ausgebildete Bubonensepe selbst originär zu entwickeln, und deren bedingte Steigerungskraft selbst für ausgemacht contagiose Epidemien zugestanden werden muss. Wir haben uns bereits an mehreren Stellen über diesen sehr schwer zu entscheidenden und doch sehr wichtigen Punkt ausgesprochen. — Der Danziger Pest gingen erst anderthalb Jahre lang die Blattern vorher, denen dann „*Feveres catarrhales malignae*“ und im Uebergange zur wahren Pest Petechialfieber folgten.

Die ersten bereits völlig charakteristischen Pestfälle kamen Anfangs November 1700 in den Vorstädten von Danzig bei Personen der ärmern Volksklasse vor, und man glaubte sie aus der ununterbrochenen Communication mit Thora herleiten zu können. Sie blieben aber, vorzüglich in Folge der plötzlich eintreffenden Kälte des in dieser Hinsicht so ausgezeichneten Winters (sollt<sup>2)</sup>). Indess veranlassten sie doch den Berichter-

1) Lauterbach, S. 119. Im Jahre 1595 waren zu Pommern 1189, im J. 1617 über 2000 an der Pest gestorben.

2) Danzig wurde häufig von der Pest heimgesucht, namentlich vom schwarzen Tode im J. 1212 (starben 15,000), 1427, 1434, 1661 (st. 20,000), 1688, 1711 und 1714, 1718 (st. 20,000), 1764 (st. 21,000, nach Anders 22,000), 1766, 1767 und 1768, 1691 (st. 1800), 1692 (st. 16,725), 1628 (st. 12,800), 1624 (st. 10,500), 1629 und 1644, 1653 (st. 11,116), 1637 (st. 7249), 1668 (st. 5025), 1661, (8546).

statter bei Kanold<sup>1)</sup> und einen andern Arzt, Dr. Gerkold, zur Herausgabe eines kurzen „Unterrichts“. Ende März aber und im April erwachte auch das schlaunegnde Uebel wieder in den Vorstädten, und im Mai kamen in der Stadt schon Bubonen, Karunkeln und Pusteln bei ansteckendlicher gesteigerter Intensität und Rapidität des Verlaufs vor. Trotz der von Seiten der Aerzte in Anspruch genommenen Aufmerksamkeit der Behörden vernachlässigten diese doch alle Vorsichtsmaassregeln, bis zuletzt das Uebel im September eine für Danzig beispiellose Höhe erreichte, auf welcher es in einer einzigen Woche 2205 (nach einer weniger glanzhaften Angabe sogar 2235) Personen, ungerchnet die ungefähr auf 1000 zu schätzende Todtenzahl in den Vorstädten, hinwegraffte<sup>2)</sup>. Dabei blieb im Sommer sowohl als im Herbste das Wetter fortwährend ausgezeichnet schön<sup>3)</sup>; von einem andern Beobachter wird das gänzliche Fehlen der Gewitter und des Fortziehens der Vögel hervorgehoben<sup>4)</sup>. Seitdem nahm die Epidemie zwar immer mehr ab, scheint sich aber doch noch bis in den Anfang des Jahres 1710 hinüber gezogen zu haben. Ueber die Maassregeln, welche man theils gegen die Verbreitung der Krankheit (wenn dieser Hauptpunkt überhaupt, wie es nicht den Anschein hat, in Betracht kam), so wie über die, welche man zur Unterstützung der ärmern Klassen traf, finden wir keine Nachrichten. Man scheint sich, wie gesagt, auf letztere beschränkt und hier viel Gutes gewirkt zu haben, da, (bei unter solchen Umständen seltenes Beispiel), das Volk die Sorgfalt der Behörden pries<sup>5)</sup>.

wig, Varroth.) Wir haben diese Angaben hier wieder mitgetheilt, da die meisten, wie es scheint, auf gewissen Zählungen beruhen.

1) Kanold, Einziger Medicorum Schriftsteller, p. 6. Der Verf. dieses Reichs (J. G. K.) ist nach einer handschriftlichen Bemerkung in unserem Exemplar Joh. Georg Kulman.

2) Vergl. unten die Mortalitätsliste.

3) Das, S. 45.

4) Schöschwig.

5) Stück c), bei welchem sich auch ein kurzes von der Sanitätsbehörde ausgegebenes Pastreiglement befindet.



[1709.]

Auch in Bezug auf die Beobachtung der Zufälle der Krankheit und ihre Behandlung verdient jener Berichterstatter (Kulmus) die erste Stelle. Seine reiche Erfahrung (er behandelte in dieser Epidemie 2500 Pestkranke) hatte ihn als das pathognomonische Kennzeichen der Pest jene eigenthümliche äusserste Ermattung der Angesteckten erkennen lassen, welche nicht eher als nach Eintritt der Krise wich. Diese aber zeigte sich bald, vorzüglich bei stärkeren Constitutionen und heftiger oder übermässiger Reaction, als Karbunkeln oder Pusteln, bald als Bubonen; mit beiden Formen der Entscheidung aber waren wesentlich gelinde und anhaltende Schweisse verbunden, und auf diese legte Kulmus ein so grosses Gewicht, dass ihre Erweckung und Unterhaltung durch mässige äussere Wärme und den Gebrauch der mildesten Schwitzmittel ihm zur Hauptaufgabe wurde. Im erfreulichsten Widerspruche zu dem abergläubischen Vertrauen alterer Zeit steht die gänzliche Verwerfung des Theriaks, der sich so schädlich bewies, dass der Verkauf desselben den Apothekern verboten wurde; eine Massregel, die gewiss erst durch die evidentesten Beweise der absoluten Schädlichkeit dieses sinnlosen Gemisches herbeigeführt wurde, über welche man sich aber sehr leicht durch ältere Beobachter, z. B. Forestus <sup>1)</sup>, hätte belehren lassen können, da man doch in dieser Zeit weit weniger als später vernachlässigte. — Mit ehrenwerther Offenheit bekennt Kulmus, dass er fast keinen Kranken habe retten können, bei dem die Krisis in anderer Form als in der Erzeugung von Bubonen und später als am vierten Tage eingetreten sey <sup>2)</sup>. Insig erfüllt von derjenigen Verleugung von dem stillen Walten der Naturheilkraft, wie sie zu allen Zeiten in den geweihtesten Priestern der Kunst sich offenbart, verschmäht er alle jene heroischen Mittel, mit welchen noch zu seiner Zeit die meisten Aerzte einen Feind zu bezwingen glaubten, gegen welchen man im ritelnden Wahn die

1) N. oben S. 35.

2) K. an Oltz, a. a. O. S. 73.

Kunst für mächtiger hielt als die Natur<sup>1)</sup>. In sieben kurzen Sätzen, deren Inhalt einer Fluth von Pestschriften die Wage hält, vereinigt er die Grundregeln für die Behandlung des Uebels, und verwirft namentlich eine jede zu heftig eingreifende Behandlung, vorzüglich den Aderlass, Brech- und Purgirmittel. Mit dem scharfen Urtheile des unbefangenen Beobachters erklärt er auf eine durchaus genügende und überzeugende Weise die den reinigen entgegenstehenden Beobachtungen der Französischer Aerzte<sup>2)</sup>, und zeigt, dass ihre übermäßig eingreifende Behandlung grossen Antheil an den unglücklichen Resultaten ihrer Bemühungen hatte. In Danzig betrachtete man den Ausbruch der Bubonen, namentlich mit gleichzeitigen Schweisten, als die günstigste Krise; man suchte sie durch Kataplasmen (— von Vesicatorien und Scarificationen sah man dieselben häufig schmerzhaft werden und zurücktreten —) zu zeitigen, oder, was ebenfalls ohne allen Nachtheil gelang, zu zertheilen<sup>3)</sup>. Sehr interessant nach den neuere Behauptungen über die specifisch feindliche Einwirkung dieses Mittels auf das Krankheitsagens erinnernd, ist die Erfahrung, dass Umschläge von warmen Kampherspiritus alsbald die Schmerzhaftigkeit der Bubonen verminderten, und ihre gefahrlose Zertheilung beförderten<sup>4)</sup>. Unter den übrigen von Kulmans mitgetheilten Beobachtungen verdient vorzüglich der nachtheilige Einfluss der Epidemie auf alle Schwangeren hervorgehoben zu werden; erkrankten sie an der Pest, so war Abortus, ohne Rücksicht auf die Zeit der

1) Das., S. 20. „*Qua pariter quae rationem non amittit, et mollior, weil zu solcher Zeit eine allgütliche moderatior natura bei dem Menschen zu spüren ist.*“ — S. 13. „*Ann. scilicet manifeste colligitur, dass die Natur zur Zeit der Pest ihre Symplicia mittius bewiset, scilicet, ut non relinquatur, sed vixit, et non moritur.*“ Dass aber in der Pest so viele sterben, geschähe theils, dass die Natur durch allzuviel ausser sich sei; *ad naturae excessum, in illius quidem latitudinem constituta fuisse, theils auch, dass ihr nicht soviel genug zur Hilfe gekommen werde und sie allein solchen zu verrichten nicht capax sit.*“

2) Das., S. 30 ff.

3) Das., S. 42.

4) Das., S. 12. Vergl. Eisenmann, d. Krankheitslehre. Typhus. S. 632 und 633.

107934

Schwangerschaft, unabweisbar. Aber auch alle gesund bleibenden Frauen kamen zu früh nieder, ohne Schaden für Mutter und Kind, sobald es letzteren nicht an der gehörigen Sorgfalt fehlte. Ferner wird die recht kritische Natur der für sich ausbrechenden Pestepidemien bestätigt.

Eine auffallende, aber in andern Pestepidemien ebenfalls beobachtete Erscheinung ist die anfanglich, d. h. in den ersten 6 Monaten (Januar bis Juni) durchaus, trotz der entschiedenen Gegenwart der Pest, nicht gesteigerte Sterblichkeit, welche sich fortwährend zwischen 20 und 68 für den Tag hielt, meistens aber gegen 20 betrug. So starben z. B. am 1ten Januar (mit welchem Tage die Liste bei Kanold <sup>1)</sup> beginnt), 53, und ebensoviel am 15ten Juni. Nun aber nahm die Zahl der Pestfälle in so rasch sich erhebenden Verhältnissen zu, dass sie schon am 16ten Juni 83 betrug. Wir lassen hierbei eine die monatliche Mortalität zusammenfassende Uebersicht der bei Kanold mitgetheilten wöchentlichen Sterblichkeitsstabelle folgen, mit der Bemerkung, dass sie, wie sich aus einer bei Weichmann <sup>2)</sup> befindlichen Notiz ergibt, nur für die Instadt gilt.

Es starben vom	5. Jan.	—	2. Febr.	226.
"	"	—	2. Febr.	— 2. März 171.
"	"	—	2. März	— 6. April 203.
"	"	—	6. April	— 4. Mai 200.
"	"	—	4. Mai	— 1. Juni 172.
"	"	—	1. Juni	— 6. Juli 319.
"	"	—	6. Juli	— 3. Aug. 1313.
"	"	—	3. Aug.	— 7. Sept. 6139.
"	"	—	7. Sept.	— 5. Oct. 8303.
"	"	—	5. Oct.	— 2. Nov. 4032.
"	"	—	2. Nov.	— 7. Dec. 4961.
"	"	—	7. Dec.	— 31. Dec. 584.

Zusammen 24,513.

1) Kanold, a. a. O. S. 48.

2) Weichmann, S. 12. Die Zahl der Todten in den väterlichen Familien.



Die grösste Höhe erreichte die Krankheit in der Woche vom 7ten bis 14ten September, in welcher sie 2205 tödtete <sup>1)</sup>.

Breslau hatte den angestrengtesten Bemühungen seiner Behörden, welche jedenfalls durch die Einsicht der Aerzte zweckmässig geleitet wurden, völliges Verschoontbleiben zu danken, obschon die Pest bis nach Oels, einer 4 Meilen östlich von Breslau gelegenen Stadt vorgeedrungen war<sup>2)</sup>. Im Juni 1709 wurde Dr. Joh. Georg Brunschwitz in diesen Ort geschickt, um einen Bericht über die Krankheit aufzunehmen. Nach seiner Rückkehr begab sich Dr. Winckler dahin; dieser wurde aber schon im August ein Opfer seines Eifers <sup>3)</sup>.

#### 1710. Pest zu Marienburg. — Kendl.

Zu Anfang des Jahres 1710 hatte die Pest zu Danzig und in den übrigen Städten so aufgehört, dass man kein Bedenken trug, den freien Verkehr wieder zu eröffnen, und am erstgenannten Orte feierte man gleich nach Ostern ein öffentliches Dankfest. Dass indess die Krankheit noch nicht gänzlich erloschen war, offenbarte sich gar bald in den zahlreichen Erkrankungen des Königlich Polnischen Hofpersonals, welches im Frühling des genannten Jahres von Warschau nach Danzig, Marienburg und in die umliegenden Dörfer zog, und welches theils durch seinen Eintritt in eine von den Resten krankheits-

Gellen stehendes Verhältniss belief sich auf 5066. Die Tolleinnahme aller Gestorbener war also 32,398. Unter dieser Tollenzahl befanden sich 8 von den 24 Geistlichen Danzigs, 4 Rathherren, kein Arzt, aber 26 Chirurgen. (Schellwig.)

Nach einer Angabe bei Rüsching, (Neue Krötenschreibung, 1 Teil, 2 Bd., S. 18.) starben im J. 1709 in Preussen und Kurlanden 35,398, im J. 1710 188,537 Menschen an der Pest. Bekanntlich nahm König Friedrich Wilhelm bald darauf, zum Theil auch aus der Population wieder aufzuheben, 28,600 protestantische Kaliburger in sein Land auf.

1) Ausser den hier angeführten Quellen finden sich noch Nachrichten über die Danziger Pest in Gottwald, Joh. Christ., *Memorie medicum de peste Danthensi* ann. 1709. *Deutsche*, 1719. S. nach *Transact. philoe.* No. 237. (Citat von Linné und Sprengel). Wir konnten leider diese Schrift nicht benutzen.

2) Irrig hat Sprengel (V. p. 469) zu Breslau 24,500 Menschen an der Pest starben.

3) Kendl, S. 56.

[1710.]

zeugender Elemente noch nicht ganz freie Stadt, theils durch das weichliche, jeder Sinnenlust ergebene Leben eines üppigen Hofes eine vorzügliche Anlage zur Erkrankung darlegen musste<sup>1)</sup>. In vielen, vielleicht den meisten Fällen konnte die offensbare Ansteckung durch Benutzung verpesteter Kleider, Betten und andern Geräthes nachgewiesen werden<sup>2)</sup>. Gar bald kamen unter den Neugekommenen, vorzüglich Solchen, die kurz vorher ein Wechselfieber überstanden hatten, Krankheitsfälle vor, die man im Anfang für Wechselfieberrecidive hielt, die aber nur zu bald durch den Uebergang in den anhaltenden Fiebertypus, durch den Ausbruch von Petechien, Karbunkeln und Bubonen, zu denen sich alsdann alle der ächten Drüsenpest eigenthümlichen Erscheinungen gesellten, ihren wahren Charakter deutlich genug an den Tag legen. Diejenigen Fälle, bei denen erst dem allmählichen Anbruche der Bubonen das eigentliche Pestfieber folgte, wurden im Anfange sehr oft für syphilitisch gehalten, obgleich ihre Entwicklung an einer von der bei syphilitischen Bubonen verschiedenen Stelle des Oberschenkels aufmerkssameren Aerzten zum sichern Unterscheidungszeichen diente. Diese kleine Epidemie dauerte vom December 1710 bis zum Februar des folgenden Jahres und verschwand erst völlig mit der Rückkehr des Hofes nach Warschau. — Unter mehreren besondern Beobachtungen verdient noch das Auftreten des Frinxels mit allen dieser merkwürdigen Krankheit eigenthümlichen Erscheinungen, namentlich der dem Ausbruch vorhergehenden Angst u. s. w., der grossen Neigung zum Zurücktreten, hervorgehoben zu werden, und namentlich ist ein Fall dieser Art interessant, in welchem nach dem Zurücktreten ein wasserheller Harn in unglaublichen Quantitäten gelassen wurde<sup>3)</sup>. Es braucht aber kaum bemerkt

1) Krauß, Christ. Henr., *Febris pestifera in mela regia Polon. annis 1710 et 1711 graviter depressa hactenus relicta*. (Epistol. N. C. Cent. V. p. 241 seq.)

2) Ibid., p. 232.

3) Krauß, l. c. p. 224.

zu werden, dass auch beim gewöhnlichen Friesel die gesteigerte Urinsecretion einen so bedeutenden Bestandtheil der Krisis bildet, dass manche Aerzte auf diesen Umstand selbst ein ansehnliches therapeutisches Gewicht legten<sup>1)</sup>. Erndl beobachtete ferner Fälle der Pest, bei denen eine äusserst lange Latenz des Contagiums angenommen werden musste, und gründet darauf die entschiedene Missbilligung einer zu kurzen Quarantäne. Auch die therapeutischen Bemerkungen des genannten Arztes zeichnen sich so vorthellhaft aus, dass sie noch jetzt die volle Beachtung in Anspruch nehmen. Erndl sah fast Keinen genesen, der nach Verlauf der ersten 24 Stunden in Behandlung kam. Zuerst musste ein Brechmittel gereicht, nur selten, wenn sich schon Bubonen und Karbunkeln gebildet hatten, konnten statt ihrer sogleich Beccardica und Alexipharmaca gegeben werden. Nie war ein Aderlass indicirt; die Bubonen wurden durch Umschläge zur Zeitigung gebracht, die Karbunkeln scarificirt. Mischlich schien es nach mehreren, auch von Danziger Aerzten bestätigten Beobachtungen, die Bubonen mit Vesicatorien zu bedecken, indem danach leicht Verhärtung und Zurücktreten derselben folgte. Ausserdem ist Erndl der grösste Lobredner des Theriaks, den er in grossen Dosen verabreichte, obschon er auf der andern Seite weit entfernt ist, demselben und den Opiaten überhaupt bei drohenden Blutungen, Frieselausbruch u. s. w. das Wort zu reden.

#### 1716. Dänemark, Schweden, Russland, u. s. w.

Es würde eine eben so unendlich mühselige, als im Ganzen fruchtlose Arbeit seyn, die Pest auf ihrer ferneren Wanderung an den Ufern der Ostsee genau zu verfolgen. Ueberallhin wurden fruchtbare Keime derselben ausgestreut, namentlich wurde sehr bald nach Danzig, ausser einem grossen Theil von Schweden, Russland u. s. u., Kopenhagen, Friedrichs-

<sup>1)</sup> Hasekardt, David, *Therapia peripneumoneae receptis tubis solidiorque*, Ztg. 1762. 4.



[1710.]

haven, ganz Holstein, Rendsburg, Itzehoe, Glückstadt, Altona, Hamburg, Schleswig und Flensburg befallen, wobei den gleichzeitigen Kriegsereignissen eine bedeutende Steigerung der Verheerungen zugeschrieben werden muss.

Im J. 1710 war die Pest in Kurland und Liefland allgemein verbreitet; zu Riga gesellte sich zu den durch sie verursachten Bedrängnissen alles Uebel der Belagerung durch die Russen. Nach der Einnahme der Stadt (im Juli) griff die Seuche um so mehr um sich<sup>1)</sup>. Vorzüglich heftig wurde die Insel Oesel ergriffen. Der Pest folgten Wechselfieber, Scharlach, Blattern und Masern. — Ein Rigascher Schiff brachte die Pest nach Schweden, wo sie bis ins folgende Jahr wüthete. Zu Karlskrona starben im J. 1710 16,000, zu Stockholm 40,000 Menschen<sup>2)</sup>. — Weniger heftig wurden die Bezirke der Niederelbe befallen<sup>3)</sup>.

#### 1710. Die Pest zu Kopenhagen, in Holstein, u. d. w. Böttcher.

Die Beobachtungen Böttcher's bestätigen im Allgemeinen die Erfahrungen der Danziger Aerzte. Vor der Pest hatten zwei Jahre lang sehr mörderische Petechialfieber, namentlich aber ein exanthematisches Fieber mit Hautausschlägen von der Form der „Rothweizenkörner“ (Erisipel?) geherrscht. In Kopenhagen konnte es nicht an Gelegenheit fehlen, das fast stets tödtliche Zusammentreffen der Pest mit dem Scharlach häufig zu beobachten. Eben so starben alle von der Pest befallenen Philäcker<sup>4)</sup>, und sehr vielfältig waren die Modificationen der Krankheit je nach den individuellen Krankheitsanlagen der Einzelnen. So trat dieselbe bei Hysterischen mit

1) Fischer, Bresl. Samml. Verh. 3: 5. 34.

2) Sprengel, V, p. 488.

3) v. Fischer, Uebersicht des Landwirthschaftsbauh. S. 250 ff. Diese Schrift enthält überhaupt zahlreiche chronologische Angaben über die Epidemien der Pest in Kurland und Liefland.

4) Böttcher, p. 42. — Fischer, Uebersicht des Landwirthschaftsbauh.



[1714.]

ter sehr verdächtigen Umständen starb. Man verhinderte jede Gemeinschaft mit der Leiche, den Angehörigen u. s. w., und es gelang durch *diese* ganz im Stillen durchgeführten Maassregeln, das drohende Uebel im Keime zu ersticken. — In Holstein hörte die Pest angeblich auf, ohne dass man Schutzmassregeln irgend einer Art in Anwendung gesetzt hätte, nachdem das Heer der Schweden unter Steinbeck, und gleich darauf das der Russen nach der für die Dänen so unglücklichen Schlacht bei Gadebusch (zu Anfang des Jahres 1713) in das Herzogthum einrückten.

Hamburg wurde im J. 1714 ergriffen. Die von Beerwinkel gegebenen Notizen enthalten Nichts Besonderes, verriethen aber einen tüchtigen Beobachter<sup>1)</sup>.

Zufolge einer von Sander nach gleichzeitigen amtlichen Quellen gegebenen Notiz drang die Pest bis in die Gegend von Braunschweig vor, und ergriff namentlich Haarburg, Celle, die Dörfer Nienfeld, Holdenstädt, Melle, Bienenhüttel, Achem, Trebel, Brincken, Goldenstädt und Fellingbostel<sup>2)</sup>.

Wir wenden uns zu dem zweiten südlichen Arme der Richtung der Pest über Siebenbürgen, Ungarn und Oesterreich.

**Die Pest in der Moldau, Wallachei, Steyermark,  
Oesterreich. — Kéleser de Kérés-Escr,  
Kézi, Loigk.**

Die ersten Berichte über den Ausbruch der Pest in Steyermark und Unter-Ungarn liefen am 8ten, 10ten und 17ten

1) Schkürer nennt unter den von der Pest hefallenen Städten auch Hannover, wahrscheinlich verleitete ihn zu dieser Angabe irgend eine in dieser Zeit zu Hannover erschienene Pestchrift.

2) Französisches Magazin, 1817. 5tes Stück.



Januar 1710 bei dem Gesundheitsrath zu Wien ein<sup>1)</sup>, verfaßt von Köleser de Kérés-Eer, Distriktsarzte und Bergaufseher zu Szeheny<sup>2)</sup>, Kötzi, Physikus, und Ausfeldt, (nicht zu verwechseln mit dem später ansehnlichen Wiener Arzte gleiches Namens), Feldarzt zu Segedin<sup>3)</sup> und Arad<sup>4)</sup>.

Nach Köleser's Bericht<sup>5)</sup> war die Pest durch die Siculischen Alpen, die Grenzgelörge Steyermark's, von der Moldau oder auch von Polen aus durch Landstreichler zuerst nach Gyergyo gelangt, und hatte dort, trotz sabbaldiger Abgerrung von 20 Häusern, in kurzer Zeit 160 Menschen getödtet. (Gyergyo hatte erst kurz vorher durch Feuer und Schwert unterworfen werden müssen). Leigk, der damals die gegen Ragotzy kämpfenden kaiserlichen Truppen als Feldarzt begleitete, bestimmt diese Angaben dahin, dass die Pest im Januar 1708 durch Zigeuner, die aus der Moldau und Walachei kamen, und sich in die Siculischen Alpen in der Nähe von Kronstadt<sup>6)</sup> flüchteten, oder vielmehr durch Kleidungsstücke derselben, die ein Bauer mit sich nahm, (= jene Zigeuner waren in den Wäldern durch Kälte und Hunger aufgerieben worden =) nach Gyergyo gelangte<sup>7)</sup>. — In Schesburg tödtete die Seuche drei Viertel der Bevölkerung, und verbreitete sich weit und breit in die angrenzenden Orte und Comitats, von denen Udvarhely, Maros und Küküroló genannt werden. So waren bald über 300 Orte angesteckt. Die Krankheit verlief

1) Die Quelle für diese und den größten Theil des folgenden Nachrichten bildet Prima de Kreitzema's Schrift, welche durch die kaiserliche Befehlung ihres Verfassers (= K. war erster kaiserlicher Leibarzt und beifälliger Präsident des Gesundheitsraths zu Wien =) einem hohen Grad historischer Glaubwürdigkeit darthut.

2) Szeheny, (Giblinum, Salomon) eine Stadt in der Scharoscher Gespanschaft des Königreichs Ungarn, gegenwärtig von 2800 Russ.

3) Segedin, Séged, in der Tschakmagaler Gespanschaft, Stadt von 16,000 Russ. mit starker Festung, 26 Meilen von Ofen und 14 von Temeswar.

4) Arad, Marktflecken in der Arader Gespanschaft.

5) S. des Schriftstellers Vorrede.

6) Kronstadt, nächst Hermannstadt der bedeständische Ort Sibiu-bürgen.

7) Leigk bei Werlowskij, S. 156.

[1754.]

sehr häufig mit einer Schnelligkeit, die sie unter geringerer Begünstigung der örtlichen Verhältnisse nur selten erzeugt; der Tod erfolgte unter Hitze, Herzbeklemmung, Petechien und Pusteln, (die zuweilen eine außerordentliche Grösse erreichten, und in 3 Fällen 12 Zoll lang und 2 Zoll breit waren), vorzüglich wenn diese sich auf der Brust entwickelten, schon binnen 2 — 4, höchstens in 24 Stunden. Häufig schien zwar der Ausbruch von Babonen, zahlreichen Karbunkeln und weissen Blasen Rettung zu bringen, aber bei den Meisten wurde diese Hoffnung durch den Hinzutritt aller Zeichen typhösen Ergriffenseyns bald wieder vereitelt. Auch die gleichzeitig herrschenden anhaltenden und intermittirenden Fleker anderer Art nahmen, zum deutlichen Zeichen des noch auf sie sich erstreckenden Einflusses der vorherrschenden Krankheitsconstitution, an derselben Bösartigkeit Theil. —

Diese Angaben werden von Kötzi durchaus bestätigt. Er fügt hinzu, dass bei Karben sich innerhalb eines Tages Petechien und Babonen unter endlosem Fahren, Schlafsucht und Convulsionen bildeten, und dass zuweilen der Ausbruch von 15—20 Karbunkeln heilsam war. Fehnten aber diese und die Exantheme, oder erschien einer der ersten auf der Brust, so war der Kranke verloren. Greise, bei denen schwarze Petechien erschienen, starben nach 4—24 Stunden. Inguinalbubonen waren vorzugsweise tödtlich, günstiger Babonen und Karbunkeln an fleischigen, vom Herzen entfernten Orten. Kötzi fügt hinzu, dass viele Einwohner von Schesburg und Medgy durch die Flucht dem verheerenden Uebel entgingen.

Zu Segedin starben bloß 385 Personen, unter denen 150 binnen 3 Monaten an den sehr bösartigen gleichzeitig herrschenden Blattern verstorbenen Kinder sich befinden. Zu Schesburg, Kükulö, Medgy, Marosch, Gordy betrug die Gesamtzahl der Todten mehr als 400.

Die Beobachtungen des schon oben genannten Loigk erhalten durch die Aufmerksamkeit, welche dieser Arzt auf die verschiedenen Formen richtete, in die das reine Uebel zerfiel,

ein ganz besonderes Interesse. Derselbe unterschied vier nach dem verschiedenen Ausbildungsgrade der Krankheit verschiedene Nuancen, 1) das einfache Tertianfieber, 2) das häufige anhaltende Fieber (*febris costiosa maligna*), 3) das Pestfieber (*febris pestilentialis*), 4) die eigentliche Pest. Im Anfang jedes einzelnen Falles war es unmöglich, zu bestimmen, welche dieser Formen sich ausbilden würde. — Das einfache Tertianfieber verlief mit ein- oder zweitägigem Froste, welchem starke Hitze folgte, heftigsten Kopfschmerz, Zusammenschnürung der Brust und brennenden Drucke in den Präcordien, Uebelkeyn und überaus copiosen und häufigem Erbrechen galliger Stoffe, Schwindel, Delirien, unbärschbarem Durste, trockner Zunge, Zittern der Glieder. Diesen Zufällen folgte nach zwölf Stunden ein äußerst copioser Schweiß, durch welchen sich nach 5—7 Anfällen das Uebel günstig entschied. Wurde dieser Schweiß nicht gehörig abgeworfen, so zog sich das Fieber bis zu 18-, 24-, ja 30 stündigem Verlaufe hin, und ging somit in den anhaltenden Typus der zweiten Form über. Schon die erste Form war deutlich ansteckend, indem stets in den einzelnen Häusern einen Krankheitsfälle mehrere folgten. — Das anhaltende Fieber zog sich bis zum 21sten Tage hin, und war außer den allgemeinen Erscheinungen vorzüglich vom heftigsten Kopfschmerz, trockner Zunge ohne Durst begleitet, und liess, wenn es nicht tödtlich endete, die Genesenen erst nach einem halben Jahre ihre Kräfte wieder gewinnen. — Das Pestfieber trat außer diesen Symptomen mit Durchfällen und Hämorrhagien auf, zu denen sich am 3ten bis 4ten Tage Petechien, Vabices, oder ein zweites vor, zuweilen erst nach dem Tode ausbrechendes Erysipelas gesellte. Es zeigte sich im höchsten Grade gefährlich und contagios. — Die meisten Verheerungen aber richtete die eigentliche Pest an. Leigk berechnet die Zahl der im österreichischen Staate innerhalb dreier Jahre an derselben Gestorbenen auf 300,000. Ueberall aber löste sich dasselbe wieder in Tertianfieber auf<sup>1)</sup>. Uebri-

1) Werlowski, p. 201. B.



[1713.]

gens bestätigt auch Loigk, dass der Pest eine erysipelatöse Krankheitsconstitution (außer den Tertianfiebern Petechialfieber, Scharlach, Rothlauffieber, Friesel, Masern, Blattern) vorausging. — Die Aufzählung der einzelnen von der Pest verheerten Orte glauben wir übergangen zu können; überall liess sich die Verschleppung nachweisen.

#### 1715. Pest zu Wien. — Beintema. Ausfeld.

Erst im Sommer 1713 finden wir die Pest in der Gegend von Wien, unter viel milderer Gestalt und im Ganzen in geringer Verbreitung; unter den zuerst befallenen Orten werden Inzeradorf am Wiener Berge und Petzeldorf genannt. Heftiger und allgemeiner grassirte die Seuche in Tornbach, Hornals, Weinhaus und Wahreng, in grösster Bösartigkeit aber zu Siffring, Salmeradorf und Neustift.

In der Hauptstadt Wien vermochte sich die Pest in Folge der vortrefflichen policeilichen Massregeln, die indess nicht näher angegeben werden<sup>1)</sup>, nur auf einzelne Häuser zu verbreiten. Es kamen einzelne Tage vor, wo in der ganzen Stadt Niemand begraben wurde; eine Angabe, die fast zu günstig klingt. Dagegen betrug die tägliche Zahl der Erkrankungsfälle in den Vorstädten 40—80<sup>2)</sup>. Ein Resultat, aus welchem Beintema etwas vorläufig auf den rein epidemischen, d. h. durch eine bestimmte Beschaffenheit der Luft, felderkhafte Düst v. s. w. bedingten Ursprung der Krankheit schliesst<sup>3)</sup>. — Der übrige Inhalt der ziemlich unflüchtigen Schrift des Genannten bietet weder in geschichtlicher, noch in ärztlicher und sanitäts-policeilicher Hinsicht etwas Bemerkenswerthes dar.

Ziemlich Dasselbe muss über Ausfeld's, eines erfahrenen Praktikers während der Epidemie selbst verfassten Bericht gesagt werden. Nach diesem trat die Pest Anfangs oft so mild

1) Ausfeld, bei Warfenchauig, S. 105, ff.

2) Es schliesst, meint von Yarnschauer bewohnte, Vorstadt Landstrass dicht von der Pest völlig frei. Beintema, p. 24.

3) Beintema, p. 24.

auf, dass die Pestkubonen von Vielen mit syphilitischen verwechselt wurden<sup>1)</sup>.

Später gibt Chenot an, es seyen von 5795 Kranken 5371 gestorben, de Haën versichert selbst, es seyen bloß in den Lazarethen 1337 umgekommen.

### Weitere Verbreitung in Oesterreich.

Von Wien und Niederösterreich aus verbreitete sich die Pest nach Oberösterreich. Insbesondere wurden Ried und Warthberg jenseits der Traun und das ganze Traunviertel überhaupt genannt. Nach Ried kam die Krankheit durch einen aus Wien entflohenen Maurer. Man zählte in diesem Districte 1500 Todesfälle; eine zu sich nicht sehr beträchtliche Zahl. Aber man ergriff auch überall die besten Anstalten, und namentlich preist Werlooschnig, dem wir diese und die folgenden Notizen verdanken, die außerordentliche Umsicht und Thätigkeit des Baron von Grientall, K. K. Rath und Assessors des oberösterreichischen Tribunals. Sogleich nach den ersten Krankheitsfällen veranlasste derselbe die Physikatärzte seines Bezirks, Caecar, Pfeiffer von Altshofen und Werlooschnig von Pörsberg zu einem gemeinschaftlichen Berichte über die Natur der Krankheit, welche diese, ohne bis dahin noch einen einzigen Pestkranken gesehen zu haben, auf den Grund der ihnen vorliegenden Berichte, namentlich eines sehr gründlichen, mehrere Sectionsberichte enthaltenden, von Schimperich<sup>2)</sup> für die Pest erklärten, und so die Veranlassung gaben,

1) Werlooschnig, S. 94 — 126. — Der Wiener Pest geduldet auch Ramazzini in einer seiner schärfsten Reden, die er als 80jähriger Greis, ein Jahr vor seinem Tode hielt.

2) Der Bericht Schimperich's ist in der im Schriftverzeichn. genannten Schrift Werlooschnig's p. 22 — 23 vollständig abgedruckt. — Die Schrift Werlooschnig's gehört, trotz der nicht eben sehr mangelhaften Eigensinnigkeit ihres Verfassers, zu den wichtigsten dieser Periode, indem sie sich fast lediglich auf die von ihrem Verfasser auszusorgestellten Berichte von Augenzeugen stützt. Sie scheint ziemlich selten zu seyn, wir verdanken ihre Mittheilung aus der Erlanger Bibliothek der Güte des Hrn. Prof. Leopoldi dankbar.

[1712.]

dass die entstehende Seuche mit einer Sorgfalt überwacht wurde, welche grossen Lathel abwendete. —

Im August brach die Pest zu Wels in dem sogenannten Hausruck-Viertel, Werloschnig's Wohnorte, in Folge offenkundiger Verschleppung aus. Die Durchführung der Sperrmassregeln stiess hier, bei dem geringen Bildungsgrade der Einwohner, auf beträchtliche Schwierigkeiten, und so kam es, dass der Krankheit 400 Opfer fielen. Die Beschreibung der Erscheinungen bietet Nichts Besonderes dar; Werloschnig selbst war zu furchtsam, um zu genauer Beobachtung fähig zu seyn<sup>1)</sup>. Dessen ungeachtet preist er das Erbarmen der heiligen Mutter Gottes und die Kraft ihrer göttlichen Fürsorge<sup>2)</sup>.

Sehr heftig wurde im J. 1713 auch Pressburg ergriffen, indem es nach einer vielleicht etwas übertriebenen Angabe die Hälfte seiner Einwohner verlor<sup>3)</sup>.

#### 1715. Prag. — Fuchs, Schamsky.

Es ist ungewiss, ob Prag, wo die ersten Pestfälle im Juni 1713 vorkamen, von Polen oder von Wien aus ergriffen wurde; indes ist nach Fuchs<sup>4)</sup> das Letztere wahrscheinlicher. Der genannte Arzt bezweifelt das frühere, angeblich schon im J. 1711 bemerkte Vorkommen der Pest in Prag<sup>5)</sup>, und behauptet, ein aus dem Wiener Pestlazareth entlassener Schneider habe die Krankheit zuerst in die Prager Neustadt gebracht. Mit reissender Schnelligkeit verbreitete sich das Uebel über die ganze Neustadt, die Judenstadt, die Altstadt und die kleine Seite, und

1) Werloschnig, p. 45. „*Veritatem non petiit, sed quae velaret latuisse, quia quilibet horum fecit statim sua cura. Etiam transiitibus unguib. suis infectis non cessavit tangere, et nunquam latere vellet latuisse*“.

2) Sehr ausführlich verbreitet er sich über die cura hominibus, und mit diaphanischer Treue theilt er die heimlichen mehrerer Kranker mit, die zur Ehre der Heiligen strichelt worden. S. 12. Endet sich auch ein in Ungarn verfasster Brief in Hexametern: „*ad presidentem abbas*“.

3) Wundisch, *Geographie d. König. Ungarn*, Presb. 1760. I. Th. S. 421.

4) K. Jansen Brief bei Werloschnig, p. 64 unq.

5) Schamsky. — Der Letztere verfasste auch seine Angabe drei Jahre früher ein grösseres Werk über die Pest.



liess erst im November, noch mehr aber im December nach. Die von Fuchs mitgetheilten praktischen Bemerkungen vermuthen den tüchtigen Beobachter. — Schamsky's Angaben sind ziemlich werthlos. Er selbst erkrankte im Oktober, und verfasste während der Krankheit seine Schrift. Gleichzeitig mit der Pest herrschten ansteckende Rahren. Im September trat die Pest vorzüglich mit schwarzen Petechien, ohne Karbunkeln und Bubonen auf, und wurde dadurch in ihrer Tödtlichkeit höchst bedeutend gemildert. Ausserdem fehlte es an Lebensmitteln, da der auf das Land geflohenen Adel seinen Unterthanen jede Communication mit der Stadt untersagte.

### 1715. Regensburg.

Wenn irgend jemals die contagiose Verschleppung der Pest mit mathematischer Evidenz nachgewiesen werden konnte, so war es mit der Epidemie der Fall, welche im Juli desselben Jahres zu Regensburg ausbrach, nachdem einige Schiffe, auf denen sich Juden aus Wien befanden, sich in der Nähe der Stadt vor Anker gelegt hatten. Trotz des ihnen angekommnen Befehls, nicht aus Land zu steigen, da man in Erfahrung gebracht hatte, dass sich „Blatternkränke“ Kinder an Bord befanden <sup>1)</sup>, wagten es die Einwohner, die Schiffe zu betreten, den Passagieren Lebensmittel und Branntwein zu verkaufen, ja das Trocknen und Reinigen ihrer Kleider zu übernehmen. Eine furchtbare Pestseuche war die Frucht dieser grenzenlosen Sorglosigkeit, die zum Theil auch den Behörden vorgeworfen werden muss.

Nach Alkofer's Angaben bei Schnurrer, die wir eben so wenig benutzen konnten, als die nachher zu nennende Schrift Dieterich's, griff die Pest sehr langsam um sich, so dass noch im August noch Wenige starben. Erst Anfangs September brach die Reicherversammlung auf, und begab sich zu Land und zu Wasser nach Augsburg. Mit dem Eintritt des Herbstqu-

1) Thill, ein andrer Regensburger Arzt bei Werleschlag, p. 76.

[1711.]

nocturns starben täglich 30—40 Personen; diese Zahl fiel Anfangs November auf 5, doch zeigte sich die Krankheit den ganzen Winter durch noch hin und wieder, und erst am 16ten Februar wurde das Pestlazareth, welches auf einer an der Stadt gelegenen Dominical errichtet worden war, geschlossen. Die Zahl der Todten betrug bis zum 19ten Januar 1714 über 7000, nach Andern überhaupt nur 6000. Erst am 6ten Mai wurde die Sperrung ganz aufgehoben, und zugleich bei den Hochzeiten die Musik erlaubt, „damit mit aller Macht die Leute anfangen zu freyen und sich freyen zu lassen, es dass in mancher Woche 8—13 Paare in der evangelischen Gemeinde getraut wurden“.

Schnurrer bemerkt endlich, der Pesttrüder sey von Danzig aus über Dünkirchen nach London gebracht worden, es habe sich aber keine Pest ausgebildet, sondern die Krankheit meist durch reichliche Schweisse sich entschieden. In Ermangelung der von Schnurrer erwähnten Schrift Ratty's<sup>1)</sup> sind wir nicht im Stande anzugeben, worauf sich diese Angabe stützt. Mead indessen gedenkt dieser Krankheit als einer höchst gelinden, nur einen Tag dauernden, obschon er sie ebenfalls mit der Pest in Hamburg und Danzig in Verbindung setzt, und vergleicht sie mit dem englischen Schweisse, den er für eine gemilderte Pest erklärt. Zu Dünkirchen ergriff das Uebel, welches man zu London „Dunkirk Fever“ nannte, vorzüglich die englische Besatzung als Erbrechen und Durchfall<sup>2)</sup>.

## Wissenschaftliche Ergebnisse.

### Kanold, Kulmus, Eggerdes.

Nachdem wir so die wichtigsten Thatfachen zusammengestellt haben, welche die Geschichte dieser letzten grossen Pest, der es gelang, Deutschlands weite Gauen zum Schauplatz ihrer

1) Ratty, *A chronological history of the Weather and seasons and of the prevailing diseases in Dublin*, Lond. 1771.

2) Mead, *Dis. de pestifera contagione natura*, p. 32.

Verheerungen zu machen, darbietet, so mag noch ein Wort auf den Gewinn hinweisen, den die Wissenschaft aus so beklagenswerthem Uebel zu ziehen suchte.

Die Namen dreier Männer vorzüglich sind es, welche die Nachwelt in ewig lebendigem Gedächtnisse zu den unendlichen Wohlthaten erinnern werden, welche diese mit unermüdlichem Eifer, mit der aufopferndsten Menschenliebe und derjenigen Begeisterung, welche das Bewusstsein wahrhaft grosser Bestrebungen erweckt, der Menschheit zu leisten so glücklich waren. Kanold, Kulmus und Egger des, in ihnen verehrt die Wissenschaft und die Menschheit die klarste und freisinnigste Erkenntniss und Beurtheilung aller das Wesen der Pest, ihrer Erscheinungen, ihrer Verbreitung, ihrer Hemmung und Vertilgung betreffenden Verhältnisse, und ihre Schriften stehen als um so gewichtigere Zeugen der Wahrheit da, als sie lediglich in der reifsten Erfahrung und umsichtigsten Beobachtung während der so eben beschriebenen Pestepidemien ihren Ursprung fanden <sup>1)</sup>. Dem durch sie bis zur mathematischen Evidenz geführten Beweis der Contagiosität

1) K. d. Schriftenterscheidung. Namentlich verdienen auch die hier genannten Aphasmen Egger des hervorgehoben zu werden. — Kanold spricht an mehreren Stellen seiner Schriften und der Besondere Sammlung von seinem Plane, die Geschichte der Pest zu Anfang des 18ten Jahrhunderts in einem eignen Werke zu behandeln, und er suchte auch den Plan dieses Werks in den „historischen gelehrten Zeitungen“ (1718, p. 61 seq.) bekannt. Nach Kästner's Angabe (Medic. Gelehrtenlexikon, Art. Kanold) hiess dasselbe er wirklich die weitläufige handschriftliche Werk: „*Annuaire de peste progressu et cuncta usque Annorum pestilentiae ab a. 1701 ad a. 1719 usque*“. Nach Kanold's eigener Angabe war dasselbe indessen in deutscher Sprache abgefasst und führte den Titel: „*Ausführliche Jahrbuchzeit von der gesammten Pestgenussion der Jahre 1701—1719*“. Dasselbe ist indess weder jemals erschienen, noch findet sich gegenwärtig die geringste Spur des nach Kanold's eigener Angabe „völlig zu Papier geschriebn“ Manuscript. Wie wären hier mit dem innigsten Danke der unermüdlichen Nachforschungen gedenken, welchen sich Hr. Prof. Henschel in Breslau auf unsre Bitte in dieser Rücksicht zu unterziehen die Güte hatte. Dasselbe waren aber leider erfolglos. Es ist nicht ganz aussergewöhnlich, dass Kanold das Manuscript bereits einem Verleger zugesandt hatte, dass aber trotz im J. 1719 erfolgender Teil des Druck vertriebe. — Kanold starb in grösster Dürftigkeit, an einem von ihm selbst vermachtigten vierstägigen Wechselheber, gegen welches er sich körperlich weigerte die Chaux anzuwenden. (Büchner in der Vorz. zum 28. Vers. der Acad. Nat. d.)



ität der Pest muss größtentheils die Freiheit von dem furchterlichen Uebel zugeschrieben werden, welche seit dieser Zeit das westliche Europa genoss, und wenn sie allerdings darin irren, die originäre Entstehung der Pest nur für Aegypten und Asien zuzugestehen, so haben ja erst die neuesten historischen Forschungen, und selbst diese nicht auf eine allgemein anerkannte Weise, die gefürchtete Einseitigkeit dieser Ansicht darzulegen vermocht<sup>1)</sup>. Ihnen reihen sich aus der Zahl der vorzüglich durch praktische Wirksamkeit Verdienten Hölmann und der bescheidene Stückel an. Dem Ersten begegnet wir in zwei Pesten, im Kampfe mit den widrigsten Verhältnissen, täglicher Lebensgefahr Preis gegeben, und selbst die unzählige Untersuchung der Pestleichen nicht schreckend, die doch selbst Kulmuss für unmitte Waghalsigkeit erklärte. In dem Zweiten erkennen wir mit freudiger Ueberraschung einen tüchtigen, klar beobachtenden und stets das Rechte erfassenden Geist, den wir um so mehr zu schätzen haben, als er ohne eigentlich gelehrte Kenntnisse (Stückel war Chirurg) sich auf eine nur von wenig Aerzten erreichte Stufe wissenschaftlicher Bildung zu erheben vermochte. Stückel war sowohl in der Thurner als in der Danziger Epidemie ingesamt thätig, er sah manchen Tag 150 — 200 Kranke, und wurde selbst zweimal von der Pest ergriffen. Ganz im Gegensatz zu den älteren Grundätzen seiner unvorsenden Genossen, ja selbst der meisten Aerzte, dringt er auf eine möglichst einfache Behandlung der Pest, und sehr gut erklärt er sich über das Verhältniss des Petechialtyphus zur Pest und die Contagiosität der Letzteren. Durch die Beobachtungen dieser Männer wurden eine Reihe von leitenden Grundsätzen für die Erkenntniss und Behandlung der Pest festgestellt, welche in der ganzen Folgezeit nicht nur nicht berührt und geläutert werden konnten, sondern selbst in offenkundige und durch Nichts zu entschuldigende Vergessenheit geriethen. Das Wesentliche dieser Grundsätze haben wir schon oben<sup>2)</sup> mitgetheilt.

1) Becker, Gesch. d. neuer. Heilkunde.

2) S. S. 324 ff.

Hier genügt die Erinnerung an die hauptsächlichsten Resultate ihrer Beobachtung. Der Verlauf unserer Betrachtungen über die Lehre von der Pest mag lehren, wie dieses Vermächtniss von den neueren und neuesten ihrer Bearbeiter benutzt worden ist.

1) Die Pest ist eine absolut contagiöse Krankheit, die sich von Aegypten und dem Orient aus von Zeit zu Zeit durch Menschen- und Waarenverkehr über Europa verbreitet.

2) Die Weiterverbreitung derselben kann nur durch die strenge Absonderung der Kranken verhütet werden.

3) Entnernte Subjecte werden von der Pest am leichtesten und heftigsten befallen.

4) Fontanelle, alte Geschwüre und Syphilis schützen nicht vor der Pest.

5) Fast alle Schwangeren, auch die von der Pest nicht ergriffenen, abortiren, die zu früh geborenen Kinder aber werden bei gehöriger Sorgfalt leicht erhalten.

6) Der Beginn und Verlauf der Krankheit zeigt sich sehr häufig ohne die gewöhnlich für charakteristisch gehaltenen Symptome.

7) Unter diesen Symptomen ist bösartige Kraftlosigkeit bei dem Fehlen aller übrigen Erscheinungen das gewöhnlichste und gefährlichste.

8) Die übrigen Erscheinungen der Pest sind unendlich verschieden, und richten sich vorzüglich nach den individuellen Verhältnissen und Krankheitsanlagen der Befallenen.

9) Unter den Krisen der Pest ist der Ausbruch und die rechte Zeitigung der Bubonen die günstigste, und oft allein zur Herbeiführung der Genesung hinreichend.

10) Die Pestbubonen zeigen sich häufig bei übrigens anscheinend Gesunden. In Fällen dieser Art führt die geringste Vernachlässigung den Tod herbei.

11) Nächst den Bubonen sind kritische, mässige und anhaltende Schweisse vorzüglich wichtig, obschon zur Heilung nicht unbedingt nothwendig.

12) Andere Krisen, z. B. Erbrechen, Durchfälle, Blutungen sind von zweideutiger Vorbedeutung.

13) Karunkeln sind für sich allein selten kritisch heilsam. Noch weniger ist dies mit Pusteln der Fall.

14) Für die Behandlung verlangt die Herbeiführung der Krise durch Bubonen die erste Rücksicht. Sie wird in der Regel durch mässig warmes Verhalten herbeigeführt.

15) Die Zeitigung der Bubonen gelingt am Besten durch Anwendung warmer, gelind reizender Kataplasmen.

16) Die Ueberführung der Bubonen in Eiterung ist zur Heilung nicht unbedingt nöthig. Sehr häufig gelingt die gefahrlose Zertheilung der Bubonen.

17) Die gefahrlose Zertheilung der Bubonen gelingt am Besten durch die örtliche Anwendung des Kampherspiritus.

18) Die zum Zwecke der Zeitigung der Bubonen angewendeten Vesicatoren und Scarificationen sind gefährlich, weil sie leicht das Zurücktreten der Bubonen verursachen.

19) Noch bedenklicher ist die Exstirpation der Bubonen mit dem Messer, indem dieses Verfahren theils das Organ der pathischen Krisen zerstört, theils entstehende Narben und Entartungen der nahegelegenen Theile zurücklässt.

20) Freiwillig entstehendes Erbrechen ist zu Anfang der Krankheit meist heilsam; weit gefährlicher in einem vorgerückten Zeitraume der Krankheit.

21) Aus diesem Grunde ist die Anwendung der Brechmittel zu Anfang der Krankheit heilsam. Sie wird am Geeignetesten durch die Ipecacuanha bewerkstelligt.

22) Zur Herbeiführung der kritischen Schweisse sind warmes Verhalten und die gelindesten Diaphoretica hinreichend.

23) Uebermässige Schweisse sind fast stets schädlich, indem sie den Ausbruch der Bubonen hindern, den der ominösen Pusteln aber begünstigen.

24) Alle erhitzenden Schwitzmittel, namentlich der Theriak, sind schädlich, indem sie die Neigung zur Zersetzung des Blutes, Congestionen, Blutungen, Pusteln, Delirien, kurz



alle Erscheinungen des ausgebildeten typhösen Charakters befördern.

25) Uebermäßiger Hautthätigkeit und andern Erscheinungen von colligativem Charakter wird am Besten durch den Gebrauch gelinder Pflanzensäuren begegnet.

26) Die ausbrechenden Karbunkeln erfordern ein frühzeitiges chirurgisches Verfahren. Auch bei ihnen setzt der örtliche Gebrauch des Kampfers der Neigung zu tief eindringender brandiger Zerstörung am sichersten ein Ziel.

27) Aderlässe sind bei der Pest niemals nöthig; nur selten werden sie bei Vollblütigen zu Anfang der Krankheit ohne Nachtheil angewandt, aber selbst in diesem Falle verlängern sie die Dauer der Krankheit und erschweren die Genesung. Unter allen andern Verhältnissen sind sie wegen des durch sie herbeigeführten typhösen Zustandes als direct schädlich zu betrachten.

28) In den Leichen der an der Pest Verstorbenen finden sich vorzüglich geschwürige Affectionen des Magens, Petechienartige Flecken auf der Schleimhaut des Darmkanals, in den Drüsen des Gekröses, auf dem Bauchfell, in der Leber, in den Lungen, auf dem Herzen, zuweilen Karbunkeln in einzelnen Theilen, z. B. im Magen, in der Harnblase u. s. w.

29) Unter den Folgeübeln der Pest zeigen sich öftlich am häufigsten hantartige Geschwüre und Atrophien der Extremitäten; allgemein Plakia und Wassersucht; epidemische hartnäckige Durchfälle und scorbutische Affectionen.

### Die Pest der Jahre 1719 — 1721.

Wenige Jahre liegen zwischen den so eben beschriebenen Verheerungen und dem ersten Unheil, welches die Furie des Ostens über den von ihr so oft heftretenen Schauplatz, das östliche Stromgebiet der Donau nicht allein, sondern diesmal auch über eins der gesegnetsten, beglücktesten und gebildetsten Länder Europa's, über Frankreich ergoss.

**1719. Siebenbürgen. — Köleser. — Lemberg.**

Schon seit dem Mai des Jahres 1719 beobachtete Köleser <sup>1)</sup> zu Kronstadt in Siebenbürgen Krankheitsfälle, die Anfangs mehr dem Petechialtypus, später der eigentlichen Bubonepest angehörten und im November ihre Höhe erreichten. Köleser bemerkt, dass die Krankheit, wenigstens zu Anfang der Epidemie, zwei bis drei Tage vor dem Neumond jedesmal heftiger wurde, und dass sie, im Gegensatz zu der gewöhnlichen Erfahrung, mehr Kinder und Frauen als Männer ergriff. Brechmittel und gelinde Schweißmittel erwiesen sich heilsam; das Volk nahm mit Erfolg „einen halben bis ganzen Schma“ Schießpulver mit Essig ein. Nach einer späteren Nachricht waren von der ganzen Einwohnerschaft Kronstadt's zuletzt nur noch 30 Personen übrig <sup>2)</sup>. Zu Ende des Jahres gelangte das Uebel auch in einige ungarische Grenzdörfer, in denen man es durch Vertreibung der Einwohner in die Wälder und Verbrennung der Wohnungen zu tilgen suchte <sup>3)</sup>. Auch zu Belgrad, so wie auf der türkischen Grenze, namentlich zu Chocim und Zwaninc, richtete die Pest nicht unbedeutende Verheerungen an <sup>4)</sup>. In den folgenden Monaten wurde sie, wie dies bei der Steigerung des Verkehrs im Sommer in der Regel geschieht, ganz allgemein, und wüthete namentlich zu Smyrna, auf der dalmatischen Küste, in Griechenland, Aegypten, Siebenbürgen, der Wallachei, und drang selbst bis zur polnischen Grenze vor <sup>5)</sup>. Hier wurde vorzüglich die Festung Chocim heftig ergriffen, und vor ihr ausverbreitete sich der Same des Uebels durch die von den Türken aus der Stadt vertriebenen Juden, deren Schacherei kein Einhalt gethan werden konnte,

1) Breslauer Sammlung von Natur- und Medicin-Geschichten u. s. w., Verh. d. S. 5816 K. — Verh. 16, S. 678. Es ist derselbe Köleser de Kéres-Eer, dessen schon oben (S. 342.) gedacht worden ist.

2) Das., Verh. 3. S. 218.

3) Das., S. 1052.

4) Das., Verh. 7, S. 47.

5) Das., Verh. 9, S. 675.

weit umher über das ganze Land, wo man ihm ausser allgemeiner Flucht und Umhertragung wunderthätiger Heiligenbilder keine Dämme entgegenzusetzen im Stande war. Die Zahl der an der Pest Gestorbenen betrug für Siebenbürgen nach amtlichen Nachrichten über 100,000, in Chocim allein waren 10,000 gestorben<sup>1)</sup>. Bald wurde durch Juden auch Lemberg und mehrere benachbarte Orte angesteckt, und die Behörden von Posen, Breslau, Königsberg u. s. w. erliessen die geschärfsten Spermandate, die schon früher auch in Venedig wieder in Wirksamkeit getreten waren.

### Die Pest in der Provence. 1720 und 1721.

So oft die furchtbare Geissel Aegyptens den blühendsten Staaten Europa's in den verfloßenen Jahrhunderten Gelegenheit gegeben hatte, mit ihrer ganzen Wuth auch die Wege ihrer Verbreitung, damit aber auch die Mittel zu ihrer Bändigung kennen zu lernen, — Sorglosigkeit, Unwissenheit und verbrecherischer Eigennutz hatten stets die durchgreifenden Erfolge einer so oft wiederholten Lehre vereitelt. Es schien einer mit graumaner Eindringlichkeit erneuten Erfahrung zu bedürfen, um die civilisirten Staaten Europa's endlich zu den kräftigsten Massregeln gegen den furchtbarsten Feind ihres Aufblühens zu vermögen. Marseille, welches die Chronik der Pest als die erste notorisch von derselben befallene Stadt nennt, (580 nach Christus) sollte für Frankreich auch die Reihe schliessen; seinem Unglück sollte die Zukunft der übrigen Länder Europa's eine nur noch selten gestörte Sicherheit verdanken.

Die Geschichte der Pest in der Provence ist so häufig behandelt worden, dass wir nur um der Vollständigkeit zu genügen die Hauptpunkte derselben, wie sie namentlich von Bertrand<sup>2)</sup> und Anders, Patrik Russel<sup>2)</sup> festgestellt worden

1) Hist. Samml. Vers. 5, 8. 58 ff. — Vers. 18, 8. 183 ff. — Vers. 21, 8. 62.

2) Bertrand's Schrift, die wir nicht benutzen konnten, bezeichnet Ozanam (IV, 26), als die gediegenste.

2) P. Russel, *A Treatise on plague*, p. 210, seq.



[1740.]

sind, aufzuführen haben. Sehr schätzbar sind auch die zahlreichen Notizen, welche sich bei Kanold über dieselbe finden <sup>1)</sup>; der übrigen Quellen wird bei Gelegenheit Erwähnung geschehen.

### Marseille.

Ein französisches, von Capitain Chataud <sup>2)</sup> befehligtes, mit Baumwolle und Seidenzeugen beladetes Schiff verließ Anfangs Februar 1720 Saidn in Syrien. An Bord befanden sich einige Türken, welche mit dem Schiffe nach Cypren reisen wollten. Chataud erhielt einen Gesundheitspass, obwohl auf der syrischen Küste die Pest herrschte. Kurz nach der Abfahrt starb einer der Türken; man versenkte ihn mit seinen Habseligkeiten ins Meer. Bald darauf starben zwei Matrosen, die mit ihm in Berührung gekommen waren, an derselben Krankheit; ihnen folgten zwei andere und der Chirurg, der sie behandelt hatte. Noch drei Matrosen erkrankten und starben zu Livorno, wo das Schiff anlegte. Die dortigen Aerzte erklärten ihre Krankheit für ein lösartiges, pestähnliches Fieber; nichts desto weniger setzte Chataud seine Reise ungehindert weiter fort, und langte am 25ten Mai zu Marseille an, nachdem unterwegs noch drei Personen gestorben waren <sup>3)</sup>. Das Schiff wurde der Quarantaine nicht unterworfen, da ein Chirurg zu Livorno in dem Gesundheitspasse die Krankheit der unterwegs Verstorbenen für ein hitziges Fieber erklärt hatte. Am 27ten Mai starb ein Matrose des Schiffs, den 12ten Juni ein Quarantainebeamter, welcher an Bord geschickt worden war, den 23ten Juni ein Kapitänsjunge. Noch früher erkrankten und starben auch einige Träger, welche im Lazareth die dort niedergelegte Ladung des Schiffs geöffnet hatten. Als der Chirurg hartnäckig leugnete, dass diese Kranken der Pest erlegen seyen, beauftragte man noch zwei andere Aerzte, welche das Uebel für die Pest er-

1) Kanold, *Sensschreiben über die Pest in Maritten*. — *Essai*. Samml. 20 vollen Stücken des 18ten bis 19ten Versuchs.

2) Andere nennen ihn Chateau oder Caatoul.

3) Kanold, *Sensschreiben*, S. 5 ff.

Mürten. Nun unterwarf man die Passagiere des Schiffs einer neunzehntägigen Quarantaine und ihre Effecten einer Räucherung. Schon in der ersten Woche des Juni waren einige andere Diener erkrankt, bei denen sich Beulen unter den Achseln und in den Weichen zeigten. Der Priester, welcher die Kranken besuchte, erkrankte und starb; eben so der sie behandelnde Wundarzt mit einem Theil seiner Familie.

Die Ladung des Schiffs wurde bald darauf auf die kleine bei Marseille gelegene Insel Jarre gebracht, und dort später auf Befehl der Regierung verbrannt. In der Zwischenzeit wurde sie infam so schlecht bewacht, dass habgierige Seeräuber es wagen durften, zu ihr einen Raub zu begehen, der nicht allein über sie selbst, sondern über viele Tausende Tod und Verderben brachte <sup>1)</sup>.

Am den zwanzigsten Juli zeigte sich die Krankheit auch in der Stadt, zuerst in der Strasse l'Escale bei vierzehn Personen, welche höchstwahrscheinlich mit der Ladung des Schiffs in Berührung gekommen waren. Es ist also recht bekannt geworden, wie die Pest aus dem Schiffe und dem Lazareth in die Stadt gekommen ist, aber sehr wahrscheinlich, dass sie durch kleine von den Matrosen gestohlene oder auf eigene Rechnung verhandelte Quantitäten seidener Waaren vertheilt wurde.

Wiederholt warnten einige Aerzte (Peyssonel, Vater und Sohn, und Sicard) die Behörde auf den höchstverdächtigen Charakter der ersten Erkrankungen aufmerksam; man glaubte sich aber völlig sicher, nachdem ein Chirurg die Krankheit für ein gefahrloses Wurmfiieber erklärt hatte, das Produkt der heißen Jahreszeit und des Mangels an Getreide, Oel und Wein, in Folge des vorjährigen Misswachses. Selbst als die Krankheit schon eine bedeutende Zahl von Opfern gefordert hatte, sah man sie noch als ein ungewöhnlich bösartiges Fleckfiieber an. Indessen erklärte Peyssonel der Sohn öffentlich die Anwesen-

1) S. unten Pest zu Toulon.

[1726.]

beit der Pest, und das Parlament von Aix untersagte alle Verbindung mit Marseille, so dass sich Mangel an Lebensmitteln zu zeigen anfang, denn man ludess durch Errichtung neuer Märkte in der Umgegend, (auf der Strasse nach Aubagne, Aix und l'Estrange von der Seeseite), bei denen die Käufer von den Verkäufern abgesondert waren, anzukommen suchte. Selbst als noch vier Aerzte, zwei Chirurgen und ein Apotheker den Pestcharakter des Uebels officiell bestätigt hatten, erklärte der Magistrat das Uebel für nicht contagios. — Mit Recht beklagten sich die benachbarten Staaten bitter über die Sorglosigkeit der Marseiller Behörden, welche dem furchtbaren Uebel erst dann einen Damm entgegenzusetzen versuchten, als es bereits seine Keime weit und breit ausgestreut hatte.

Die antliche Erklärung von dem Ausbruche der Pest hatte keine andern Erfolge als die gewöhnlichen, den Schrecken und die Verzweiflung der Bevölkerung, welche sich nach den strengsten Anordnungen bereitwillig unterwarf, wenn nur dem Furchterlichsten ein weniger abschreckender Name gegeben wird. Freilich hat selten eine Behörde so viel Geistesgegenwart, Ansehen und Zutrauen besessen, um diesen Anforderungen genügen zu können. — Die wohlhabenderen Bürger Marseille's flohen auf ihre Landhäuser, Viele verliessen Frankreich, ja Europa. Unter ihnen selbst vier Aerzte, denen man ohne Erfolg nachsetzte. Später entflohen selbst die Behörden 1); tausend Einwohner machten den Versuch, sich mit den Waffen in der Hand einen Weg nach Toulon zu bahnen. Zu der Pest gesellte sich der Hunger, es kam wiederholt zu Zusammenrottungen des Pöbels 2); Mord und Plünderung waren an der Tagesordnung, und nur die strengsten Massregeln der Besatzung vermochten die wiederholt ausbrechende Wuth des verzweifolenden Volkes

1) Bresl. Samml. Vers. 14. S. 277.

2) Unter 20 Personen konnte z. B. nur ein Pfund Fleisch vertheilt werden; ein Kil kostete 52—12 Sous, u. s. w.



zu bezähmen <sup>1)</sup>. Nur die Freigebigkeit des Hofes <sup>2)</sup>, reichliche Unterstützungen der Nachbarstädte, so wie die Unerblichkeit und Ummacht Einzelner, z. B. des Bischofs de Belzunce, und des Commandanten Langeron, retteten endlich Marseille aus dieser Bedrängnis.

Erst nach dem vollen Ausbruch der Seuche (Mitte August) wurden von Montpellier die Aerzte Chicoyneau, Verney und Pons nebst einigen Andern, von Paris de Verney, Boyer und vermuthlich auch Astruc, im Ganzen acht fremde Aerzte, nach Marseille gesendet, deren Meinungsverschiedenheit in Bezug auf das Wesen und vorzüglich die Contagiosität der Krankheit die Verwirrung und die Unschlüssigkeit der Behörden nur zu sehr nährte <sup>3)</sup>. Es scheint, dass man den fremden Aerzten auf Kosten der einheimischen, welche fast sämmtlich strenge Contagionisten waren, einen zu grossen Einfluss vergönnt habe <sup>4)</sup>. Zwei von den Aerzten aus Montpellier waren gewissenlos genug, bald wieder in ihre Vaterstadt zurückzukehren, aus der sie indess alsbald auf Befehl des Hofes entfernt wurden, um eine strenge Quarantaine zu halten. Statt ihrer gingen Deidier und Zermé von Montpellier nach Marseille <sup>5)</sup>.

Alle Beobachter entwerfen in abschreckenden Zügen das Bild der Noth, der Verzweiflung, der Verwirrung, welche die Stadt erfüllten. Während die Mehrzahl der Aerzte die Krankheit für die Pest erklärte, wurde der willkommenen Darstellung der Gegner gottlos Alles verabsäumt, um das Uebel im Keime zu ersticken, viele Aerzte verliessen die Stadt, und die wenigen noch übrig gebliebenen Wundärzte hielten sich verborgen. Die ärmsten Volksklassen litten am meisten; am furchtbarsten wüthete die Krankheit in den engen Gassen der

1) Brühl, Samml. u. s. O.

2) Man schenkte der Stadt 1 Million Livres, später kostbare Mengen von Getreide, u. s. w.

3) Vergl. Lörincz, Pest des Orients. S. 32 ff.

4) Kämpel, Sendeschreiben, S. 7.

5) Brühl, Samml. Vers. 12. S. 119. Die Thätigkeit der Genesenen so wie die eines andern Arztes, Bontiller, wird sehr gerühmt. — Das. Vers. 12. S. 122.

[1726.]

alten Stadt, in den Schlupfwinkeln der Verworfenheit und des Lasters. Schon am 28sten August hatte dieselbe eine solche Höhe erreicht, dass die Zahl der Todten an diesem Tage 800 betrug. Sie verlief äusserst rasch, oft in weniger als 24 Stunden, selten währte sie bis zum 5ten Tage. Vorzüglich wurden Kinder und Frauen ergriffen; eintretende Durchfälle waren absolut tödtlich. Brechmittel leisteten häufig gute Dienste, ebenso Aderlässe zur Beschwichtigung heftiger Kopfschmerzen (1) <sup>1)</sup>, welche indess Andere durchaus verwarfen <sup>2)</sup>. Die Untersuchung der Leichen zeigte keine der sonst gewöhnlichen Erscheinungen, ausser entzündlichen Affectionen einzelner Organe und grossen Mengen von Würmern. Einige hielten die Krankheit selbst für das *Mor de Sicc* (die damalige Bezeichnung des gelben Fiebers.) Später indess traten statt des anfänglichen Fiebers mehr die Rabenru hervor. Im September errichtete man im Freien Zelte zur Aufnahme der Kranken, und es schien darnach die Wuth der Krankheit sich eine Zeitlang zu mässigen <sup>3)</sup>. — Bald fehlte es an Leichenbestattern, wie es schon längst an Aerzten und Arzneien gefehlt hatte; 200 Galeerensclaven wurden befreit, um als solche zu dienen, aber auch sie waren unzulänglich, und ein grosser Theil der Todten wurde durch eigens hierzu bestimmte Schiffe auf das hohe Meer gefahren und dort versenkt <sup>4)</sup>.

Die Nachricht von dem Geschick der unglücklichen Stadt verbreitete überall Furcht und Schrecken, und veranlasste in der Nähe und Ferne die strengsten, zum Theil übertriebenen Massregeln zur Abhaltung des furchtbaren Feindes. So nicht allein Frankreich selbst, sondern ganz Italien, Spanien, England u. s. w. Die päpstliche Regierung hob alle Communication nicht allein mit Frankreich, sondern auch allen zwischengelegenen Ländern auf, und erklärte Graubünden und die Schweiz

1) Kanold, Sendechnien S. 12.

2) Das., S. 16.

3) Uresl. Samml. Verh. 11. S. 217.

4) Das., Verh. 11. S. 218.

schon deshalb für verdächtig, weil der französische Gesandte die an ihn gerichteten Briefe aus Frankreich, um sie der zerstörenden Strenge der päpstlichen Quarantaine zu entziehen, über die Schweiz hatte kommen lassen. Auf ein Marseiller Schiff, welches von Livorno kam, wurden die Kanonen gerichtet, als es den Versuch machte, in den Hafen von Civita vecchia einzulaufen. Man vermurte 6 Thore Roms, und die übrigen 10 liess man durch Cardinele bewachen. In Neapel bedrohte man den Capitain eines Schiffes, welches zwei Monate vor dem Ausbruche der Pest von Marseille ausgelaufen war, mit dem Tode, wenn er in dem Hafen vor Anker gehen würde u. s. w. Noch grausamer verfuhr man zu Ostende mit einem Marseiller Schiffe, welches sich 4—5 Tage lang, zumal da ein Sturm bevorstand und es an Lebensmitteln zu fehlen anfang, bemühte, in den Hafen einzulaufen, von welchem man es mit Kanonen abbließ. Der Sturm warf dasselbe endlich auf eine Sandbank, von welcher aus es der unglücklichen Mannschaft glückte, aus Land zu gelangen. Aber auch hier verhinderte sie eine starke Wache am weiteren Vordringen. Endlich gelang es dem französischen Gesandten, ihnen Hilfe zu schaffen. Indess wurde das Schiff und die Kleider der Schiffbrüchigen verbrannt, sie selbst aber nicht eher als nach einem allgemeinen Seebade in die Quarantaine aufgenommen. (Bezel. Samml. V. 14. S. 407.)

Dergleichen Vorfälle wiederholten sich an andern Orten häufig<sup>1)</sup>. Selbst der Bey von Tunis übte gegen alle provençalischen Schiffe die strengste Sperr.

Zu Marseille selbst nahm man erst dann zu den kräftigsten Massregeln seine Zuflucht, als die Erbödigung des Uebels unsern den Grenzen der Möglichkeit lag, und auch da noch fand man in dem Dogma von der Luftansteckung Trost und Beruhigung. Chataud war verhaftet und zum Tode verurtheilt, sein

1) Bezel. Samml. 2. u. 3.



[1720.]

Schiff mit aller Ladung verbrannt <sup>1)</sup>), ebenso das Hausgeräth der zuerst infectirten Wohnungen zerstört worden. Wie erfolgreich aber diese und andere Anstalten waren, ergab sich, als bereits im October 35 Orte der Provence für angesteckt erklärt werden mussten, unter denen sich die Städte Aix und Toulon befanden <sup>2)</sup>).

Ende Novembers schien die Pest zu Marseille ihr Ende erreicht zu haben, obschon sich in den Hospitälern, wohin nun alle Erkrankten gebracht wurden, noch Pestkranke in ziemlicher Anzahl befanden. Man gab deshalb den Verkehr wieder frei, die benachbarten Städte traten wieder in freie Communication, und mit einem allgemeinen Dankfeste am Allerheiligentage glaubte man die letzten Reize des verheerenden Uebels in Unthätigkeit gebannt zu haben. Die Folgen einer so übereilten Massregel zeigten sich gar bald; schon in der Mitte Novembers war die tägliche Sterblichkeit, angeblich in Folge der Eröffnung eines verpesteten Magazins, wieder über 30 gestiegen, und erst mit dem eintretenden sehr gelinden Winter, schien sie gänzlich zu erlöschen <sup>3)</sup>. Grosse unentgeltliche Getreidezusendungen der Regierung kamen der Hungersnoth zuvor, welche die unterlassene Aussaat fürchten liess, grosse Freiheiten wurden Denen ertheilt, welche sich in der entvölkerten Stadt niederliessen <sup>4)</sup>. Denn man berechnete im Februar 1721 die Zahl der an der Pest und vor Hunger Gestorbenen auf mehr als 64,000 <sup>5)</sup>. Ueber 300 Kinder, deren Aeltern und übrige Angehörige nicht ermittelt werden konnten, wurden von dem Gese der ohne Erben Gestorbenen ausgestattet. Jeder der in der Pest thätig gewesenen Aerzte erhielt von der Regierung eine jährliche Pension von 4000 Livres, eine verhältnissmässige Rente belohnte die Wandärzte, deren Verdienste jene der Aerzte

1) Chataud stark noch vor der Vollstreckung des Urtheils selbst an der Pest. *Recueil. Suppl.* V. 13. S. 45.

2) S. unten.

3) *Recueil. Suppl.*, V. 14. S. 529 ff.

4) *Das.*, S. 528.

5) *Das.*, V. 13. S. 140.

vielleicht noch übertrafen. — Im März 1721 kehrte der öffentliche Verkehr in seine alten Formen zurück; die verdächtigen Waaren wurden auf der kleinen Insel Pomigé der Desinfection unterworfen, und zunächst nahm nun die strenge Bestrafung der in der Schreckenszeit verübten Verbrechen die Aufmerksamkeit der Behörden in Anspruch <sup>1)</sup>. Nichts desto weniger kamen bei der Sorglosigkeit im Gebrauche der verpesteten Mobilien bis spät in den Sommer des folgenden Jahres immer noch einzelne Pestfälle vor <sup>2)</sup>, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Funke bis zum J. 1722 unter der Asche fortglühte, welcher sich in demselben von Neuem zur hochloдерnden Flamme erhob <sup>3)</sup>. Uebrigens zeigte sich nach hier nach der Pest die gewöhnliche Heirathalast; in einem Monate wurden 1000, (Anderer sagen sogar 10,000) Ehen geschlossen <sup>4)</sup>.

### Aix.

Nächst Marseille wurde Aix, eben so schrecklich als die benachbarte Schwesterstadt, heimgesucht. Einigen Angaben nach betraf der erste Pestfall im August ein 60jähriges Weib, deren Section drei dabei beschäftigten Wundärzten, und später noch 11 andern Personen aus den Familien derselben den Tod zuzog <sup>5)</sup>. Indess erreichte die Seuche erst im December, (in welchem Monate sie in Marseille allmählig verschwand, zu Toulon aber anbrach), ihre Höhe, auf welcher täglich in der von drei Viertheilen ihrer Einwohner verlassenen Stadt über 100 Personen starben <sup>6)</sup>. Selbst das Parlament der Provinz, durch dessen Sitz in Aix dieser Ort zur Hauptstadt derselben

1) Bred. Samml. V. 15. S. 258. — Unter diesen Verbrechen befand sich einer, welcher mehrere Kinder durch Arzneien vergiftet hatte, um ihre Mütter an sich zu bringen.

2) Das. S. 490. V. 17. S. 345.

3) S. unten.

4) Bred. Samml. V. 17. S. 345.

5) Scheuchzer, a. a. O.

6) Bred. Samml. V. 14. S. 628. — Das. S. 322. — Der Winter 1721 zeichnete sich durch Gelmüthigkeit aus.

[1720.]

wurde, war gewissenslos genug, die Stadt zu verlassen, und sich zuerst nach Tarascon an der Rhone, dann, von der dortigen Bürgerschaft zurückgewiesen, nach St. Remy zu begeben, woselbst man es ebenfalls erst nach einer Quarantaine von 15 Tagen aufnahm<sup>1)</sup>. Als aber auch St. Remy bald darauf inficirt wurde, zerstreuten sich die Mitglieder<sup>2)</sup>. — Unterdessen erneuerten sich zu Aix, zufolge günstlicher Rathlosigkeit und Unkenntniß der so theuer erkauften Lehren, welche die Geschichte der Pest in so furchtbarer Reichhaltigkeit enthält, alle an oft beschriebenen Ausfritte früherer Epidemien. In Aix kam es so weit, dass diejenigen, welche die Erkrankten in die Lazarethre brachten, nach der Anzahl der von ihnen eingelieferten Kranken bezahlt wurden, und so ereignete es sich häufig, dass diese Verworfenen völlig Gesunde oder doch an andern Uebeln leicht Erkrankte gewaltsam aufraßten und in die Lazarethre überlieferten, wo sie nun erst angesteckt wurden<sup>3)</sup>. Man klagte allgemein die Feigheit des Parlaments und der ebenfalls entwichenen Behörden als die Ursache dieses und andern Unfugs an. — Eben so einstimmig war man in dem Lob der Aerzte, zu denen sich auch Chicoyneau und Vernay gesellt hatten, welche auch hier wieder die unmittelbare Ansteckung beugneten, aber an Garidel einen einsichtsvollen Gegner fanden<sup>4)</sup>. Indessen behandelten die Aerzte von Montpellier im Ganzen nur sehr wenige Kranke, und ohne bessern Erfolg als die Spitalärzte<sup>5)</sup>. Man machte zu Aix die Beobachtung, dass Fontanelle, Fisteln, Krätze und andere Hautausschläge vor der Pest schützten, dass dagegen Syphilitische, denen Quecksilber gegeben worden war, unfehlbar starben. Die Application der Vesicatore auf die Bahonen bewies sich nachtheilig, indem sie eine heftige Entzündung verursachten. Zweckmäßiger war

1) Bresl. Samml. V. 14. S. 400.

2) Das., V. 12. S. 30.

3) Das., V. 14. S. 613.

4) S. die Briefe Garidel's an Scheuchzer; Bresl. Samml. V. 15. S. 122 und 214.

5) Das., S. 271.



es, sie zu scarificiren und durch Digestiva zur Eiterung zu bringen. Aetzmittel zeigten sich dagegen bei den Karbunkeln, nachdem sie scarificirt worden waren, sehr hilfreich <sup>1)</sup>.

Im März endlich ließen die Verheerungen nach, nachdem mehr als 12,000 Menschen hinweggerafft worden waren <sup>2)</sup>, und man setzte auf den 20ten April den Anfang der allgemeinen Quarantaine fest, vor welcher auffallend viele Heirathen, namentlich zwischen Wittuern und Wittwen, geschlossen wurden <sup>3)</sup>. Nichtsdestoweniger kamen immer noch Pestfälle genug vor, und gleichzeitig wurden viele Kinder von den Blattern hinweggerafft. Ja zu Anfang Aprils schien die Pest noch einmal ihre alte Wuth erneuern zu wollen, wobei man die Beobachtung machte, dass die in der ersten Periode mit Erfolg angewendeten Heilmittel Nichts leisteten und selbst schädlich waren. Dies galt insbesondere von den Brech- und Abführmitteln.

### Toulon.

Die außerordentlich lebhafte Verbindung der Städte und Gemeinden der Provence durch die Leichtigkeit der Communication zur See erklärt den Ausbruch der Seuche in den übrigen Orten nur zu leicht, und lässt erwarten, dass dieselbe auch weit umächtigerer Massregeln als der wirklich angewendeten gespottet haben würde.

Antreichau's Beschreibung der Pest zu Toulon fasst der bürgerlichen Stellung ihres Verfassers nach <sup>4)</sup> zwar vorzüglich das sanität-polizeiliche Interesse ins Auge, und führt dieses nicht ohne eine sehr häufige und wenig geordnete Breite durch,

1) Schewckzer, a. a. O.

2) Erel. Samst. V. 15. S. 257.

3) Das., S. 270.

4) Antreichau war erster Bürgermeister von Toulon, und stand deshalb im Mittelpunkte der Ereignisse. Er wurde von allen umliegenden Orten allein nicht von der Krankheit hinweggerafft, obwohl in seiner nächsten Nähe zwei seiner Brüder starben. Er glaubt, dass ihn ein chronisches Nasengeschwür geschützt habe.

[1720.]

ist aber immer für die Geschichte der Seuche selbst und der Pest-Schutzanstalten nicht ohne Werth.

Bald nach dem Ausbruche der Pest in Marseille flohen viele Familien nach Toulon, um dort in die Quarantaine aufgenommen zu werden; ihre Zahl wuchs aber bald so sehr, dass sehr Viele zurückgewiesen werden mussten. Es konnte nicht fehlen, dass der Same der Krankheit gar bald (nach 18 Tagen) durch jene Flüchtlinge in die Quarantaine von Toulon gebracht wurde, und hierdurch diese Anstalt ihren eigentlichen Zweck verlor. Deshalb richtete man nun das Marinehospital St. Mandrier zur Quarantaine ein, und glückte genug gethan zu haben, wenn man den Zugang zur Stadt durch zwei kleine Fahrzeuge, welche vor dem Hafen kreuzten, schützte, während man die Noth der Nachbarstadt durch reichliche Zufuhr linderte. Aber eben diese thätige Hilfe wurde durch die Gewissenlosigkeit Derer, die sie zunächst vermittelten, der Stadt zum Unheil. Denn jene Schiffer gingen zu Marseille ans Land, und verkehrten mit den Einwohnern ohne die geringste Vorsicht. Trotzdem blieb die Pest noch immer auf die Quarantaine beschränkt, obgleich die sich täglich mehrende Zahl der Kranken die Errichtung einiger hölzernen Spülörter nöthig machte, zu denen der König das Material aus den Magazinen des Arsena's verwilligte. — Aber nur zu bald bereiteten Nachlässigkeit und schamstüchtige Gewinnsucht auch der Stadt den Untergang, welchen diese durch die bisherigen Vorsichtsmaßregeln auch ferner von sich abwenden zu können geglaubt hatte. Ein Theil der Ladung Chataud's war, wie wir schon oben bemerkt haben, auf die bei Marseille liegende Insel Jarre gebracht worden. Ihre schlechte Bewachung reizte die Habsucht einiger Einwohner von Bandol, einem kleinen, 3 Meilen von Toulon gelegenen Seehafen, welche in einer Nacht auf Jarre landeten und einen Ballen Seide mit sich nahmen. Diese Elenden unterlagen nicht allein selbst der Pest, sondern verbreiteten sie sehr bald auch über ihr ganzes Dorf. In dieser Zeit war ein gewisser Cancellin, ein Barkenfahrer, in Bandol gewesen, von wo er, nach Zurück-

lassung seines Fahrzeugs am 5ten Oktober 1720 zu Lande nach Toulon zurückkehrte, unter dem Schutze seines Gesundheitspasses, den er unterwegs selbst noch einmal hatte bestätigen lassen. Erst am 6ten Oktober wurde es bekannt, dass in Bandol die Pest ausgebrochen sey, worauf sogleich Alles Nüthige und zwar mit dem besten Erfolge verfügt wurde. Cancellin selbst aber starb am 11ten Oktober, ohne dass sein Tod weiter bemerkt wurde. Als aber am 17ten Oktober auch Cancellin's Tochter starb, ärmerte ein Nachbar den Verdacht, dass Cancellin, wie sich aus der Gegenwart seiner Barke in Bandol schließen lasse, dazwischen gewesen und sein und seiner Tochter Tod durch die Pest verursacht worden seyn möchte. Indessen längneten die Aerzte, welchen die Untersuchung der Leiche der Tochter aufgetragen wurde, wiederholt, dass diese an der Pest gestorben sey, und erst eine dritte Commission, welche genauer zu Werke ging, erklärte den Fall für verächtlich, worauf sogleich alle im Hause gerade gegenwärtigen Personen, Nachbarn, Freunde und Verwandte der Verstorbenen abgesperrt und bald darauf in das Hospital St. Roch gebracht wurden, wo erst am 25ten Tage zwei Kinder und später noch fünf andere Personen aus der Familie Cancellin's starben. Bald darauf (vom 3ten December an) kamen noch einige Pestfälle unter den Erben einer angeblich am Schlagfluss gestorbenen Wittwe vor. Durch baldige Isolirung dieser Kranken gelang es auch jetzt noch, das drohende Unheil abzuwenden. Auf's Neue überliess man sich den frohesten Hoffnungen, als plötzlich (Ende December) das Uebel in einer Verbreitung und auf so vielen Punkten zugleich ausbrach, dass seine nachmalige Unterdrückung geradezu unmöglich wurde.

Diesmal wurde der Zunder des Verderbens, der nur zu bald zur ungeheuren, Alles verheerenden Flamma aufloderte, aus dem benachbarten Aix, wo die Behörden, obgleich bereits die Pest in der Stadt herrschte, fortfuhren, Gesundheitspässe auszustellen, in das unglückliche Toulon geschleudert. —



[1721.]

Ein gewisser Gras<sup>1)</sup> bemerkte, dass es in der Stadt an großen wollenen Tüchern fehle. Er gab vor, dergleichen in Signe, einem kleinen Flecken, 4 Meilen von Toulon gelegen, wo man solche Zeuge verfertigte, kaufen zu wollen. Er gesellte sich einem Mauleschreiber aus demselben Orte zu, mit welchem er von Signe nach Aix reiste, und kaufte dazwischen vier Ballen von diesem Zeuge, die er in der Nacht in eine nicht weit von Signe entfernte Scheune bringen liess; unter dem Schutze seines Passes kehrte er wieder in den Flecken zurück. Dort liess er sich einen neuen Zettel für sich und den Mauleschreiber geben, in welchem bezeugt wurde, dass er von Signe, wo Alles gesund sey, (welches pünktlich wahr war), mit zwei Mauleseln abreise, die mit vier Ballen dort verarbeiteter Wolle beladen seyen.

Gras kam mit seiner Waare am 10ten Januar in Toulon an und hatte bereits nach zwei Tagen seinen ganzen Vorrath verkauft. Am 17ten starb seine Tochter mit den maxweidrigsten Symptomen, Gras selbst begab sich in ein Landhaus, wo er vor seinem nach 5 Tagen ebenfalls erfolgenden Tode sein Verbrechen gestand. Zum Theil hatte er jene Waaren in Toulon verkauft, zum Theil nach Saine, Auriol, Sanlieu und andere Orte versendet, welche nur zu bald Toulon's Schicksal theilten<sup>2)</sup>. Aber es war zu spät! Die Seuche hatte sich bereits in einer Allgemeinheit verbreitet, dass es unmöglich wurde, die bereits hell lodernde Flamme noch einmal zu ersticken. Trotz der strengsten Absperrung der Kranken, trotz der eifrigsten Sorge für die Verhütung von Unordnung, Mangel und Gesetzlosigkeit offenbarten sich gar bald alle die Schrecken, deren nähere Schilderung nur eine Wiederholung von Scenen seyn würde, die wir in dieser Schrift schon so oft beleuchtet haben. Man untersagte alle öffentlichen Zusammenkünfte, man verschloss selbst die Kirchen; — die Post drang mit einem Kar-

1) Anders nennen denselben Grassé.

2) Bresl. Samml. Verh. 32. 8. 224.

ren Leinwand, den man zum Verband der Kranken aus angeblich gesunden Häusern gesammelt hatte, selbst in das Rathhaus, und raffte das sämmtliche Behördenpersonal, Antrethaus ausgenommen, hinweg. Hunderte von Galeerensclaven erlitten ihre Freiheit für den gefährlichen Preis, als Leichenbestatter zu dienen, hundert Andere ihres Gleichen ersetzten ihren Verlust, um bald ihr Schicksal zu theilen. Vor Allem war der Untergang der meisten Aerzte und Wundärzte schmerzlich, und die Noth zwang selbst hier zu dem Versuche, befreiten Galeerensclaven die Pflege der Kranken zu überlassen. Einer von diesen erwarb sich bald durch seine grosse Geschicklichkeit vielen Ruhm und nicht geringes Verdienst. Erst im Juni 1721 wurden die Aerzte Meane und Bailly von Paris nach Toulon geschickt und denselben sehr bedeutende Gehalte zugesichert. Indessen wüthete die Krankheit wie kaum je anderswo, und zu Ende April betrug die tägliche Todtenzahl über 300. Erst als man am 10ten Mai die strenge Sperrung der angesteckten Häuser aufhob, und den Einwohnern selbst die Sorge für ihre Sicherheit überliess, liess das Uebel nach; vielleicht eben so sehr, weil es ihm in der entvölkerten Stadt an Opfern zu fehlen anfing, als in Folge dieser Massregel, die noch niemals günstige Erfolge gehabt hat, wo ihr nicht regelmässig eingerichtete Besuchsanstalten zu Hilfe kamen. Erst mit dem 18ten August hörte die Seuche auf; der letzte Todesfall aber betraf noch am 8ten September einen Herrn de Bonnegrace, welcher sich zu eilig einer ihm zugefallenen Erbschaft versicherte.

Toulon hatte vor dem Ausbruche der Pest, im September 1720, ohne die Marine und Garnison, 26,276 Einwohner, die Zahl der an der Pest Gestorbenen betrug nach den Todtenlisten 13,283. Da indes eine Zählung der Einwohner nach der Pest nur die Summe von 10,493 ergab, so musste der Menschenverlust als über 16,000 betragend angenommen werden. Indes ist nicht zu vergessen, dass manche Flüchtlinge nicht wieder zurückkehrten. — In die Klöster war die Pest dorthin nicht eingedrungen. — Die Zahl der Städte und Ortschaften, in

[1722]

welchen die Pest geherrscht hatte, betrug überhaupt 63 1/2. — Als aber zu Marseille im April 1722 die Pest von Neuem ausbrach, hatte es Toulon nur der strengsten Absperrung seines Gebiets zu danken, dass das kaum überstandene Unheil nicht wiederkehrte, welches die unverantwortliche Sorglosigkeit der Aerzte der Nachbarstadt auch jetzt wieder verkannte 1).

Wenig fehle, dass die Pest von Toulon aus nicht auch nach Amerika durch zwei dahin bestimmte Schiffe gelangt wäre, auf welchen bereits 150 Personen gestorben waren, deren Tod man dem Scharlat zuschrieb. Glücklicherweise wurden sie noch zu rechter Zeit verhindert, die Anker zu lichten 2). Eine Nachricht behauptet zwar die Verschleppung der Pest nach Cusco in Peru durch ein Marzeiller Schiff, ohne sich indess über die Eigentümlichkeiten der Krankheit näher auszulassen 3).

Ferner darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass neben der Pest zu Marseille und Toulon die Blattern herrschten, woraus die Irigkeit der Annahme hervorgeht, welche beide Krankheiten als sich einander ausschliessend betrachtet.

### 1722. Marseille.

Noch einmal sollte das unglückliche Marseille aus einer Sicherheit aufgeschreckt werden, der es sich schon seit lange glaubte überlassen zu dürfen. Die Pest war eigentlich seit ihrem ersten Ausbruche noch nie ganz verschwunden gewesen; aber vereinzelte Erkrankungen und Todesfälle wurden fast nicht geachtet, wo man die ganze Wuth des entfesselten Unge-  
 thüms kennen gelernt hatte. Diese Sicherheit sollte Marseille von Neuem an den Rand des Verderbens heingen. Im April 1722 mehrten sich die verdächtigen Erkrankungen; die Aerzte erklärten dieselben von Neuem für von der Pest verschiedene

1) Sie sind bei Antrechaux, S. 167 der deutschen Uebersetzung, namentlich verzeichnet.

2) S. oben S. 225.

3) Boiss. Savent. Vers. 14. S. 521.

4) Das., V, 17, S. 251. — V, 18, S. 466.



Krankheiten) ein Urtheil, welches vielleicht nicht sowohl aus einer wirklich gänzlich merklichen Verblendung, als aus Rücksichten für die Ruhe der Einwohner hervorging. Nichtsdestoweniger griff die Pest von Neuem um sich, die Behörden stellten keine Gesundheitsplätze mehr auf, viele Einwohner verliessen die Stadt, und diese selbst wurde mit einem Cordon umgeben. Glücklicherweise gelang es indess, durch strenge Massregeln die Seuche so zu beschränken, dass die durch sie verursachte Sterblichkeit die Zahl von 100 Personen wenig überstieg, und im November endlich konnte nicht allein Marseille, sondern auch ganz Frankreich als gänzlich von der Pest frei erklärt werden. Die letzten Fälle kamen in dem besonders hart betroffenen Avignon und Mende vor<sup>1)</sup>. —

Ozanam gibt den durch die Pest vom Juli 1720 bis zu Ende August 1721 in der Provence verursachten Menschenverlust auf 84,719 an.

Wenn wir aber nach den Resultaten fragen, welche die Beobachtung so ungeheurer Verheerungen für die Wissenschaft hatten, so werden dieselben fast gänzlich vermisst. Wenigstens war dies in Bezug auf die Nosologie der Krankheit der Fall. Denn wenn auch in dem eigentlich längst abgehandelten Streite über die Contagiosität die Verfechter der letzteren zuletzt den Sieg davon trugen, und wenn das sanitätspolizeiliche Interesse dadurch sehr gewann, so blieb die Therapie desto vernachlässigter, und Theriak, Diacordium u. s. w., namentlich der berühmte *Fisavigre* der *jeune école* spielten noch immer eine Rolle, deren sie längst nicht mehr würdig hätten gehalten werden sollen. — Nichtsdestoweniger war es diese provençalische Pest, welche Patrik Russel's und Muratori's klassische Schriften hervorrief, deren Verdienste indess schon von Lörinser ausführlich gewürdigt worden sind<sup>2)</sup>.

1) Boel. Nömmel. I. vers. 22. S. 304.

2) Lörinker, *de Pest des Orientis*. S. 82 ff.

Verzeichniß der wichtigsten Schriften über  
die Pest der Jahre 1700—1714; — 1720—1722.

Sthaar, Joh. Bern., *De peste Polonica. — Act. erudit.*  
*Lips. ann. 1710. p. 215. seq.*

Grassius, Sam., *Historia compendiosa pestis in confinia*  
*Silesiae graecantis anno 1710. — Eph. N. C. Cent. I. et*  
*II. opp. p. 107. seq.*

de Helwich, Christ., *De peste aspera Rosenbergensi. —*  
*Ibid. Cent. I. et II. p. 202. seq.*

Lauterbach, Sam. Fried., *Kleine Fränkstädtliche Pest-*  
*Chronika, oder kurze Erzählung Alles dessen, was sich*  
*bei wehrender Contagiosa ereignet.* Leipz. 1710. 8.

† Wiel, Joh. Balth., *Von der Thomischen Pest 1708.*  
*— † —*

Kanold, Joh., *Einiger Medicorum Sendschreiben von der*  
*α. 1708 in Preussen und α. 1709 in Danzig grassireten*  
*Pestilenz u. s. w., nebst einem Anhang; Von der α.*  
*1708 zu Rosenberg im Schlesien, und α. 1709 zu Fran-*  
*stadt in Polden esidireten Pestilenz u. s. w.* 2. Ausg.  
Bresl. 1713. 4. — Hauptquelle, —

Stückel, Manasse, *Anmerkungen, welche bei der Pest,*  
*die α. 1709 in Danzig grassirt, beobachtet.* Hamb. 1710. 4.

Schelwig, Sam., *Denkmal der Pestilenz, womit der ge-*  
*rechte Gott — im Jahre 1709 die Stadt Danzig hein-*  
*geschickt hat.* Danzig. o. J. 8.

Weickhmann, Joach., *Theologischer und ausführlicher*  
*Unterricht von der Pestilenz (zu Danzig) u. s. w.*  
Zerbst, 1711. 8.

Erndl, Christ. Henr., *Febris pestilentialis in aula regia*  
*Polonica anno 1710 et 1711 graecari deprehenae histo-*  
*rica relatio. — Eph. N. C. Cent. V. p. 247. seq.*

Waldschmidt, Christ., *De singularibus quibusdam pestis*  
*Asiaticae.* Kd. 1721. 4. (S. nach Haller, *Dis-*  
*sect. Pract. Vol. V. p. 547. seq.*) Eine nicht allein für die

Geschichte der Pest in Holstein im Jahre 1711 wichtige, sondern auch sonst sich sehr vorthailhaft auszeichnende Dissertation.

Büttcher, Joh. Gottl., *Marborum malignarum, imprimis pestis et pestilentiae brevis et genuina explicatio, — cui pestis per sex menses Hagginae iustitiae brevissima et vera historica descriptio hinc inde est adjecta.* Hamburg. 1713. 8.

Köleser de Keres-Eer, Sam., *Pestis Dacicae anni 1709 scrutinium et cura.* Claudi, 1709. 12.

de Palma, Baro de Heintema, J. J. W., *Iconologia sive historiae constitutionis pestilentiae annis 1708 — 1713 per Thraciam, Sarmatiam, Poloniam, Silegium, Daciam, Hungariam, Livoniam, Duxiam, Saccinam, Saxoniæ, inferiorem Austriam etc. grauitas.* Viena. 1711. 8.

Werloschnig a Perenberg, J. Bapt., et Loigk, Ant., *Historia pestis, quae ab anno 1708 ad annum 1713 Transylvaniam, Hungariam, Austriam, Pragam et Ratibonem aliasque conterminas provincias depopulabatur etc.* Styr. 1715. 8.

† Benza, Franc. Xav., *Historica relatio pestis Austriam et conterminas partes infestantis.* Viena. 1717. 8.

† Stockhammer, N., Gründliche und ausführliche Nachricht von der a. 1713 in Niederösterreich grassirenden ansteckenden Seuche. — † —

(Kirchhoff, Gottfr.), Vier Tractätlein von der ansteckenden Seuche, welche Anno 1713 In das Erzt-Hertzogthum Nieder-Oesterreich eingeschlichen. Hamb. 1714. 4. — Enthält eine Verordnung des niederösterreichischen Gesundheitsrathes (angeblich von Stockhammer) und drei populäre Pestschriften von Wiener Aerzten ohne besondern Werth. \*

† Pestbeschreibung und Infectiontsordnung, welche vormals in besondern Tractaten herausgegeben, nunmehr in ein Werk zusammengetragen, sammt der anno



1713 zu Wien in Oesterreich fargewesten Contagion, mit den dagegen gemachten und beschriebenen Veran-  
staltungen. Wien, 1763. Fol.

Ramazzini, Bern., *De peste Vicavensi dissertatio.* — Opp.  
ana. Genev. 1716. 4. p. 801. reg.

Schamsky, Alex., *Fresch in der Noth, oder kurtzer und  
gründlicher Unterricht, wie Jeder bei jetzt grassirenden  
Seuchen sein eigener Medicus seyn solle.* Prag, 1713. 8.

† Dieterich, G. Nic., *Gewisse Untersuchung der Seuche,  
welche zu Regensburg 1713 grassirte.* Regensb. 1714. 8.

† Alkofer, F. S., *Regenspurgisches Pest- und Bau-Denk-  
mal.* Regensb. 1714.

† Beringer, *de peste in genere et sui gravitate in specie.*  
*Herbipoli.* 1714. 2.

† Eggerdes, Alard. Maur., *Aphorismi, pestis causationem  
quaque curam, nec non infallibilem eam tam avertendi  
quam extinguendi methodum continentes.*

Eggerdes, A. M., *Neue unthaffte Iden und Abbildung der  
Pest.* A. d. Lat. von J. H. Jüngken. Frankf. 1715. 8.

Chicoyneau, Vernet, Daidier et Soulier, *Observations  
et reflexions touchant la nature, les évenemens et le  
traitement de la peste de Marseille et d'Aix.* Lyon,  
1712. 12.

† Chicoyneau, *Lettre pour prouver que la maladie de Mar-  
seille n'est point communicable.* Lyon, 1721. 12.

Chicoyneau, *Traité des causes des accidens, et de la cure  
de la peste, avec un recueil d'observations, et un détail  
circonstancié des précautions qu'on a prises pour subven-  
ir aux besoins des peuples affligés de cette maladie, ou  
pour la prévenir dans les lieux, qui en sont menacés.  
Fait et imprimé par ordre du Roy.* Paris, 1744. 4.

† Bertrand, *Relation historique corrigée de la peste de  
Marseille.* Cologne. 1721. (Par. 1722. Amsterd. 1779.)

- A (steuct) *Diss. de la peste de Provence.* — Auch lat. u. deutsch von Scheuchzer. Zürich, 1721. 4.
- † Deidier, A., *Oratio de natura pestis contagiosa.* Franc. in *hessum Consultationes et observationes medicinales.* T. III. Par. 1754. 12.
- † Astruc, *Diss. de la contagion de la peste.* Toulouse, 1721.
- † Postalossi, *Art de précaution contre la maladie contagieuse de Marseille etc.* Lyon, 1721. 12.
- Gavet de Rumilly, *Traité de la peste, ou conjectures physiques sur sa nature et ses causes.* Lyon, 1722. 8. (Leipz. Univibibl. — Völlig werthlos.)
- † Boucher, *Recueil des observations qui ont été faites sur la maladie de Marseille.* Straub. 1721. 8.
- † Pichari, *Journal abrégé de ce qui s'est passé en la ville de Marseille pendant la peste.* Tiré du *Memorial* de la chambre du conseil de l'Hotel de ville. 1721.
- d'Antrechean, *Relation de la peste dans la ville de Toulon qui affligée en 1721.* Par. 1756. 12. Ins Deutsche übers. von Adolph Freiherrn Knigge, mit einer Vorrede von Reimarus. Hamb. 1791. 8.
- † Couzier, *Diss. de la contagion de la peste.* Toulouse, 1721.
- † Manzuchelli, Car., *Memorie de Provedimenti ordinati dal supremo Magistrato della Sanità dello stato di Milano per difesa della publica salute durante il contagio nella Proenza, Linguadoca, e ne' vicini paesi negli anni 1720 e 1721.* Milano. 1722. 4.
- Kunold, Joh., *Einiger Marsilianischer Medicorum in französischer Sprache ausgefertigte und ins Teutsche übersetzte Sendschreiben von der Pest in Marsilien, u. s. w.* Leipz. 1721. 4.
- † Scheuchzer, Jac., *Leinographia Massiliensis, die in Marseille und Provence eingebrachte Pestaniche betreffend.* Zürich. 1721.
- † Maratori, Lod. Ant., *Li tre governi, politico, medico ed ecclesiastico utilissimi anzi necessari in tempo di Peste,*

[1721.]

*dati in luce nell'anno 1714 ed in questa terza edizione accresciuta col dettaglio della Peste che ultimamente ha devastato Marsiglia. Milano. 1721. 8. (3te Ausgabe. Die erste ist von Modena 1714; die neueste von Mailand 1832.)*

Russel, Patrik, *Treatise on the Plague. Lond. 1791. 4. Deutsch. Leipz. 1792.*

## Die Wechselfieber der Jahre 1734 und 1735.

Nach dieser Abschweifung knüpfen wir den Faden der chronologischen Betrachtung der Volkskrankheiten da an, wo wir ihn nach der Schilderung der Beobachtungen Wintringham's verliessen <sup>1)</sup>.

Noch immer finden wir in dieser Zeit die Wechselfieber an der Spitze und als die gemeinsame Grundlage der Volkskrankheiten, selbst an Orten, welche sonst durch ihre Immunität gegen diese, gewöhnlich lokalen Einflüsse zugeschriebenen Uebel bekannt sind. Aber eben so klar heben sich auch die Uebergänge und Verbindungen derselben mit der ungewöhnlich grossen Zahl der typhösen Krankheitsformen hervor, welchen wir in dieser Zeit nicht allein auf dem alten, sondern auch auf dem neuen Continent begegnen.

Ganz besonders hatten von diesen Wechselfiebern die Kriegsheere, besonders die österreichischen zu leiden, weil ihre Thätigkeit sich öfter auf Schauplätzen bewegte, die von je durch ihre verderblichen Krankheiten berüchtigt waren. Eine vortreffliche Dissertation aus dieser Zeit gewährt ein höchst sprechendes Bild von diesen Zuständen der damaligen Kriegsheere. Der Verfasser, Kramer, österreichischer Feldarzt <sup>2)</sup>,

<sup>1)</sup> S. oben S. 316.

<sup>2)</sup> In einer andern, seines vorführenden Schrift nennt er sich „Kaiserl. Feldmedicus am Rhein“.



hebt vorzüglich die Beziehung des Scorluts zu jenen Wechsel-  
fiebern hervor, den er besonders in Ungarn, namentlich im  
Bannat und in Oberitalien beobachtete. Er hält jenes Ver-  
hältnis des Scorluts zu den Wechselnfebern für ein so inniges,  
dass er geradezu behauptet und es wiederholt hervorhebt, kein  
Soldat bekomme den Scorlut anders als nach einem Wechsel-  
fieber, sobald nur die übrigen, namentlich diätetischen Ur-  
sachen des ersteren sich ebenfalls vorfinden. Aus dem letztere-  
ren Grunde sey er vorzüglich unter böhmischen Regimentern,  
am wenigsten unter den deutschen gemein, weil jene fast nur  
von Hülsenfrüchten und Mehlspeisen lebten, während diese eine  
kräftigere Kost vorzögen.

Unter den vielen interessanten Angaben befindet sich auch  
eine in Bezug auf die Diagnose der Wechselnfeber, welche auf-  
fallend genug an eine neuere Behauptung von Kramers erin-  
nert<sup>1)</sup>. Kramer nämlich hörte alle Wechselnfeberkranke über  
einen innerlichen Rückenschmerz klagen, welcher schon  
vor dem Eintritt des Fiebers da war, während dieses wieder  
nicht früher wich als nach dem Verschwinden jenes Schmerzes.  
Kramers aber hält bekanntlich einen durch äussern Druck auf  
die Dornfortsätze an irgend einer Stelle der Wirbelsäule her-  
vorgegerufenen Schmerz für das pathognomonische Symptom der  
Wechselnfeber.

**1754 und 1755. Wechselnfeber am Rhein. — Molitor.  
— Ruhr, Lagerfieber. — Kramer.**

Am Rhein verbreiteten sich diese Wechselnfeber bei einer  
durch Regengüsse und Ueberschwemmungen charakterisirten  
Witterung vorzüglich unter den kaiserlichen und französischen  
Truppen, namentlich bei der Belagerung von Philippsburg<sup>2)</sup>.

1) Kramers, C., Beobachtungen und Untersuchungen über das Wechsel-  
fieber. Aachen u. Leipz. 1837. 8.

2) Vom 18ten Mai bis 15ten Juli. Die Belagerung endete mit der Uebergabe  
der Festung an die Franzosen unter Akerfeld. Die Veranlassung dieses durch die  
Schlacht bei Clousen besetzten kurzen Krieges gab bekanntlich Ludwig XV.

[1734.]

— Die hervorstechenden Krankheiten waren Durchfälle und Petechialfieber; ein bedeutender Theil der Truppen wurde nach Heidelberg verlegt, wo sich nun dieselben Uebel verbreiteten, und vom Herbst 1734 bis zum März 1735 fortwährten. — Diese Fieber begannen meistens unter der Form rheumatischer Zufälle, dann gab sich das Leiden der Respirations- und Darmschleimhaut durch Husten und Erbrechen kund, bis zuletzt heftige Schweisse, Delirien, Petechien und Zersetzungsriesel den ausgebildeten Typhus offenbarten.

In ähnlicher Weise litten die Truppen im J. 1735. Der Winter war von gehöriger Beschaffenheit, der Frühling vorzüglich schön gewesen, die Hundstage aber waren leicht und regnerisch. Die sich nun verbreitenden Tertianfieber ergriffen zuerst die Gemeinen, dann aber auch den Stab der französischen Truppen, vorzüglich das Regiment Schiv. Weniger und gelinder wurde das Civil befallen. So herrschten diese Fieber zu Speyer, Philippsburg und Frankenthal. Vorzüglich litten Stallknechte und Wäscherinnen, namentlich auf den Dörfern Mangelheim und Rotha. Ein Bataillon schätzte sich auf den Rath seines Chirurgen durch den Genuß von Weimathwein, und hatte, statt wie die übrigen 80—100, nur 8—10 Fieberkranke. Mehr noch befiel die China. Die Hauptsymptome waren, ausser leichtem Frost, Kopf- und Lendenschmerzen; ersteres war so heftig, dass die Kranken in den Paroxysmen die Besinnung verloren. Dem Lendenweh aber folgte häufig Paralyse, die man nicht von dem bei den Soldaten gewöhnlichen Gebrauche von Arsenikpillen ableiten konnte, da dieselbe auch da eintrat, wo jene Pillen nicht angewendet worden waren <sup>1)</sup>.

Plan, seinem Schützlingsknecht Stanislaus Lekziński, der polnischen Krone anzuverleihen. —

1) Der Gebrauch des Arséniks gegen Wechselfieber ist sehr alt. Paracelsus schon das Blei angewendet zu haben, und wenn er trotz vieler günstiger Erfahrungen bei den Ärzten in Verrath geriet, so beklagte sich das Volk über seinen Aberglauben. Vergl. Lichtenhan, die Krankheitslehre. Typogr. 8, 234. 5.

Bei Allen zeigte die Hornhaut eine safrangelbe Farbe, und der bedeutende Antheil des Lebersystems an den Krankheitserscheinungen gab sich noch mehr durch den als Narkkrankheit auftretenden Icterus zu erkennen. Befallene Schwangere abortiren sehr oft. Unter den Folgeaheln waren Oedeme und Ascites die häufigsten. Zum Theil vielleicht in Folge des unsinnigen Aderlassens der französischen Feldärzte. Bei Einigen folgte der Krankheit ein kräftiger Ausschlag. Phthisischen war das Fieber vorzüglich gefährlich, Syphilis aber wurde durch dasselbe nicht geheilt.

Kramer, dessen wir schon oben gedachten, nennt als die häufigsten Krankheiten die Ruhr und das Lagerfieber<sup>1)</sup>. So unbedeutend im Ganzen auch die Angaben seiner mehr populären Schrift sind, so geht aus ihnen doch der ächte und ausgebildete Charakter der Ruhr hervor. Unter den Narkkrankheiten derselben nennt er Oedeme und Hydrops. Therapeutisch verliess sich Kramer vorzüglich auf ein zeitig angewandtes Brechmittel, dann auf ölige und schleimige Mixturen, zuletzt auf linnere Mittel, namentlich die Simaruba. Drastica aber, Adstringentia und Narcotica verwirft er durchaus.

Die Lagerfieber befielen nach Kramer vorzüglich die der Schädlichkeiten des Kriegslebens ungewohnten neuen Regimenter. Unter vielen absoluten Mitteln wird das *Magisterium Bismuthi*, so wie eines *Pulvis antiperiodicus*, welches Zinnober enthält und von Kramer ein „göttliches *Reservat*“ genannt wird, als eines besonders heilsamen gedacht. Diarrhöe war häufig kritisch, sie hob „augenblicklich alle Delirien und andere böse Zufälle“. Im Anfang der Krankheit (in den ersten 24 Stunden) waren Brechmittel eben so hilfreich, als Purganzen schädlich<sup>2)</sup>. — Auch die französischen Truppen hatten

1) S. das Schriftenverzeichniss. — Kramer sagt, er sey auch in der Pest des Jahres 1712 thätig gewesen. — In seiner Schrift über den Scorbut nennt er als kircher gehörig: Mayer, *De febre typhana continua enterica*. Hildb. 1723.

2) Eine Diarrestalan Hilacher's, — *De morbo enterico epidemico ab ali-*



11734.]

von diesen Krankheiten, namentlich in den Cantonnements nach der Belagerung von Philippaburg viel zu leiden <sup>1)</sup>).

**1755. Wechselfieber im Eiderstädtischen. — Detharding; im Cremonesischen. — Valenrenghi.**

In demselben Jahre beobachtete Detharding im Eiderstädtischen (Westflriesland), einem am Meere gelegenen, vorzüglich aus Thonboden bestehenden sumpfigen Landstriche, Wechselfieber mit einem ausgebildeten typhösen Charakter; und ganz ähnlicher Art sind die bei Ozanam <sup>2)</sup> verzeichneten Angaben Valenrenghi's über einen in demselben Jahre im Cremonesischen herrschenden Typhus.

**1755. Petersburg. — Weithrecht.**

Zu Petersburg entwickelten sich die Petechialfieber in diesem Jahre, dessen Anfang stürmisch und heftig war, neben Masern, Scharlach, Blattern und Friesel. Der Typhus war nicht sehr verbreitet, und ergriff vorzüglich die niederen Volksklassen. Sehr häufig ging er nach der Genesung in anhaltende und langwierige Wechselfieber über, die sonst in Petersburg nicht vorkommen. Weithrecht gab niemals Brechmittel, dagegen stellte er oft mit Erfolg einen einmaligen Aderlaß an. China bekam sehr gut, Opium dagegen mußte mit großer Vorsicht gegeben werden.

**1755. Rinderpest, Angina maligna in Amerika.**

Es erhebt auf den ersten Blick, dass mit diesen Erscheinungen in Europa, die sich gewiss noch an sehr vielen Orten und vielleicht in noch gesteigerter Bösartigkeit fanden, ohne die Aufmerksamkeit der Aerzte verdienstlicher Mannen auf sich zu

*Ne revit a 1755 in centro ad Biberon et in circulo proximo, Jen. 1755. — Linn.*  
 ten wir nicht bewahren.

1) Ozanam, III, 451.

2) Das., 124.

ziehen, die zugleich bedeutenderen Epidemien der Rindorpest und der *Angina maligna* Amerika's in Verbindung standen, über welche Fuchs<sup>1)</sup>, Hecker<sup>2)</sup> und wir selbst<sup>3)</sup> uns bereits geäußert haben. Den Beobachtungen der amerikanischen Aerzte in dieser Epidemie verdanken wir vorzugsweise die genaue Kenntniss des Garotillo, der wenige Jahre später England mit eben so mörderischer Wuth verheerte<sup>4)</sup>.

Von ganz besonderem Werthe aber ist die Beschreibung, welche uns Degner über die im J. 1736 zu Nymwegen herrschende Ruhr hinterlassen hat. Derselbe scheint uns so sehr eine nähere Beachtung zu verdienen, als mit dem Erscheinen dieser berühmten Schrift für die Kenntniss der Ruhr eine neue Periode beginnt.

### Die Ruhrepidemie zu Nymwegen im Jahre 1736.

#### Degner.

Im April, Mai und Juni 1736 kamen zu Nymwegen bei Personen jedes Alters häufig Durchfälle mit Erbrechen und kramptzigen Symptomen vor, welche erst dann eine allgemeinere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen anfangen, als die Zahl der Kranken im Monat Juli eine ungewöhnliche Höhe erreichte, und zuletzt an der Anwesenheit einer sich entwickelnden Ruhrepidemie von besonderer Bösartigkeit nicht mehr gezweifelt werden konnte. Ganz offenbar spielte Ansteckung die vorzüglichste Rolle bei der Ausbreitung des ungebildeteren Uebels, und auf diese Weise wurde die Krankheit namentlich nach einem Jahrmärkte im September von der Stadt auf die bis dahin freien Dörfer der Umgegend, in einzelnen Fällen selbst noch noch entfernteren Orten verschleppt. Anfangs herrschte dieselbe mehr unter den niederen Volksklassen, später auch un-

1) Fuchs, Med. Univers. lib. leg. vol.

2) Hecker, Gesch. d. neuen Heilkunde, 8. 245. ff.

3) Med.-pathol. Univers. I. S. 389.

4) Bisher gehört eine uns unbekante Dissertation: Egger, *Uss. de angina maligna. Altdorf. 1722.*

[1736.]

ter den höheren Ständen. Vorzüglich auffallend aber war die gänzliche Immunität der Juden und zum Theil der Franzosen, von welchen Letzteren nur zwei erkrankten und starben. Die höchste Höhe ihrer Ausbreitung erreichte die Ruhr in der Mitte des September, und sie blieb auf derselben bis zum 26ten Oktober; fortwährend aber litten diejenigen Stadttheile am meisten, in welchen die ersten Krankheitsfälle vorgekommen waren. Der letzte Todesfall in der Stadt fiel auf den 23ten December; auf einem nahegelegenen Dorfe (Gent) starben noch in der Mitte Januars des folgenden Jahres einige Ruhrkranke. Bis zum Oktober 1737 aber kamen noch ruhrartige Durchfälle, die während der ganzen Epidemie nicht gefehlt hatten, häufig vor.

Dies sind die Umrisse der äusseren Geschichte des von Degner <sup>1)</sup> mit einem Sydenham's würdigen Schaulblicke verfolgten Uebels, welches die betroffene Stadt mit einer nur zu sehr gerechtfertigten Furcht erfüllte, und welches durch das Andenken an die grade 100 Jahre früher in Nymwegen herrschende Pest, welcher eine Ruhrpandemie vorausgegangen war, eine ganz besondere Furchtbarkeit erhielt.

Bei den einzelnen Kranken begann dasselbe, nachdem mehrere Tage lang Blähungsbeschwerden, leichtere Anfälle von Kolik, Stuhlverstopfung, oder sogleich Diarrhöe, bei welcher jene Symptome fehlten, ferner Appetitlosigkeit, Uebelkeit, Brechneigung und wirkliches Erbrechen, mit grosser Kraftlosigkeit, vorausgegangen waren, mit heftigen Magen- und Kolikschmerzen, deren häufiger, aber immer sparsamer werdender Abgang einer Anfangs gelblichen oder röthlichen, löcherförmigen, später grünnen, blutwasserähnlichen, zuletzt blutigen Flüssigkeit folgte. Diese war häufig mit Fragmenten der zerstörten Darmschleimhaut, mit kleinen drüsenartigen Körperchen, zuweilen selbst mit Fettpartikelchen vermischt <sup>2)</sup>. Es muss

1) OZZERI'S Ausage aus DEGNER'S Schrift ist von der Art, bei diesem Schriftsteller gewöhnlichen Ungenauigkeit und Dürftigkeit.

2) DEGNER, p. 15. „*Perori - tuberculis, spiculis - alveolatis tuncque interstitiis pilulis oblationes refractant.* — *Quibus corporalis carnis, carni-*



freilich zweifelhaft bleiben, in wie weit diese Angaben auf genauer Untersuchung der Abgänge beruhen, ob schon mehrere gute Beobachter (Siebert) dieselben Erscheinungen anführen. — Bei Manchen ging Alles Genossene nach kurzer Zeit unverändert durch den Stuhl wieder ab. — Die durch Erbrechen entleerten Stühle glichen ganz den Stuhlabgängen, mit Ausnahme des Umstandes, dass sie höchst selten mit Blut vermischt waren. — Meist war ein höchst übler, fauliger, cadaveröser Geruch zugegen; Manche wurden schon am 1ten bis 3ten Tage, die Meisten erst kurz vor dem Tode von Schindizen befallen, welches im ersten Falle auf die fast immer Statt findende Anwesenheit von Spalwürmern schließen liess, und deshalb Nichts Schlimmes bedeutete. Das Fieber war bald sehr bedeutend, bald fehlte es gänzlich, bemerkenswerth waren die häufigen Intermissionen oder auch das (scheinbar) gänzliche Fehlen des Pulses, der zuweilen einige Tage vor dem Tode wieder normal wurde.

Unter den übrigen Symptomen verdienen vorzüglich der unvollständige Durst, die Schlaflosigkeit, die gänzliche Harnverhaltung oder auch Strangurie, der unerträgliche Tenesmus hervorgehoben zu werden. Zuweilen hatte die Krankheit Vorfall des Mastdarms zur Folge. Aber vorzüglich verdient, wegen seiner hohen Bedeutung für die Erkenntnis des eigentlichen Charakters der Krankheit, der Umstand hervorgehoben zu werden, dass sich zu Ende derselben nicht selten ein Scharlach ähnlicher Ausschlag, zuweilen durch rothe in Eiterung übergehende Pusteln (= höchstwahrscheinlich ein der *Scarlatina miliaris* analoges Exanthem —) bildete \*).

*culas et quasi glandulas parent, et et integris singulis frequentius tantum inter-  
rumpit et mundissime intestinum abluunt, excrementa cruenta et purulenta  
intus deponunt, quae integra et subdita extrahunt. At haec praetermittenda  
quidem, et. gr. pinguis corpuscibus lardis velis oblique globosis curculio  
ejus fuisse cili.*"

1) „Purpura cutanea fuit mihi non raro conspicua; Barbae vero aspi-  
ribus accedebant; Alii pustulae rubrae in cute variegatae apparebant, quae in sup-  
puracionem abibant.“ — p. 37.

[1774.]

Ersteres Exanthema hatte kaum eine kritisch-prognostische Bedeutung; letzteres führte meist die Genesung herbei<sup>1)</sup>. Selten traten Aphken (mit absolut ungünstiger Prognose), noch seltener Schminhöpfen und Convulsionen hinzu; Delirien kamen nur bei Sterbenden und auch hier nur in sehr leichter Form vor. Bei einer vornehmen Jungfrau entstanden über den ganzen Körper Flecken und schwarze harte Tuberkeln, fast wie echte Pestkarbunkeln, die in tödlichen Sphacelus übergingen<sup>2)</sup>. Unter diesen Erscheinungen wurden die überaus capitären Darmabgänge häufig, und unter allen Erscheinungen der Erschöpfung starben die Kranken im Verlauf der ersten oder zweiten Woche, seltener schon am 3ten bis 4ten Tage.

Unter den prognostischen Bemerkungen Degner's sind besonders folgende auszuzeichnen. Die günstigste Prognose gab reichlicher, freiwillig oder in Folge der gebrachten Arzneien eintretender Abgang gelber oder grüner Galle, durch Erbrechen oder Stuhlgang. Diese Krise war zu jeder Zeit heilsam und von allen die wichtigste. Reichlicher Abgang reinen Blutes kam zwar nur bei sehr Wenigen vor, bildete aber ebenfalls eine sehr günstige Erscheinung und verminderte die Gefahr der Krankheit beträchtlich; sehr übel war dagegen Blahbrechen, noch schlimmer Erbrechen eiteriger Stoffe. Freiwillig eintretende Schweisse waren günstig, künstlich hervorgemessene viel weniger, um so mehr, als Schutzmittel, bei der beständigen Gefahr der Erkältung, nicht wohl verordnet werden konnten<sup>3)</sup>.

Unter den Kranken befanden sich Personen jedes Alters und Geschlechts, selbst Säuglinge, vorzüglich aber litt das weibliche Geschlecht, und zwar in so auffallend überwiegender Mehrzahl, dass Manche die Krankheit als „Weiberkrankheit“

1) Degner, p. 24.

2) Man konnte diesen Fall als Bestätigung der nur zu häufig gehegenen Farsch, dass der Peste wie im J. 1629 die Pest folgen werde,

3) p. 22—23.

bezeichneten<sup>1)</sup>. Schwängern und Kindbettcrinnen war dieselbe sehr gefährlich, obwohl bei ersteren nur selten Abortus eintrat, und bei letzteren nicht immer das Kind erkrankte.

Unter den Neckkrankheiten verdienen vor Allem die nach zwar überstandener, aber nicht durch gehörige Krisen beseitigter oder unpassend behandelter Krankheit eintretenden „Lencophlegmasien“ und Fussödeme Erwähnung, die übrigens bei passender Behandlung bald wieder verschwanden. In manchen Fällen blieben langwierige „Denterien“, Mastdarmgeschwüre zurück. Rückfälle waren sehr häufig und meistens tödtlich<sup>2)</sup>.

Während der Epidemie traten, mit Ausnahme einiger Fälle der Blattern und einfacher Diarrhöen, alle andern Krankheiten zurück.

Mit derselben Bescheidenheit und demselben Gefühl der Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse, welche die neueste Schrift über die Ruhr<sup>3)</sup> auszeichnen, und welche als wahre Kennzeichen des wirklich talentreichen Arztes betrachtet werden müssen, gesteht Degner seine Unwissenheit in Bezug auf die letzte Ursache und das Wesen des von ihm so meisterhaft beschriebenen Uebels. Weitläufig zeigt er, dass keiner von all den unzähligen Einflüssen, welchen Unwissenheit, Einseitigkeit, Vorurtheil und Aberglaube die Entstehung epidemischer Krankheiten zuschreiben gezeigt ist, mit Grund habe beschuldigt werden können, trefflich spricht er sich über die Schwierigkeiten der Auffindung eines der jedesmaligen Natur der Krankheit, welche in jeder Epidemie eine andere ist, entsprechenden Heilverfahrens aus, und bezeichnet es als die höchste Aufgabe des Arztes, der Natur selbst die passendste Behandlungsweise abzulesen<sup>4)</sup>.

1) p. 25—27.

2) p. 28.

3) Die in Schriftenverzeichniss genannte Schrift Siebert's.

4) Unter vielen Stellen von ähnl. „Ita et, gr. alter vomitibus, purgatione, refrigeratione movetur, alter quoniam maxime dormit, his aliptores recipit, alter perlegit; hic adstrigentes, huiusmodi et corroborare commendat, alter regit; hic



[1846.]

Degner glaubte, der von ihm beobachteten Bahrepidemie einen galligen Charakter zuschreiben zu müssen und wachte diese Ansicht durch alle ihm in dieser Hinsicht zu Gebote stehenden Gründe nach dem Geschmacke der damaligen Zeit zu beweisen. Weiter unten werden wir selbst untersuchen, in wie weit diese Meinung richtig war; hier nur so viel, dass die auf sie gestützte Behandlung Degner's die beste war, die er nach dem damaligen Stande der Lehre von der Ruhr, (von der der gegenwärtige nicht so sehr verschieden ist, als es Vielen scheinen möchte), in Anwendung ziehen konnte. Er begann die Behandlung bei allen Kranken ohne Unterschied mit einem Brechmittel aus Ipecacuanha in Pulverform, welche letztere er theils aus Rücksicht auf die grössere Schnelligkeit der pharmaceutischen Bereitung, theils der grösseren Genossigkeit der Gabe wegen, theils um die adstringirende Wirkung des Dekokts zu vermeiden, wählte. Durch das Erbrechen wurde die Krankheit entweder gleich völlig abgeschnitten, oder doch in ihrem Verlaufe viel gelinder. Häufig musste es 2 bis 3mal wiederholt werden. Bei gehöriger Indication leistete die Ipecacuanha selbst noch in vorgerückten Zeiträumen die herrlichsten Dienste, indem sie viel Galle entleerte und dem Durchfall, sobald er noch nicht colliquativ war und von „Fluoribus“ herrührte, in wenigen Tagen ein Ende machte. Der Ipecacuanha liess Degner das Rheum (*Tinctura Rhei Raffinätis s. oxina Rhei*) folgen, „um die Galle völlig zu entleeren“, wobei indess die Ruhrdurchfälle sich constant verminderten, obschon Degner die genannte Tinctur zu  $\frac{1}{2}$  — 1 Esslöffel nehmen liess. In solchen Fällen, wo bei dieser Behandlung die Durchfälle noch fortäuerten,

*apertis tumens et angustata virtutes trahit, alter nihil nisi parum illis confert; alius nil nisi apertum corpus, alius unum unumque specifice virtutum negat; alius ex gr. equum frigidum mortis, alius vitas eorum docet; et si quis alius scripturam sua ostendit libi exstiterit, quae hanc omnia rursus erat et tunc hanc habere putat, damna etiam exstiterit morbi genus quaque omnia prius certe exploravit.* (Degner, p. 88.) Würde wohl Degner es für möglich gehalten haben, dass die Ärzte nach hundert Jahren den so weit gekommen seyn würden! —

namentlich bei rein oder vorwiegend blutiger Beschaffenheit der Stühle, gab Degner die oben damals bekannt werdende Simulacra mit dem besten Erfolg; zuweilen die Crocaturille und das Catechu. Der übrige Theil der Therapie wurde nach symptomatischen Indicationen eingeleitet, und deshalb durch Oleron, Macilaginosa, (vorzüglich die damals noch wenig bekannte „Baldix Salab“) Anodyna u. s. w. ausgeführt. Zum Getränk eignete sich abgekochtes Wasser, Bruchwasser oder Molken am besten. — Noch mag erwähnt werden, dass die Nymweger Aerzte in der Ruhrépidemie von 1762, wie aus dem noch vorhandenen Recepten in den Apotheken hervorging, unter Andern auch Rheum mit Jalappe, *Mercurius dulcis* und etwas Opium gegeben hatten; indem Siebert besonders auf den unendlichen Werth des ohne weiteren medicinischen Zusatz gereichten Calomel in der erysipelatösen Ruhr aufmerksam gemacht hat.

Es ist sehr zu beklagen, dass Degner Nichts über den Leichenbefund der an der Ruhr Verstorbenen mittheilt, obschon aus einer Stelle hervorgeht, dass er Sectionen angestellt habe <sup>1)</sup>. Eben so muss das Fehlen einer Mortalitätstabelle als ein wichtiger Mangel bezeichnet werden, da diese den einzigen Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Wirksamkeit der von Degner eingeleiteten Behandlung gewähren würde, um so mehr, als dieser Arzt die meisten Kranken hatte, wie theils aus seinen eigenen Angaben, theils daraus hervorgeht, dass ihn die Stadt Nymwegen wegen seiner während der Epidemie geleisteten ausgezeichneten Dienste zu ihrem *medicus ordinarius* ernannte.

Kaum bedarf es wohl der näheren Nachweisung des erysipelatösen Charakters dieser Ruhrépidemie, mit welcher der Zusammenhang derselben mit den übrigen Ereignissen auf dem Gebiete der Volkskrankheiten dieser Periode sich von selbst darstellt. Vor Allem spricht für einen solchen Charakter die ausgebildete Tendenz der Natur zur Erzeugung peripherisch-

1) „*Quare, qui hoc morbum curaverunt, ex intrinsecis quædam et quædam extrinsecis. Hæc non solum palam delictis — — — sed et vultu anatomico in defunctis demonstrantur.* — Degner, p. 176.

[1722.]

kritischer Rothlaufformen, namentlich Scharlach- und vorzüglich Scharlachfriesel-artiger Exantheme. Man könnte gegen eine solche Deutung dieser Erscheinung einwenden, dass bei Weitem nicht in allen Fällen sich die Krankheit mit dem Auftreten dieser Exantheme entschleden habe, wenn es nicht bekannt wäre, dass mit dergleichen peripherischen Krisen allein die Genesung nicht gegeben ist, sondern dass die örtlichen Krisen, auf welche Degner so wenig wie die übrigen Nymneger Aerzte aufmerksam gewesen zu seyn scheint, die Hauptsache bilden, und dass statt dieser in den meisten Fällen sich Brand oder Geschwüre im Dickdarm erzeugten, wie es bei der im Ganzen auch ziemlich richtigen Indicationen eingeleiteten, aber leider durch erhitze, reizende und adstringirende Mittel ausgeführten Behandlung Degner's nothwendig der Fall seyn musste. — Außerdem spricht noch eine als Nachkrankheit auftretende Erscheinung für die bezeichnete erysipelatöse Natur des Lebel; — die bei Vernachlässigung und unpassender Behandlung auftretenden Leukophlegmasen und Erysipelen. Ferner nach das gleichzeitige Vorkommen einzelner Variolen-Kranker, während sonst alle übrigen Krankheiten zurücktraten.

### 1757. Breslau. Petechialfieber. — Pauli.

In dieselbe Zeit fällt die von Pauli <sup>1)</sup> kurz beschriebene Epidemie einer „*Febris petechialis*“ zu Breslau; Pauli führt an, dass derselben im J. 1726 überall bedeutende Ueberschwemmungen und eine allgemeine Theuerung vorausgegangen sey. Schwach zählt diese Epidemie zu den Influenzen, und er würde sich in dieser Meinung vielleicht noch haben bestärken lassen, wenn ihm bekannt gewesen wäre, wie ein allerdings ähnliches Lebel nach Fischer <sup>2)</sup> zuerst in Moskau herrschte, dann den 16ten, 17ten und 18ten März zu Petersburg, den 21sten zu Kronstadt und den 27sten zu Wiburg ausbrach, und am er-

1) *Acta medic. curios.* Vol. I, abt. 66, p. 248.

2) Fischer, Littenländisches Landwirthschaftsmach. 3, 352 E.



sten Orte bis zum 7ten, am zweiten bis zum 15ten, am dritten bis zu Ende April dauerte. Leider fehlen nähere Nachrichten, aus denen sich bestimmen lassen könnte, ob dieses so kurze Uebel wirklich als lokale Influenza (= da Nachrichten von andern Punkten her fehlen —) angesehen werden mus. — Pauli's Krankheit war offenbar mehr als gewöhnliche Grippe. Sie charakterisirte sich durch außerordentliche Abgeschlagenheit, vorzüglich der Glieder, Schwäche des Kopfes, Schnupfen, Husten, rheumatische Schmerzen in verschiedenen Körpertheilen, denen dann leichter Schauer, Hitze, ein spannender und stechender Schmerz in der Herzgegend, im Rücken, muskeln auch in der Gegend der Zäune, mit Ekel und schleimigem oder galligem Erbrechen folgte. Später stellten sich Delirien, leichte Schürisse und bei nicht gehörig vorrückender Krise Zittern der Lippen, Schluckzen, Ohnmachten, Krämpfe ein, unter denen, wenn sich keine gehörige Krise bildete, am 9 — 11 Tage der Tod eintrat. Kritisch aber waren vor Allem Schweiß, häufig, elischen nicht immer, Friesel („*Purpura rubra et alba*“). Die Krankheit ergriff vorzüglich Erwachsene beiderlei Geschlecht; bei Kindern verlief sie binnen 3 — 5 Tagen sehr leicht. Die Hervorrufung der peripherischen Krisen nahm bei der Behandlung die vorzüglichste Rücksicht in Anspruch; Aderlässe und Purganzen waren nachtheilig \*).

Gleichzeitig (im Jan. und Febr. 1737) verwüstete ein Typhus das Dorf Sannoy und das ganze Thal von Montmorency, ausgezeichnet durch seine Wurmcomplication, welche in der Behandlung die erste Rücksicht erforderte \*).

#### 1740 — 1741. Petechialfieber, Lagertyphus, Ruhr in Hessen. — Ritter, Fürstenuu.

Zahlreiche Nachrichten gedehken für die folgenden Jahre künlicher, zum Theil auf die höchste Höhe ihrer Bösartigkeit

1) Oranien erwähnt noch einer Epidemie zu Neßau in Schlesien nach den Berichten Hall's, über dessen Schicksal er keine nähere Auskunft gibt.

2) Oranien I., 211. ohne Angabe der Quelle.

[1746.]

gesteigter Fieber, namentlich unter den Heeren, welche der siebenjährigen Krieg über Deutschland dahinführte, in dessen Geleite ausser der gewöhnlichen Noth nach Verderbniß des Getreides und Kriebelkrankheit sich gesellten<sup>1)</sup>. Kurz sind Ritter's Angaben über eine räumlich wenig ausgedehnte Epidemie im Hessischen. — Heftiger zeigte sich die im März bis Juni des Jahres 1741 zu Rinteln und der Umgegend herrschende und von Fürstenau beschriebene Epidemie, welche zuerst die Soldaten der Garnison, dann aber auch die Studierenden ergriff und die Meisten der Befallenen tödtete. Delirirende starben sicher, von Petechien Befallene fast immer; Schweißmittel leisteten noch die meisten Dienste, Drastika aber waren höchst nachtheilig.

Diesen Fiebern folgte im Oktober und November 1741 die Ruhr, als deren Ursache man die fast beispiellose Kälte des Winters 1742 und die Ueberschweamungen des ihm folgenden Frühlings betrachtete. Auch bei dieser Ruhr starben die Meisten der Erkrankten, und vergeblich verschwendeten die Behörden Belehrungen und Sorgfalt jeder Art an das in fatalistische Indolenz versunkene Volk. Bei Kindern beobachtete Fürstenau sehr häufig Wurmconglomeration, als Narkkrankheiten „Arthritis“, Oedeme und Wassersuchten. Der Ruhr endlich folgte im J. 1742 eine epidemische „Pleuritis“ welche vorzüglich die früher von der Ruhr Befallenen ergriff.

#### 1740. Typhus im Rösshild'schen. — Schauer.

Ungleich werthvoller sind Schauer's Angaben über die Verbreitung ähnlicher Krankheiten, namentlich der typhösen Fieber im Rösshild'schen, vom December 1740 — August 1741. Dieselben ergrieffen vorzüglich die ärmere Volksklasse, und verliefen unter pleuritischen, anginösen, dysenterischen Zufällen, mit heftigem Erbrechen, grosser Angst, Delirien, Convulsionen. Vielleicht muss es auf die grössere Intensität der

<sup>1)</sup> Becker, Gesch. der anat. Heilk. 8, 210 ff.

Krankheit bezogen werden, dass bei Kindern „Morbillen“, bei Erwachsenen „Blattern“ ausbrachen, welche in Eiterung übergingen und sich eitrig abschuppten. Bei Andern erzeugten sich unter heftigen Schweißen und grosser Angst, „Friesel“ und Pötechien, eine Angabe, aus der man in Verbindung mit der über die vorzügliche Wichtigkeit der Umrüstung, auf eine nähere Verbindung der Krankheit mit dem in dieser Zeit so häufigen Friesel schliessen könnte, wenn die Verwechselung dieses Exanthems mit dem Zerstreuung-Friesel im Typus nicht so häufig wäre. Schauer bringt die Krankheit etiologisch mit dem kalten Winter von 1739, so wie mit den ungeheuren, seit Menschengedenken nicht beobachteten Nebeln des Herbstes 1740 in Verbindung. Weit zufälliger, obwohl von ähnlichen Beispielen nicht entblösst, ist die Entstehung und Verbreitung der Krankheit mitten in der eiqen Kälte des Winters von 1747. Die Behandlung Schauer's entspricht den geläutertsten Grundsätzen der damaligen Zeit. — Auch zu Jena herrschte in derselben Zeit eine *Præparæ maligna*, bei welcher häufig tödtliche Wüthet abgingen.

#### 1741. Lagertyphus in Schlesien. — Brandhorst.

Unter den unzähligen Bedrängnissen des ersten schlesischen Feldzugs, welcher in dem kaiserlich feindlichen Frühling von 1741 in einem von der Oder meilenweit überschwemmten Lande begann, spielten diese Lagerkrankheiten gewiss nicht die unbedeutendste Rolle. Der Frühling 1741 war so kalt, dass noch am 10ten April, dem Tage der Schlacht bei Mollwitz, Schnee lag. Dazu kam der übermässige Genuss des ungarischen und böhmischen Weins, den sich die Soldaten erlaubten, und gewiss auch die zügellose Unzucht im preussischen Heere, welches ganze Scharen von Weibern mit sich führte, über welche Brandhorst<sup>1)</sup> klagt. Die Weiber wurden nicht gelinder vom

1) S. L. Schöllerseri. — Brandhorst war preussischer Feldarzt und später im Hospitale von Kattinberg angestellt.



[1742]

Typhus befallen. Derselbe heilte übrigens die Syphilis in allen ihren Formen. — Dieselben Krankheiten herrschten, selbst früher als im preussischen Lager, unter den Oesterreichern.

#### 1742. Lagertyphus zu Prag. — Serinici und Bache.

So furchtbar aber auch je in einem Kriegsheere der Typhus gewüthet haben mag, die schrecklichsten Verheerungen verschwinden vor der Niederlage, die weniger er, als der Unsinn und die Verblendung der französischen Militärärzte im J. 1742 zu Prag anrichteten, eine Niederlage, die in der Geschichte ihres Gleichen nicht hat. So lehrreich es in vieler Hinsicht um die Bildung der deutschen Feldärzte noch in dieser Zeit beschaffen seyn mochte<sup>1)</sup>, so kann sie doch mit der bedenklichen Unwissenheit der französischen auch nicht im Geringsten verglichen werden, welcher in der genannten Epidemie mehr als dreissigtausend Typhuskranke erlagen, die nicht gerechnet, welche auf andern Punkten Böhmens ankamen. Der Tod Kaiser Karl's VI., des letzten männlichen Sprösslings aus dem erlauchten Stamme der Habsburger, veranlasste unser König August von Polen, Philipp V. von Spanien, vorzüglich den Churfürst Carl Albert von Bayern, seine Ansprüche auf die Krone von Böhmen, Maria Theresia, der Erbin des Verstorbenen, gegenüber, geltend zu machen, und vorzüglich durch französische Hilfe gelang es ihm, sich im December Prag's zu bemächtigen. —

Schon vor der Ankunft der Franzosen hatten nach Serinici und Bache zu Prag Petechial- und Frisselfieber geherrscht<sup>2)</sup>,

1) In der preussischen, auch in dieser Hinsicht auch am besten eingerichteten Armee hätten damals die Feldärzte ungefähr gleichen Rang mit den — Truppenchirurgen. Wenn ihnen einer der berühmten Giganten-Grenadiere stach, so bekamen sie — Pechel. (Kek, Rede am Stichtage des Friedrich-Wilhelm-Instituts für Militärärzte, 1848.)

2) Thierry, *med. experim.* p. 324, und Sauvages (*anal. meth.* T. 433.) erwähnen bereits im J. 1718 für Prag einen höchst hässlichen „*Pyauquus pyrenalis*“, welcher nur von einem Arzte mit Erfolg glücklich behandelt wurde.

diese kritischen Exantheme aber zeigten sich aus leicht einzusehenden Gründen bei Keinem der erkrankten Franzosen. Diese kamen ausgehungert zu Prag an, für lange Entbehrungen entschädigten sie sich durch thierische Gier, mit der Waffe stets das gefüllte Essgeschloß herumtragend. Der Mangel an Lebensmitteln stieg während der nun folgenden Belagerung durch die Oesterreicher, Preussen und Ungarn plötzlich so sehr, dass sieben Wochen lang kein anderes als Pferdefleisch zu haben war. Dazu kam die grenzenloseste Unordnung und Unreinlichkeit in den Hospitälern. Mehr aber als dies Alles die wahrhaft entsetzliche Behandlungswaise der Aerzte. Aller Ermahnungen der Prager Aerzte ungeachtet liessen diese allen Typhuskranken wenigstens einmal, vielen sechzehnmal zur Ader, und trotz der Durchfälle verordneten sie Nichts als unendliche Brechmittel, Abführungen und Klystiere. Nie hauste ein Typhus entsetzlicher! Es entwickelte sich ein furchtbares Misere, dass nicht allein fast alle französischen Aerzte, sondern selbst alle Prager Aerzte bis auf einen, welche, wie die Medicin-Studirenden, zur Behandlung der Kranken gezwungen wurden, starben, nachdem die unverhüllte Darstellung des wahren Grundes einer so beispiellosen Wuth der Krankheit, welche die medicinische Facultät auf Befehl des Marschalls Bellisle gegeben hatte, entweder zu spät kam oder fruchtlos war. — Ausserst Wenige der Erkrankten genasen, und auch diese erst nach einer sehr langen Reconvalescenz.

#### 1745. **Upsala-Fieber. — Baeck.**

Mit diesen Fiebern durchaus identisch ist das Upsalafieber, dessen für das J. 1743 gedacht wird. Es kam in die genannte Stadt, wo schon vorher einfache und complicirte Wechselstieber durchaus nicht selten waren, angeblich durch aus dem Finländischen Kriege zurückkehrende Soldaten. Jedenfalls waren sie nach diesem Kriege häufiger, contagióser und bössartiger. Baeck's kleine Schrift scheint überhaupt für die in Schweden

[1142.]

und Norwegen einheimischen Krankheiten nicht unvorteilhaft zu seyn<sup>1)</sup>).

## Die Feldkrankheiten der Jahre 1742 — 1747.

### Pringle.

Niemals hat eine Armee unterrichteter Feldärzte gehabt, als die englische, welche sich im Juni 1742 nach Flandern einschiffte, um den preussischen Waffen zu Demüthigung französischen Uebermuthes beizustehen; nie ist die oberste Leitung der Sanitätsverhältnisse eines englischen Heeres nieder einem Arzte vertraut worden, der Pringle an Gelehrsamkeit, Erfahrung, Thätigkeit und Einsicht gleich gekrönt wäre. Eine nähere Betrachtung des unsterblichen Werkes über die Krankheiten der Armee im deutschen Feldzuge bietet der Anziehungspunkte zu viele dar, als dass sie nicht unternommen werden sollte, wenn auch im Grunde die isolirtere Natur der Krankheitschicksale eines Heeres in einem umfassenderen Verhältnissen gewöhneten Buche auffällig erscheinen mag.

Nicht desto weniger standen die Lagerkrankheiten, aller ihrer Selbstständigkeit ungeachtet, von je mit allgemeineren epidemischen Zuständen im Zusammenhange; ja zahlreiche Beispiele belehren uns sogar über den grossen Einfluss, den sie nur zu häufig auf die Entwicklung, Ausbildung und Verbreitung von Uebeln hatten, die ihre Verheerungen weit über die Grenzen der Kriegsschauplätze vertheilten, namentlich sobald es sich, wie hier so häufig, um contagiose Vermittelungen der Ausbreitung handelte.

Wenn nach Pringle von seinem umfassenderen Standpunkte fast aller Krankheiten gedenkt, denen die Heere ausgesetzt sind, so sind es für uns doch zunächst drei, die das Interesse in Anspruch nehmen: die Wechselfieber, das „remitt-

1) Abt. Bacc. I. *Tafel von Parasiten, vom man hat ja schon öfters Abwege*. Nordb. 1765. (S. Vogel's neue med. Biblioth. VI. 2. 1.) — Vergl. auch Orsini III. 315.



tirende Fieber<sup>1)</sup> und die Ruhr. Um so mehr, da diese Uebel auch ausserhalb der Lagerplätze in weiten Kreisen herrschten. In der englischen Armee hielten jene Krankheiten längere oder kürzere Zeit in dem verschiedensten Grade der Intensität, je nach der Verschiedenheit der Ursachen und der äusseren Verhältnisse der Truppen. Ueberall aber trat, — und das ist das besonders uns anziehende Wort, — die innige Verwandtschaft dieser Uebel, namentlich die Bedeutung des vielgestaltigen Wechselfieberprocesses, in der sprechendsten Weise hervor.

**1742. Wechselfieber.** — Das englische Heer, 20,000 wohlgeübte Krieger, hatte im Sommer 1742 in Flandern zunächst nur von den endemischen Wechselfiebern zu leiden, vorzüglich in dem feuchten Brügge, wo diese Fieber sehr häufig anhaltend, ruhrartig und tödtlich wurden. Pringle macht bei dieser Gelegenheit die oft bestätigte Bemerkung, dass die Kavalleristen viel weniger heftig ergriffen wurden, als das Fussvolk, weil dieses theils weniger körperliche Bewegung hat, theils schlechter quartiert zu werden pflegt, theils im Winter weniger mit erwärmenden Kleidern versehen ist.

**1745. Ruhr.** — Die Wechselfieber wichen im Winter einer katarrhisch-entzündlichen Constitution. Nur im Hospital zu Gent brach der Typhus aus, blieb aber auf dasselbe beschränkt. — Bis zu der für die preussischen und englischen Waffen ewig glorreichen Schlacht bei Dettingen (27sten Juni 1745) war der Gesundheitszustand der Truppen im Allgemeinen ungetrübt, aber starke Regengüsse unmittelbar nach derselben, eintretende kalte Witterung, und die Lagerung auf einem durchwässerten Boden riefen in dem Lager bei Hanau die Ruhr hervor, die sich mit einer so grossen Schnelligkeit verbreitete, dass in wenigen Wochen entweder die Hälfte der Truppen an diesem Uebel darniederlag oder es bereits überstanden hatte<sup>1)</sup>. Im Lazareth zu Feckenheim aber, welches ungefähr 1500 Kranke

1) Pringle (Oeuvres, von Brandt.) 8. 25.

[1743.]

anfahen, stellte sich zu der Ruhr der Hospitaltyphus in einer höchst bösartigen Weise <sup>1)</sup>. In der Armee hörte die Ruhr, nachdem man das Lager bei Hamau verlassen hatte, (was am 26ten August geschah), allmählig auf, und in den Cantonirungen am Rhein wurde ausser leichteren und gewöhnlicheren Uebeln nur ein „resultirendes Fieber“ beobachtet, welches einen ziemlich ausgebildeten gastrisch-typhösen Anstrich hatte, der sich im Winter, (um mit der Schule zu reden), mit dem katarhalisch-entzündlichen Elemente verband <sup>2)</sup>. In diesem Fieber gingen, wie in der Ruhr häufig, runde Würmer ab, die Pringle nicht näher beschreibt, denen er aber, gegen die damals sehr verbreitete Meinung, keine grosse, am wenigsten eine ätiologische Bedeutung zuschrieb. Im Herbste indessen konnte die ganze Armee in einem sehr befriedigenden Zustande in die Niederlande zurückkehren.

Indess blieben 3000 Kranke in Deutschland zurück; ein Theil zu Feckenheim, die Uebrigen zu Osthaven und Bechtelheim bei Worms. Zu Feckenheim wütheten das Lazarethfieber und die Ruhr noch immer fort, und beide vereinigten sich in der Regel zu einem um so heilloseren Uebel, dem nur Wenige entrannen. Das Lazareth verlor beinahe die Hälfte der Kranken, und die Einwohner des Dorfes wurden fast gänzlich aufgerieben. — Etwas besser war der Zustand in den Lazarethen am Rhein. Indess auch hier steigerte sich der Typhus zu pestartiger Bösartigkeit, als man alle Kranken, so auch die von Feckenheim, in das neuerrichtete Hauptlazareth zu Newwied brachte. Und als man endlich auch von hier aus alle Kranken nach Holland einschiffte, so hatte man für diese noch weit unüberlegtere Massregel mit dem Verlaste der grösseren Hälfte der Kranken auf der Ueberfahrt zu lassen <sup>3)</sup>.

1) Pringle, S. 22. F.

2) Das., S. 25.

3) Das., S. 23. F. — „Die Aechtheit dieses Fiebers mit der wahren Pest wurde noch immer durch folgenden merkwürdigen Vorfall bestätigt. Eine Anzahl alter Zelte, die auf oben die Klüden mit den Kranken gethan worden waren, wurden von ihnen anstatt der Betten gebraucht. Diese Zelte wurden

Der folgende Winter war bloß durch das Vorkommen von Wechselfiebern und fieberlose Gelloucht bezeichnet; und nach dieses fast nur in den ungesünderen Quartieren zu Gent und Brügge.

Das Auftreten der Gelloucht aber mächte mit der vorherigen Ruhr nicht ganz ohne Zusammenhang seyn.

1744. — Der Gesundheitszustand des um 10,000 Mann verstärkten Heeres, das sich nun in Flandern, bei Lisle, befand, war im ganzen Jahre überaus befriedigend. Eigentliche epidemische Krankheiten herrschten gar nicht, und nur zu Anfang des Oktobers hatte die Armee, nach vielem Regen, gegen 500 Ruhrkranke. Sehr bald darauf wurden die Winterquartiere wieder bezogen, und in diesen, so wie im ganzen Feldzuge des Jahres 1745 in Flandern, genossen die Truppen ebenfalls der besten Gesundheit. Nur das Regiment Hanöyside, welches erst in diesem Jahre zur Armee stieß, und in die Citadelle von Antwerpen gelegt wurde, litt in dieser höchst ungesunden Garnison ungemein von intermittirenden „remittirenden“ (typhösen) Fiebern und der Ruhr, die zugleich auch unter den Einwohnern herrschten.

Im J. 1736 bildete vorzüglich Schottland, aus Anlass der durch den Kronrätendenten Carl Eduard von Schottland erregten Unruhen, den Hauptschauplatz des Krieges. In diesem ebenfalls glücklichen Feldzuge bildeten das „remittirende Fieber“, namentlich aber das aus ihm sich entwickelnde „Schiffs-Lazareth- und Gefängnisfieber“ die vorzüglichsten Krankheiten.

Im Sommer des folgenden Jahres (Feldzug in Brabant) war der Gesundheitszustand der Truppen weniger befriedigend<sup>1)</sup>; besonders verbreitete sich im August, bei heißen Tagen und kalten Nächten, die Ruhr im Lager bei Maestricht und in der Umgegend, das gesund liegende Maestricht selbst unge-

einem Manne zu Gent zur Anstreuung hingelassen, der von 22 Flandrischen Geistes, die er zu dieser Arbeit gebraucht, 17 durch diese Krankheit verlor, ob sie gleich weder keine Gemeinschaft mit dem Kranken gehabt hätten“.

1) Pringle's Corps blieb in diesem Jahre in Schottland zurück.



[1766.]

nommen, ohne indess, bei aller Allgemeinheit, sehr gefährlich zu seyn<sup>1)</sup>. Am heftigsten aber litten die seit dem Anfang des Krieges in Zeeland stationirten Truppentheile, auf welche die ganze Macht der ungünstigsten Lokalverhältnisse einwirkte; besonders hatte das königliche Regiment am Ende des Feldzuges nur vier Leute die nicht krank gewesen waren. Es waren vorzüglich im Sommer 1747 die gefährlichen typhösen Wechselfieber dieses Landes tödtlich allein den Truppen, sondern auch den Einwohnern sehr gefährlich. Auch die Ruhr kam hier sehr häufig vor, und es war merkwürdig, dass die von ihr Befallenen gemeinlich von dem Fieber frei blieben, oder dass beide Krankheiten mit einander wechselten, so dass das Fieber aufhörte, wenn die Ruhr anfang, und sich wieder zeigte, wenn diese aufgehoben wurde. „Hieraus sah man“, führt Pringle fort, „dass diese zwei Krankheiten von einer ähnlichen Ursache herrührten, ob sie gleich unter verschiedener Gestalt erschienen.“

Ähnlich war der Gesundheitszustand der Armee im letzten Feldzuge, im J. 1748, der nur bis zum 9ten Juni währte<sup>2)</sup>. Da brach noch einmal eine Epidemie aus, allgemeiner und verderblicher als irgend einer der bisherigen Uebel<sup>3)</sup>. Das Hauptquartier war zu Eyndhaven, die Infanterie lag in den umliegenden Dörfern, die Reiterei um Herzogenbusch.

„Dieser Theil von Brabant ist einer der ebensten in den Niederlanden. Der Boden ist ein unfruchtbarer Sand, und man sieht so wenig Wasser, dass man bei dem ersten Anblick glauben sollte, das Land sey trocken und gesund. Dieser Anschein täuscht aber, denn es findet sich aller Orten Wasser, in einer Tiefe von zwei bis drei Fuss; und die Einwohner sind in einem Verhältnis mit der Entfernung dieses Wassers von der Oberfläche von Krankheiten frei. Diese Gegend ist ungesund, nicht nur weil sie an den untern Theil der Maas stösst, sondern auch,

1) Pringle, S. 61.

2) Aschener Fieber, des 33ten UG. 1748.

3) Pringle, S. 62.

weil sie, durch die Ueberschwemmungen der kleineren Flüsse, den ganzen Winter hindurch unter Wasser liegt und den ganzen Sommer nass bleibt. Die Feuchtigkeit und Verderbnis der Luft wurde sehr durch die Ueberschwemmungen vermehrt, die seit dem Anfange des Krieges um die Festungen gemacht worden waren, und wurden merklich zöthlicher, als im Anfange des Sommers, nach Unterschreibung der Präliminar-Friedensartikel, ein Theil des Wassers abgelassen wurde. Denn diese Gegenden, die vorher ganz überschwemmt gewesen waren, füllten die Luft jetzt, da man sie halb ungetrocknet und zumpf gelassen hatte, mit faulen Dünsten an. Die Staaten von Holland, welche hiervon durch die zu Breda und in den naheliegenden Dörfern wüthende Seuche überzeugt wurden, ertheilten den Befehl, das Wasser wieder hineinzulassen und es bis an den Winter zu erhalten <sup>1)</sup>.

Das Erkranken war viel stärker um Breda und Herzogenbusch, als zu Eyndhoven, da dieser Ort weiter von den Ueberschwemmungen und Sümpfen entfernt war. Es entstand also die Fruchtigkeit in den meisten Cantonirungen von dem unterirdischen Wasser, welches durch den Sand ausdünstete. In der Nähe von Eyndhoven lagen zwei Dörfer, Lind und Zelus genannt, das eine zehn, das andere vierzehn Fuss über der Oberfläche des Wassers (eine in diesem Lande wasserordentliche Höhe), und die Soldaten befanden sich in diesen beiden Oertern augenscheinlich besser, als in allen übrigen Cantonirungen.

Zu Eyndhoven lagen zwei Bataillone von der Garde in der Stadt, und das dritte in den Bauerhöfen auf dem Lande, alle in dem Bezirk einer Meile; doch war es merkwürdig, dass das Bataillon, welches ausser der Stadt lag, allezeit dreimal mehr Kranke berichtete, als jedes von den andern beiden, obgleich eines von diesen das vorhergehende Jahr kränklich in Zeeland gewesen war. Da nun die Höhe des Bodens bei allen

1) Vergl. Eikenmann, Typogr. S. 24.

[1748.]

gleich war, so konnte der Unterschied in Ansehung der Gesundheit keiner andern Ursache, als der grösseren Feuchtigkeit der Bauernhütten zugeschrieben werden; denn in andern Sachen waren sich diese Corps gleich, was nämlich den Dienst, die Diät und die Bewegung betraf. Ein Gleiches ereignete sich bei der Cantonirung eines Infanterieregiments, von welchem eine Compagnie, da sie in Häusern lag, die auf einer Heide standen, einer ziemlichen Gesundheit genoss, während die andere, die in einem Holze lag, sehr kränklich war. Einen ferneren Beweis, wie schädlich es sey, die Luft in einem feuchten Lande durch Baumplausungen einzuschleuken, gab auch das holländische Lager zu Gilzen, welches zu unsere Cantonirungen stiess, aber in einer offenen Heide lag, denn als wir uns zu schliessenden befanden, herrschte in demselben augenscheinlich eine ziemliche Gesundheit.

Der Sommer war bis hieher warm geteert; aber den Julius und August hindurch, da das Erkrancken am stärksten war, hatten wir keinen Regen, und die Luft war windstill und schwül. In der Nähe der Ueberschneemungen waren die nächtlichen Nebel dick und stinkend. Im Anfang des Septembers nahm die Hitze ab, und nach diesem Verhältnis auch die Krankheiten; aber bis den 20ten Oktober war die Witterung niemals kalt. Um diese Zeit hatten wir etliche regnerische und stürmische Tage, und gegen Ende des Monats etliche Nächte, in welchen es hart froh; darauf wurde das Wetter gelinder und hierbei blieb es, bis wir diese Gegend verliessen.

Die Epidemie zeigte sich zuerst und am schlimmsten unter der Gestalt eines brennenden Fiebers. Die Leute wurden plötzlich mit einem heftigen Kopfschmerz und oft mit einem Irredesin befallen. Wenn sie bei Verstande waren, klagten sie nach über starke Schmerzen in dem Rücken und den Lenden, heftigen Durst, brennende Hitze, Uebelkeit und Beklemmung am den Magen, Würgen und galliges Erbrechen. Bei Andern ging die Galle unterwärts ab, mit Stuhlflüssen und Schmerzen im Leibe. Gewöhnlich remittirte das Fieber gleich vom Anfange,



besonders nach dem Aderlassen und den Adererzungen der ersten Güte; wenn aber diese Mittel versäumt wurden, blieb die Krankheit fast unheilend. Die Neigung zur Fäulung war so gross, dass Eitliche Flecken und Vähices, und selbst den kalten Brand bekamen, und diese starben fast alle.

Mit diesen und andern ähnlichen Zufällen waren in den na die Ueberschwemmungen stossenden Cantonirungen die meisten dieser Fieber während der ersten Wuth der Krankheit verknüpft. Diejenigen aber, die weiter von dem Wasser entfernt waren, und nur unter der natürlichen Feuchtigkeit des Landes und der Hitze der Witterung litten, hatten wenigere und gelindere Fieber.

Ob also gleich die Krankheit allgemein war, litten dennoch die, welche nahe bei den Sümpfen lagen, weit mehr sowohl in Ansehung der Zahl, als der Heftigkeit der Zufälle. Unter den grossen Dragonern, die zu Vucht (ein Dorf innerhalb einer Stunde von Herzogenbusch, das mit Wiesen, die entweder noch unter Wasser lagen, oder erst kürzlich angetrocknet waren, umgeben ist), ihre Cantonirungsquartiere hatten, war das Erkranken am stärksten. Die ersten vierzehn Tage blieben sie gesund; nachdem sie aber fünf Wochen dasselbst gewesen waren, berichteten sie ungefähr 150; nach zwei Monaten 200 Kranke, welches über die Hälfte des Regiments war; und am Ende des Feldzugs hatten sie überhaupt nur 30 Mann, die nie krank gewesen waren. Die Dragoner von Rothex und Rich, welche nahe bei den Ueberschwemmungen lagen, waren gleichfalls sehr kränklich. Das Infanterie-Regiment von Johnson zu Nienland, wo die Wiesen den ganzen Winter unter Wasser gestanden hatten, und nur eben angetrocknet waren, berichtete zuweilen über die Hälfte seiner Leute. Und die schottischen Fusiliers zu Dinther, ob sie gleich in einer grösseren Entfernung von den Ueberschwemmungen lagen, hatten doch, da sie in ein niedriges und nasses Dorf einquartiert waren, auf einmal über 300 Kranke. Allein es war merkwürdig, dass ein Regiment Dragoner, welches zu Helvoirt (ein Dorf, das nur eine

[1793.]

halbe Stunde süd-westlich von Vacht liegt), constant lag, grösstentheils von dem Unglück seiner Nachbarn befreit blieb, indem es remittirende und intermittirende Fieber von einer bessern Gattung und in weit geringerer Anzahl hatte. So ansehnlich waren die Vortheile dieser Entfernung von den Sümpfen, des Windes, der meistens von den trockenen Gegenden herwehte, und einer Lage auf einer offenen Heide, etwas höher als die Uebrigen.

Die Truppen waren bei diesen Umständen kaum einen Monat in den Cantonirungen gewesen, als sich die Berichte im Ganzen schon an 2000 vermehrt hatten; und hernach stiegen sie noch viel höher. Denn das Erkranken dauerte den August hindurch fort, und nahm erst mit der Hitze, in der Mitte des Septembers, ab. Alsdann verminderte sich freilich Beides, die Anzahl und die Heftigkeit der Fieber; auch waren die Remissionen freier, so dass sich dieses stöhnende Fieber unmerklich mit der kühleren Witterung in ein tödtliches Wechselweiser verwandelte, und bei Herannahen des Winters gänzlich aufhörte.

Die Officiere waren in allen Cantonirungen bei Weitem nicht so kränklich, als die Gemeinen; ein Vortheil, den sie guten Betten, trockenen Zimmern und einer besaern Diät zu danken hatten.

Die Bauern litten sehr, besonders die um Breda und Herzogenbrach; in den Städten aber war das Erkranken geringer, und es starben im Vergleich weniger. Ueberhaupt war das Fieber unter den inneren Leuten am häufigsten, die in den untersten Stockwerken lagen, schlechte Kost und Mangel an Arzneimitteln hatten; denn ohne durch die Kunst hervorgebrachte Ausleerungen konnte die Natur entweder gar keine, oder doch nur unvollkommene Curen wirken.

Ungefähr um die Mitte des Novembers rückten die Truppen, da der Friede beschlossen war, aus ihren Cantonirungen nach Willenstadt, wo sie für England eingeschifft wurden; da ihnen aber der Wind entgegen war, so lagen verschiedene von

den Schiffen über einen Morat vor Anker, und da sie zuletzt doch eine langwierige und stürmische Reise hatten, (während welcher die Soldaten meistens unten im Schiffe blieben), so wurde die Luft verdorben und verursachte das Gefüngen- oder Lazarethfieber. —

Dies die geschichtlichen Thatsachen. Pringle bedient sich ihrer im Verfolge seines Werkes zur Aufklärung der auszeichnendsten und schwierigsten Punkte der Pathologie; insbesondere zur näheren Untersuchung des Verhältnisses, welches zwischen diesen „Fiebern“ und der Ruhr Statt findet <sup>1)</sup>. Unter den ersteren musste das remittirende oder intermittirende Malariefieber als die Grundform angesehen werden, obgleich selbst dieses nicht eigentlich ein reines Wechselfieber darstellte, sondern (nach gegenwärtiger Terminologie) mehr als gastrisch-biliöses Fieber auftrat <sup>2)</sup>. — Dieses remittirende Fieber begleitete jeden Feldzug, und war am häufigsten und tödtlichsten nach den heissen Sommern der J. 1743 und 1747.

Wichtiger sind Pringle's Bemerkungen über die kaisartigen Sumpffieber, deren Beschreibung er auf die Beobachtungen in der oben erwähnten Brabant'schen Epidemie, der schlimmsten, stützt <sup>3)</sup>.

„Am Ende des Julius 1745, als unsere Truppen vierzehn Tage oder drei Wochen in den Cantonirungen gelegen hatten, indem die Tage schwül, die Nächte aber kühl und nebelig waren, wurden verschiedene Soldaten (von den Regimentern, die den Ueberschreunungen am nächsten lagen), auf einmal mit einer brennenden Hitze und heftigem Kopfschmerz befallen; einige fühlten einen kurzen und geringen Frost vor dem Anfall, andere erinnerten sich keiner vorübergehenden Ungesundheit. Alle klagten über heftigen Durst, Schmerzen in den Knochen, Rückenweh, grosse Müdigkeit und Unruhe, oft über Ekel, Uebelkeit,

1) Pringle, S. 129 ff.

2) Das., S. 202. — Die Beschreibung der Zufälle müssen wir selbst bei Pringle selbst nachsehen.

3) Das., S. 206.



[1748.]

oder einen Schmerz um die Herzgrube, und zuweilen brachen sie grüne oder gelbe, üdrig riechende Galle aus. Der Puls war bei dem ersten Ausatze insgesamt gedämpft (*depressus*), erhob sich aber nach dem Aderlassen. In einigen Fällen wurde der Kopf so plötzlich und heftig angegriffen, dass die Leute ohne vorhergegangene Unpässlichkeit auf eine wilde Art herumliefen und für toll gehalten wurden, bis die Auflösung des Anfalls durch einen Schweiß und seine periodische Wiederkehr die wahre Beschaffenheit ihres Delirium entdeckte.

Zuweilen waren die Remissionen so unmerklich, dass die Krankheit eine fast anhaltende Gestalt hatte. Je näher sie diesem Zustande kam, desto schwerer war sie zu heilen; wenn aber die Paroxysmen deutlich unterschieden waren, mit einer Internission von einigen Stunden zwischen denselben, so wurden die Kranken meistens wieder besser, so heftig auch das Delirium während des Fiebers seyn mochte. Eine eben nicht öftere Wiederholung der Anfälle schwächte die stärksten Leute so sehr, dass sie nicht vermögend waren zu stehen. Einige wurden ohne vorhergehende Unpässlichkeit auf einmal stehend, und würden sich, wenn man sie nicht verhindert hätte, aus den Fenstern oder in das Wasser gestürzt haben. Diese Illerei hielt etliche Stunden an, hernach verfielen sie in einen tiefen Schlaf, und erwachten vollkommen verständig, aber mit einem heftigen Kopfschmerz. Andere, deren Fieber in einer anhaltenden oder remittirenden Gestalt erschien, bekamen ungefähr um den neunten Tag kritische Schweißse, und hernach ordentliche Fieberanfälle und Internissionen. Einige wenige hatten die Krisis durch den Stuhlgang oder Harn. Einige waren ungefähr drei Wochen krank ohne alle merkliche Remission, hernach endigte sich das Fieber mit etlichen alltäglichen Paroxysmen, und diese Leute hatten während ihrer Krankheit gelinde Schweißse, oder vielmehr eine beständige Feuchtigkeit auf der Haut. Viele hatten ein galliges Erbrechen, wie sie zuerst befallen wurden, und verschiedene gaben durch beide Wege runde Würmer von sich. Die starken Schweißse hatten immer einen

faulen Geruch, und der Ausfluss von den Blasenzylindern war so stinkend, dass die Wütterinnen sich weigerten, sie zu verhindern. Das Merkwürdigste war, dass man bei Einigen wenigen von denen die starben einen ordentlichen Puls beobachtete, ob sie gleich ihrem Ende sehr nahe waren. Alle die starben hatten einige Tage vor dem Tode einen asphäitigen Geruch, und gleich nach dem Tode bläuliche Flecken und andere Zeichen eines Brandes.

Bei der Cavallerie wurden die Meisten zuerst bei der Rückkehr vom Fournagieren befallen; denn weil das Regiment zur Rechten und Linken von St. Michels-Geatel (ihrem Hauptquartier) dicht an den Ueberschürmungen cantonnirt war, und viele von den Quartieren über zwei Stunden von Herzogenbusch lagen, wo die Magazine waren, so mussten die Leute ungefähr um 4 Uhr des Morgens wegritten, damit sie vor der grössten Tageshitze zurückkommen konnten. Zu dieser Frühstunde waren die Wiesen und Sümpfe an beiden Seiten der Heerstrasse mit einem dicken Nebel, der einen widrigen Geruch hatte, bedeckt, welchen Herr-Lander, Regimentschirurgus, als die Hauptursache der Krankheit ansah. Denn obgleich diese Reiter vor Mittag zurückkehrten, so sagte er doch, Viele hätten schon ein Fieber, und Einige ein wirkliches Delirium gehabt; ja es wären zwei auf dem Rückwege so plötzlich von der Raserei befallen worden, dass sie sich von ihren Pferden in das Wasser gestürzt und geglaubt hätten, sie müssten nach ihren Quartieren schwimmen. Gleich vom Anfange an klagten diejenigen, welche bei Verstande blieben, über heftiges Kopfwach, Durst und brennende Hitze; und Alle, wenn sie versuchten aufrecht zu stehen, fielen durch einen Schwindel, Uebelkeit und Würgen zum Brechen beinahe in eine Ohnmacht. Diese Fieber waren einige Tage hindurch anhaltend, oder hatten höchstens geringe Remissionen, hernach aber remittirten sie entweder deutlicher, oder hatten völlige Intermissionen. Anfänglich war der Puls klein und gedämpft (obgleich der Kranke delirirte); er erhob sich aber allmählich nach dem Aderlassen.

[1748.]

Der Zustand der Infanterie war in etwas unterschieden; denn da wenige von dieser in der Nähe der Ueberschuttenungen cantonirt waren, so waren ihre Fieber, obgleich häufig, dennoch überhaupt von gelinderer Art; doch hatten einige dieser Corps die Krankheit auch in einem hohen Grade, welches der Feuchtigkeit und der verdorbenen Luft ihrer Quartiere anzuschreiben war. Das Dorf Dinther lag niedrig und war mit Gräben und dichten Baumpflanzungen umgeben. Herr Tough, Chirurgus bei dem dort liegenden Bataillon, theilte mir folgende Nachricht mit. Alle Abende breiteten sich ein Nebel über die Wiesen aus, welcher bis den nächsten Morgen nach Sonnenanfang fortdauerte, und den widrigen Geruch eines unreinen, vor Kurzem abgelassenen Grabens hatte. Die Leute wurden gewöhnlich des Nachts mit einem Schauer, der Empfindung der Kälte, auf welchen bald ein heftiges Kopfweh, starke Hitze und andere fieberische Zufälle folgten, hefallen. Der Puls war jetzt so klein und gedämpft, dass das Blut, wenn eine Ader geöffnet wurde, Anfangs kaum fließen wollte; nachdess es aber erst etwas Luft bekommen, floss es frei, und dann erhob sich der Puls. Auf die Hitze folgte ein starker Schweiß, welcher eine Remission oder Intermission des Fiebers veranlasste. Die Anfälle kamen alle Abende wieder, und wenn nicht Sorge getragen wurde, das Fieber bald zu hemmen, so veränderte es sich leicht in eine anhaltende Gestalt mit schreckhaften Zufällen. In drei Fällen sah er Petechien, und in einem vierten einen kalten Brand unter der linken Brust, der dennoch durch die Fiebrinde überwunden wurde.

Auf der Höhe der Epidemie nahmen die intermittirenden und remittirenden Fieber durch Ausdehnung oder Verdoppelung ihrer Paroxysmen eine anhaltende und gefährliche Gestalt an; die meisten Todesfälle erfolgten durch diese Formen. Indessen war die Sterblichkeit bei der Armee doch bei Weitem nicht so gross, als es sich nach der grossen Zahl der Kranken oder der Bösartigkeit der Zufälle hätte erwarten lassen. Wir fügen zu dieser Bemerkung Pringle's hinzu, dass die Tüchtigkeit



der englischen Feldärzte gar bald die Natur des Uebels erkannte, und demzufolge erfolgreich bekämpfte.

Einer der niedrigsten Zufälle war die grosse Neigung dieser Fieber zu Recidiven. Diese waren im folgenden Frühlinge so häufig, dass die Regimenter, welche den vorigen Herbst in Zeeland gedient hatten, den folgenden Feldzug aber viermal mehr Kranke als jedes andere Corps in der Linie hatten <sup>1)</sup>. Sehr häufig folgten auch Fieberschüben, Wassersucht und Gelbsucht.

Seinen Bemerkungen über die Behandlung dieser Fieber schickt der wackre Pringle auch gutem alten Brauche eine historische Uebersicht ähnlicher Epidemien, namentlich der ungarischen Krankheit, des von andern Schriftstellern, Bartholinus im J. 1612 zu Copenhagen, von Sylvius im J. 1619 zu Leyden beobachteten Fiebers voraus, und bespricht auch die entsprechenden Krankheitsformen der Wendekreise <sup>2)</sup>.

Der bei den Herbstfiebern so häufig vorkommende entzündliche Anstrich des beginnenden Uebels machte in der Regel einen oder mehrere Aderlässe, in der Remission oder im Paroxysmus, nöthig. Diesem folgte eine leichte Abführung aus Senna, durch die oft schon leichtere Fälle gehoben wurden. Noch häufiger hatte der in voller oder auch (später) gebruchener Gabe mit oder ohne Ipecacuanha gereichte Brechweinstein diesen Erfolg. In der Regel wurde das Fieber durch dieses Verfahren der Chinä zugänglich <sup>3)</sup>. Früher angewendet, leistete diese entweder Nichts, oder war selbst nachtheilig. Sobald aber das Fieber den Tertian- oder Quartantypus zeigte, so war sie, nach den gewöhnlichen Ausleerungen, ein gewisses Mittel <sup>4)</sup>. Gewöhnlich gab Pringle die mit Rhebowein macerirte Rinde, oder eine mit Salolak und Rheum versetzte Latwerge. Besonders aber rühmt er die während des ganzen Verlaufs der Krank-

<sup>1)</sup> Pringle, S. 215.

<sup>2)</sup> Das., S. 229.

<sup>3)</sup> Das., S. 218.

<sup>4)</sup> Das., S. 241.

[1748]

heit häufig angewendeten Esaignaschungen, die in der neuesten Zeit sich so häufig heilsam bewiesen haben.

Die Sumpfieber erforderten zuweilen ebenfalls einen Aderlass, indem weit seltner als die Herbstfieber, fast nie bei den Eingeborenen. Brechmittel leisteten hier fast noch bessere Dienste als bei jenen; die China aber bewährte sich auch hier, namentlich als Prophylaktikum gegen die Recidive und Nachkrankheiten.

Höchst interessant sind Pringle's Bemerkungen über die Ruhr, die zu dem Besten gehören, was über diese Krankheit geschrieben worden ist. Namentlich bestätigen die von Pringle mitgetheilten Sectionsbefunde die Häufigkeit der schwammartigen Exerescenzen im Dickdarm, auf welche wir schon mehrmals aufmerksam gemacht haben, und die erst neuerlich wieder von einem bewährten Beobachter beschrieben worden sind<sup>1)</sup>. Weniger wichtig ist das über die Therapie Angegebene, die übrigens auf die besten Grundsätze gestützt ist. Anfangs zuweilen ein Aderlass, Brechmittel, sodann Calomel mit Rhen<sup>2)</sup>, später, wo es nöthig war, China, Sinaraha u. s. w.; diesem Heilapparate vertraute Pringle am Meisten. Nur Palliativindicationen bewogen ihn zu dem vorsichtigen Gebrauch der Opate.

Nicht weniger anziehend sind Pringle's sehr umfassende Bemerkungen über das „Gefingniss- und Lazarethfieber“. Wir würden indess durch ein näheres Eingehen auf dieselben an dieser Stelle unsere eigentliche Aufgabe aus den Augen zu verlieren fürchten.

1) Berndt, Bemerkungen über die Ruhr. Göttingen 1809.

2) Wir finden nicht früher als bei Pringle den neuerdings von Sieberd so gepriesenen Calomel erwähnt. Pringle gab ihn n. g. Calomel mit 20 gr. Rheum pro dos. S. 317.

**Die Volkskrankheiten der Jahre 1727 —  
1748 zu London.**

**Huxham.**

Eine nähere Betrachtung der vortheilhaften Beobachtungen Huxham's über die Volkskrankheiten der genannten zwei Decennien schliesst sich am Passendsten hier an. Wir folgen ihr um so mehr, als unsre Wissenschaft die Verdienste Huxham's in dieser Beziehung, der anerkannt wichtigsten bis jetzt noch nirgends eine detaillirte Erörterung erfahren haben.

Der erste Theil der Schriften Huxham's <sup>1)</sup> enthält das genaue Tagebuch über seine epidemiologischen Beobachtungen, einen Zeitraum von 25 Jahren umfassend. Ein reiches Material, aus dem aber Huxham's eindringender Geist eine noch reichere Fülle der wichtigsten Ergebnisse zu ziehen wusste, die, wenn wir von der unwesentlichen Fassung absehen, welche ihnen die tyrannische Zeit, in welcher Huxham lebte, auflegte, dem Besten und Geläutersten sich anschliessen, was Hippokrates, Sydenham's und Ramazzini's Griffel auf den Tafeln der höheren Wissenschaft eingezeichnet haben.

Diese Ergebnisse enthält der zweite Theil der Huxham'schen Werke, und er wird uns zur nächsten Quelle der folgenden Darstellung.

Diese aber beginnt Huxham mit dem Bekenntnis, dass der grosse Koer es sey, dem er den besten Theil seines Wissens verdanke, dass der begeisterte Wunsch, dieses Vorbild zu erreichen, ihn bewogen habe, seine Beobachtungen zu veröffentlichen, dass er nur den für einen wahren Arzt halten könne, der in die ganze Eigenthümlichkeit des Hippokrates, des unvergänglichen, unerreichten Musters ärztlicher Kunst, eingedrungen sey <sup>2)</sup>. Die ganze Vorrede ist klassisch, d. h. von unvergänglicher Bedeutung und Wichtigkeit ihres Inhalts.

1) Wir folgen der Reichel'schen Ausgabe. Leipz. 1784.

2) *„Sicut aliquis arripit ad fucile et expellit ad periculum intendens, ita, ad ea hic colligenda judicant, ad concentratissimum experimentum analogum.“*



[ 18722 ]

Nicht weniger gilt dies von dem ersten Kapitel: „*De simplici, compacta magis et inflammatoria febre*“, dessen wahrer Inhalt, die Grundlage des physiatrisch-pathologischen Heilverfahrens, seinen Werth behält, so sehr die intro-physischen Theorien die Fesseln zeigen, mit denen auch der freieste Geist zu sein Jahrhundert gekettet ist. Diese Fieberform, oder vielmehr die eigenenthümliche Veränderung der Säfte, durch welche es erzeugt wird, betrachtet Huxham als die primitive; den Wechselleberprocess und den dem „Nervenleber“ zu Grunde liegenden Krankheitszustand als blosse Varietäten <sup>1)</sup>. Denn das Fieber als solches ist ihm Nichts als eine reactive Erscheinung. Grundsätze, die eben so einfach als ewig wahr sind, und die Nichts von dieser Wahrheit verlieren, wenn sie auch durch eine vergängliche Theorie, die Solidarynalogie der mechanischen Schule, verhanden werden, zufolge welcher Huxham die Veränderungen der Säfte auf primäre krankhafte Zustände der

diffinitio verum aequilibrium et crystallinam naturam veterum, Hippocrati primigenio, conferemus. Huic H. prof. A. — „Equilibrio dices ut nullo, aut magis hujus medicinae veram crystallinam naturamque perfectionem mediana hanc esse posse naturam? id vero promovere non valueris, quoniam in aequilibrium medicina fieri multo melioris, atque purior vel saltem, qui illa non indiget, aliquam saltem in hac sententia veram agere personam, existimo. — Hippocrati profecto veram medicinam paratam, et tripartitam ab ipso indubitanter tanquam unita veris et solidis medicinis hucusq. collimarunt. Illamque cum illis, quorum generalitas digressu realitatis unum ejus incrementum, ad unitatem unum illi, qui de illi rebus saltem ferre valeret iudicium. — Cuius rei ratio manifeste hinc est, quod si naturam medicam cum cura et equitate disquisimus non solum huiusmodi, sed quaeque illam tam accurate arguas fuerit, ut ejus crystallinam unitatem induruerit, temporibus ejusque accommodaret hinc incipit. — Hic.

3) „Ergo et illa sanatio, quae fit de re aut dicto, exparet, immutatioque ordinum terminum inter inflammationem et leucam mercuriam esse intuentibus; atque solidorum solidiorumque constitutionem ex altera parte tantum commutari posse, ut sanguinem ad febrem continuam inflammationem transiret; et ex altera parte tantum deprimi posse, ut effectum leucam vel leucam mercuriam febrem prodigat.“ Ibid. II, p. 26. „Folices veridici et inflammationes aut tantummodo abstrahi aliis characteribus et signis singulisque distincti ac ab eisdem effectus; cum febris et mercurius febrem a nimia leucam mercuriam statu et angustiae curae atque tenui oriatur. — Reprehenditur autem curatio ista, praecipue illi contagio exicibili, qui utriusque sunt communis.“ Ibid. III, p. 48. Not.

festen Theile zurückführt<sup>1)</sup>. Aber so sehr beherrschte doch auch ihn die Gewalt der Wahrheit, dass er weit ausführlicher diese secundären Veränderungen der Blutmasse bei dem entzündlichen und dem Faulfieber schildert, als er die hypothetischen Anomalieen der festen Theile erklärt<sup>2)</sup>, und dass man wiederum einen aufgeklärten Sybianer zu hören glaubt, wenn er von der Alkaleszenz des Blutes spricht. Nur dieses Bedürfnis eines Systems ist es, welches Huxham's Bedeutung geringer als die Sydenham's erscheinen lässt, so sehr auch gerade diese Unsicherheit der dogmatischen Ansichten für den Zwang spricht, den sie seinem weiter blickenden Geiste anlegten.

Die Lehre Huxham's von der *Febris putrida maligna* als einer Blut-, und der *Febris nervosa lenta* als einer Nervenkrankheit hat seinen Namen vorzüglich berühmt gemacht. Dieselbe hängt mit den angedeuteten allgemein-pathologischen Grundsätzen desselben auf das Innigste zusammen. Es scheint uns indessen, als ob man sie sollten ihrem wahren Sinne nach aufgefasst habe, und es mag deshalb vergnüt sein, dieselbe genauer zu erläutern. Huxham erläutert dieselbe theils in seiner Dissertation „*de febris lenta et nervosa*“<sup>1-2)</sup>, theils und vorzüglich im Verfolge der von uns betrachteten Ergebnisse seiner Beobachtungen<sup>3)</sup>.

Hier ist aber zunächst schon überraschend, wie Huxham, seinen iatrotechnischen Dogmen zum Trotz, auch der *F. nervosa lenta* ein flüssiges Substrat anweist, die lymphatischen und Nervensäfte<sup>4)</sup>. Ihre nahe Verwandtschaft drängte sich ihm

1) „*Malignum statum maxime ex parte — solidam dependet conditionem*“.  
(Huxh. II. p. 44.)

2) p. 44 seq.

3) *Opp. T. I. p. 362 seq.*

4) *Opp. II. 35.*

5) „*Putrida maligna in fibrillis et primariis sanguinem propriis in se appellatum affuit, et illa, quae supra sunt propoſita, tota evidenter apparentur existim; nam e contrariis febres lentae et nervosae totidem rationem percipiunt in humoribus lymphaticis et nervosis habere viduantes. Haemorrhagiarum correptionis utique sanguinis dissolutio in illa aetate in gradu observatur; sed*

[1727.]

selbst so sehr auf, dass er nicht allein eine häufige Verbindung beider zugeh, sondern ihr bei den Faulfiebern so offenkbares Contagium auch mit denen des Viperin- und Wuthgiftes verglich, von denen das erste sich durch den akuten, das zweite durch den chronischen Verlauf der von ihm hervorgerufenen Krankheitserscheinungen auszeichnet <sup>1)</sup>.

Das Wesentliche der Beschreibung nun ist Folgendes <sup>2)</sup>. Die Krankheit beginnt mit einem gewissen Gefühl der Trägheit, leichtem Schauer, flüchtiger Hitze und allgemeiner Abgeschlagenheit, Eingenommenheit des Kopfs, Kopfschmerz, Schwindel; — Ekel, Brechneigung ohne oder mit nur wenigem Erbrechen. Sie zeigt Anfangs gewisse Remissionen; in den abendlichen Exacerbationen nehmen aber die geschilderten Erscheinungen immer mehr zu. Besonders nimmt den Hinterkopf ein gewisser Torpor oder ein dumpfer Schmerz mit Kältegefühl ein, der sich nicht selten längs der ganzen Kranznahse verbreitet, und welchem sehr häufig Delirium folgt. — In diesem Zustande lebt der Kranke häufig 5 bis 6 Tage, und trotz seiner grossen Neigung zum Schlaf stellt sich doch niemals dieser, sondern nur ein gewisser somnolenter und abgespannter Zustand ein, der von den Umstehenden häufig für Schlaf gehalten wird.

Während dieser ganzen Periode ist der Puls schnell, schwach und ungleich, zuweilen langsam, selbst intermittirend, darauf wieder schneller, sodann ruhig, gleichmässig u. s. w. Derselbe Wechsel zeigt sich in allen übrigen Erscheinungen. — Der Urin ist meistens blass und klar, mit keinem oder geringem, kleinstenartigen und ungleichem Bodensatz. — Die Zunge ist Anfangs selten oder nie trocken und missfarbig, zuweilen mit einem weisslichen Schleim überzogen. Erst später, auf der Höhe oder gegen das Ende der Krankheit, wird sie trocken, roth,

*Interdum et nervosae febres in longum temporis spatium trahuntur, idque sine aliquo periculo inaugurantur.* Opp. II. 72.

1) L. c. p. 75.

2) L. c. p. 76 seq.



schründig und citronenfarbig; fast nie aber klagt der Kranke über Durst.

Am 6ten oder 7ten Tage nehmen Kopfschmerz oder Schwindel unter beständigen Ohrenrauschen und Ohrenklingen, wodurch häufig Delirium entsteht, eben so die Schwere in den Präcordien, die Angst, die Abgeschlagenheit immer mehr zu; sobald der Kranke den Versuch macht, sich zu erheben, so bricht plötzlich ein kalter Schweiß auf der Stirn und den Handrücken aus, während sich die Wangen und die Hohlhände glühend heiss zeigen. Wird jetzt der Urin blässer und klarer, so kann man sicher Delirium, allgemeines Zittern und Schnees hüpfen erwarten. Die Delirien indess sind selten wild, und von vorübergehenden hellen Augenblicken unterbrochen. Die Zunge, vorzüglich die Mitte derselben, wird auf der Höhe der Krankheit häufig trocken, mit gelbem Rande auf beiden Seiten, und sie zittert heftig, sobald sie der Kranke hervorstreckt. Feuchtwerden der Zunge um diese Zeit mit gleichzeitigem copiosen Auswurf, ist ein äusserst günstiges Zeichen. Höchst bedenklich dagegen Schlingbeschwerden, fortwährendes Aufstossen, Brustkrampf, und vor Allem Schlocken.

Um den 9ten, 10ten oder 11ten Tag bricht häufig mit einem Male profunder Schweiß hervor, welcher an den Extremitäten meistens kalt und klebrig ist; hierzu gesellen sich erschöpfende Durchfälle. So gefährlich diese Erscheinungen sind, von so günstiger Vorbedeutung ist eine andauernde feuchte und warme Hautbeschaffenheit, so wie eine mässige Diarrhöe.

Im ersten Falle indessen nehmen die Kräfte schnell ab, die Extremitäten werden kalt, die Nägel bleich oder livid, der Puls zitternd, kaum fühlbar, doch schon zuweilen äusserst langsam und sehr häufig aussetzend. Der Kranke versinkt in den tiefsten Stupor, aus dem er nur selten wieder erwacht. Stahl, Urin und Thränen ergiessen sich unwillkürlich, heftiges Zittern und Flechsen springen verkünden die allgemeinen Convulsionen, unter denen das Leben erlischt. — Diesen Ausgang nimmt die Krankheit nach 14, 15 bis 16 Tagen, zuweilen viel später.

[1777.]

Alle Befallene werden zu Ende der Krankheit anwermüdet, im Gegensatz zu der äussersten Reizbarkeit im Anfange derselben, Einige scheinen durch ihre Todesfurcht den unglücklichen Ausgang zu beschleunigen, Andere vermeiden es aus demselben Grunde, sich dem Schlafe hinzugeben. — Ein gutes Zeichen ist es, wenn sich die Taubheit durch einen Ohrabscess oder Eiterung der Parotiden kritisch entscheidet, eben so, wenn viele Pasteln aus Lippen und Nase hervorbrechen.

Zur Beseitigung des Uebels sind gelinde Analeerungen zu Anfang der Krankheit meistens von eben so günstigem Erfolge, als Uebermass und unzeitige Anwendung derselben sich unbedingt schädlich erweisen. Ganz vorzüglich hilfreich, ja unumgänglich notwendig sind unter den bekannten, zu Anfang der Krankheit sehr häufig dargebotenen Verhältnissen Brechmittel, eben so, bei vorherrschender Turgescenz nach unten Klystiere aus Milch, Zucker und Salz. Ausserdem dienen vor Allem temperirende, herztürkende und schmerzstillende Mittel bei gehöriger Diät. Nächst dem vor Allem zu gehöriger Zeit angewendete Vesicatore. Opiate dagegen sind im höchsten Grade gefährlich.

Kritisch sind vor Allem mässige, warme Schwelisse. — Niemals darf man sich durch die Hitze und Röthe einzelner Theile, die grosse Angst, das Delirium, die Athemnoth, den Druck und die Schwere in den Präcordien verleiten lassen, auf eine Peripneumonie zu schliessen und vielleicht eine Ader zu öffnen. Die geschildesten Beschwerden gehen zuweilen einem am 7ten, 9ten oder 11ten Tage auftretenden Frieselausschlage vorher, der nicht selten vollständig kritisch ist, er tritt dann von den übrigen ungünstigen Umständen begleitet, übermässig reichlich seyn oder 2 bis 3 Mal wiederkehren. — Sehr nützlich bewirkt sich unter diesen collapsativen Erscheinungen der vorsichtige Genuss eines guten rothen Weins, welchen schon Celsus im *morbo cordiacus* empfiehlt<sup>1)</sup>. Ausserdem, vorzüg-

1) Celsus de re med. L III. c. 19. Es ist bekannt, dass Becker die Herz-

lich zu Ende der Krankheit, eine kleine Dosis der Chininfactor mit Crocus und virginischer Schlangewurzel, zuweilen abwechselnd mit einer Gabe Rheim. Hierdurch treten vorzüglich die zu Ende der Krankheit häufig bemerklichen Remissionen und Intermissionen deutlich und klar hervor, und so wird der Körper zum Gebrauch der Rinde selbst glücklich vorbereitet. Diese wird mit grossem Erfolg in dieser Zeit mit salinischen Tränken (Wermuthsalz und Limonienessig) verbunden, und hierdurch in ihrer Kraft bedeutend gesteigert.

Keine Ausleerung ist wohlthätiger, als ein ziemlich copióser Speichelfluss ohne Aphthen. Wo er eintritt und zugleich die Haut mässig feucht ist, wird fast stets der Kranke gerettet, so gross auch Schwäche und Stupor erscheinen mögen. — Der Urin ist nur selten gekocht, sondern roh, klars und dünn, und nicht selten äusserst reichlich. — Häufig brechen auf der Höhe der Krankheit oder nach derselben zahlreiche brennende Pusteln (*partulae vesicatae*) aus, welche nicht selten eitern und weit um sich fressen, zum Heile des Kranken <sup>1)</sup>.

Aus dieser Darstellung ergibt sich vor Allen von Neum die nahe Beziehung der „*Febris nervosa lenta*“ zu dem Abdominaltyphus, und wir behaupten gewiss nicht zu viel, wenn wir die erstere nur für eine, vielleicht nur durch die Individualität des Kranken, die epidemischen Verhältnisse u. s. w. gegebene Varietät der letzteren ansprechen. Eine Behauptung, welche zur Gewissheit werden würde, wenn uns Huxham durch Sectionsberichte namentlich über das Verhalten der Darm-schleimhaut aufgeklärt hätte. — Auf der andern Seite steht aber die *Febris nervosa lenta* wieder dem Friesel so nahe, dass man sie selbst für diese, gerade in derselben Zeit so häufig epi-

krankheit der Alten mit dem englischen Schussias vergleicht. (Huxham, d. engl. Schussias, S. 185 ff.) An andrer Stelle nennt Huxham den *verbaei cordicis* „*species febris nervosae non auctore ulliquaque*“.

1) Schliesslich bezieht sich Huxham auf einen sonst nirgends erwähnten „angestrichenen“ Tractat von Richard Manningham „*de febricula*“.



[1721.]

detaillirnde Krankheit halten könnte, wenn nicht Friesenanschläge, kritisch wie symptomatisch, sehr häufig als Bestandtheile des Typhusprocesses beobachtet würden.<sup>1)</sup> Aber gerade diese Aehnlichkeit spricht immer wieder von Neuem für die Insigelt, mit welcher die Natur Krankheitsformen verbindet, welchen die Schule, nach einseitiger Berücksichtigung einzelner, willkürlich aufgefaßter Gesichtspunkte, die heterogensten Stellungen anweist. — Dafür spricht auch noch die offenbare Beziehung der *Febris vercomp. lenta* zum Wechsellieberprocess, wie sie sich theils aus dem namentlich zu Anfang und zu Ende des Verlaufs zur Intermission neigenden Typus, theils aus der unter bestimmten Umständen so grossen Heilkraft der China ergibt.

Ueber Huxham's Behandlungsmethode brauchen wir kein Wort zu verlieren. Sie ist die rein Hippokratische, und dem Specifischen im Krankheitsprocess wird, wie es von jeher geschehen, eine höchst untergeordnete Rücksicht gewidmet. In jener ersten physischen Rücksicht aber kann sie vollendet genannt werden. Vorrüglich wichtig scheint die uns wenigstens neue Bemerkung von der grossen Heilbarkeit des Speichelflusses, auf welche sich gewiss selbst wichtige therapeutische Folgerungen gründen lassen<sup>2)</sup>.

1) S. oben S. 255 f.

2) Noerlich haben wir dieses kritischen Speichelflusses im Typhus von Otto in Kopenhagen, vorzüglich nach einer an sich selbst gemachten Beobachtung gedacht. (Casper's Wochenschrift 1833, Nr. 7, S. 9. — Schmidt's Jahrb. IX. 173.) Ferner sagt Rösch: „Dahals erfuhr ich zuerst die Wirksamkeit des Quacksilbers, als Salbe in den Tadeln eingestrichen. In 3 Fällen ruht sich Speichelfluss, mit weissen Entschleimen besetzte sich die Krankheit; sie verlief kürzer, wenn es nach viel zu schaffen machte und die Kranken länger im Bett unruhig blieben.“ (Med. Correspondenz; d. Woch. ärztl. Verch. Bd. III, Nr. 9. — Haeser, Archiv f. d. ges. Medic. Bd. 1, S. 79.) — „Fast immer ist“ schallt (= nach grossen Dosen Calomel —) Speichelfluss eintritt, die Krankheit überwinden.“ (Rösch, am leibigen. Orte, S. 79.)

## Die Pest in der Ukraine, zu Messina und in Siebenbürgen.

Es möge, ehe wir uns der Betrachtung der Volkskrankheiten der Jahre 1750—1770 zuwenden, vergünnt seyn, einen Blick auf die letzten Epidemien der Pest zu werfen, welche in den Zeitraum dieser Untersuchungen fallen.

Die Marseiller Epidemie hatte die Einrichtung der strengsten Quarantainen in den Häfen des mittelländischen Meeres zur Folge; weniger bewacht blieb immer der Landweg, auf welchem das furchtbare Ungeheuer seit Menschengedenken am häufigsten die Bahn nach dem Herzen Europa's gefunden hatte, und wenn es auch den hochherzigen Aufopferungen der österreichischen Regierung gelang, das Unheil der früheren Jahrhunderte von dem westlichen Europa abzuwehren, so worden doch gerade die östlichen Grenzländer dieses Staats bis in die jüngste Zeit noch so oft von dem alten Feinde heimgesucht, dass es eben nur jenen unendlichen Opfern beizumessen ist, wenn der Krankheit der fernere Verfolg ihrer alten Bahnen abgeschritten wurde.

### 1758 und 1759. Die Pest in der Ukraine. — Schreiber.

Die Bemerkungen Schreiber's über die Pest, welche in den Jahren 1758 und 1759 die Ukraine verwüstete, gehören zu den vorzüglichsten, und sind namentlich durch die Umsicht ausgezeichnet, mit welcher ihr Verfasser dem Gemeinmännlichen seiner Beobachtungen bestimmte, in kurzen Aphorismen niedergelegte Resultate abzugewinnen wusste. Schreiber selbst spricht sich über die erste Entstehung der Pest in der Ukraine nicht näher aus; es unterliegt aber nicht dem geringsten Zweifel, dass das verheerende Uebel in dem damaligen Kriege Russlands mit der Pforte, deren Gebiet die Pest gerade jetzt wieder verwüstete, die reichste Nahrung fand. Wiederholte Feind-

[1738]

seligkeiten der Türken hatten die Kaiserin Catharina zur Ausrüstung zweier Heere unter den Grafen von Münch und Lasci veranlaßt, welche im Mai 1736 das Perocop, im Juni das Bahinsarey und die wichtige Grenzfestung Aaxow wieder eroberten. Im J. 1737 wurde auch Oczacow nach einer harten Belagerung wieder genommen. Unter der türkischen Besatzung dieser Festung aber war nach einigen Nachrichten die Pest verbreitet. Gleichzeitig wurde die Pforte auch von Oesterreich hart bedrängt; General Seckendorf bemühte sich im J. 1738 der Festung Nissa und des Passes Meadia. Trotz dieses die christlichen Waffen begleitenden Glückes (noch am 28sten Aug. 1739 blieben die Russen bei Chozim Sieger), wurde im September 1739 ein Friede geschlossen, vermöge dessen die Russen die vorher geschloffenen Festungen Aaxow und Oczacow den Türken wieder einräumten, und die Oesterreicher, welche allerdings bei Grotzka und Panzowa (22sten und 29ten Juli 1739) geschlagen wurden, sogar Belgrad den Türken wieder überlassen mußten.

Zu so demüthigenden Bedingungen veranlaßten lediglich die Krankheiten, welche die christlichen Heere härter als das Schwert der Feinde trafen, diese finstern Gestalten, welche nirgends unheimlicher die Reihen der Krieger durchschreiten, als in den Gegenden des damaligen Kriegsschauplatzes, in denen sich zu der Nähe der Pest selbst einheimische Uebel gesellen, die dieser an Gefahr und verheerender Gewalt Nichts nachgeben. —

Schreiber's Bemerkungen beziehen sich, wie gesagt, nur auf die Ergebnisse seiner Beobachtungen, von denen den wichtigsten eine Erwähnung vergl. seyn mag. Zunächst wird als die einzige Ursache der Epidemie das Contagium hervorgehoben, obschon nicht verschwiegen wird, dass im Juni viele hitzige Fieber, mit mannigfaltigen Erscheinungen, namentlich Petechien vorkamen, denen alsdann im Juli die vollständig charakterisirte Bubonenpest folgte. Es ist indess eine feststehende Thatsache, auf die wir im Verlaufe unserer Bemerkungen



wiederholt hingewiesen haben, dass die ersten Fälle der Pest sehr oft unter der Maske des *Petechialtyphus* auftreten, und auf diese Weise sehr häufig die Sorgfalt der ersten Beobachter zum Verderben vieler Tausende täuschen.

Nichtsdestoweniger wollte man auch hier wieder die bekannten atmosphärischen Erscheinungen (Wegfliegen der Vögel, stinkende Nebel u. s. w.) in Zusammenhang mit der Seuche bringen. — Bei schnell tödtlichen und ohne Bubonen u. s. w. verlaufenden Fällen fand Schreiber die Lungen mit kleinen, schwarzen und lividen Flecken besetzt. — Vorzüglich wichtig aber ist die therapeutische Bemerkung Schreiber's, dass die Anwendung eines Brechmittels (*Ipecacuanha* oder *Zinkvitriol*, — Brech Weinstein rief heftige Krämpfe hervor)<sup>1)</sup> am ersten Tage der Krankheit, kritische Fieberbewegungen erregte, unter denen am vierten oder fünften Tage Bubonen oder Karbunkeln ausbrachen. Wurde dagegen die Anwendung des Brechmittels versäumt, so nahmen am zweiten und dritten Tage die Erscheinungen des bei den meisten Kranken vorherrschenden Magenleidens zu. Wurde Kranken dieser Art am dritten Tage ein Brechmittel gegeben, so starben sie am fünften oder sechsten unter Convulsionen und dem Ausbruch schwarzer Petechien<sup>2)</sup>. — Diese Bemerkung ist vorzüglich geeignet, den Streit zu schlichten, den die Aerzte seit mehr als 200 Jahren über die Anwendbarkeit der Brechmittel in der Pest geführt hatten, und bei dem der vorzüglichste, aber auch häufigste Fehler, Nichtberücksichtigung der individuellen Verhältnisse und besonders der Zeit der Anwendung, nur selten vermieden worden war. —

Unter den Folgeübeln beobachtete Schreiber häufig sphacelöse Zerstörung und Lostosung des Scrotums; eine Bemerkung, welche sehr lebhaft an die gleiche Beobachtung des *Thucydides* erinnert<sup>3)</sup>. — Greise wurden häufig ergriffen, und zwar kam es bei ihnen, zu Folge des Mangels an reactiven Beac-

1) Schreiber, *ob.* 28.

2) *Ibid.*, *ob.* 11.

3) *Ibid.*, *ob.* 18. — *Mat.-path. Unters.* I. S. 54. 55.

[1728.]

kungen, nicht zur Bildung von Bubonen und Karbunkeln. Kinder unter acht Jahren wurden selten befallen; am häufigsten Frauen und männliche Jünglinge <sup>1)</sup>. — Trunkenbolde starben am dritten Tage unter Convulsionen. — Frauen, die im dritten Monate schwanger waren, wurden zwar auch von der Pest ergriffen, aber ohne dass Abortus und Tod eintrat. In beiden Beziehungen waren sie dagegen in vorgerückteren Perioden der Schwangerschaft gefährdet <sup>2)</sup>. — Ruhrkranke, welche von der Pest befallen wurden, waren unfehlbar verloren; während des Todeskampfes brachen Petechien aus <sup>3)</sup>. Eine Beobachtung, die nicht ohne tiefere Bedeutung für die Verwandtschaft der Pest mit dem erysipelatösen Krankheitscharakter seyn dürfte, den wir ja so häufig eine Neigung zum Uebergange in typhöse Zustände offenbaren sehen. — Noch interessanter ist die folgende Beobachtung über das Verhältniss des Wechselfiebers zur Pest. Personen, welche am Quartanfieber litten, wurden ebenfalls von der Pest befallen, indess erlangten die bei ihnen sich zeigenden Bubonen ihre Ausbildung nicht, sondern verschwanden mit dem Eintritt des nächsten Paroxysmus und kehrten nicht wieder zurück. Alsdann setzte aber das Wechselfieber seinen Verlauf fort bis zur Beseitigung der Pest, worauf es dann durch die Chima geheilt wurde <sup>4)</sup>. Leider ist uns der unten angeführten Stelle nicht mit völliger Sicherheit abzusehnen, ob Schreiber sich auf die individuellen Erkrankungen oder auf die Totalität der Wechselfieber- und Pest-Epidemie bezieht. So viel aber ist klar, dass das Quartanfieber der Pest einen bedeutenden Abbruch thut. Wir sahen schon oben, dass zu Breda im J. 1625 das Tertianfieber vor der Pest schützte <sup>5)</sup>, und wenn

1) Schräcker, *obs.* 18.2) *Ibid.*, *obs.* 19 et 20.3) *Ibid.*, *obs.* 21.4) *Ibid.*, *obs.* 24. „*Febres quartanae decedentes neque humores perhibuerunt a peste. His ubi bubones coacti, — sed creverunt, resurgente paroxysmo, cessaverunt. Ipse valens febris later hanc decedens peripneumonia continuavit per omne depopulanti pestis tempus, donec, hoc cessante, et ipse profligatus per exitum Peruvianum.*“

5) S. oben S. 112.

auch diese Beobachtung von der Mye's nicht ganz unantastbar seyn sollte, da es noch immer die Frage ist, ob die Wechselieberkranken der Einwirkung des Pestcontagiums blossgestellt waren, so scheint doch aus diesen Erfahrungen sich einerseits die Möglichkeit der Complication der Pest mit dem Wechselieber, andererseits aber auch eine relative Schutz- oder Milderungskraft der letzteren, der Pest gegenüber, zu ergeben<sup>1)</sup>. Diese Bemerkungen scheinen allerdings mit früheren Behauptungen von der Verwandtschaft des Wechseliebers mit dem typhösen Processus und der Pest im Widersprache zu stehen, sagen aber doch im Grunde nur aus, dass die Gegenwart des Wechseliebers der Ausbildung der einigermaßen verwandten Pest zu ihrer höchsten Höhe hinderlich sey, wie nicht allein das Entgegengesetzte, sondern auch das Aehnliche sich anschliessen kann.

Ausserdem bemerkte Schreiber, dass Syphilitische, die in einer Salivationskur begriffen waren, von der Pest sehr heftig ergriffen wurden. —

Zu gleicher Zeit herrschte die Pest auch zu Odzawow, wo sie im Februar 1739 noch einmal ausbrach, und erst im Juli, nachdem man einige Erderschütterungen beobachtet hatte, aufhörte<sup>2)</sup>. —

Nicht geringer waren die Verheerungen, welche das mörderische Uebel in den so oft schon heimgesuchten Grenzgebieten Oesterreichs bis nach Ofen hin ausrichtete, ja deren Spuren man sogar in einigen Erkrankungen in dem Wiener Spitälern erkennen wollte. Hier wurde sie zu Anfang des Jahres 1733 aus Siebenbürgen durch österreichische Truppen nach Temeswar und in die umliegenden Gegenden übergepflanzt, verbreitete sich von da allmählig in alle Gegenden des Königreichs, hier bis an die Grenzen von Krain, Oesterreich und Mäh-

1) Vergl. HAUENHAIN, die Krankheitsfamilie Typhus. S. 289. — Die Krankheitsfamilie Typhus. S. 114.

2) Schreiber, in dem Anhange über diese Pest zu Odzawow in der zweiten Ausgabe seiner Schrift (vom J. 1744.)



[1741.]

ren, dort längs des ganzen karpatischen Gebirges bis an Polen und die Bukowina. Bis in das siebente Jahr währten mit ungleicher Stärke die Verheerungen des wüthenden Uebels, über welches menschliche Vorkehrungen wenig vermochten, und vorzüglich in den über der Theiss gelegenen Gespanschaften richtete es gräßliche Verwüstungen an. Erst mit dem Frühlinge des Jahres 1744 hörte die Seuche auf, und die bis dahin gegen sie unterhaltenen Vorkehrungen konnten eingestellt werden <sup>1)</sup>.

#### 1745. Pest zu Messina. — Melani, Turiano.

Zu derselben Zeit wurde Messina und mehrere andere Städte Siciliens, ja nach Schnurrer selbst Calabrien von einer furchtbaren Pest verheert. Wir sind leider unserer Stunde, die Schriften der obengenannten Beobachter zu benutzen, und wissen uns deshalb auf das beschränken, was Oxman nach Turiano mittheilt. Die Pestepidemie des Jahres 1743, sagt derselbe, veranlaßte zu Messina und in der Umgegend einen Verlust von 43,400 M. Das Contagium wurde durch die genuesische Tartane Maria della Misericordia, Capitain Giacomo Bozzo, welche von Missolunghi kam, und Korn, Wolle und feine Leinwand an Bord hatte, nach Messina gebracht. Ein Matrose und der Capitain starben bei ihrer Ankunft unter allen Erscheinungen der Pest. Zwar ließ der Senat sogleich die Tartane und den noch an Bord befindlichen Theil ihrer Ladung verbrennen und die Mannschaft in Quarantaine setzen, indess hatte sich aber die Seuche schon der ganzen Stadt bemächtigt. Die Erscheinungen waren die gewöhnlichen. — Mit dem 15ten August fieng die Pest an nachzulassen, im September hörte sie gänzlich auf. Einzelne Personen, welche in der Marceller Epidemie die Pest gehabt hatten, blieben, bei fortwährender Gemeinschaft mit den Kranken, von derselben verschont.

1) Schraud, die Pest in Sicilien, S. 3. — In dieser Zeit erlitten die untere Reich-  
Theile mehrere, nach Schraud nicht sehr merkliche Pestereischeinungen.

## 1756 — 1757. Pest in Siebenbürgen. — Chenot.

Die Resultate, welche sich aus den Forschungen des hochherzigen Chenot für die Prophylaxis der Pest ergaben, sind ungleich wichtiger als die Geschichte der Epidemie im Gebiete von Kronstadt, welche zu demselben die Veranlassung bildete. Chenot bewies in seiner Schrift <sup>1)</sup> aufs Neue, dass die Pest sich lediglich auf dem contagiösen Wege verbreitet habe, er bewies es mit einer Schürfe, er ordnete nach diesem Grundsatz die Lehre von der Sperre mit einer Einsicht, die noch jetzt ganz Europa um so dankbarer verehren muss, als Chenot für unendliche Mühe, ja eigne Todesgefahr Nichts, als den schändlichsten Undank ärztete <sup>2)</sup>. Diese unsterblichen Verdienste Chenots sind unlängst von berufenerer Hand geschildert worden <sup>3)</sup>, und für die Geschichte dieser Pest genügt die Angabe, dass ihr erster Zunder durch einen armenischen Eisenwarenhändler nach Siebenbürgen gelangte, dass die Behörden die ersten Fälle, zum Theil gegen die ausdrückliche Erklärung der Aerzte, andern Krankheiten zuschrieben, dass man die wahren Schutzanstalten vernachlässigte, und auf diese Art dem Uebel 4203 Menschenleben opferte. Die Zahl der Erkrankten betrug 6677, die der Genesenen 2374. Chenot selbst war unter den Erkrankten, und die Geschichte seiner Krankheit wurde ihm vorzüglich zur Quelle der naturgemässen Grundsätze, die er nach für die Pathologie und Therapie der Pest aufstellte.

1) S. d. Schriftenverzeichn.

2) Vergl. Becker, Gesch. d. neuer. Hildesheim. Chenot musste vieler Anstoss dem Magistrat zu Kronstadt, dem es nicht einfiel, an eine Besetzung des Betters der Stadt zu denken, nach erfolgter Pest einige Klüften Holz beschaffen, die er sich während seines Aufenthalts hatte anfertigen lassen. (Vorrede.)

3) Larivière, die Pest des Orients. S. 3 ff.

## Die Volkskrankheiten der Jahre 1750 – 1770.

Die beiden Decennien von 1750 bis 1770 bilden den Schluss unserer Betrachtungen. Sie gehören zu den reichsten in Bezug auf die vielfachsten Formen epidemischer Ereignisse, und zahlreiche werthvolle, zum Theil klassische Schriften machen wenigstens den Versuch, zu einem übersichtlichen Standpunkte zu gelangen, möglich. Wiederum aber sind es die alten Verhältnisse, denen wir begegnen, jene unendliche Reihe der verschiedenartigsten Formen des Erkrankens, als deren Hauptfactoren der Wechselfieber- und typhöse Process erscheinen, aber zufolge der hochgebildeten Zeit und der Vortrefflichkeit einzelner Beschreibungen in einer selten erreichten, niemals übertraffenen Klarheit.

Der Winter 1751 war, wenigstens im Norden, durch Kälte, im Frühjahr durch Ueberschneemungen ausgezeichnet; sonst aber hat die Beschaffenheit des Jahres keine besonders anormen Verhältnisse dar. Nur in Oberitalien verdrang der Rost Getraide, Wein und Maulbeerbäume, in Constantinopel herrschte die Pest, in Philadelphia das gelbe Fieber, ausserdem der Garotillo; eben dieser, für dessen Geschichte diese Periode vorzüglich wichtig ist, mit verderblichen Viehseuchen in England und der Schweiz <sup>1)</sup>, für welche Zimmermann noch einer Ruhr gedenkt <sup>2)</sup>. In den folgenden Jahren zeigten sich ausserordentlich häufig Erdbeben, in einer in der Geschichte dieses furchterlichen Phänomens beispiellosen Häufigkeit und Heftigkeit <sup>3)</sup>. Gleichzeitig aber erreichten die Sommertemperaturen dieser Jahre ungewöhnliche Grade. — Nichtsdestoweniger gibt selbst Schnurrer, der doch sonst auf den ursächlichen Zusammenhang der terrestrischen Revolutionen mit den krankhaften Er-

1) S. Schnurrer, II, 311 ff. Schnurrer's Nachrichten sind in dieser Periode besonders reichhaltig. — Hist. pathol. Übers. I, 280 ff.

2) Zimmermann, von der Ruhr unter dem Volke, Vorrede.

3) Cairn, Quake, Lisbon (am 1sten Nov. 1755.)



scheinungen im Leben des Menschengeschlechts ein so grosses Gewicht zu legen pflegt, zu, dass ein solcher sich gerade in dieser Zeit nicht bemerklich gemacht habe.

Trotzdem liegt es sehr nahe, zu glauben, dass dieselben Ursachen, welche zu Anfang dieses Decenniums die Pest an ihrer Geburtsstätte hervorriefen, und vielleicht auch ihre Verbreitung bis nach Siebenbürgen begünstigten <sup>1)</sup>, auch für die Erzeugung des höchst ausgebildeten typhösen Krankheitscharakters in Betracht kommen, welcher uns für die Volkskrankheiten des übrigen Europa in dieser Periode entgegentritt. Dieser gab sich, wenigstens in Norddeutschland, einem der tüchtigsten Beobachter, Lentin, in so ausgezeichnete Weise zu erkennen, dass dieser von dem J. 1756 an den Untergang der vorher Statt findenden „sthenisch-entzündlichen“ Krankheitsconstitution (1) in die „asthenisch-faulige“ datirt <sup>2)</sup>.

In den verschiedenartigen Formen des epidemischen Erkrankens dieser Periode tritt uns, — wenn es erlaubt ist, der historischen Darlegung vorzugreifen, — vor Allem eine harschest scharfe Ausprägung dessen entgegen, was die Schule als gastrisch-bilösen Charakter bezeichnet. Es ist indess nur zu wahrscheinlich, dass theils die grössere Aufmerksamkeit der Aerzte auf einzelne früher weniger hervorgehobene Symptome, theils das ungebührliche Gewicht, welches man einzelnen derselben zufolge der gerade verhandelten Tagesfragen beilegte, die Nosologie in dieser Zeit mit Krankheitsformen bereicherte, die nur in den Schulen, nicht in der Natur neu waren. Findet diese Bemerkung auf die Mehrzahl der Volkskrankheiten dieser Zeit, namentlich auf die Wechselfieber Anwendung, so gilt sie vor Allem von dem „Schleimfieber“ welches seit dieser Zeit in den ärztlichen Schriften eine jedenfalls zu bedeutende Rolle spielt; noch mehr gilt sie von der Wichtigkeit, die man der

1) S. oben S. 425.

2) Lentin, *Mémoire sur les épidémies et autres Climatologiques*. 1779. — Diss., Beiträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft. 2. Ausg. I, 225, II, S. III, 3 und 229.

[1120.]

den Epidemien dieser Zeit allerdings vorzüglich eigenthümlichen Wurmcomplicationen heimass.

Dennoch ist derangedeutete Punkt nicht ohne eine tiefere Beziehung für die Geschichte der Kenntnisse von dem typhösen Krankheitsprocesse. In einem so hochgebildeten Zeitalter, als es die erste Hälfte des 18ten Jahrhunderts darstellt, konnte man sich nicht mehr mit den vagen Bestimmungen der früheren Zeit begnügen, welche genug gethan zu haben glaubte, wenn sie die in Rede stehenden Krankheiten schlechthin als „böartige, pestilentielle“ bezeichnete. Man fing an das Bedürfniss zu fühlen, die Nosologie mit den angeheeren Fortschritten der Anatomie in Uebereinstimmung zu bringen. Der erste Schritt dazu war die Bestimmung des hervorstechenden Leidens der Schleimhäute im Typhus; durch Friedr. Hoffmann wurde die Benennung der „böartigen Katarrhalfieber“ eingeführt<sup>1)</sup>. In ähnlicher Weise versuchte man vielfältig die diesen lokalen Affectionen zu Grunde liegenden Veränderungen der Säfte aufzuklären; die alte „Böartigkeit“ wich der „Fäulniß“ und den endlosen Untersuchungen der Frage nach dem laugenhaften oder sauren Verhalten faulender Substanzen, welche von Pringle angeregt, von Fan, Gaber, Macbride, Boissier und der Frau von Darconville fortgesetzt wurden. Diesen Untersuchungen, — welche gewiss die ihnen folgende Nerven-theorie, angeregt durch Haller's unsterbliche Versuche über die Irritabilität, und vorzüglich durch die Lehre des schottischen Nervenpathologen nicht in Vergessenheit gerathen seyn würden, wären sie weniger mit dem todtten Sinne Sylvischer Iatrochemie angedellt worden, — diesen Untersuchungen gingen die Forschungen über die Produkte des Schleimhautleidens im Typhus, die Aufstellung der Warmfieber, der Schleimfieber, der biliösen Fieber, parallel, denen sich erst im 19ten Jahrhunderte die Lehre vom Abdominaltyphus, gewissermassen als Verklärung aller dieser pathologisch anatomischen Tendenzen,

1) Friedr. Hoffmann, *op. cit.* II, p. 84.

als Wiedereinsetzung der Humoralpathologie in die Rechte anschliessen sollte, welche ihr der Brownianismus ungehörig lange, selbst noch lange nach seinem officiellen Falle entzogen hatte.

Vielleicht können diese Bemerkungen für einen rohen Umriss der Geschichte des Typhus in der Schule gelten. Die ausführlichere Darstellung muss ihnen in einer Schrift, welche die Geschichte der Krankheiten in der Natur zum Gegenstande hat, versagt bleiben.

Niemals beobachteten die Aerzte häufiger „Wurmfieber“, als während des im Folgenden von uns zu untersuchenden Zeitraums. Seit je waren in einzelnen Epidemien des Typhus Würmer vorgekommen; bei Oxanam<sup>1)</sup> findet sich eine Reihe derselben, wie gewöhnlich ohne Angabe der Quelle, verzeichnet. Aber nur selten hatte man die symptomatische Gegenwart der Helminthen für wichtig genug gehalten, um die Annahme besonderer „Wurmfieber“ auf sie zu gründen. Diese aber waren, wie gesagt, Nichts, als eine plühere Bestimmung der „böartigen Katarrhalfieber“ Hoffmann's und seiner zahlreichen Schüler<sup>2)</sup>, und die „Wurmfieber“ erhielten sich in Ansehn, trotz der Erinnerungen Torti's<sup>3)</sup>, Pringle's<sup>4)</sup> und Sarcou's<sup>5)</sup>, dass die Wurmscomplication weder die Natur noch die Behandlung der in Frage stehenden Fieber abändere. Trotzdem bezeichnete schon Moreali eine von ihm zu Reggio beobachtete Epidemie des Typhus als eine verminosa (1732!); trotzdem legte Pedratti<sup>6)</sup> in der von ihm im J. 1705 zu Farnese beobachteten typhösen Pneumonie auf die, nicht einmal constante, Wurmscomplication ein ungehöriges Gewicht, trotz-

1) Oxanam, I, 205 ff. — Es ist unbegreiflich, wie ein Geschichtschreiber wie Oxanam von einer „fièvre putride képhalique“ reden kann.

2) Vergl. oben die von Weibrecht, Deibarding u. s. w. beobachteten Epidemien. (S. 299, 302.)

3) Torti, *Therap. spec.* p. 281. (*Princif.* 1716. 4.)

4) Pringle, *Diseases of the army*, p. 5, 213.

5) Sarcou, *Distia vaginata etc.* II, p. 200.

6) Margagli, *de pedil. et caus. morbor.* ep. 21. u. 32.



[1150.]

dem bezeichnete noch Sagar eine dem Lungen typhus der Erwachsenen ähnliche epidemische Kinderkrankheit (im J. 1751 und 1760) als vermünos <sup>1)</sup>, und zu ähnlicher Einseitigkeit liess sich Lapeq de la Cloture <sup>2)</sup> bei Beschreibung der Epidemie des Typhus zu Gros-Theil in der Normandie vom J. 1770 verweisen <sup>3)</sup>.

Die Schrift von van den Bosch, „der Triumph des Vorurtheils“ ist uns nur aus Sprengel und Oxenham bekannt. Die von demselben angenommene Wurmcconstitution dauerte vom J. 1760 bis 1763, vorzüglich auf den Inseln Overflaque und Godreod, an der Zusammenmündung der Mayo und Oster-schelde, in einer überaus sumpfigen und namentlich im J. 1760 stark überschwemmt gewesenen Gegend. Am heftigsten wurde die Stadt Caillan ergriffen. Uebrigens wird die Krankheit durchaus wie ein sehr intensiver Abdominaltyphus beschrieben, dessen man durch Anthelmintica, *Aux foetida*, China, antiseptische Klystiere, eröffnende Getränke, Molken und Mineral-säuren Meister zu werden suchte <sup>4)</sup>.

Dennoch würde man zu weit gehen, wenn man nicht zugeben wollte, dass in der genannten Periode das gastrische, schleimige und verminderte Element des Typhus einen hervorstechenden Zug der Krankheitsbilder mehr als sonst dargestellt habe. Namentlich würden dagegen die klassischen Beschreibungen des „Schleimfiebers“ sprechen. Aber dennoch zeigt gerade die Geschichte dieser letzteren ihre wesentliche Identität mit dem Typhus, und nur die Verkennung der unendlichen Vielgestaltigkeit dieses noch immer nicht seinem innersten Wesen nach erforschten Uebels konnte noch in neuerer Zeit einzelne Aerzte bewegen, das Schleimfieber von dem Typhus zu trennen, von welchem es sicher nur eine Varietät ist.

1) Sagar, *Système médical*, Vol. II, p. 656. (siehe 327. Sprengel.)

2) Lapeq de la Cloture, *Observations sur les maladies épidémiques etc.* Par. 1776. 4.

3) Sprengel, *Gesch. d. Med.* V. 5. 524 ff. Vergl. ant.

4) Bera, V. 523.

Es gilt, diese Sätze durch historische Belege zu stützen, vor Allem die natürliche Verbindung der Volkskrankheiten dieser Zeit nachzuweisen.

**1746—1754. Wechselfieber. — Grainger, Cartheuser, Fabricius und Farenholtz, Benvenuto, Coley u. s. w.**

Hier begegnet uns nun zunächst wieder jenes geheimnissvolle und bedeutsame Geschlecht der Wechselfieber, welches in seinem Schoosse so vielfache Keime der verschiedenartigsten Krankheitsformen birgt. Ist auch bei den Epidemio-graphen dieser Zeit vorzüglich nur von den ausgebildetsten und heftigsten Graden dieser Uebel die Rede, so ist doch mit Gewissheit eine sehr grosse Häufigkeit derselben, wenn auch nur in den ersten Jahren dieser Krankheitsperiode, und da, wo sich die Constitution nicht bis zu den äussersten Gliedern der Reihe hinabbildete, voranzusetzen. Jedenfalls ist die ausserordentliche Häufigkeit der Wechselfieber in den Jahren 1746—1755 nicht zu übersehen, welche uns den Schriften der obengenannten Beobachter hervorgeht.

Grainger's Beobachtungen schliessen sich durchaus an die Pringle's an, dessen Werk die Schrift des Erstgenannten, welcher ebenfalls als englischer Feldarzt im holländisch-französischen Kriege thätig war, an äusserem sowohl als innerem Umfange übertrifft. Dies hat vorzüglich seinen Grund in der ausschliesslichen Aufmerksamkeit, welche Grainger den anomalen Wechselfieberformen schenkte, die in den englischen Lagern während der Jahre 1746—1748 vorkamen.

Nach Cartheuser folgten die auch durch ganz Deutschland verbreiteten Wechselfieber auf eine sehr unregelmässige Witterung. Die beiden letzten Monate des Jahres 1747 waren feucht und neblig, der Anfang des Jahres 1748 äusserst kalt, der Sommer sehr heiss, und der Herbst wieder winterlich. Dieser letztere brachte zuerst dreitägige Intermittentes, aber auch zahlreiche anhaltende Fieber. Bei ersteren war der Frost sehr

[1759.]

kurz, desto heftiger das Hitzestadium; die Krisen erfolgten vorzüglich durch bedeutende Schweisse; wenn diese unterdrückt wurden, durch Lungenanwurf, Durchfall, gelindes Nasenbluten, besonders durch Wochenlang anhaltende Urinkrisen. Zuweilen erschienen auch Peterbläsen. Aderlässe waren nur zu Anfang der Krankheit zuträglich; Brech- und Purgamittel schädeten unbedingt, ebenso die China. (*„Matus perarpe ceceni vires exercet.“*)

Fabricius in Helmstädt erzählt für das J. 1750 der Wechselfieber als der vorzüglichsten Krankheit neben sehr allgemein verbreiteten Nervenfebern, mit heftiger Entzündung der Lungen und des Netzes, und heftiger Zerstörung der Leber, bei denen statt der Potechien *Purpura rubra et alba* erschien. Gleichzeitig (d. h. vom gelinden Winter bis zum Herbst) herrschten Bläthern, Scharlach, Pleuritis, Diarrhoeen und Ruhr. Diese Häufigkeit der Wechselfieber veranlasste sogar ein erhmliches hexametrisches Gedicht <sup>1)</sup>.

Aber gar bald wurde die typhöse Stimmung, welche sich bisher nur hier und da gezeigt hatte, allgemein, obgleich auch noch im Anfang dieses Ueberganges sich der ursprüngliche Wechselfiebercharakter des Erkrankens nicht verlor.

**1750 — 1755. Garotillo in der Schweiz, England,  
Schweden und Nordamerika, — Langhans,  
Huxham u. s. w.**

Die Geschichte der Schindpest ist von uns <sup>2)</sup> und vorzüglich von Hecker <sup>3)</sup> bereits so ausführlich besprochen worden, dass es hier genügt, an die Häufigkeit ihrer Epidemien in dieser Zeit und an ihre, keinem Zweifel Raum gehende, Beziehung zu dem typhösen Prozesse zu erinnern. Ueberall, namentlich aber in der Schweiz, erhält ihr Erscheinen vorzüglich dadurch

1) Reishard, Christ. Tob. Ephe, de febribus intermittentibus speciebus epidemicis anni 1747 usque 1754. Dresd. 1752. 8.

2) Hist.-pathol. Unternoch. 3. 5. 273.

3) Hecker, Gesch. d. westr. Heilk. 5. 1239 ff.



tieferer Bedeutung, dass ihr theils Krankheiten der Cerealien, theils Epizootien parallel gingen <sup>1)</sup>, so wie dass ihm höher entwickelte, allgemeinere typhöse Erkrankungen folgten, die theils durch ihre Verbreitung und Blausartigkeit, theils durch die klassische Eigenthümlichkeit ihrer Geschichtsschreiber für uns von grösster Bedeutung sind.

Unter jenen eben erwähnten Epizootien wird zunächst die Klauenseuche genannt. Sie herrschte mit der eigentlichen Viehseuche von 1753 bis 1759. Diese, schon im J. 1744 verbreitet <sup>2)</sup>, verheerte vorzüglich Holland und England, und wurde schon damals mit Erfolg inoculirt <sup>3)</sup>.

**1755. Wechselfieber, Friesel, Lungentypus, Keuchhusten, Ruhr, Blattern u. s. w. zu Basel. — Zwinger.**

Schon die Zusammenstellung dieser Namen lässt das Gesetz erkennen, unter welchem der Krankheitscharakter des Jahres 1755 zu Basel stand, der vielleicht mit dem Schneereichthum des Winters, den Überschwemmungen des Frühlings und der Hitze des Sommers zusammenhing. Endemische Ursachen mögen zu Basel den wahren Friesel, — denn dieser lässt sich in Zwinger's sehr guter Beschreibung noch nicht einen Augenblick verkennen, — in die Reihe der übrigen Krankheitsformen eingeschoben haben. Zu Ende des kurz beschriebenen Krankheitscyklus brachen auch unter den Schafen die Blattern aus. — Zwinger bewährt sich als denkenden und sehr genau beobachtenden Arzt. Seine Therapie ist die rein physiatrische, aber nur deshalb, weil er eine spezifische Heilmethode schmerz-

1) „Die schon in den nicht vorausgegangenen Jahren erwähnten Krankheiten der Getreidearten wurden was auch in der Schweiz bemerkt. Besonders sah man am Weizen die Halm graue und raue werden, und aus denselben einen gelblichgrünen Saft ausquellen, wormal innerhalb acht Tagen die ganze Pflanze schwarz wurde.“ Schenkler, II, 216.

2) Schenkler, II, 325. Sagat, *Léçons de médecine vétérinaire* 1756. Fischel, 1765. (Nicht von uns benutzt.)

3) Brandhorst, bei Haller, *Disq. pract.* V. p. 421.

[1756.]

Jich vernimmt<sup>1)</sup>. — Eben so vortreflich sind seine Bemerkungen über den Lungentypus, den wir bald näher als „Alpenstich“ in der eigentlichen Schweiz finden. Häufig entschied sich dieser, zum deutlichen Beweise seiner Natur, durch Frieselausbruch. Mächtige Aderlässe bekamen besser als zu starke Brechmittel und Purganzen. — Zu Ende des Sommers herrschte die Ruhr, im folgenden Winter die Blattern.

#### 1756. Typhus in Frankreich. — 1757. Alpenstich in der Schweiz.

Eine der heftigsten Epidemien des Typhus herrschte im April 1756 zu Linières la Doucette im Departement bas Maine. Sie ergriff ungefähr 900 Personen, von denen 160 starben. Zu den allgemeinen Symptomen des Typhus gesellten sich bei erwachsenen Mädchen oft tödtliche Uterioblationen, ausserdem wurden Würmer nach oben und unten entleert, der Stuhlgang war schwärzlich, höchst übelriechend. Ausleerende Mittel, Antispasmodika und Antihelmintika leisteten das Meiste<sup>2)</sup>.

Die allgemeine Verbreitung dieser Uebel aber beginnt vorzüglich mit dem J. 1757. Zunächst kehrte in der Schweiz unter den bekannten Verhältnissen und in Begleitung der Lungenseuche des Rindviehes der Alpenstich zurück<sup>3)</sup> und Guggenbühl ist mit Recht geneigt, denselben auch in den Epidemien bösartiger Pneumonien wiederzuerkennen, die gleichzeitig Deutschland und Flandern überzogen. Aber ungleich verbreiteter und bösartiger wurde die Epidemie des Jahres 1762, welcher wir unten näher gedenken werden.

Für die Jahre 1750—1757 finden sich zerstreutere, wie gewöhnlich der Angabe ihrer Quellen ermangelnde und auch sonst wenig interessante Nachrichten bei Ozanam, namentlich über

1) „*Antidotum specificum minime illius delirio idoneum velut dicitur*“ *Act. Medec.* III, p. 203.

2) Ozanam, I, 382, ohne Angabe der Quelle.

3) Guggenbühl, S. 45 und 107.

einige Epidemien in Frankreich<sup>1)</sup>. Bedenklicher ist die Noth Kuhn's über den Typhus, der sich zuerst in Eisenach, wo sich die französischen Truppen mit den kaiserlichen vereinigten, um gegen die Preussen vorzurücken, und bald darauf fast im ganzen Umfang des Kriegsschauplatzes zeigte, aber nach die später in ihre Heimath zurückkehrenden Truppen nicht verlorste.

**1757 — 1759. Petechialtyphus (= typhöse Wechsel-  
fieber —) zu Wien. — Hasenöhrl, Störck.**

Die epidemiographischen Schriften der genannten Beobachter liefern den erfreulichen Beweis, mit welchem Geiste der herrliche van Swieten seine Schüler zu erfüllen wusste. Namentlich zeichnet sich in der für uns in Frage kommenden Rücksicht Hasenöhrl's Schrift<sup>2)</sup> aus, obgleich es ihrem Verfasser vorgeworfen werden muss, dass er die epidemischen Verhältnisse zu erörtern unterliess, welche dem von ihm beschriebenen „Petechialfieber“ vorausgingen. Höchstwahrscheinlich spielten unter diesen die Wechselfieber ebenfalls die Hauptrolle, höchstwahrscheinlich war das „Petechialfieber“ der Jahre 1757 — 1759 Nichts als ein zu typhöser Höhe gesteigertes Wechselfieber. Dies muss nicht allein deshalb vermuthet werden, weil Lautter<sup>3)</sup>, der die Fortsetzung dieser Epidemie beobachtete, dies geradezu ausspricht, sondern auch, weil sich die China gegen dieses „Petechialfieber“ als Hauptmittel bewährte. Jedenfalls drang Hasenöhrl nicht mit Lautter's tiefem Sinne in das innerste Wesen des Uebels, und selbst der Versuch, die Heilsamkeit der China durch ihre stärkende Einwirkung auf das Nervensystem zu erklären, muss als verunglückt bezeichnet werden.

Genug dieser Andeutungen! — Nach der Sprache der Schule war Hasenöhrl's Epidemie ein Petechialfieber mit wenig ausgeprägter gastrischer Complication. Es herrschte in ausseror-

1) *Observ.* III, 157 ff.

2) Hasenöhrl, *Med. med. univ. epid.* p. 55.

3) *S. astr.* S. 441.



[1757.]

dentlicher, namentlich auch durch seine Contagiosität vermittelter Verbreitung vom November 1757 bis in das J. 1759, und hat in seinem Verlaufe wenig Bemerkenswerthes dar. Sehr oft begann es mit der heftigsten Abgeschlagenheit, leichtem Frost und Hitze, und machte dann erst am 4ten Tage wieder einen Paroxysmus <sup>1)</sup>. Bei regelmässigem Verlaufe brachen am 4ten, höchstens am 7ten Tage gutartige, kritische Petechien aus, die am 14ten bis 17ten zuweilen mit gleichzeitiger Hautabschuppung verschwanden <sup>2)</sup>. — Die bösartigeren Formen erzeugten alle Erscheinungen des ausgebildeten typhösen Characters; seltener indess, wie bemerkt, auffallende gastrische Symptome. Aus diesem Grunde waren auch Brech- und Abführmittel von untergeordneterer Bedeutung. Kritisch waren unter den Petechien Schweisse, gelinde Durchfälle, gutartige Parotiden. Zuweilen kam kritische periphere Gangrän vor. Aderlässe und antiphlogistisches Verfahren überhaupt waren ziemlich häufig angezeigt oder doch unschädlich; nachtheilig erhaltende und schweißtreibende Mittel. Hasenöhrl selbst bediente sich, ehe er durch de Haën auf die China, welcher selbst seine Rettung verdankte, aufmerksam gemacht wurde, des Kamphers, der Serpentaria, der Mineralsäuren, die damals die Rolle zu spielen anfangen, deren Glanzpunkte in die Brown'sche, noch jetzt nicht ganz zu Ende gegangene Periode fallen. Es gereicht Hasenöhrl, wie so vielen älteren Aerzten, zum Ruhme, sich des Bedürfnisses einer specifischen Beilmethode, im Gegensatze der rein symptomatischen, die nur zu häufig sich mit dem Namen der physiatrischen brüstet, bewusst geworden und so auf die Anwendung der China gekommen zu seyn.

Für die Beziehung des Uebels zum Wechselstieber spricht auch die Häufigkeit der Recidive in Fällen, die nicht mit China behandelt worden waren. Häufig auch bildeten sich am 3ten bis 4ten Tage nach der Genesung Parotiden, oder andere kri-

1) Hasenöhrl, p. 6.

2) Ibid. p. 7 et 8.

tische Abresse u. s. w. Ganz besonders häufig aber wurden, vorzüglich gegen Ende der Epidemie, im Sommer 1759, sehr viele Personen von der Krätze befallen. — Hasenöhrl theilt auch zwei Sertinasberichte mit, in denen indess unter Anderem das Wichtigste, die Untersuchung der Darmachleimhaut, vermisst wird.

**Störck. — Petechial- und Erisielfieber, Wechsel-  
fieber, Erysipelaceen.**

Diese Angaben werden von Ant. Störck, unter dessen Leitung damals das Pazinar'sche Krankenhaus und eine Zeitlang auch das Militärhospital stand, im Ganzen bestätigt <sup>1)</sup>. Eine berufenere Stimme hat bereits Störck's klinische Wirksamkeit gewürdigt <sup>2)</sup>. Das rein praktische Interesse überwiegt bei der selben zu sehr, als dass die tieferen Beziehungen der epidemischen Krankheitsverhältnisse die verdiente Aufmerksamkeit gefunden hätten. Störck's Hauptverdienst ist die Bekämpfung der verderblichen Grundsätze de Haën's, welcher verblendet genug war, die Verantwortlichkeit der exanthematischen Erscheinungen bei dem „litzigen Fieber“ zu leugnen, und dem Aderlass eine viel zu ausgedehnte Anwendung einzuräumen. — Seltnet als Hasenöhrl, welcher mehr zu de Haën's Partei gehört zu haben scheint, wandte Störck den Aderlass an, und bei den einfacheren Formen des reinen Petechialfiebers sah er weniger Nutzen als jener von der Clima. Auch ihm drängte sich eine Ahnung der Beziehung der „litzigen Fieber“ zu den Wechselfiebern auf <sup>3)</sup>. Häufiger als Hasenöhrl beobachtete er die ominösen Durchfälle der ausgebildeten typhösen Formen, und nach seinem Bericht eines Falles von „Gangrän eines grossen Theils des Colons“ kann über die wahre Natur dieser Uebel kein Zweifel mehr Statt finden <sup>4)</sup>.

1) Störck, *Annales médicaes* I et II.

2) Hecker, *Gesch. d. neuer. Heilkunde* 3. 478.

3) Störck, I, p. 68.

4) *Ibid.*, p. 4.

[1757.]

Wichtig aber für die Beurtheilung des gemeinsamen Krankheitscharakters, unter dessen Einfluss die einzelnen Erscheinungen in der Krankheitswelt standen, sind Störck's von ihm selbst durchaus isolirt hingestellte Angaben über die ferneren epidemischen Krankheitsformen. Wie gewöhnlich hatte sich in dem geschilderten Typhus fast stets die Lungenaffectio bemerklich gemacht. Gegen den Winter 1759 erhielt sie die Oberhand, — die Petechial- und Frieselfieber gingen in typhöse Pneumonien über, und ihnen folgte eine Reihe von Erscheinungen, die nur genannt zu werden brauchen, um dem Unbefangenen sogleich in ihrer ganzen Bedeutung zu erscheinen. Neben diesen „bösartigen Peripneumonien“ nämlich waren einfache Wechselieber und die mannigfaltigsten Rothlaufformen ausserordentlich häufig. Im Herbste 1758 z. B. wurden mehr als hundert vom Rothlauf befallene Frauen im Spital behandelt<sup>1)</sup>. Nachdem waren vorzüglich im Frühling, Herbst und Winter rheumatische und arthritische Fieber verbreitet, denen sehr leicht hydropische Uebel, seröse Geschwülste u. s. w. folgten<sup>2)</sup>. Ferner kamen Apoplexien sehr häufig vor. Eben so Anginen, mit grosser Neigung zu Geschwülstbildung, nach vorgängigem Auftreten gelber Pusteln. Der wahre Charakter dieser Anginen ergibt sich noch deutlicher, wenn man erfährt, dass sie sehr häufig Brand der nahe gelegenen weichen und harten Theile nach sich zogen, dass sehr häufig auch die Respirationorgane ergriffen wurden, dass in einem Falle ein vollständiges Faulfieber, mit putriden Durchfällen, Petechien u. s. w. sich ausbildete, und dass der Wärter dieses Kranken von einem höchst gefährlichen Petechialfieber ergriffen wurde<sup>3)</sup>.

Interessant sind auch die Angaben Störck's über die im Februar und März des Jahres 1760 vorkommende „*Febris haemorrhoidalis*“ bei welcher, so räthselhaft sie auch durch

1) Störck, II, 112 seq.

2) *Ibid.*, p. 98.

3) *Ibid.*, p. 127 seq. — 144 seq.



Störck's ziemlich ungenau Angaben bleibt, der Einfluss der allgemeinen erysipelatösen Constitution und namentlich der kurz darauf eintretenden Ruhrconstitution kann zu erkennen seyn möchte <sup>1)</sup>.

Nach allgemeinen heftigen Erbrechen, Spannung im Nacken und Hinterkopfe, unherzielndem, kriechendem Wärmegefühl im Rücken, entstanden Herzensangst, Spannung der Hypochondrien, bisweilen Brechneigung, äusserst heftige Kolikschmerzen bei zusammengezogenem Unterleibe, während der letztere in anderen Fällen, in denen die Kolikschmerzen gering waren, die Brechneigung aber gänzlich fehlte, anschwell. Der Urin war meist feurig, nur bei heftigen Kolikschmerzen dünn und roh; der Stuhl hartnäckig verstopft, nur durch wiederholte Klystiere konnten kleine Quantitäten von Koth entfernt werden. Oft war der After so fest verschlossen, dass kaum eine kleine Röhre eingeführt werden konnte. — Der Durst war beträchtlich, der Puls schnell, ungleich, zuweilen doppelschlägig, zuweilen intermittirend, fast stets aber voll und hart. Die Nächte waren unruhig und von ängstlichen Träumen gestört.

Am zweiten Tage liess sich der Lebeschmerz, das Angstgefühl und die Spannung der Hypochondrien nach, der Puls wurde gleicher und freier, der Durst mässiger. Nun aber entstand in der Lendengegend ein drückender reissender Schmerz, zu dem sich Tenesmus und Haraverhaltung gesellte, während sich der Nackenschmerz nach dem Scheitel und den Schläfen ausbreitete, und die Bewegung des Kopfes äusserst schwierig und schmerzhaft machte. Die Nacht war wieder unruhig, besonders durch das von Zeit zu Zeit eintretende ungewöhnliche Herzklopfen.

Am dritten Tage entstand ein so heftiger Schmerz in der Gegend der Lendenwirbel und des Kreuzbeins, dass die Kranken sich nicht im Mindesten bewegen konnten; dabei war der After im höchsten Grade contrahirt.

1) Störck, U, p. 140 seq.

[1757.]

In der Nacht auf den vierten Tag erreichte die Unruhe der Kranken ihre grösste Höhe; an diesem selbst aber liessen Leiden-, Nacken- und Kreuzschmerzen mit dem Ausbruch von „Tuberkeln“ von verschiedener Grösse um den After nach. Zuweilen waren diese Tuberkeln weich und von keiner Beschränkung begleitet. In diesem Falle hörte mit ihrem Ausbruche das Fieber gänzlich auf. Zuweilen aber waren sie sehr roth, gespannt und im höchsten Grade schmerzhaft, so sehr, dass Leichschneiden, Tenesmus, Schwindel, Starrheit der Glieder, unendliche Angst, Ohnmacht, Kaltwerden der Extremitäten entstand. — Nur bei zwei Kranken bildete sich am 4ten Tage mit Nachlass des Fiebers statt der Tuberkeln ein copöser schmerzloser Blutfluss aus dem After.

Bei schlechter Behandlung konnte diese Krankheit leicht einen gefährlichen Charakter annehmen, ja selbst tödtlich werden. Mittel insbesondere, die in der Absicht gegeben wurden, die Hämorrhoidalkrise (f) zu befördern, waren jedenfalls nachtheilig. — Am ersten und zweiten Tage musste wiederholt zur Ader gelassen werden; übermässigen Aderlässen folgten Convulsionen und überhaupt ein anomaler, längerer Verlauf. Ausserdem bewährten sich leichte salzige Abführungen, Oele, warme Umschläge auf den Unterleib, erweichende Klystiere, Dampfbäder des After, Blutegel, palliativ leichte Narkotika; nach dem Ausbruch der Tuberkeln genügte ein diätetisches Verhalten.

In einem Falle, wo nach dem Gebrauch des Terpentins Anschwellung des Unterleibes, heftigste Angst, absolute Harnverhaltung und heftigste Icturie, Tenesmus, der Tod eingetreten war, fand Störck das ganze Rectum und den ihm zugekehrten Theil der Blase entzündet oder brandig<sup>1)</sup>.

Es bedarf, wie gesagt, keiner weiteren Erörterung, um die Beziehung dieses Fiebers zu der Ruhr aufzufassen, welches

1) Vergl. die Beschreibung des im J. 1792 in Breslau unter ähnlichen Umständen vorkommenden „Hämorrhoidalfiebers.“ (Hist. med. Fröscher, p. 375.)

einem weniger als Störck dem rein therapeutischen Interesse hingegebenen Arzte sicher nicht entgangen seyn würde.

Nächst diesem „Hämorrhoidalfeber“, gegen dessen Annahme de Haën mit Gründen streitet, die eigentlich nur die unpassende Benennung betreffen<sup>1)</sup>, gedenkt Störck der epidemischen Verbreitung der Masern und Blattern<sup>2)</sup>; und unter den chronischen Uebeln dieser Zeit namentlich einer auffallenden Häufigkeit hydropischer Affectionen.

#### 1759 — 1761. Einfache und typhöse Wechselieber zu Laxenburg. — Lautter.

„Joseph Lautter rechtfertigt die Achtung, welche van Swieten gegen ihn hegte, in jeder Rücksicht, indem er sich den besten Beobachtern von Volkskrankheiten, vor Allen Sydenham anzuerschließen sucht, und in der Ermittlung der Ursachen, wie in der Beschreibung der den Wechseliebern sehr günstigen Gegend von Laxenburg keine wichtige Frage unerörtert läßt. Diese Beobachtung kann überhaupt zu den besseren über Wechselieber gerechnet werden, und zeigt die Spuren des Geistes, mit dem van Swieten die österreichischen Aerzte zu bezaubern wußte.“

So günstig dieses Urtheil Hecker's<sup>3)</sup> über die Schrift Lautter's<sup>4)</sup> schon ist, so sehr gewinnt die letztere durch die Klarheit an Werth, mit welcher ihr Verfasser die Vielseitigkeit der Natur des Wechselieberprocesses in einer Menge von Krankheitsformen nachzuweisen sich bemüht, die sich jenem Proteus unter seiner Beobachtung entbildeten. Verhältnisse, welche damals früher oder später häufig vorkamen, ohne indeß je nach Verdienst gewürdigt und in ihren allgemeinen und durchgreifenden Folgen benutzt zu werden.

1) de Haën, *Nor. med. VII*, 263 seq.

2) Störck, *B.* 154 seq.

3) Hecker, *Gesch. d. neuer. Heilkunde*, S. 425.

4) S. d. Schriftverzeichn.



[1759.]

Die einfachen Wechselfieber des Frühjahrs 1759 wurden durch die gewöhnlichen Sommerkrankheiten, Diarrhoeen und Ruhren fast gänzlich verdrängt. Die letzteren behandelte Lautter nach dem Beispiele seines Vorbildes, Sydenham, mit Rheum und Laudanum. — Aber noch während des Sommers erhoben die intermittirend-remittirenden Fieber ihr Haupt, deren Beschreibung die Hauptaufgabe Lautter's war, und behaupteten ihre Herrschaft länger als zwei Jahre lang. Derselben ergriffen unter vorwiegend gastrischen Erscheinungen alle Klassen der Bevölkerung, alle Altersstufen u. s. w., und veranlassten, wenn auch nicht gleich zu Anfang der Epidemie, doch später, eine nicht unbedeutende Sterblichkeit. Sehr oft und gefährlich wurden Schwangere ergriffen<sup>1)</sup>.

Lautter versuchte in den leichteren Fällen einige der damals getriebenen Ersatzmittel der China, namentlich das *Pulvis Cornachini* u. *P. Comitii de Warwick* u. *febrifugum purgans*<sup>2)</sup>, und er stimmt in die Lobeserhebungen mit ein, welche Cornachini, Helvetius, Kerger, Sylvius, Blegny u. A. m. demselben ertheilt hatten. Es nützte in vielen Fällen, in der Gabe von zwei Scrupeln und darüber, auch wenn es keinen Durchfall erregte. Häufig freilich blieb es nach wirkungslos. Eben so heilsam zeigte sich in leichteren, namentlich in Quotidian- und Tertianfiebern der Salmiak. Immer aber blieb China das Zuverlässigste.

Zu Ende des Sommers 1759 nahmen diese Wechselfieber in ihrem Uebergange zum remittirenden Typus einen ungleich bössartigeren Charakter an, der oft schon zu Anfang, häufiger noch nach dem 3ten oder 4ten Anfalle hervortrat. Stupor, Sopor, Schlagfluss, Delirien, Convulsionen, Angst, Seitenschmerzen, Erbrechen, Durchfälle, heftige ziehende Schmerzen, das waren die häufigsten Symptome, zu denen sich oft noch die

1) Lautter, p. 13.

2) Dieses nach *Heracles totius* genannte, jedenfalls sehr kumultöse Mittel besteht aus gleichen Theilen *Asiaticum sphaerocentrum*, *Scammoneum* und *Cassiae Tinctur*.

Erscheinungen einer Pneumonie gesellten<sup>1)</sup>, in denen nur der Kundige des türkischen Koholâ erkannte, der unter den verschiedensten Masken die Aerzte täuschte und die Kranken ins Verderben stürzte. — Glücklicherweise indes war die Behandlung des Uebels leichter als seine Diagnose, und es widerstand, auch in seinen heftigsten Formen, nur selten der China.

Der Winter (1722) verdrängte diese Fieber fast gänzlich, und brachte statt ihrer eine ausgebildete katarrhalische Constitution, die nur Greisen durch „falsche Pneumonien“ zuweilen gefährlich wurde<sup>2)</sup>. Später herrschten gelinde Masern, und als Produkt übermäßig heißen Verhaltens beobachtete Lautter häufig den falschen Friesel.

Aber schon im März 1760 erhoben jene remittirenden Fieber wieder ihr Haupt, und zwar traten sie nicht, wie im vorigen Jahre, Anfangs einfach und leicht, sondern gleich mit der vollen, ja noch gesteigerten Bösartigkeit des Endes der vorjährigen Epidemie auf. Sie ergriffen selbst Viele noch einmal, die schon im vorigen Jahre befallen gewesen waren, und namentlich erging fast Keiner zwei- und dreimal wiederholten Rückfällen<sup>3)</sup>. Auch jetzt leistete die China die sicherste Hilfe; Unterstützungsmittel der Behandlung aber waren nicht mehr, wie im vorigen Jahre, Aderlässe und Antiphlogistika, sondern *Aseptica*, *Cardiaca* und *Stimulantia*<sup>4)</sup>. — Nächst der China erprobte sich selbst in hartnäckigen Fällen eine damals berühmte Mischung aus Salmiak, ( $\frac{1}{2}$  Drachme — 2 Scrupel) *Sal Abysynthii* und *Antimonium diaphoreticum* (an gr. 15 — 20), welche, wenn sie zusammengerieben wurde, einen höchst penetranten Geruch entwickelte (in Folge des sich entbindenden Chlors)<sup>5)</sup>.

1) Lautter, p. 24.

2) Das., p. 24.

3) Das., p. 28 *rep.*

4) Das., p. 46.

5) Offenbar gehen bei der Mischung der genannten Stoffe mannigfache Zersetzungen vor sich; namentlich dürfte sich kohlensaures Ammon und Antimonchlorid bilden, der Ueberschuss aber an Chlor frei werden.

[1733.]

In diesem zweiten Jahre erhob sich nun die in ihrer Ausbildung steigende Wechselfieberconstitution als zur Erzeugung rein typhöser Krankheitsformen, die zwar Anfangs einen remittirenden Typus zeigten, aber später, und gerade bei dem Gebrauche der China, anhaltend und offenbar durch denselben im Nichts gebessert wurden. — Lautter behandelte diese Fieber, bei denen oft schon früh rother und weisser Friesel, ja Petechien ausbrachen, mit Aderlässen, antiphlogistischen, reizenden Mitteln, Vesicatoren, je nach den Zufällen, und will bei dieser Behandlung nur zwei Kranke verloren haben. Die Hauptkrisen erfolgten durch Harn und Schweiß.

Einen grossen Theil der Schrift füllt die Erzählung einiger Krankengeschichten; Sectionen werden nicht erwähnt.

Als Lautter seine Schrift herausgab, dauerte die von ihm geschilderte Krankheitsconstitution noch fort. Diese erhält aber ihr vorzügliches Interesse weniger durch die Form der in ihr auftretenden Erscheinungen, als durch die Aufeinanderfolge derselben, und besonders durch die von Neuem sich darbietende Entwicklung der bösartigsten typhösen Krankheitsformen aus den einfachsten Gestaltungen des Wechselfiebers, durch die constante und von intercurrirenden Witterungseinflüssen unabhängige Fortbildung einer einmal eingeleiteten Krankheitsconstitution.

Bei dem Mangel an Sectionsaufträgen ist es nicht möglich, zu entscheiden, in welcher Beziehung die letzte der von Lautter geschilderten Krankheitsgruppen zu unserer Abdominaltyphus gestanden habe, mit welchem dieselbe symptomatisch allerdings viel Aehnlichkeit darbot. Wenn es indessen wahrscheinlich ist, dass diejenigen Formen des Typhus, bei welchen sich Hautaffectionen entwickeln, aus leicht einzusehenden Gründen eine geringere Neigung zur geschwürigen Darmaffection haben, als diejenigen, wo dies nicht der Fall ist, so dürfte sich daraus erklären, wie Lautter, der freilich die Zahl der von ihm behandelten Kranken nicht angibt, nur zwei Kranke verlieren konnte.



1757 — 1762. Göttingen. — Riepenhausen, Röderer und Wagler, Werthof und Saalmann, Hensler.

Ein ziemlich vollständiges Bild der Volkskrankheiten der Jahre 1757 bis 1762 ergibt sich aus den Schriften mehrerer Göttinger Aerzte, welche alle jenen frischen und freien Geist athmen, der die junge Pflanzschule der Wissenschaften besaß. Die Reihe derselben beginnt mit einer kleineren Schrift von Riepenhausen, welcher sich alsdann das klassische Werk Röderer's und Wagler's, und die Arbeiten Werthof's, Saalmann's und Hensler's anschließen.

#### 1757 — 1762. Riepenhausen.

Riepenhausen beginnt seine Beschreibung mit der Angabe, dass im Sommer und Herbste 1757 der Typhus mit Pestechien zu Göttingen zuerst unter den niederen Volksklassen sich gezeigt, im Winter sich gesteigert, im Anfange des Jahres 1758 seine grösste Höhe erreicht, und im April sich in ein dreitägiges Wechsellieber verloren habe. Ueber die ersten Anfänge der Epidemie, namentlich ihren mathematischen Ursprung aus Wechselliebern, erfahren wir Nichts. Es war ein ausgebildeter Typhus, ausgezeichnet durch bedeutende Contagiosität<sup>1)</sup> und durch die ganze Summe der Erscheinungen, welche unsern Abdominaltyphus zu begleiten pflegen, obschon über die pathologischen Vorgänge auf der Darmschleimhaut erst Röderer und Wagler Aufschluss gaben. Die Krankheit begann mit Frost und Hitze, namentlich aber mit äusserster Kraftlosigkeit. Die ersteren kehrten am zweiten und dritten Tage, begleitet von Durst, Kopfschmerz, Schmerzen in den Gliedern und Präcordien zurück, während die Respiration noch frei blieb. Zu diesen Erscheinungen gesellte sich Ekel, Erbrechen galliger Stoffe, oft mit Würmern gemischt; zum offenkundigen Zeichen,

1) Zwei der geschäftigsten Göttinger Aerzte, Brendel und Pape erlagen der Krankheit.

[1857.]

dass die den Epidemien dieser Zeit so eigenthümliche Werm-  
erzeugung auch hier nicht fehlte. Der Puls war im Anfang  
der Krankheit schnell und voll, vom achten Tage an langsam;  
das im ersten Zeitraum gelassene Blut von normaler Beschaf-  
fenheit und kaum veränderter Farbe; die Anfangs heisse und  
trockne Haut wurde am den 11ten Tag feucht. Im Beginn der  
Krankheit fand Schlaflosigkeit, vom 8ten Tage an Sopor Statt.  
Schon am ersten oder zweiten Tage brachen binnen 24 Stun-  
den wahre Petechien aus, die bis zum 11ten Tage stehen blie-  
ben, und abdann unter demselben Schussissen zu verschwinden  
pfliegen. Auf der Höhe der Krankheit zeigten sich sämtliche  
Erscheinungen des ausgebildeten adynamischen Typhus. Oft  
fiel durch die ganze Krankheit hindurch Schlucken Statt,  
ohne dass dieses Symptom eine ähliche Bedeutung hatte. Der  
Anfangs dicke, trübe, schleimige Urin wurde am 8ten Tage  
dünn und wässerig, auf der Höhe der Krankheit, am 14ten  
Tage, wiederum dick, trübe und sedimentös. Blieb er so und  
wurde die Haut brennend und trocken, während sich sonst  
keine üblen Zufälle einstellten; so deutete das auf den Aus-  
bruch kritischer Paroxysmen, oder auf eben solche Blutungen aus  
der Nase, zuweilen aus dem Uterus. — In der Zunahme der  
Krankheit stellten sich copiose, gallige, höchst übelriechende,  
mit Würmern gemischte Durchfälle ein, welche bis zur Höhe  
anhielten, wo sie oft durch Schweisse gehoben wurden. Aus-  
serdem war Taubheit von günstiger Vorbedeutung. — Dagegen  
gestaltete sich diese durch das Nichtansprechen, Stehenbleiben  
und Schwarzwerden der Petechien, vorzeitige, profuse Schussisse,  
hartnäckige Verstopfung, schwere Respiration u. s. u. höchst  
ungünstig<sup>1)</sup>.

Am heftigsten und gefährlichsten ergriff die Krankheit Per-  
sonen von 40—50 Jahren. Kinder wurden gar nicht ergriffen.

Riepenhausen's Therapie war eine symptomatische. Er  
stellte zu Anfang der Krankheit stets einen, zuweilen mehrere

1) Riepenhausen, p. 4.

Aderlasse, zu und gab innerlich kühlende Salze, Nitrum, bei der in der Regel Statt findenden Brechkrüftigkeit Brechmittel (Ipecacuanha), die zuweilen ebenfalls wiederholt wurden. So bis zum 5ten Tage. Nach hinreichender Entleerung der „scharfen Galle“ schien es vor Allem nöthig zu seyn, der drohenden Fäulniss entgegen zu arbeiten, die Durchfälle zu beseitigen, und die Hautkrisen einzuleiten. Dazu wurden Solusiva, Diaphoretika, vorzüglich Kampher in Anwendung gesetzt. Bei bedeutenderen, wie es scheint sehr häufig vorkommenden, Ergriffenseyn der Lungen wurde indess mit Hineinglasung dieser Mittel wieder der Aderlass in Gebrauch gezogen. Gegen die Delirien u. s. w., ja selbst zur leichteren Einleitung der Krisen, leisteten Vesicatores grossen Nutzen; niemals beobachtete man bei ihrem Gebrauche die Bildung von Parotiden. Sehr bedenklich war es, im Sopor Brechmittel zu geben; sie bewirkten nie Erbrechen, selbst in doppelter und dreifacher Gabe nicht, sondern stets heftige, sehr häufig den Kranken schnell aufreißende Durchfälle<sup>1)</sup>.

Riepenhausen will bei seiner Behandlung nur den 15ten Kranken verloren haben. Sectionen werden nicht erwähnt. Jedenfalls dürfte der Typhus in dieser Epidemie nicht sehr ausgebildet gewesen seyn.

Die sehr allgemein herrschenden Tertianfieber, welche derselben folgten,boten Nichts Besonderes dar. Ebenso war die diesen im August (1758) folgende Ruhr durch Nichts ausgezeichnet. — Die Salubrität aber des Winters 1758 und des diesem folgenden Frühlings war ausserordentlich, Niemand konnte sich einer so geringen Sterblichkeit erinnern.

Die Masernepidemie, welche vom Juni bis zum November 1759 herrschte und fast alle Kinder ergriff, ist nicht allein wegen ihres offenbaren Zusammenhangs mit den ihr vorausgehenden und mit ihr gleichzeitigen epidemischen Ereignissen, namentlich der Ruhr, sondern auch deshalb interessant, weil

1) Riepenhausen, p. 11.



[1761.]

ihr eine sehr heftige Keuchhustenepidemie folgte. Bekanntlich aber steht dieser zu den Masern in einem so innigsten Verhältniss, dass Autenrieth beide Krankheiten nur ihrer Intensität nach für verschieden erklärte, obgleich gewiss keine wahre Identität, sondern nur eine sehr nahe Verwandtschaft Statt findet <sup>1)</sup>. — In der Göttinger Epidemie wurden die ergriffenen Kinder leicht hydropisch.

Gleichzeitig mit diesem Keuchhusten verbreitete sich im August unter den Erwachsenen die Ruhr, die aber schon im September wieder durch das Petechialfieber verdrängt wurde, welches nun bis zum J. 1761 fort dauerte, und im Ganzen dieselben Erscheinungen, wie in der Epidemie von 1758 darbot. Indessen scheint dieselbe doch unserm Abdominaltyphus näher als jene gestanden zu haben. Wenigstens sagt Riepenhausen, der Gebrauch des Kampfers sey diesmal nachtheilig gewesen, eben so haben kritische Parotiden gefehlt, und sehr einträglich haben sich starke Durchfälle gezeigt. Auch verlor Riepenhausen den 10ten Kranken. Mag deshalb die Epidemie eine geringere Extensivität gehabt haben, intensiver war sie gewiss.

Auch dieses „Petechialfieber“ ging im Frühlinge 1760 in Tertianen über, und diesen folgte alsdann im Sommer die Ruhr und die ganze Reihe der epidemischen Ereignisse, wie sie uns Röderer und Wagler in ihrer klassischen Schrift schildern, zu der wir uns, Riepenhausen's weit unvollständigere Darstellung verlassend, nun hinwenden.

#### 1761. Schleimfieber. — Röderer und Wagler.

Den Mittelpunkt dieser Schrift bildet das „Schleimfieber“ des Jahres 1761. Dieses steht aber in einem zu innigen Verhältnisse zu den ihr vorausgehenden epidemischen Erscheinungen, als dass diese nicht ebenfalls einer genaueren Betrachtung, die ihnen auch von den trefflichen genannten Beobachtern zu Theil wurde, würdig wären. Um so mehr, als die neuer-

1) Vergl. Eisenmann, Krankheitsfam. Pyra. I. S. 259.

dings hin und wieder beobachteten Schleimfieberepidemien nicht immer eine umfassende Beurtheilung erfahren haben, und als selbst ein neuerer ausgezeichnete Schriftsteller in seiner nosologischen Darstellung des sogenannten Schleimfiebers überhaupt jenen Zusammenhang nicht nach seiner ganzen Wichtigkeit aufgefaßt zu haben scheint<sup>1)</sup>.

Zu Göttingen fanden in dieser Zeit dieselben Witterungsverhältnisse Statt, die wir oben besprochen, und welche das J. 1760 zu einem der merkwürdigsten in der Geschichte der Meteorologie gemacht haben. Sehr ausführlich theilt Wagler die Witterungsveränderungen vom Juli 1760 bis zum September 1761 nach Hollmann's Beobachtungen mit<sup>2)</sup>. Die höchste Temperatur des Juli betrug 88° Fahr. d. h. fast 40° R. die niedrigste 24° R. (d. h. in der Sonne), die durch zahlreiche Regengüsse und Gewitter nur zuweilen auf kurze Zeit vermindert wurde. — Noch höher stieg die Hitze im August, und schon seit dem 9ten dieses Monats hörten für dieses Jahr die Gewitter auf. Fortwährend blieb der Himmel trübe, und noch im November war der tiefste Thermometerstand etwas über + 12° R., ja im December sogar + 13° R. und selbst im Januar sank derselbe nicht tiefer als + 6° R. bei beständig sehr reichlichen atmosphärischen Niederschlägen und fortwährend vorherrschenden Westwinden. Im Sommer des Jahres 1761 wiederholte sich aber im Ganzen die Witterungsbeschaffenheit seines Vorgängers.

Die epidemischen Krankheiten dieser beiden Jahre waren nach der Ordnung ihrer Reihenfolge Wechselstieber, Ruhr, Schleimfieber, Blattern, — denen noch Riesenpocken

1) Eisenmann, *de Knochleustulio*. P. 1. c. II, S. 56 ff. wo das Schleimfieber unter dem Namen Guttur-Dysenteria Rosacea abgehandelt wird. — Wie können auf Eisenmann's höchst interessante Bemerkungen später zurück. — Uebrigens bildet die Schrift Wagler's allen ihrer Vorzüge ungeachtet an einem gewissen Mangel an Ordnung, dessen Einfluss auf unsere Darstellung wir möglichst zu vermeiden gesucht haben.

2) Wagler, p. 209.

[1760.]

splitzt wieder die Ruhr, Masern und Scharlach folgten <sup>1)</sup>), eine Gruppierung, die an sich schon für den Kündigen zu Anregung mancher interessanten Betrachtung hinreicht und unter Andern namentlich lebhaft an die epidemischen Ereignisse der Jahre 1760 und der folgenden erinnert, die Sydenham's unsterblicher Griffel verewigt hat. — Nicht geringer ist aber der Ruhm unserer mit wahrhaft Hippokratischem Sinne beobachtenden Göttinger Aerzte, und vor Allem eutging ihnen der innige Zusammenhang zwischen diesen Krankheitsnuancen nicht, die zur verblendeten und einseitigen Systematik aus ihrer lebendigen Ordnung reissen kann.

Folgendes ist die Uebersicht der bemerkenswertheiten Krankheitsgestaltungen dieses Zeitraums. Schon im Juli 1760 kamen, wie, nach Riepenhausen's Darstellung, auch in den früheren Jahren, Wechselfieber vor, die bald regelmäßig und gutartig verliefen, bald aber auch bössartiger und unter der Larve haltender Fieber auftraten <sup>2)</sup>. Diese Wechselfieber dauerten nicht allein im folgenden Monate fort, sondern sie nahmen auch an Allgemeinheit und Bössartigkeit zu. Sehr oft tretzten diese unregelmässigen Wechselfieberformen selbst der China; häufig gingen sie in langwierige Nachkrankheiten, zuweilen in tödtlichen Hydrops über, der nach nach andern Krankheiten, besonders bei alten Frauen, ziemlich häufig war. Zum deutlichen Zeichen des Charakters und der Tendenz aller dieser Erscheinungen erhob bereits, obachon noch sporadisch und gelinde, die Ruhr ihr Haupt; wie denn Kolikschmerzen, Durchfälle u. s. w. theils als selbstständige Beschwerden, theils bei den Wechselfiebern häufig beobachtet wurden.

Im September wurden viele Kinder von einer trocknen „*Toux abdominale, ferine*,“ mit schleimigem Durchfall ergriffen, zu welcher sich hässlichen blutiger Auswurf, Brustschmerz, Druck in den Präcordien, ja selbst blutige Färbung der Stuhlgänge gesellten. Geschwüre und Krätze vertrockneten jedes-

1) Riepenhausen, p. 42.

2) Wagner, p. 55.



mal vor dem Ausbruche der Krankheit, die Wechselfieber dauerten zwar fort, aber sie traten allmählig vor der sich immer deutlicher ambildenden Ruhr zurück, die sich in diesem Zeitraume besonders häufig bei Kindern aus katarhalischen Affectionen hervorbildete. — Im Oktober verschwanden die Wechselfieber fast ganz vor der immer mehr sich verheerenden Ruhr. Säuglinge wurden in dieser Periode sehr häufig von einer den ganzen Körper einnehmenden, Exulcerationen der Haut, besonders in der Sitzbeingegegend, herbeiführenden „*Intertrigo*“ befallen. Andere Kinder gingen an tödtlicher „*Scabies*“, Keuchhusten, Kinnbackenkrampf und Epilepsie zu Grunde. — Im November dauerten diese Uebel fort; zu der „*Intertrigo*“ gesellten sich, wie auch zur Phthisis, häufige Schindeldrüsen. Phtisiker litten häufig an Fussödemen und anhaltenden Durchfällen. Die Ruhr aber erzeugte jetzt häufig Würmer, und kündigte hierdurch, wie durch andere Erscheinungen, besonders ihr allmähliges Selbsterwerden, ihren Uebergang in das Schleimfieber an. — Dieses letztere gelangte im December, besonders aber im Januar 1761, immer mehr zur Alleinbierrschaft, und drückte allen übrigen Krankheiten ihren Charakter auf. — Erst im März begann das Schleimfieber sich allmählig wieder zurückzubilden, nachdem es vorher sich dem eigentlichen Petechialtyphus genähert hatte. In dieser Zeit wurde Icterus, der für das Schleimfieber häufig kritisch war, nicht selten beobachtet. — Im April fingen die gewöhnlichen, meistens gutartigen, Frühlingswechselfieber sich wieder zu zeigen an, aber ganz besonders deutlich offenbarte sich im Mai der Uebergang der Schleim- in die Wechselfieber, bis endlich im Sommer sich die nun folgende variolöse Constitution immer deutlicher zu erkennen gab.

Dies sind die Grundzüge der von Röderer und Wagler geschilderten Krankheitsperiode. Die innige Beziehung ihrer einzelnen Gestaltungen konnte so aufmerksamen Beobachtern nicht entgehen; gleich zu Anfang ihrer Schrift sprechen sie sich auf das deutlichste über die Verwandtschaft des Schleimfiebers

[1760.]

mit der Ruhr, mit den Wechselfiebern und mit dem Scharbat (nach der damaligen umfassenden Bedeutung dieses Ausdrucks) aus. Wir ersparen die Erörterung dieser Beziehung bis auf den Schluss dieses Abschnitts. Aus ähnlichen Gründen begnügen wir auch Anleitung der chronologischen Ordnung mit der Mittheilung der wesentlichsten und wichtigsten Bemerkungen unserer Beobachter über die Ruhr.

Dieselbe herrschte, wie gesagt, vom August bis November 1760 in Göttingen und der Umgegend. In der Stadt zeigte sie sich nicht selten als wahre „*Febris intermittens dysenterica*“. An einigen Punkten der Umgegend herrschten bloss Wechselfieber, z. B. im Dorfe Mengershausen; in einem andern, Macentzen, welches rings von Bergen umschlossen ist, war bloss die Ruhr sehr verbreitet. — Zu Göttingen erreichte die Ruhr ihre Akme im September 1760. Sie zeigte bald einen akuten, bald einen chronischen Verlauf, und kam in allen Graden der Heftigkeit, meistens aber ohne fieberhafte Erscheinungen vor, wenigstens traten diese erst nach einigen „chronischen Präliminarien“ auf. Stets aber stand die Gürtigkeit der Prognose zu der Heftigkeit des ersten Fieberanfalls in einem umgekehrten Verhältnis, indem gerade in den schlimmsten Fällen das Fieber fehlte oder mehr in Folge allgemeinerer katartholischer Zufälle, Schlundangina, denen erst später die eigentliche Ruhr folgte, auftrat.

Röderer und Wagler unterschieden nach der grösseren oder geringeren Bösartigkeit der Krankheit drei Formen derselben.

Bei der ersteren fanden häufige, mehr oder weniger blätige Stuhlgänge Statt, bei allgemeiner Abgeschlagenheit, Verlust des Appetits in den ersten Tagen, Durst, Stuhlzwang und Leibschmerz. Gegen die Krisis hin nahmen alle diese Erscheinungen an Heftigkeit ab, der Puls hob sich, und die Entscheldung erfolgte vorzugsweise durch den Harn, der ein starkes ziegelmothartiges Sediment absetzte, während die Füsse etwas anschwellen. (Auch Rioponhausen hebt wiederholt für

alle Krankheiten dieser Periode die grosse Wichtigkeit der Hämikrisen hervor.) Bei einem Aderlasse floss das Blut schwer aus der Vene, der keine Entzündungskrust absetzende Blutküchen schwamm in vielem Serum, und zeigte auf seiner Oberfläche eine purpurrothe, auf seiner intern Seite eine schwarze Farbe. — Die Exacerbationen fielen in die Abendstunden. Die Zunge zeigte sich trocken, roth, rauh, mit Schleim bedeckt, allmählig feuchter, reiner und blässer werdend.

Bei dem höher gesteigerten Uebel machten sich gleich zu Anfang die grösste Schwäche, gänzlicher Verlust des Appetits, heftiger Darst und häufiges Drängen zum Stuhl, mit Borborygmen, Leibschneiden und heftige Schmerzen im Unterleibe bemerklich, wobei unter Stuhlzwang dünne Flüssigkeiten, die bald mit Blut vermischt waren, bald nicht, bald aber auch ganz reines Blut, ferner gallige, schleimige, mehr oder weniger faulige und übelriechende Stoffe ausgeleert wurden. Ausserdem klagten die Kranken über Schmerzen des trocknen, ja exulcerirten Schlundes. Die rothe, rauhe, trockne Zunge spaltete sich in gleichsam geschwürige Furchen, bedeckte sich mit einem weissen oder parulenten Schleime, und zeigte bedeutende Erhebungen ihrer Papillen. Später wurde sie immer röther, immer geschwollener, und nahm eine exulcerirte Beschaffenheit an. Dabei war der Puls frequent, klein, unterdrückt, schwach, ja schnell, weich, intermittirend, gegen Ende der Krankheit verschwand er fast gänzlich. Das Gesicht zeigte ein blühendes Aussehen; zuweilen kamen vorübergehende flüchtige Stiche in der Brust vor. Es wurde ein halbdurchsichtiger, dicker, fetter, gelber Urin ohne Wölken und Sediment in geringer Quantität abgesondert. — Mit Zunahme der Krankheit, zuweilen schon am 5ten Tage, entzündeten sich die Genitalien und die Gegend des After, allmählig excoriirten sich diese Theile unter den heftigsten, namentlich beim Urinlassen und Stuhlgang gesteigerten Schmerzen, exulcerirten und wurden brandig. — Zu diesen Zufällen gesellten sich Magenschmerzen, Angstgefühl in den Präcordien, [Empfindlichkeit der Hypochondrien gegen angebrach-



[1769.]

ten Druck, Uebelweyn, Erbrechen, innere Hitze des Unterleibes mit küsserer Wärme, soporöser Zustand, tympanitische Auftreibung des Unterbauchs. Gegen Ende der Krankheit wurde das Gesicht immer blässer und nahm den Hippokratischen Anstrich an. Die Excremente wurden schwarz, stinkend, gingen unwillkürlich und zuweilen mit einzelnen Spulwürmern vermischt ab. Die bis dahin ungestörte Respiration ward kurz, röchelnd, ängstlich, tief, aufsetzend, häufig; die Stimme rau, dumpf, schwach, abgebrochen; die Zähne belegten sich mit einem schmutzigen Ueberzug; und unter Schenkelzucken, Zuckungen, vorzüglich in den oberen Extremitäten, erfolgte der Tod.

Eben so gefährlich zeigte sich der mehr chronische Verlauf des Uebels, in Folge dessen allgemeine Abmagerung eintrat, die Haut sich mit einer schmutzigen Kruste bedeckte, und der schmerzhaft Unterleib tympanitisch anschwell. Die Zunge zeigte sich schmutzig, bräunlich, trocken, die Zähne feucht, hin und wieder zeigten sich tief in der Haut schwarze, exanthematische, gangränöse Flecken. Am Hüftein und im Kreuz erzeugte sich trockener, brandiger Decubitus. Der heftige Durst konnte wegen Schlingbeschwerden und Schlangenschmerzen nicht gestillt werden, das Getränk wurde entweder unter Röcheln wieder ausgeworfen oder fiel hörbar hinab. Die copiosen Stuhl-  
abgänge waren im höchsten Grade übelriechend. Dabei fand in dieser Form kein oder nur höchst unbedeutendes Delirium und mässiger Sopor Statt. Zuletzt erfolgte der Tod durch Erschöpfung. Bei Andern ging der noch langsamer verlaufende Krankheitsprocess auf die Lungen über, und rief den Organismus, unter trügerischem Scheine der Genesung, durch Phthisis auf. —

So vortreflich die Beschreibung ist, welche Röderer und Wagler von der Krankheit selbst geben, so sehr muss das von ihnen angewendete therapeutische Verfahren als ein rein symptomatisches bezeichnet werden. Es ist indessen ganz dasselbe, auf welches sich noch jetzt der Gesichtskreis der meisten Aerzte beschränkt, von denen nur wenige das Bedürfnis haben, der

innersten, wesentlichsten Eigenthümlichkeit der Krankheit, den mehr oder minder offenbaren Fingerzeigen der Natur selbst die Indicationen eines wahrhaft rationellen Heilverfahrens abzulesen. — Unsere Göttinger Aerzte, Röderer und Wagler sowohl als Riepenhausen, wandten Brechmittel, zuweilen Aderlässe, Rhubarber, Demulcentia, vorzüglich Manna, Oleum, fäulnisswidrige Mittel, Opiate, Klystiere, und unter Umständen Chinaextract an. Von der Anwendung des *Filix Antiacidi ceratum* beobachteten sie fast stets Zunahme der Angestufte und Steigerung des Durchfalls<sup>1)</sup>. Auffallend ist es, dass der 22 Jahre früher erschienenen Schrift Degner's<sup>2)</sup> keine Erwähnung geschieht.

Genau sind die Angaben über die Resultate der Leichenöffnungen, welche im Allgemeinen mit dem von Bonet und Pringle Beobachteten übereinstimmen. Die Leichen blieben noch lange nach dem Tode warm, und gingen schnell in Fäulnis über. Die Gedärme zeigten sich sehr entzündet, hier und da brandig, um so mehr, je weiter sie sich vom Magen entfernten. Die Schleimhaut des Duodarmus sah wie injicirt aus, und war mit hundert zahlreichen Punkten und kleinen schwarzen Flecken („*areolae*“) bedeckt. Die Schleimhaut des Dickdarms war „*zerrißen*“ („*lacerata*“), ungleich, wie verbrannt, dunkelroth, ja schwärzlich gefärbt. Sie war mit hügelartigen abwechselnden, harten, schwarzen Erhabenheiten bedeckt, zwischen denen sich vertiefte furchenartige Stellen befanden, die gewissermassen erodirt und geschwürig erschienen; ihre Oberfläche war ungefähr so beschaffen, als wenn ein entzündeter oder verbrannter Theil durch die heftige Spannung Risse bekommen hätte, und sich in schoefartige Erhabenheiten erhebe,

<sup>1)</sup> 1) Das *Filix Antiacidi ceratum*, eine Mischung des Spinnglases (Schwefelantimonasyl) mit Wachs, ein höchst zweckmässiges Brechen und Purgiren erregendes Gemisch, stand damals gegen die Ruhr in einem Rufe, den es vielleicht seiner Anwendung bei der rheumatischen Form dieser Krankheit verdankte.

2) S. oben S. 283.

[171a.]

zwischen denen sich würde Furchen befinden<sup>1)</sup>. Selten fanden sich in dem Dickdarm einzelne dünne, abgezehrte, kleine Spulwürmer<sup>2)</sup>, nie im Dünndarm. Die Leber war mit lividen Streifen überzogen, ihre concave Fläche und der rechte Rand gänzlich blauschwarz gefärbt. Dagegen zeigte sich ihr Parenchym, wie das der Milz und der übrigen Eingeweide, gesund. Die etwas schleimige Galle war normal beschaffen, das Pankreas sehr verhärtet. In der Brust- und Bauchhöhle fanden sich keine, im Herzbeutel nur sehr unbedeutende Exsudate. Das Herz klein, fest, die Kronegefäße turgescirend. Die Lungen gesund.

Zu Anfang des November traten, wie schon erwähnt, diese Fahren immer mehr zurück, die leichteren, chronischen Formen wurden häufiger, Viele litten an gewöhnlichen Diarrhöen, und diese vorzüglich schienen den Uebergang in das nun sein Haupt erhebende Schleimfieber zu vermitteln.

Wagler unterschied drei Formen dieses letzteren, die chronische, die akute und die langsam verlaufende, ausserdem die Complicationen des Schleimfiebers mit andern Zuständen, Schwangerschaft, Wunden u. s. w.<sup>3)</sup>.

1. Chronische Form. Bei dem chronischen Verlaufe besorgten die Kranken noch eine Zeitlang ihre gewöhnlichen Geschäfte, während zuerst der Appetit gestört, krankhaft verändert erschien, zuweilen, namentlich des Morgens, Brechneigung eintrat u. s. w. Bei Einigen stellte sich leichte, schleimige, bald nachlassende, bald wiederkehrende Diarrhöe, bei Vielen ein quälender, trockner Magenlaster ein. Bei Manchen

1) Diese schwer zu übersetzende Stelle lautet im Original folgendermaßen: „*Altera areat colliculosa, duras, nigrae, cum mediis colliculis et sulcis depressabilibus, nobis tenuis, sulphureis, oleis oleifera; atque aspersa de fere comparsa est, ut si per suffragmen aut combusta, a vicino igne tenuis fumus delibaret et elateris sui in colliculis, carbonis simul corrumpatur, medius autem siccus in parte laevi relinquitur.*“ (p. 8.)

2) Diese „Würmer“ waren jedoch, wie sich aus späteren Angaben ergibt, Exemplare des *Trichocephalus dispar*.

3) Wagler, p. 28 seq.



bildete sich ein oder das andere ephärische Geschwürchen im Munde, an der Zunge, unter gleichzeitigen schwachen, unregelmässigen Fieberbewegungen, meist zugleich mit Schmerzen im Zahnfleische. — Die reichliche Wurmerzeugung war besonders dieser Form der Krankheit eigenthümlich; diese Parasiten gingen sehr häufig und in grossen Mengen lebend durch den Mund, oder (meistens todt) durch den After ab. Diese Entelminthen waren theils der gewöhnliche Spulwurm, (*Ascaris lumbricoides*) oder der von Röderer in dieser Epidemie zuerst beobachtete und genau beschriebene Peitschenwurm, *Trichocephalus*, der auch in neueren Schleimfieberepidemien eine so grosse Rolle gespielt hat. In der Regel fand man diese Helminthen im Blinddarm, nie ausserhalb des Dickdarms, während sich die Spulwürmer dagegen im Dünndarme aufhielten.

Diese chronischen Formen brachten nur dann Gefahr, wenn sie in den akuten Verlauf übergingen, obachten sie sich nach hier häufig durch normale Fieberkrisen von selbst entschieden. Oft wurden sie durch ein regelmässig verlaufendes Wechselfieber gehoben, — zum deutlichen Beweis der nahen Verwandtschaft auch des Schleimfiebers mit dem Intermittensprocesse; — zuweilen durch scabiose, herpetische und andere Hautausschläge. Personen, welche an „nächtlichen Fieberbewegungen“, an Morgenschweissen, an chronischen pustulösen Hautausschlägen, Schwitzen der Füsse u. s. w. litten, Fontanelen trugen, blühen, selbst wenn sie fortwährend dem Contagium ausgesetzt waren, von der Krankheit verschont. — Die Krisen aber, selbst bei der chronischen Form, wurden theils von der Schleimhaut des Darmkanals, der Lungen, der Nase, oder der Geschlechtstheile (weisser Fluss) durchgeführt <sup>1)</sup>. Zuweilen wurden diese Krisen durch pustulöse Exantheme, „*Intertrigo*“, Geschwürchen auf der Haut, an den Lippen, dem Zahnfleische, durch Aphthen in der Mundhöhle vervollständigt. Ausserdem kamen kritische Nacht- und Morgenschweisse, so wie Urinkri-

1) Wagler, p. 37.

[1768.]

sen (mit schleimigem Sediment u. s. w.) vor. Häufig zeigte sich auch eine ödematöse Geschwulst um die Knöchel, welche nach Abgang von Wärmern verschwand. Häufig entschied sich das Uebel ferner durch eintretende Gelbsucht, welche überhaupt während der Epidemie häufig vorkam.

Der Uebergang der chronischen Form in die akute und fieberhafte wurde meist durch lange, zuweilen Monate anhaltende Durchfälle, die bald schleimig waren, bald auch Blutspuren enthielten, bedeutendes Schweregefühl in den Gliedern, Anschwellung der Knöchel, Entstehung oder Steigerung des Magenhustens, Leibschmerzen, vorzüglich im Unterbauche, Zunahme des Ekel, Erbrechen, faden, bitteren Geschmack, Durst, Schmerz des angeschwellenen und mit Aphthen besetzten Zahnfleisches und des wirklichen Ausbruch des Fiebers vermittelt.

## II. Akute Form.

Der akuten Form des Schleimfiebers gingen immer eine Zeitlang die geschilderten Erscheinungen der chronischen, wiewohl etwas heftiger, voraus, und nur allmählig entwickelte sich der akute Verlauf, wenn den Eintritt des Fiebers nicht besonders schädliche Einwirkungen, namentlich Gemüthsbewegungen, beförderten. Mit dem Eintritt des Fiebers hörte die Menstruation auf, Hämorrhöen traten zurück, die chronische Diarrhoe verschwand, es entstand häufig wiederkehrende Herzensangst, erschwerte Respiration, Magendruck, heftiger Ekel, Erbrechen und Frost, aus dessen Intensität auf die Heftigkeit und Bösartigkeit der nachfolgenden Krankheit geschlossen werden konnte.

### 1) Gutartige Form.

Die gutartige Form des akuten Schleimfiebers machte ihren ersten Anfall und ihre Exacerbationen in der Regel des Abends; dem Froststadium folgte in der Nacht ein entsprechend ausgebildetes Hitzestadium, mit heftigem Durst und Kopfschmerz, vorzüglich im Vorderkopfe, je nach der Individualität des Falles mehr oder weniger deutlich ausgesprochen. Der Appetit verschwindet gänzlich, die Kranken werden von stetem Brech-

reiz gequält, während der Stuhl verstopft ist, selten zeigen sich profuse Schweisse, am seltensten an der obern Körperhälfte. Gleichzeitig gibt sich die Affection der Respirationsschleimhaut durch trocknen, krampfartigen Magenbreiten zu erkennen. Durch Brechmittel werden reichliche Mengen von Schleim, mehr oder weniger Galle, zuweilen auch Spalwürmer ausgeworfen; das gelassene Blut springt in einem starken Bogen aus der Vene, die Oberfläche des glänzenden Blatkachens ist mit einer dünnen, weissen oder bläulichen, halbdurchsichtigen Faserstoffschicht bedeckt. Die Quantität des Serums ist unbedeutend. Bei Vollblütigen erzeugt der Husten häufig flüchtige Stiche durch die Brust, sie klagen über Herzensangst, Respirationsbeschwerden, Schmerzen in den Hypochondrien. Dabei zeigt sich das Gehirnleben in allen Abstufungen von der Unruhe bis zum Delirium aufgeregt. Bei sehr heftigem Fieber entstehen zuweilen statt des Durchfalls unter Gliederachmerzen profuse Schweisse. Bei Andern treten am 3ten oder 4ten Tage nach Darreichung von Abführmitteln Durchfälle ein, die auch ohne den Fortgebrauch der ersteren fortauern. Diese sind im Anfang schleimig, später nicht selten mit Blut vermischt, zuletzt gallig, selten schaumig und plötzlich eintretend, ausser zu Ende des Lebens, wo sie einen fauligen Geruch annehmen. Mit den Durchfällen sind die heftigsten Kolikschmerzen und Tenesmus verbunden. Häufig gehen Würmer, selten Blähungen nach oben ab. Mässiger Durchfall ist häufig schmerzlos, und verschafft dem Kranken sichtlich Erleichterung.

Plethorische zeigen während des Verlaufs der Krankheit fortwährend eine blühende Gesichtsfarbe, zuweilen auch Röthe der übrigen Körpertheile. Häufiger bei Kindern als Erwachsenen ist der Unterleib hart, aufgetrieben und gegen Druck empfindlich. Dasselbe gilt vom Kitzeln in der Nase. Häufig schmerzen die Füsse, seltner sind sie geschwollen, bei Kindern ist dies im leichteren Fällen häufig gleich zu Anfang des Fiebers der Fall. Eins der constantesten und am meisten charakteristischen Symptome ist die Excoriation der inneren Oberfläche



[1846.]

des Mundes, der angeschwollenen Zunge und des schmerzhaften Zahnfleisches. Die Mundhöhle und der Schlund sind mit einer starken Schleimdecke überzogen, während der Fieberexacerbationen trocken, dieselbe reichliche Schleimsecretion findet in der Luftröhre Statt und macht die Respiration rüchelnd. Der Geschmack ist fade, zuweilen etwas bitter, die Zunge ist ziemlich trocken, blais, weiss, glänzend, mit einem dicken, weissen, schaumigen Schleime überzogen, an ihrer Wurzel gelb, bräunlich, an ihren Rändern und der Spitze meistens roth. Die Papillen derselben treten vorzüglich bei Kindern und Frauen erhoben und geröthet unter dem Schleime hervor. Nicht selten exulceriren auch Zunge und innere Oberfläche des Mundes, und bedecken sich zur grossen Qual der Kranken mit Aptyhen. Die Stimmheute hat, auch wenn keine Schmerzen zugegen sind, einen klagenden Ausdruck. — Der Urin ist gelb, roth, dick, und, wenn die Krankheit nicht von bläuerer Natur ist, ohne Sediment; am vierten Tage wird er trübe, lehmig, mit einem grauen, weissen, leichten, schleimigen, zuweilen etwas ziegelmehlartigen Bodensatz, mit einem Ringe an den Wänden des Glases. Manche Kranke leiden an beträchtlichem, oft ziemlich anhaltendem Harabrennen. — Die Beschaffenheit des Pulsus ist bei den einzelnen Kranken sehr verschieden. Während derselbe bei Plethorischen in leichteren Fällen und zu Anfang der Krankheit aufgeregt, voll, mehr oder weniger hart und frequent ist, zeigt er unter entgegengesetzten Umständen eine entgegengesetzte Beschaffenheit; stets aber bleibt er frequent; bei krampfartigen Zufällen, Delirien u. s. w. wird er oft unzufühlbar. Gegen den Eintritt der Krisis hebt er sich wieder, wird freier, voller, weich und saft („Mansuet“) und nimmt an Frequenz ab. Mit Zunahme der Durchfälle und der Unterleibssymptome wird er kurz, frequent, zusammengezogen, hirtlich, ungleich, unregelmässig, ja intermittirend.

Krisen. — Die Naturheilskraft gab sich bei dem Schleimfieber durch eine grosse Mannigfaltigkeit kritischer Bestrebungen zu erkennen, die als mehr oder weniger vollständig und

zum Ziele führend betrachtet werden mussten. Am häufigsten erschienen nächtliche und Morgenschwäche, an verschiedenen Tagen, den 9ten, 11ten, 14ten, 17ten, während des Schlafs ausbrechend, die zuweilen einen sauren Geruch hatten, und selten mit einer leichten ödematösen Anschwellung der Fußknöchel verbunden waren. Kritisch war ferner freiwilliges oder künstlich beurrktes Erbrechen von reinem oder mit Galle gemischtem Schleim, sobald es mit der Zeit und den übrigen Symptomen in Uebereinstimmung stand. Ebenso waren Urinkrisen häufig; ein leichtes, weißes, etwas ziegelaschartiges Sediment, ein weißes, schleimiges, festes, strenger abgeschnittenes und schwereres, am 7ten, 9ten, 11ten Tage; ein trübes („samentös“), gelbes, den 22sten; abwechselnd wieder schleimiges, selten röthliches; zuweilen ein aufschwimmendes Fetthäutchen. Wagler rechnet zu diesen kritischen Erscheinungen in gewisser Beziehung auch die oben unter den Krankheitsymptomen beschriebenen Aphthen und Mundgeschwüre, so wie die Anschwellungen des Zahnfleisches. Ausserdem kamen oft exanthematische Krisen vor, namentlich ein am 11ten Tage ausbrechender pustulöser Lippenauschlag, der sich zuweilen auch über den übrigen Körper, besonders die Brust und die Arme verbreitete. Ausserdem kamen entzündete, eitrige Pusteln vor, die am 6ten, 11ten, 21sten und 23sten Tage ausbrachen, und zuweilen das Ansehen wahrer Furunkeln darboten. Endlich kamen auch am 14ten Tage arabisöse und purpurartige Exantheme („*purpuracea exanthematosa*“) vor. Seltener erzeugte sich Decubitus, welchem eine Metastase auf das innere Ohr, mit beständigem Sausen, Schwerhörigkeit (schon am 7ten Tage bemerklich) und Stumpfsein vorherging, welche Erscheinungen aber mit dem Erscheinen des Decubitus verschwanden<sup>1)</sup>.

1) Es ist bekannt, dass der Decubitus häufig eine kritische Bedeutung hat, und den aufgetriebenen nekrotischen Zuständen an der Nare, den genanten Fungarben (s. B. in der ungarischen Krankheit) des Genitalien (Fist., Kistlettyphus) gänzlich analog ist. — Es ist ist indess dieser deutliche Fingerzeig der Natur therapeutisch noch wenig ins Auge gefasst worden.

[1766.]

Einige Male entschied sich die Krankheit auch durch schleimige Durchfälle, Schleimexpectoration durch den nun gelinderen und feuchteren Husten. (Wagler führt nach kritischen Wurmehgang mit auf.) Einmal wurde bei einer Wächnerin Anschwellung der Brustdrüse beobachtet<sup>1)</sup>. Vielleicht mussten auch sparsames Nasenbluten und Bluthusten zum Theil hierher gerechnet werden. —

Nicht selten machte das Fieber am siebenten Tage einen Rückfall; dann entschied es sich entweder am vierten Tage durch Durchfall, oder durch eine mehrere Unzen betragende Nasenblutung, durch ein milchiges Harnsediment am 7ten, und durch am 17ten eintretende Fussgeschwulst. — Häufig wurden auch die Krisen in einem längeren Zeitraum und in weniger bemerkbarer Weise durchgeführt.

Uebergänge in andre Krankheiten und Folgeübel. — Dieselben waren ziemlich häufig. Einmal ging ein Recidiv des Schleimfiebers in eine vollständig verlaufende *Quotidiana* über. Zu Ende der Epidemie war der Uebergang in den, wie erwähnt, gleichzeitig häufig vorkommenden (örtlichen und allgemeinen) Icterus nicht selten. Ausserdem liess das Schleimfieber viele Nachkrankheiten zurück, Schmerzen und Zittern der Glieder, Rauheit der Stimme, Geschwülste und Abscesse des Mundes, Ophthalmieen, leichte Fussödeme, aber auch tödtlichen Ascites.

Prognose. — Günstig zeigte sie sich bei normalem Verlaufe der Krankheit, ungünstig bei Uebergang in die biliosa und putride Form, bei bedeutender Lungenaffection, Uebergang in Phtisis, Darmbrand. Diese Ausgänge mussten erwartet werden, wenn die Leibschmerzen mit Kürzerwerden der freien Zwischenräume sich ungewöhnlich vermehrten, oder der Husten sehr zunahm. Allmählig wird der Durchfall colligativ, die Excrementen gehen Stossweise oder unwillkürlich ab, sind schwarzlich, gallig, faulig, zuweilen blutig, höchst übelriechend und mit

1) „*Fecula rivioli albastris die septimo crasi est in guttu sanguinis gelatinosa*“ sagt Wagler ziemlich unverständlich klar.



dem äussersten Sinken der Kräfte verbunden. Ist endlich Darmbrand eingetreten, so hören die Schmerzen zwar auf, aber der Kranke verfällt in trübige, nur zuweilen von hellen Zwischenräumen unterbrochene Delirien oder dumpfen Sopor, und stirbt unter colligativen Schweissen u. s. w. — Geht der Zug des Krankheitsprocesses mehr nach den Respirationsorganen, so bilden sich in diesen Infiltrationen, die Bronchien füllen sich mit Schleim, den der Kranke auszuwerfen unfähig ist u. s. w.

## 2) Bösartige Form.

Es versteht sich von selbst, dass zwischen der gutartigen und dieser Form mannigfache Uebergänge gegeben waren, obwohl die äussersten Grade beider sich wesentlich von einander unterschieden. Eine Mittelform zwischen beiden bezeichnet Wagler als *Febria mucosa veniosa*.

Die bösartigen Formen des Schleimfiebers waren vorzüglich in dem späteren Zeitraume der Epidemie, gleichzeitig mit den bösartigeren Formen des Wechselfiebers, häufig. Dieselben zeigten sich zuerst in einem einige Meilen von Göttingen entlegenen, sehr überfüllten Krankenhause, gelangten von da in ein anderes und zuletzt in die Stadt, zuerst die niederen Volksklassen, dann aber auch die übrigen ergreifend<sup>1)</sup>. Diese bösartigeren Formen kamen vorzüglich in den Militärspitälern zu Kassel<sup>2)</sup>, Oxendorf und Reinbeck<sup>3)</sup> vor, und ergriffen auch viele Aerzte und Krankenwärter. Am leichtesten wurden Leberkranke, nie solche Personen ergriffen, welche im Herbste zuvor ein Wechselfieber gehabt hatten; am häufigsten wurden Erwachsene, niemals Kinder, am gefährlichsten Männer ergriffen.

Diese Form des Uebels hatte zu Anfang fast stets einen entzündlichen Anstrich, der aber nur zu bald sich in den putriden Charakter umwandelte. Warmerzöugang fand selten, und dann immer zum Verderben des Kranken Statt. Der akute

1) Wagler, p. 64 seq.

2) H. p. 17.

3) H. p. 20.

[1768.]

Verlauf des Fiebers zog sich gewöhnlich bis zum 14ten bis 21sten Tage hin, wo es sich theilweise kritisch entschied, um dann noch eine Zeit lang (zweilen länger als 30 Tage) in einer *Fevbris lenta* die völlige Beendigung des Krankheitsprocesses durchzuführen. Oft aber endete es schon am 9ten, 14ten oder 21sten Tage, entweder durch Entzündung und Brand der Unterleibsorgane im langsameren oder schnelleren Verlaufe, oder durch Zerstörungen ähnlicher Art in den Respirationsorganen. Bei den meisten Kranken aber folgten die tödtlichen peripneumonischen Erscheinungen den Unterleibsauffällen; der zweilen beobachtete Ausbruch von Petechien war prognostisch völlig bedeutungslos. Die Hauptregel in dieser Beziehung war die, dass nur die Rückkehr des Uebels zu dem normalen Verlaufe der gutartigen Form günstig erschien. — Viele Kranken, namentlich solche, die schon vorher an chronischen Uebeln litten, gingen auf langwierigerem Wege durch organische Fehler, äussere und innere Verschwürungen, durch allgemeine Erschöpfung, Hydrops, Phthisis u. s. w., zu Grunde.

Von der gutartigen Form unterschied sich die bösartige durch den Mangel der Aphthen, der Geschwulst des Mundes, der Zunge und der Füsse, durch die grössere Heftigkeit der Gliederschmerzen, durch den Mangel oder die kurze Dauer des Stadiums der Vorboten, durch den Mangel oder doch die grosse Seltenheit der Durchfälle vor dem Ausbruche der Krankheit u. s. w.

Wagler unterscheidet als Unterarten der bösartigen die putride und die entzündliche Form.

a) Die erstere beginnt stets mit trügerischen Vorboten, Frösteln am Morgen, dem am Abend Hitze folgt; Viele erwachen mitten in der Nacht, vom heftigsten Fieber, Kopfschmerz, Pulsiren der Arterien und Durst ergriffen. Sie gehen zwar noch einige Tage lang umher, aber ohne im Stande zu seyn, ihre gewöhnlichen Geschäfte zu besorgen; das abendliche Fieber zeigt den täglichen oder drittlägigen Typus; am 4ten Tage werden die Kranken meist bettlägerig. Zu dem heftigsten

Kopfschmerz gesellt sich Schlaflosigkeit, Durst, bitterer Geschmack, Aufstoßen, Druck im Unterleibe, der mit Abgang von Blähungen nach oben und Erbrechen aufhört, welches letztere schleimige, mit etwas Galle gemischte Stoffe entleert. Zur höchsten Schwäche gesellen sich heftige, des Nachts exacerbirende Gliederschmerzen, die durch Abführmittel gelindert werden. Der Stuhl ist in den ersten Tagen meistens verstopft; selten klagen die Kranken über Schmerzen im Unterbauch, und diese sind stets um so gelinder, je heftiger die Glieder schmerzen. In der Nacht werden die Kranken durch Phantasmen beunruhigt. — Meistens tritt am 4ten Tage mit einer Naxenblutung, Durchfall, Harnsediment, eine trügerische Krise ein, nach welcher die Erscheinungen um so stürmischer wiederkehren. Zu dem Kopfschmerz gesellt sich Schwindel, der durch Erbrechen etwas gemildert wird. Ein gelinder, schmerzloser Durchfall wird zuweilen, aber selten, durch Schweiß unterbrochen, am 6ten Tage fließen meistens wieder einige Unzen Blut aus der Naxe ab. Um dieselbe Zeit zeigen sich bei zuweilen sehr beträchtlichen Schweißes die ersten Spuren von Delirien. Der mühsam zurückkehrende Schlaf ist unruhig, von Träumen und Phantasmen beunruhigt. Bei Manchen brechen rosenrothe, runde Petechien wie Flohstiche auf der Brust, dem Halse, den Armen und den Schenkeln aus. Statt findende Diarrhoe indess schließt diese Petechien aus. Am 7ten Tage treten mit Nachlass des Schwindels Ohrensausen und Schwerhörigkeit ein, die Respiration ist beschleunigt, ängstlich, unterdrückt. Die Durchfälle sind nicht selten gallig, übelriechend und werden oft Stossweise entleert. Auch diejenigen Kranken, bei welchen keine Exantheme ausbrechen, beobachten um die Zeit ihres gewöhnlichen Eintritts ein gesteigertes Wärmegefühl in den oberen Extremitäten, dem ein sehr leichtes Frösteln vorhergeht. Das Erbrechen entleert braune und grüne Stoffe; die Stimme ist weinerlich, schwach. Die Kräfte sinken immer mehr. — Bei Andern tritt nach heftigen Kopf- und Gliederschmerzen, Durst, Schlaflosigkeit



[1860.]

keit, Delirien, erst am 9ten Tage der Durchfall, von bedeutendem Sinken der Kräfte begleitet, ein. Ein trockner Husten quält die Kranken, die zum Auswerfen des angesammelten Schleims zu schwach sind, Durst und beständige Trockenheit des Schlundes. Sie haben um diese Zeit (den 9ten Tag) zuweilen ein leichtes Frostgefühl und das Bedürfniss wärmerer Bedeckung. Die Zähne des Unterkiefers sind schmutzig benetzt, die obern rein. Vom 9ten Tage wird bei Vielen der Durchfall immer häufiger, zur grössten Schwäche gesellt sich bei jeder Körperbewegung Zittern der Glieder. Um den 11ten Tag hören die Durchfälle zum Theil oder gänzlich auf, und die Krankheit entscheidet sich entweder kritisch, unter Zunahme der Schwerhörigkeit, die nicht selten zur völligen Taubheit wird, durch eine kritische Schleimdiarrhoe, oder durch einen leichten, mit schleimiger Expectoration verbundenen Husten, milchiges Urinsediment, durch den Ausbruch einiger Pusteln, oder eine andere unvollkommene Krise, Rückkehr des Appetits, — oder aber die Symptome werden noch gefährlicher, und die Krankheit geht in ihr letztes Stadium über. — Im ersten Falle bleibt die Schwere des Kopfs, der Durst steigt, u. s. w., der Kranke weint unwillkürlich, die Haut bedeckt sich mit einem schmutzigen Ueberzuge, der Durchfall hört auf, und ist nicht mehr faulig und übelriechend, der Stuhlgang ist zuweilen normal oder rein schleimig, die Nächte werden ruhiger, es treten pustulöse Exantheme, kritischer Decubitus auf, und allmählig stellt sich unter den bekannten Erscheinungen die völlige Genesung ein.

Nimmt im Gegentheil die Krankheit eine unglückliche Wendung, was sich schon aus der grösseren Heftigkeit der oben geschilderten Symptome entnehmen lässt, so verschwindet das Ohrensausen, und das Gehör kehrt völlig zurück. Die Haut zerfließt in Schweissen, und der Kranke behauptet fortwährend die Rückenlage. Dem After entfliessen braune Flüssigkeiten mit häufigen Blähungen, die Glieder zittern, eben so die hinter den Zähnen liegende Zunge. Im Sopor treten leichte Convulsionen der oberen Extremitäten ein, die Respiration ist röchelnd,

die Conjunctiva überzieht sich mit schmutzigem Schleime, die Augen sind starr und unbeweglich. Das Gesicht schwillt etwas an. Der Puls ist bald voll, bald klein, unterdrückt und aussetzend. Häufig macht sich um den 11ten Tag eine anscheinende Besserung bemerklich, indem die Zunge feucht wird, der Kranke eine Seitenlage annimmt, und überhaupt die Heftigkeit der Symptome nachläßt, aber diese Täuschung weicht schon am andern Tage einer desto offenkundigeren Verschlimmerung. Selbst beim Erwachen ist der Kranke bewusstlos, am 12ten Tage kehrt der Sopor zurück, die obern Extremitäten und der Unterkiefer werden von Krämpfen ergriffen. Der Athem ist tief, die braune, trockne Zunge starr, der Urin wird wieder roh, die Krämpfe ergreifen auch die untern Extremitäten; der Kranke liegt im tiefsten Sopor; wenn er in lichterem Augenblicke bestrbt ist zu reden, so gehen die Worte in einem undeutlichen Gekramel verloren, und der Unterkiefer wird krampfhaft ergriffen. Das Schlucken ist sehr erschwert und ruft Schluckzen hervor. Kurz es treten alle die so bekannten Zeichen des Todeskampfes bei typhösen Krankheiten und endlich der Tod selbst ein.

b) Weniger ominös waren die, obzchon immer zu den böartigen zu rechnenden, entzündlichen Formen. Hier fehlte häufig der Durchfall, er entleerte nur wenig Schleim, keine Würmer, ja es fand selbst Verstopfung Statt. Nach einer oder einigen stüssigen Nasenblutungen brachen um den 6ten Tag zahlreiche Petechien aus, die die ganze Krankheit hindurch, selbst nach dem Tode noch, stehen blieben. Bei Vielen entschied sich dann schon am 7ten Tage die Krankheit durch reichliche Lungenexpectoration, unter Ohrensausen und Schwerhörigkeit. Im ungünstigeren Falle traten an demselben Tage wüthende Delirien, später Sopor, Flockenlesen u. s. w. ein. Die Krisis bildet sich hier durch Schleimkrisen der Nase und Lungen, bei Arthritikern durch Gliederschmerzen, und so verschwindet die Krankheit allmählig mit dem 18ten Tage. — In leichteren Fällen folgen die Delirien, die sich bis zur höchsten

[1768.]

Wuth steigern, auf freiwilliges Erbrechen, Stiche in der Brust, Angst und Trägheit des Stuhlgangs, ohne dass Exantheme ausbrechen. Durch das Erbrechen werden braune, schleimige Massen und Würmer entleert, worauf bedeutende Besserung folgt. Die Hauptkrise aber bildet die um den 11ten Tag reichlich eintretende schleimige Lungenexpectoration.

Bei einigen Kranken, denen kein Blut entzogen worden war, wurf sich das Uebel, nach hartnäckiger, zuweilen 7tägiger Verstopfung, auf irgend einen durch frühere Krankheit geschwächten Theil, namentlich die Beckenorgane und Genitalien, und erzeugte dort die heftigste Entzündung, mit bedeutenden Blutextravasaten, mit Brand des Dickdarms und der Muskeln. Am Tage vor dem Tode ging durch den After etwas Blut ab.

### III. Die schleichende Form des Schleimfiebers.

1) Die gutartige Form. Diese Form der Krankheit ergriff fast ausschließlich Kinder von 2 — 14 Jahren, vorzüglich solche, die zu Anfang des Winters an Scabies, die nun unterdrückt wurde, gelitten hatten. Bei Manchen verlief das Uebel leicht und gefahrlos, bei Andern nahm es einen tödtlichen Ausgang. — Die leichtere Form kam vorzüglich bei Säuglingen vor, und war, merkwürdig genug, von Aphthen und Wurmerzeugung nicht begleitet. Eben so leicht und beinahe chronisch verlief das Uebel bei älteren Kindern, bei denen es immer unsere Affectionen, z. B. Ophthalmale, auf gewissermassen kritische Weise erzeugte.

Die Krankheit beginnt mit einem leichten Froste, unregelmäßigem, von Zeit zu Zeit ganz verschwundenem Appetite, während Säuglinge die Brust gern nehmen. Bei Andern bleibt der Appetit die ganze Krankheit hindurch ungestört. Bei den Meisten ist der Unterleib die ganze Krankheit hindurch hart und aufgetrieben, der Geschmack bitter, es stellt sich häufiger schleimiger Durchfall ein und auf den Genuss von Speisen folgt Druck im Unterleibe, zuweilen Fieberhitze und Kopfschmerz; bei Manchen gehen zu Anfang der Krankheit Würmer ab. Nicht selten kehren Frost, Hitze und Kopfschmerz mehreremal



zurück. Die Zunge ist meistens mit Aphthen besetzt, das schmerzende Zahnfleisch und die Zunge exulceriren zu grosser Qual der kleinen Kranken, welche ausserdem über Jacken in der Nase klagen, deren Gesicht sich röthet, die unwillkürlich Thränen vergiessen und unruhig schlafen. Brechnmittel entleeren eine schleimige, zuweilen mit etwas Galle vermischte Masse. Dazu gesellt sich unter gesteigerter Ursache und vermehrter Fieberhitze Husten, während sonstige „pleuritische“ Erscheinungen, Gliederschmerz, freiwilliges Erbrechen und Schweissen fehlen. Mit Eintritt der Krisis hört der Durchfall auf, die Exsultat kehrt allmählig zurück; bei Säuglingen bildet sich eine ödematöse Geschwulst um die Knöchel und den Fussrücken, bei Andern endigt die Krankheit in der dritten bis vierten Woche mit einem scabiosen auf rothem Grunde ausbrechenden Exantheme. — Die Zunge ist während des Verlaufs der Krankheit glatt, roth, ziemlich trocken, rein, an ihrer Wurzel weisslich belegt; später zusammengezogen, spitzig, lederartig glatt; später wird sie wieder breit, blassroth, rein und feucht. Der Puls ist voll, härtlich, mässig frequent, allmählig klein, mässig schnell, frequent. Der Urin sparsam, gelb, halbdurchsichtig, mit Wolkchen und Ring, später trübe, mit einem rüthlich-weißen Bodensatz; zuletzt copios mit einem leichten schleimigen Sediment.

Bei Andern beginnt die Krankheit, ohne Fieber, mit einem mehrtägigen Durchfalle, nach dessen Aufhören die Augen und die geschwellenen Augenlider sich entzünden, und eine Anfangs wässrige, dann dickere und eiterartige Flüssigkeit in beträchtlicher Menge ergiessen. Mit Wiedereintritt flüssiger Stühle wird diese Augenaffection gelinder. Der aufgetriebene Unterleib wird hart, es stellt sich Husteln ein, welches später abnimmt, während sich im Schlunde Schleim ansammelt und zahlreiche Aphthen ausbrechen. Nach einigen Wochen erhebt sich deutlicheres Fieber, welchem Ausbruch einzelner Pusteln, Zunahme der Opöthalmie, und trägerer Stuhl folgt. Unter mannichfaltigem Wechsel von Verstopfung und Durchfall gehen allmählig viele Peitschenwunden ab, und das Zahnfleisch schwillt

[1766.]

an. Die Diarrhoe hält nach dem Verschwinden der Lebeschmerzen noch eine Zeitlang an, die Ophthalmie exacerbirt noch einige Male, bis nach 6 Wochen die völlige Genesung eingetreten ist.

2) Die hässartige Form des schleichenden Schleimfiebers kam vorzüglich bei solchen Personen vor, die durch deprimirende Leidenschaften, Anmuth, Nahrungslosigkeit, schlechte Wohnung, Anlage zur Phthisis u. s. w. geschwächt waren. Sie zeigte eine doppelte Varietät. Im ersten Falle sind beträchtlichere und deutlichere, aber anhaltende kritische Fieberbewegungen zugegen, denen dann ein ausgeprägter Stillstand folgt, nach welchem eine *Febris lenta* oder *phthetica*, mit Frost beginnend, eintritt. Im zweiten ist das erste (kritische) Fieber, so wie der ihm folgende Stillstand kürzer und undeutlicher, eben so das nachfolgende, ohne Frost beginnende Zehrfieber. Diese zweite Form wurde vorzüglich bei Solchen beobachtet, die in Folge unterdrückter Kräfte an Störungen innerer Organe litten. Der Verlauf beider Formen zog sich oft Monate lang hin. Der Tod trat unter den Erscheinungen der Phthisis meist in der 5ten, 11ten oder 12ten Woche ein.

Das chronische Stadium zu Anfang verhält sich fast ganz, wie es oben (S. 456) beschrieben wurde. Das Fieberstadium beginnt meist mit einem abendlichen Froste, der sich drei Tage, zuweilen noch öfter, wiederholt. Der Appetit verschwindet. Anfangs ist Kopfschmerz zugegen, später nicht, der Durst ist während des ganzen Verlaufs der Krankheit beträchtlich. Die Füße sind kalt, es werden durch das Erbrechen, welches vorzüglich eintritt, wenn der Kranke sich aufrichtet, Spulwürmer entleert. Einen Tag um den andern befinden sich die Kranken etwas besser, obgleich sich durchaus kein fester Typus beobachten lässt. Es tritt trockener Abdominalhusten ein, der sich besonders gegen das Ende des Lebens steigert. Die Schmerzen im Unterbauche nehmen zu, derselbe wird aufgetrieben und hart, es folgen Durchfälle, zuweilen mit Würmern gemischt. Die Kranken frieren heftig, und klagen über Abgeschlagenheit

und Schwäche. In unbestimmten Zeiträumen, bald zu Anfang, bald auf der Höhe, bald zu Ende der Krankheit, schwellen die Füsse an. Dann und wann stellen sich Frost und Hitze ein, und die Kranken klagen, wie gesagt, beständig über Kälte, obschon die Temperatur des Körpers nicht vermindert ist. Gleich mit dem Anfange der Krankheit stellt sich Abmagerung ein. Einigen Frostanfällen, der Diarrhoe und etwas geminderten Leibschmerzen folgt Schmerz des Mundes, der Zähne, des Zahnfleisches und Speichelfluss, es erscheinen Aphthen auf der Zunge und der ganzen Oberfläche der Mundhöhle, welche immer zahlreicher, breiter werden, platzen, ein dunkelgelbes Aussehen annehmen, von denen einige sich in tiefe Geschwüre verwandeln, während sich die Zunge mit einem dicken, gelblichen Schleim bedeckt. Zu den Aphthen gesellen sich stechende und reissende Schmerzen in der Mundhöhle, die vorzüglich in der Nacht zunehmen, mit nachfolgenden Excooriationen, und selbst Geschwüren der inneren Mundoberfläche. Die Kranken können aus diesem Grunde ihren übrigens ungestörten Appetit nicht befriedigen. Anders schwellen um die fünfte Woche der Krankheit die Wangen an, so dass sie den Mund nicht öffnen können; ein Zufall, der nach 8 Tagen wieder nachlässt. Während die aphthösen Geschwüre exulceriren, lässt die Anschwellung des Unterleibes etwas nach; mit den Excrementen gehen Spulwürmer ab. Die Schmerzen im Unterbauche aber kehren in Zwischenräumen zurück, sind aber nicht mit Durchfall verbunden. Andere Kranke entleeren mit weichen gelbgefärbten Excrementen zugleich festähnliche Stoffe. Die Kranken frieren, zittern, wenn sie das Bett verlassen, und können sich nicht aufrecht halten. — Aus den aphthösen Mundgeschwüren ergiesst sich Blut, welches im Munde selbst zu festen Klumpen gerinnt; nach diesen Blutungen wird der Schmerz des Zahnfleisches etwas gemässigt. Die Schmerzen des Unterbauches steigen vom Magen noch tiefer hinab, der Unterleib ist hart und beim Drucke schmerzhaft. Die Schmerzen lassen indess, wenn mit Durchfall und Erbrechen Würmer entleert worden sind, nach, der



[1560.]

Leib wird weich, die Fessgeschwulst verschwindet. Nach kurzer Zeit incess erneuern sich die Mundschmerzen, und es wird ein dünner Speichel in reichlicher Menge abgesondert.

Diese Erscheinungen faßt Wagler unter der Bezeichnung der *Febria continua longa* zusammen. Es folgt ihnen das „*Stadium lentum*.“ Nachdem nämlich eine Zeitlang Alles die bevorstehende Genesung anzudeuten schien, nachdem der Puls sich gehoben, Durchfall und Durst auf eine Zeit lang nachgelassen, der Appetit und mit ihm die Kräfte, Nachts reichliche Schweisse sich einzustellen angefangen hatten, nimmt plötzlich Alles wieder ein schlimmeres Aussehen an. Nach einigen Frostanfällen nämlich, mit darauf folgenden leichten Fieberbewegungen, schwillt der Leib von Neuem an, und der heftige Schmerz in demselben nicht allein, sondern auch die zum schmerzhaften Fessgeschwulst und die Appetitlosigkeit kehren zurück. Bei Einigen bildet sich, vorzüglich einige Wochen vor dem Tode, eine dauernde kachektische Anschwellung des Gesichts, besonders der Augenlider. Es erzeugen sich neue und so schmerzhaft Aphthen, dass die Zunge nicht hervorgestreckt werden kann. Die Abmagerung nimmt zu, der After entleert unwillkürlich braune Stoffe, und durch Durchfall und Tenesmus bildet sich Vorfall des Mastdarms. Die Kranken liegen aporetisch, mit offenem Munde, schmutzigen Zähnen, hippokratischem Gesichte, angezogenen Knäen, und eingefallenem, zuweilen eingezogenem Unterleibe rücklings da. Der Athem ist schwer, röchelnd, und unter Convulsionen, besonders der oberen Extremitäten und des Unterkiefers, erfolgt der Tod.

Bei der zweiten Form ist gleich zu Anfang Durchfall mit Anschwellung und Härte des Unterleibes, Schmerz und Kolik zugegen. Bald gesellt sich hierzu auch ein trockner Abdominalhusten und Fessgeschwulst, ein leichtes abendliches Fieber, Appetitmangel, Ekel, Erbrechen schleimiger, zäher, zuletzt mit Galle und Spulwürmern gemischter Stoffe, zuweilen lassen die Unterleibsaffectionen nach; während der ganzen Krankheit ist Durst zugegen. Es tritt Abmagerung und Geschwulst des

Mundes mit Speichelfluss, Schmerz des Zahnfleisches, Behinderung des Redens und Schlackens ein. Die Lippen sind innerlich von confluirenden Aphthen besetzt, von denen ein Theil sich in ein grosses, übelriechendes Stoffe absonderndes Geschwür verwandelt, wonach zuweilen die Geschwulst des Mundes und der Füsse etwas nachlässt. Die Nächte sind unruhig; zuweilen zeigt sich eine Spur von Exalt, vorzüglich auf flüssige Speisen gerichtet, immer aber ist Ekel, Erbrechen und Schwindel zugegen, vorzüglich wenn sich der Kranke aufrichtet. In seltenen Fällen klagen die Kranken Mittags über Kopfschmerz. Der Husten wird zuweilen auf kurze Zeit feucht und löst sich; den schleimigen Durchfällen gehen stets immer mehr zunehmende Schmerzen des Unterbauches um den Nabel mit Borborygmen voraus, später ergiesst sich mit dem Stuhle reines Blut. Am Tage liegen die Kranken schlummerstichtig da und schwitzen ein wenig. Der Husten und die blutige Diarrhoe, die Abmagerung, die Geschwulst der Füsse nehmen zu, der Unterleib aber wird weicher. Selten treten des Nachts Fieberbewegungen ein. Unter steter Zunahme der Schwäche wird der Durchfall immer heftiger und übelriechender. — Auch hier treten oft täuschende Anzeigen der bevorstehenden Besserung ein, aber nichtsdestoweniger tritt endlich unter den oben angegebenen Erscheinungen in der achten Woche der Tod ein.

#### IV. Die Complicationen des Schleimfiebers.

Schwangerschaft, Wochenbett und Verwandungen scheinen die Anlage zum Schleimfieber ausserordentlich zu steigern; aber auch chronische Uebel unterliegen mehr oder weniger deutlich dem Einflusse der epidemischen Constitution, vorzüglich veraltete Fehler der Leber, der Milz und der Lungen, vor allen Hydrops, phthisische Uebel, Syphilis. Ausserdem erhielten fast alle intercurrirenden chronischen und akuten Uebel einen ganz eigenthümlichen Anstrich. — Jede Complication machte die Krankheit gefährlicher; einzelne, an sich einfache und leicht heilbare Krankheiten erhielten durch den Einfluss der Schleimfieberconstitution einen so verwickelten Charakter,

[1764.]

dass sie entweder plötzlich, oder durch Vermittelung pathologischer Zustände tödlich wurden. Dieser Einfluss machte sich auch noch in der der Schleimfieberepidemie folgenden Blatternconstitution geltend.

Bei Schwangeren rief das Schleimfieber Abortus oder Frühgeburten hervor. Heftigem Frostschauer und entsprechender Fieberhitze folgten Schmerzen des Kopfs, des Rückens, der Extremitäten und der Hypochondrien mit Präcordialbeugung, heftiges Brennen im Unterleibe, zuweilen Erbrechen, bei fortwährendem heftigen Durste. Die Ausscheidung des Fötus folgte nach schwachen Wehen am 6ten oder 9ten Tage ohne Schwierigkeit. Nun erst folgten die Erscheinungen der unheilvollen Verbindung des Abdominalschleimfiebers und der Gebärmutterentzündung. Wenige entzogen dem Tode, der durch Darm- oder Uterinbrand kurz nach der Niederkunft eintrat. Die Complication des Schleimfiebers mit dem Wochenbette erzeugte zahlreiche und schmerzhaftes Äpfthen an den Brustwarzen, pleuritische Zufälle, Durchfall, Anschwellung der Brüste, schmerzhaftes Emaciem, welches sich bis in den Unterleib verbreitete und in Ichthias überging (†) <sup>1)</sup>.

Höchst interessant sind die Angaben über den Einfluss des Schleimfiebers auf Wunden, eine Verbindung, die in der Regel einen tödlichen Ausgang herbeiführte. Nach Verschiedenheit der Grösse der Verwundung bildete sich ein mehr oder weniger heftiges Fieber, der Eiter nahm eine schlechte, übelriechende, jauchige Beschaffenheit an, welchem Gangrän der Wunde folgte; das Schleimfieber selbst nahm den akut-bösartigen, bilösen, entzündlichen, putriden Charakter an. Selbst wenn Kranke dieser Art das Fieber überstanden, heilten ihre Wunden nicht zu, und in der Regel unterlagen sie später den fast stets eintretenden Recidiven des Schleimfiebers. Selbst die unbedeutendsten Verwundungen versuchten das letztere zu tödlicher Bösartigkeit

1) Wagner, p. 99 seq.



zu steigern, und Aderlaßwunden z. B. schlossen sich der grössten Sorgfalt ungeachtet stets erst nach mehreren Tagen. —

Bei dieser Gelegenheit mag erwähnt werden, dass das aus der Ader gelassene oder bei Operationen ausfließende Blut (— also, wie es scheint, auch das Blut vom Schleimfieber nicht ergriffener Personen —) dünn, etwas bräunlich erschien und sehr schwer zu einem in vielem Serum schwimmenden, mit einer dünnen Faserstoffschicht bedeckten Blutkuchen gerann.

Die grösste Gefahr führen Unterleibswunden mit sich. Sie ergossen eine Menge blutig-seröser Flüssigkeit, und gehen amerserst schnell in Brand und Zersetzung über, während das sie begleitende Schleimfieber, vorzüglich durch heftiges Unterleibsleiden hervorstechend, die ganze Bosartigkeit der ominösesten Formen entfaltet.

Das Schleimfieber, welches hydropische Personen befällt, hat in der Regel den Verlauf der *Morbose lenta*; oft auch ist der Hydrops erst die Folge des Schleimfiebers, namentlich des Aufhörens der Durchfälle, wonach erst das Gesicht, dann der Unterleib, zuletzt die Füsse anschwellen. Nebst den gewöhnlichen Zufällen des Hydrops exacerbiert sich zuweilen die Haut, wie bei brandiger Intertrigo, und schwärt überall eine reichliche, etwas eiterartige, scharfe Flüssigkeit aus, während die geringste Berührung irgend einer Körperstelle den heftigsten Schmerz verursacht. Zuletzt kehrt der Durchfall zurück, mit welchem jetzt Würmer abgehen. Andere leiden an Krampfhusten, Leibschmerzen, weniger deutlichen Symptomen des Schleimfiebers, die Geschwulst beginnt von den Füßen; zuletzt stellen sich Schlingbeschwerden und ein cadaveröser Geruch ein, und in den Leichen finden sich die deutlichsten Anzeichen der Krankheit.

Bei Phthisikern rief die Complication des Schleimfiebers, ausser der Steigerung der Brutsymptome, eine glänzende, schmerzende, ödematöse Füssgeschwulst, trockne, scabiose Exantheme, kleine aphthöse Bläschen im Munde und Schlunde, Exul-

[1768.]

eration der Lippen, gallertartige, colligative Durchfälle, und von Zeit zu Zeit profuse Schweisse hervor. —

Vorzüglich verderblich war die Verbindung des Schleimfiebers mit der Syphilis, welche alodan durch Nichts zu bezwingen war, und in der Regel vermittelt eines schleichenden Zehrlebens zum Tode führte. Die syphilitischen Geschwüre nahmen eine ähle Beschaffenheit an, und eben so fruchtlos bemühte man sich, einen (zur gründlichen Heilung der Krankheit damals noch für nöthig gehaltenen) gehörigen Speichelfluss einzuleiten.

#### Leichenbefund.

Die musterhafte Sorgfalt sowohl, mit welcher Röderer und Wagler die Leichen der an Schleimfieber Verstorbenen untersuchten, als auch die Wichtigkeit der von ihnen erlangten Resultate, haben ihre Schrift vorzüglich bekannt und berühmt gemacht. Nichtsdestoweniger erscheint es durchaus nicht überflüssig, auf die Ergebnisse ihrer Untersuchungen nochmals hinzuweisen, und namentlich das in ihrer Schrift selbst ziemlich Zerstreute auch hier in einen Gesichtspunkt zu vereinigen. Kann aber bedarf es hierbei der Bemerkung, dass, wie die einzelnen Formen des Schleimfiebers in der Natur vielfach in einander übergingen, so auch in den Sectionsbefunden ähnliche Nuancen sehr häufig beobachtet wurden.

1) Bei dem einfachen akuten Schleimfieber fanden sich in den Leichen vorzüglich folgende Veränderungen. Die Leber, welche weder in Bezug auf Umfang, Consistenz und Farbe verändert erschien, zeigte eine ausgeprägte sehnige Beschaffenheit; die Milz ist ebenfalls bis auf eine mässige Aufgetriebenheit und etwas dunklere Farbe normal. Im Darmkanale finden sich auf seiner äussern sowohl als inneren Oberfläche die Anzeigen einer vorhandenen gemässen Entzündung, ausgeprägter bei der eitrigen als bei der schleichenden Form des Schleimfiebers. Hin und wieder finden sich spastische Stricturen des Magens oder anderer Darmgegenden, zuweilen Verwüchungen (*volcani*) im Dünndarme. Solche Stellen sind

entweder gänzlich blutleer, oder doch blutärmer als die übrigen; im Inneren gerunzelt, faltig u. s. w. Die collabirten Gedärme zeigen in Folge der Entzündung der inneren und der Blasen und Durchsichtigkeit der äusseren Haut eine eigenthümliche bläuliche Färbung, wasser an den durch Gasansammlung aufgetriebenen Stellen, welche blass, durchscheinend, verblutet, nicht entzündet erscheinen. — Der Magen enthält viel zähen und an den Wänden anklebenden Schleim, das Duodenum und der Dünndarm überhaupt anser diesem Schleim gallige Stoffe, der Dickdarm Fäcalmaterien. Meistens findet sich in dem Dünndarme eine beträchtliche Menge von Spulwürmern, bald einzeln, bald in Klumpen, obschon letzteres hier weniger als bei der schleichenden Form vorkommt. Uebrigens sind dieselben gross, wohlgenährt, rüthlich, fest und elastisch. Im Dickdarm, vorzüglich im Coecum, kamen hiezuvielen Trichuriden vor. Diese Entozoen finden sich stets nur an den erschlafften Stellen des Darmkanals. Die Schleimcoillen des Magens, Duodenums, zuweilen auch des Jejunums und Ileums erheben sich über das Niveau der Schleimhaut. In der Gegend der Grimmdarmklappe, im Blinddarme und wurmförmigen Anhange werden häufig zahlreiche, eigenthümliche Zotten gefunden, welche treppweise zusammenstehen, niemals aber sich hügelartig erheben, und an deren jeder man dunklere Pünktchen, gewissermassen ihr Orificium, unterscheiden kann. — Die Abdominalvenen sind ziemlich turgescirend <sup>1)</sup>.

Aus naheliegenden Gründen findet sich nur selten Gelegenheit, diese einfache Form der Krankheit in der Leiche zu studiren.

1) Diese Stelle, die der Ausgangspunkt zu zahllosen Untersuchungen über die pathologischen Veränderungen des Darm- und Schleimdrüsen-systems geworden ist, lautet im Originale folgendermassen: — „*Folliculi mucosi ventriculi, duodeni, quibus interdum jejunum et ileum, mucosae turgentes in colliculos eminent. Ad valvulam Bauhini, in coeco et appendice vermiformi inceptis utuntur large folliculorum sui generis, confertim in amplius areas collecturum, nunquam tamen in collibus elevaturum; reges; ita ut nullidem parvis abacurioribus, saepe nonge quisque officio, distinguuntur.*“ — p. 161.



[1250.]

2) Bei der bösartigen, fauligen Form des Schleimfiebers ist zunächst die schnellere Zersetzung der Leichen, vorzüglich des Unterleibes, bemerklich. Die Substanz der Leber und Milz ist mürbe und leicht zu zerreißen, ihr seröser Ueberzug trennt sich leicht von dem missfarbigen Parenchym, in welchem sich Luftbläschen finden. Die grösseren Gefässe enthalten wasser etwas schaumigen, zersetzten Blute und Ansammlung fauliger Gase<sup>1)</sup> fast Nichts. Auf dem Cruor schwimmt eine zerfließende, ölarartige Fettigkeit. Der Schleim im Darmkanal ist flüssig, in der Leber fehlt die oben beschriebene grünliche Beschaffenheit, auf der Darmschleimhaut die Zotten und ihre Oeffnungen, bis auf unbedeutende Spuren der fungösen Beschaffenheit ihrer Oberfläche. Die kleine Curvatur und die Spitze des Blindsackes des Magens zeigt sich gangränös, die Schleimhaut ist mit schwarzen, dunkelfarbigen, gangränösen Flecken und wahren Ektymen bedeckt. Ähnlich entartet stellt sich die Schleimhaut der Gedärme dar; der Dünndarm enthält eine dünne jauchige Flüssigkeit (*putrilege*) in welcher sich zuweilen einige dünne, halbaufgelöste Spalwürmer finden. Ähnlich im Dickdarm, welcher zuweilen einzelne Trichuriden enthält.

3) Bei der entzündlichen Form ist der wohlgeübte Körper zuweilen noch im Tode mit den rothen Petechien besetzt; im Darmkanale finden sich die ausgeprägteren Merkmale entzündlicher Zustände. In den Gefässen findet sich ein fester Cruor, im Herzen oft falsche Polypen. Die Eingeweide, vorzüglich die Milz, sind beträchtlich vergrößert, an ihrer oberen Fläche, wie auch das der Luft ausgesetzte Blut, hell und roth gefärbt. Im Darmkanal findet sich heftige Entzündung, im Dickdarme Gangrän und Sphacelus. Die Schleimhaut des Magens und Dünndarms zeigt außer Spuren ihrer Zotten Flecken und gangränöse Punkte, welche sich beim Zutritt der atmosphärischen Luft lebhaft röthen, die Schleimhaut

1) *Uvae majores, propter purum cruorem resolutae, apomastrom, medullae nigrae colatae columnae, fere caecae sunt.*<sup>1)</sup> Das.

des Dickdarms, welcher harte, kugelige Fäces enthält, ist hin und wieder mit brandigen Stellen (*areæ escharaticæ*) bedeckt.

Bemerkenswerth ist die Beschaffenheit der Muskelhaut des Darmkanals beim Schleinfieber. Dieselbe fand sich bei allen Formen desselben dünn, gallertartig erweicht, und, die entzündeten Stellen ausgenommen, so blass und unentwickelt, dass es während des ganzen Winters unmöglich war, dieselbe in den anatomischen Vorlesungen gehörig zu demonstriren<sup>1)</sup>.

In der Kopfhöhle fanden sich in der Regel seröse Ergüsse, bald als Krankheits-, bald als Todesprodukte zu betrachten. — In ziemlich vielen Fällen kam heftige Entzündung, ja Brand des Schändes, der Zungenwurzel, des Kehldeckels, der Uvula und der Tonsillen vor, an denen nicht selten auch die nahe gelegenen, vorzüglich drüsigen Organe Theil nahmen. Unsere Beobachter legten auf diese Erscheinungen mit Recht insofern das grösste Gewicht, als sie aus denselben die nahe Verwandtschaft des Schleinfiebers mit der Ruhr erkannten, auf welche wir unten zurückkommen<sup>2)</sup>.

In den zahlreichen Fällen der vorwiegenden Lungenaffection fanden sich stets feste, plastische Exsudate, und Verwachsungen der Lungen- und Ripperpleura. Die Lungen selbst hepatisirt, vorzüglich am hintern und untern Theile, selten oben, niemals vorn, ihr spezifisches Gewicht vermehrt u. s. w., hin und wieder kleine Abscesse; in andern Fällen Lungengeschwüre u. s. w.

Bei schwanger verstorbenen Frauen fanden sich in den sehr lange warm bleibenden, äusserst schnell faulenden Leichen Spul-, zuweilen auch Peitschenwürmer in Menge. Ein anschaulicher, klebriger und fest anhängender Schleim überzog die innere Magenoberfläche; die Gedärme waren mit Galle erfüllt, und die Zotten des Dünndarms erhielten von derselben eine nicht abwaschbare gelbe Farbe. Die Milz war in der Regel weich, bisweilen von ausserordentlich grossem Umfange, die Leber ebenfalls erweicht, acinös, die Gallenblase enthielt viel dicke Galle.

1) Wagner, p. 164.

2) *ib.* p. 112.

[1866.]

— Ähnliche Erscheinungen fanden sich bei dem jedesmal todtten Fötus. Entzündliche Affectionen des Unterleibes, Stricturen der Gedärme, dentliche acinöse Beschaffenheit der livid gefleckten Leber, zähe Schleimmassen auf der Oberfläche des Magens und Dünndarms, welche beträchtlich entzündet, und, vorzüglich in Dundenam, mit dem oben beschriebenen Exantheme zahlreich bedeckt war.

#### Behandlung.

Die von Rüdorfer und Wagler eingeschlagene Behandlungsweise des Schleimfiebers kann zwar, wie die der Ruhr, nur auf den Namen einer symptomatischen, im besseren Sinne dieses Wortes, Anspruch machen, aber sie beruht doch von diesem, noch gegenwärtig die vorzüglichste Rolle spielenden, Gesichtspunkte aus auf so einfachen und naturgemässen Indicationen, dass sie noch jetzt im Ganzen als musterhaft bezeichnet zu werden verdient.

Für die chronische Form des Schleimfiebers lag es, dem bezeichneten Gesichtspunkte gemäss, sehr nahe, in Entfernung der gebildeten Schleimmassen und vorzüglich der Würmer, Verhütung ihrer Neuerzeugung, Einleitung peripherischer Kräfte, und zuletzt in Wiederherstellung des Tons der Schleimhäute die Hauptindicationen zu finden. Diesen genügten Brechmittel, in heftigen Fällen *Mercurius saccharatus*, Calomel mit Kampher, während bei gleichzeitigem Fieber Quecksilberpräparate mit Recht durchaus vermieden wurden. Ausserdem wurde der Heilapparat der Dysenterie, Desincentia, ölige Mittel, Anodyna u. s. w. herkömmlicher Weise in Anwendung gesetzt<sup>1)</sup>. Indem gereicht es unserm Göttinger Aerzten zum Ruhme, das Ungenügende einer so durchaus symptomatischen Behandlung und das Bedürfnis einer „specifischen“ gefühlt zu haben. Sie versuchten in dieser Beziehung die „auflösende“ Wirkung der Salze und des Mineralbismutes, aber ohne Erfolg, während Kampher ungleich besser wirkte, indem er zugleich die krankli-

1) Wagler, p. 48.



gen Zufälle beseitigte antihelmintisch wirkte und kritische nächtliche Schweisse antegte.

Ähnlichen Indicationen folgte man bei den akuten Formen der Krankheit. Brechmittel, vorzüglich Nausea (Ipecacuanha in Substanz und im Dekokt), wurden unter geeigneten Umständen, selten Aderlässe, Stören nur bei putriden Zuständen angewendet, da sie chemisch die Gerinnung des Schleimes beförderten. Als genial aber muss die glückliche Verbindung der Abführmittel mit dem Opium bei heftigen, zum Durchfall neigenden Unterleibskrämpfen bezeichnet werden, deren Erfolge, in Bezug auf Beseitigung der Krämpfe, gelinde Ausdehnung des Darmchleims, und kräftige Anregung der Hastthätigkeit, von Wagler höchlichst gerühmt werden<sup>1)</sup>. Wenig Erfolg brachte Rhabarber, mit welcher zu jener Zeit der grösste Misbrauch getrieben wurde<sup>2)</sup>, noch weniger salinische Mittel; offenbar nachtheilig aber zeigten sich, wegen der durch sie vermehrten Tendenz zur Zersetzung, Antimonial- und Quecksilbermittel. Vorzüglich wird auch hier wieder der Kampher gerühmt. Eigentlicher Anthelmintika bedurfte es theils nicht, theils waren sie selbst schädlich. Am ehesten durften die Bitterstoffhaltigen derselben in der Reconvalescenz gegeben werden. — Vesicator waren gänzlich erfolglos; desto hülfreicher Klystiere, vorzüglich zur Beseitigung heftigen Erbrechens.

Die Ueberzeugung von der nahen Verwandtschaft des Schleimfiebers mit dem Wechselfieber war bei unsern Beobachtern glücklicher Weise lebendig genug, um sie zur Anwendung der China in Fällen zu vermögen, welche sich durch deutliche nächtliche Exacerbationen, Schreisse u. s. w. auszeichneten. Der Erfolg war der erwünschteste, und würde höchstwahrscheinlich noch bedeutender gewesen seyn, wenn statt des Extracts das Chinin hätte angewendet werden können. Eben so schöne Resultate wurden durch die China in der Reconvalescenz erreicht, und namentlich liess sich der Einfluss dieses Mittels auf

1) Wagler, p. 58.

2) „*degravis rubens rheumatica praesent*“<sup>3)</sup> p. 59.

[1746.]

Steigerung der Hautkrisen, Beseitigung des Oedema u. s. w. nie verkennen. — Zur eigentlichen Nachkur dienten bittere Mittel, Eisenpräparate, Stahlwasser u. s. w.<sup>1)</sup>

Dieselbe Behandlung fand, mit der nöthigen Modification für die entzündlichen und fauligen Formen des Schleimfiebers, während der ersten Stadien Statt. Bei jenen waren umichtig angestellte Aderlässe oft nicht zu umgehen, bei diesen spielten Säuren, vorzüglich ihre Verbindung mit Opium und Manna eine Hauptrolle. Der an sich günstigen, oft aber zu hartnäckigen Verstopfung durfte nur durch Klystiere begegnet werden. Gegen die typhösen Zustände leistete auch hier der Kampher das Meiste, so lange noch keine Colligation vorlag. Hier waren auch Vesicatorien unter bekannten Verhältnissen vom besten Erfolge. Nichts aber übertraf im dritten Zeitraum, wenn es die Anregung der Krisen galt, die „wunderbare und specifische“ Wirkung der China. — Die schleichende Form endlich unterlag im Allgemeinen den oben für die chronische mitgetheilten therapeutischen Bestimmungen<sup>2)</sup>.

Noch muss der Klarheit gedacht werden, mit welcher unsere Beobachter die nahe Verwandtschaft zwischen den einzelnen Gliedern der grossen Krankheitsperiode erkannten, die sich ihren Blicken darbot. Ihnen erschien, wie dem grossen Meister Sydenham, das Wechselfieber als die Grund- und Ausgangsform der Ruhr sowohl als des Schleimfiebers, und selbst der diesem folgenden Epidemien der typhösen Pneumonien, von denen unten die Rede seyn wird. Deutlich bezeichnen sie die allen diesen Krankheitsphasen zu Grunde liegende Ursache als eine allen gemeinsame, nur durch veränderte Aussenverhältnisse zu Entfaltung verschiedener Formen modificirte<sup>3)</sup>. Sie erkennen in vielen Symptomen der Ruhr Zufälle, die auch dem Wechselfieber, in vielen des Schleimfiebers Erscheinungen, die beiden gemeinsam sind. So z. B. die Durchfälle, Schlundaffectionen, die

1) Wagler, p. 44.

2) Id. p. 34 seq.

3) Wagler, p. 33 seq.

ödematösen Geschwülste, die pathologisch-anatomischen Veränderungen, den Uebergang jeder dieser Formen in die andere, im Individuum sowohl, als im grossen Kreislaufe der Epidemie. Durch diese Verwandtschaft erklären sie die kritische Bebenzung blütiger Stühle bei der Internittens nach dem Gebranche der China, die Immunität gegen Ruhr und Schleimfieber bei Solchen, die ein normal verlaufendes Wechselfieber überstanden hatten <sup>1)</sup>, die Neigung zur Internittion, die häufige Rückbildung der Ruhr und des Schleimfiebers in das Wechselfieber, die eigenthümliche Reaction aller dieser Formen gegen die China, die schon Morton unter ähnlichen Umständen so treffend zu würdigen verstand <sup>2)</sup>, endlich die Identität und Aehnlichkeit ihrer Nachkrankheiten u. s. w. Verhältnisse, welche von Neuem den Beweis liefern, dessen immer wiederholter Erinnerung es so sehr bedarf, dass die Natur die Grenzen nicht kennt, welche kurzichtige Systematik ihr vorzuschreiben sich erlaubt.

Dies sind die Ergebnisse des Studiums einer Schrift, welche vor vielen andern, häufig nicht minder werthvollen, das Glück gehabt hat, in dem Andenken der Aerzte fortzuleben. Ihren Verfassern gebührt unbedingt das grosse Verdienst, die Nosologie einer wichtigen, nach Diagnose und Behandlung höchst schwierigen Krankheit wesentlich gefördert, ja dieselbe in einer Weise begründet zu haben, zu welcher neuere Beobachter wenig mehr als Bestätigungen hinzufügen konnten. Die Ausführlichkeit, mit der wir ihre Betrachtung verfolgten, mag namentlich durch die epidemische Krankheitsconstitution der Gegenwart und durch

1) Dasselbe bemerkt auch Riegschhausen, p. 27. „*Sensatio praeteritum non est, febres intermittentes laborantes dysenteria manente intacta, et circulus eam, qui nullas dysenterias torquetur, et jam fluctatua erit, intermittente inuenitur febri. Praeter reliqua febrium intermittentium propria et communia symptomata hic dilaera intestinum, diarrhoea, et quidem interdum cum creberrimis, et jam dici, crescenti, aderunt.*“

2) A. op. S. 194.



[1761.]

die gewis nicht unbegründete Besorgniß gerechtfertigt werden, dass der geringste Theil der Aerzte bei der Wiederkehr ähnlicher Modificationen des typhösen Krankheitsprocesses Irrthümer und Fehler vermeiden würde, welche auch hier die Bekanntschaft mit hervorragenden Leistungen der Vergangenheit unmöglich macht. —

Wir wenden uns wieder zu Riepenhausen's kurzen Angaben über die dieser Epidemie folgenden Krankheitsereignisse, deren Verbindung mit der allgemeinen Constitution dieser Zeit auch ohne nähere Hinweisung hervortritt.

Zuerst verheerete sich im September 1761 zu Göttingen eine Epidemie unter den Kindern, von der es unentschieden bleiben muss, ob sie als Croup oder *Bronchitis maligna* gelten soll. Riepenhausen nennt sie „*Catarrhus suffocans*“ und suchte der Erstickung, die binnen 1—3 Tagen erfolgte, durch Brechmittel (*Ipecacuanha* mit *Squilla*), Aderlass und Vesicatorie zu begegnen<sup>1)</sup>.

Im Oktober herrschten Ruhren, Durchfälle, Anginen, „falsche Pocken“<sup>2)</sup> und Wechselfieber, welche indess sämtlich Nichts Eigenthümliches darbieten.

#### Die Blattern. — Henster.

Im November fielen die Blattern an um sich zu greifen. Ueber diese aber finden sich wieder die genauesten Nachrichten in der Inauguraldissertation des nachmals so berühmt gewordenen Henkler<sup>3)</sup>. Dieser misst zwar die Entstehung derselben lediglich dem eingeschleppten Contagium bei, ohne indess die äusserst günstigen constitutionellen Verhältnisse zu überschauen, unter welchen dieses seine Wirksamkeit entfaltete. Im Sommer nämlich des Jahres 1761, der nicht übermäßig warm, aber feucht war, herrschten Dysenterien oder vielmehr Fieber,

1) Riepenhausen, p. 28.

2) A. d. Schülerversa.

die sich durch Durchfall, der oft blutig war, günstig entscheiden, und nur bei Kindern, welchen das Uebel oft Vorfall des Mastdarms erzeugte, durch Erschöpfung gefährlich wurden<sup>1)</sup>. Im Winter, der ziemlich streng war, nahmen die Blattern, die sich nun auch contagiös in das Eichsfeld verbreiteten, einen bösaartigeren Charakter an. Hin und wieder kam auch Friesel (*l* — „*Purpura*“) vor. Im Gegensatz zu anderen Beobachtungen bemerkte man, dass Zuckungen vor dem Ausbruche der Blattern eine leichtere Krankheit verkündigten. Im französischen Militairhospitale<sup>2)</sup> kamen entzündliche Brustkrankheiten, und unter den Officieren fieberhafte Rheumatismen („*Arthritides sanguineae*“) äusserst häufig vor. An ersteren fehlte es auch in der Stadt nicht. Später wurden, bei fortwährendem unbeständigen und stürmischen Wetter<sup>3)</sup>, die Blattern immer bösaartiger, es kamen viel „schleichende Fieber“ vor, die durch Uebergang in „*Pneumia*“ tödtlich wurden, und welche Henckles mit den von Sydenham im J. 1667 beobachteten „*Febris variolosa*“ vergleicht<sup>4)</sup>. — Das Schleimfieber hatte ebenfalls sich noch nicht ganz seiner Herrschaft begeben, wie sowohl aus dem hin und wieder beobachteten Auftreten seiner reineren Formen, als auch der mit ihm verwandten bösaartigen Wurmfieber hervorging. — Im schauerreichen stürmischen Frühlinge (= fortwährend behielten nördliche Richtungen des Windes die Oberhand =) fingen sich Tertianfieber zu zeigen an, die indes mit Eintritt der wärmeren Jahreszeit wieder verschwanden. Sehr häufig waren scabiose und frieselartige kritische Hautanschläge. Riepenhausen bemerkt von diesen dreitägigen Wechseln, dass sich sogleich im Anfange, nach dem ersten oder zweiten Paroxysmus, hydropische Zufälle einstellten, die

1) Henckles, p. 18.

2) Göttingen hatte in dieser Zeit (gegen Ende des siebenjährigen Kriegs und nach der Einnahme von Kassel und der Occupation von Westphalen im Juni 1761) eine französische Besatzung, die der Einwohnermenge an Zahl fast gleichkam.

3) Henckles theilt fasttaugliche meteorologische Uebersichten mit.

4) S. oben S. 184.

[1761.]

zuerst das Gesicht, dann den Unterleib und die Füße ergriffen, und ohnfehlbar in allgemeine Wassersucht übergingen, wenn statt der hier einzig hilfreichen China die gewöhnlichen *Anti-lydropica* angewendet wurden. In sehr hartnäckigen Fällen beobachtete Riepenhausen sehr gute Erfolge von starken Cathartikis (bis zum Speichelfluss<sup>1)</sup>). Im April erhoß ein rheumatisches Fieber mit entzündlichen Affectionen der Brust- und Unterleibsorgane sein Haupt, während die Blattern immer mehr verschwanden. Im Mai bildete sich eine deutliche katarrhalische Krankheitsconstitutions aus, mit welcher Katarrhalischer aufrat, die nicht selten Delirien, peripneumonische Affectionen u. s. w. erzeugten. Vorzüglich schlecht befanden sich in dieser Zeit Phthisische.

**1761. Ruhr zu Münster und Hannover. — Saalmann und Werthof.**

Der auf diese Epidemie bezügliche, übrigens unbedeutende, Briefwechsel der genannten Aerzte zeichnet sich durch Nichts aus als die günstigen Erfolge, welche durch Brechmittel erhalten wurden, denen dann Rheum mit Salisak folgte, (dessen Anwendung gegen die Ruhr damals neu war). Zu Hannover verband sich die Ruhr häufig mit dem Wechselfieber, und solche Fälle erbrachten den Gebrauch der China. Zu Münster folgten der Ruhr häufig heftige Gelenkerbarmationen (die „loopende Varen“ Westphalen's), gegen welche wiederholte Aderlässe, nach Sydenham's Empfehlung, das Meiste leisteten (2).

So weit Henxler. — Riepenhausen bestätigt die Angaben des Ersteren, hebt aber noch mehr den Bezug der eben erwähnten „böartigen Katarrhalischer“ zu dem Intermittensprocess hervor, und behauptet namentlich, die Periorde habe bei drohendem Uebergange in Phthisis die besten Dienste geleistet<sup>3)</sup>.

1) Riepenhausen, p. 29. 299.

2) Riepenhausen, p. 46.



Außerdem nennt Riepenhausen für das J. 1762 nachstehende Folge der epidemischen Krankheitsvorgänge.

Zu dem gastrisch-typhösen Fieber (denn als solches dürfte das „böartige Katarrhalfieber“ ohne Weiteres gelten können) gesellten sich im August 1762 Tertianen mit soporösen und apoplektischen Zufällen, deren dritter Paroxysmus in der Regel tödlich war. Es scheint nicht, dass man gegen dieselben ein besonders kräftiges Heilverfahren in Anwendung zog.

Im September kamen einzelne Rahren vor; Blattern und Masern verschwand auf einige Zeit. Jüngere litten häufig an einfachen Katarrhalfiebern. Aber schon im Oktober erschienen Wochalfieber, Ruhr und Masern von Neuem, und sehr bald gesellte sich zu ihnen eine sehr ausgebreitete Scharlachepidemie, (das Scharlach war in dieser Zeit über einen grossen Theil Europa's verbreitet), deren hauptsächlichste Zufälle Riepenhausen sehr kurz, aber äusserst sprechend beschreibt. Derselbe hebt, ausser der vorzüglich aus der Schlund- und Luftröhrenaffection sich ergebenden Gefahr, besonders die Wichtigkeit der Urinkrise hervor, und sagt, dass bei Allen, bei welchen der Harn gleich zu Anfang und durch den ganzen Verlauf der Krankheit hindurch gekocht erschien, die Halsaffectionen nur unbedeutend auftraten. Sogar wird erwähnt, aber durchaus nicht als ein besonders gefährliches Symptom<sup>1)</sup>. Heilmittel waren Brech- und Abführmittel, Gargelwässer u. s. w. Blutentziehungen wandte Riepenhausen nur bei drohender Erstickung an. — Ganz besonders rühmt derselbe den Calomel, insbesondere zur Verhütung der, mehr Kinder als das Scharlach selbst wegraffenden, hydrogischen Nachkrankheiten<sup>2)</sup>.

Dem Scharlach folgten im Winter „Katarrhalfieber“ mit pneumonischen Zufällen, später wieder Masern, hin und wieder Blattern u. s. w. Kurz, eine längere Zeit noch währten die Nachklänge einer epidemischen Krankheitsconstitution fort, die sich

1) Vergl. Hist. pathol. Unvers. Th. 4 S. 211, ff.

2) Riepenhausen, p. 47. ccv.

[1763.]

in dieser Zeit mit einer niemals übertrroffenen Ausgepöftheit und Allgemeinheit offenbarte, und deren wahre Bedeutung nur durch die ganze Betrachtung ihrer einzelnen formell verschiedenen, wesentlich aber einen deutlichen Zusammenhang offenbarenden Erscheinungen erkennbar ist.

#### 1762. Alpenstich in der Schweiz. — Haller.

Der Hinzutritt des schweizerischen Alpenstichs zu diesen Krankheiten würde nicht ohne den genauesten Zusammenhang erscheinen, selbst wenn Guggenbühl auf das erysipelatos Element dieses Uebels mit geringerem Erfolge hingewiesen hätte. — Der Winter von 1762 war von einer ganz besonderen Gelindigkeit und so verheirte sich denn gar bald wieder in diesem Jahre, noch weit mörderischer aber im J. 1764, die Seuche, von den Hochthälern ausgehend, über den ganzen nordwestlichen Theil der Schweiz. Zu Aalen beobachtete sie Haller, zu Lausanne Tissot, zu Brugg Zimmermann, und die Nachrichten dieser Aerzte, so wie eine grosse Zahl handschriftlicher Urkunden bilden die Grundzüge in dem überaus werthvollen Gemälde der Epidemie, welches kürzlich Guggenbühl<sup>1)</sup> von demselben entwarf, und welches uns eines erneuten Eingehens in die gleichzeitigen Nachrichten überhebt.

Diese Uebel standen durchaus nicht isolirt da. Unter den Kindern herrschte (vorzüglich zu Volperswyl und Biel) die brandige Bräune, und durch die ganze Schweiz unter dem Rindvieh ein contagioser Lungentypäus<sup>2)</sup>. — Gleichzeitig kam die Brandbräune noch an vielen anderen Orten vor, vorzüglich heftig herrschte sie zu Charon im Pays d'Aunis, in Schweden u. s. w.<sup>3)</sup>, und die Lungensucht des Rindvieh's, ebenfalls in weiten Kreisen verbreitet, zeigte in Frankreich vorwiegend Affectionen des Schlundes und der Luftröhre. Noch allgemeiner, ja in einer in der Geschichte der Epizootien unerhörten Ausdeh-

1) Guggenbühl, der Alpenstich, S. 16.

2) Guggenbühl, S. 18 u. 19.

3) Becker, Gr. ch. d. neuer. Hallwunde, S. 271.

nung, verbreiteten sich Viehsenken im folgenden Jahre <sup>1)</sup>, in welchem überhaupt die typhöse Krankheitsstimmung ihre Höhe erreicht zu haben scheint. —

### **Die Volkskrankheiten der Jahre 1763 und 1764 zu Neapel.**

Wohl war die Fülle des Elends überall dieselbe, aber am lebendigsten und ergreifendsten ist die Erinnerung desselben für Italien und Spanien, wo es an Sarcane und Maadeval seine Geschichtsschreiber fand. In den nur zu ausgeführten Angaben des Ersteren ist vorzüglich die strenge Folge interessant, mit welcher sich aus geringen Anfängen Uebel der verheerendsten Art entwickelten, eben so sehr an flüssiger Gestaltung sich unähnlich, als ihrem inneren Wesen nach innig verwandt. — Die Schrift Sarcane's verbirgt ihre wichtigen Thatsachen unter einem höchst ermüdenden Wust von breiter theoretischer Erörterungen. Die bedeutendsten der ersteren dürften folgende seyn.

Zunächst begegnen wir einer ausgebildeten rheumatisch-katarrhalischen Krankheitsconstitution, deren einzelne Offenbarungen aus dem einfachen rheumatischen Durchfall zu bis zur ausgebildeten Pleuroperipneumonie entgegenstreten <sup>2)</sup>.

Das J. 1763 war vom Herbst bis zum December mit unregelmäßiger Kälte, wenigem Regen, anhaltender Trockenheit zu Ende gegangen; im Januar 1764 gewannen West- und Südwestwinde die Oberhand. — Gleichzeitig herrschte in Folge von mehrjähriger Missernte, Verderbniss des Getreides durch Mutterkorn u. s. w. Mangel an Lebensmitteln, der indess für die folgenden Krankheiten wohl nicht von der Bedeutung war, als man ihm allgemein zuschreiben geneigt war. Die Reihe der ersteren eröffnete ein mehrere Wochen fast allgemein herrschender Brechdurchfall, der durch heftige Kolikschmerzen die wässrige, scharfe, saure Beschaffenheit der Abgänge, durch

1) Scharren.

2) Sarcane, l. p. 57 ff.



[1764.]

die Heilbarkeit der *Ipecacuanha*, Opiate und des warmen Verhaltens, vorzüglich aber durch das ihm folgende rheumatische Fieber seine analoge Natur deutlich genug zu erkennen gab; obsehon *Sarcone* sich viel zu sehr mit der Bestimmung und Erklärung der die Krankheit vermittelnden „Reize“ beschäftigt, als dass er die wahre Bedeutung der ersteren erkennen sollte.

Das rheumatische Fieber herrschte im März und April 1764, während anhaltenden Regenwetters und Südwinden. *Sarcone* ist weit entfernt, mit dem Worte rheumatisch den schief bestimmten Sinn der neueren Ärzte zu verbinden, sondern er rechnet zu denselben selbst Wechsel- und Fäullicher. Nichts desto weniger war das von ihm beschriebene Fieber ein eigentlich rheumatisches, wie es schon seit einigen Jahren im Frühling in Neapel zu herrschen pflegte. — Zuerst wurden schwächliche, schon früher kranke Personen von leichten akuten Rheumatismen befallen, und durch Aderlässe, warmes Verhalten, Schweisse, freiwillige Urinkrisen u. s. w. wieder hergestellt. Später kamen, vorzüglich bei sehr kräftigen Personen, bedeutendere Fälle mit sehr heftigem Gliederreissen, rheumatischen Entzündungen, Eiterungen u. s. w. vor. Das gelassene Blut hatte eine sehr ausgebildete Faserstoffschicht <sup>1)</sup>. Der Aderlass konnte nur selten entbehrt, musste selbst mehrmals wiederholt werden, und war überhaupt bei dem ausgebildeten entzündlichen Anstrich der Epidemie neben Salpeter, Mittelcalceen, Schweißmitteln u. s. w. das Hauptmittel. Wiederholt hebt *Sarcone* die bekannte Wichtigkeit der Urinkrisen hervor. Fast stets aber stellte sich zu der Krankheit ein gastrischer Anstrich, der den Gebrauch der Brechmittel, zuweilen der Abführmittel, überflüssig machte. Nachher verordnete *Sarcone* Senega in Abkochung, und Seife.

Im Fortgange ihrer Entwicklung bildete sich die allgemeine rheumatische Constitution zu einer ausgebildeten pleuritischen und peripneumonischen aus, bei welcher ebenfalls

1) *Sarcone*, I, 3, 53.

eine streng antiphlogistische Behandlung das Hauptaugenmerk blieb. Von Wichtigkeit ist die Bemerkung, dass auch hier die Hervorrufung der Urinkrisen weit nöthiger als die der Haut- und selbst der Lungenkrisen war. Denn es liess sich durchaus nicht verkennen, dass diese ausgebildeteren Produkte der rheumatischen Constitution einen bald mehr bald weniger auffallenden Antheil an dem intermittirenden Krankheitscharakter nahmen, welcher sich seit einigen Jahren zu Neapel zu erkennen gab <sup>1)</sup>. Ein neues schönes Beispiel von den Uebergängen zwischen Krankheitsformen, denen das System die entgegengesetztesten Stellungen anweist. Sarcione erkannte diesen Charakter der ihm vorliegenden Pneumonien aufs Deutlichste, und versichert, dass die Verkennung dieser Verbindung vielen Kranken das Leben kostete <sup>2)</sup>. Es kamen viele Todesfälle dieser Art vor, die von schlecht beobachtenden Aerzten als Schlagflüsse angesehen wurden, die auf die Pneumonien folgten. Im Sommer aber steigerte sich die Epidemie zu ihrer höchsten Blüthezeit, indem sie einen ausgebildeten biliösen Charakter annahm, vermöge dessen neben den „Pneumonien“ „Leberentzündungen“ das hervorstechendste Symptom eines Krankheitsprocesses darstellten, dessen wahre Intermittens-Natur sich deutlich genug an den Tag legte <sup>3)</sup>. Sarcione's Werk ist zu allgemein bekannt, als dass es nöthig wäre, die von ihm gelieferte Beschreibung dieser Formen zu wiederholen; es muss genügen, zu bemerken, dass dieselben entschieden den Gebrauch der China erweichten, nachdem der entzündliche Anstrich beseitigt war, dass aber die unzeitige Anwendung dieses Mittels den grössten Schaden brachte. Weniger gefährlich war es bei der gastrisch-biliösen Richtung, welche die Epidemie auf ihrer Höhe einschlug, gleich in den ersten Anfällen die Unterdrückung der Krankheit durch die China zu versuchen. Mit einem Worte, die von Sarcione geschilderten Uebel zeigten

1) Sarcione, l. c. 64. 281.

2) Das., S. 212.

3) Das., S. 215 ff.

[1764.]

sich als ein Cyklus wesentlich identischer Krankheitsformen, denen gemeinsam der Wechselfieberprocess zu Grunde lag, der sich aber erst auf der Höhe der Epidemie deutlich, wenn auch in bösartigen Formen entwickelte, nachdem er seine unvollkommenen Entwicklungszeiträume unter der Maske des rheumatischen und phlogistischen Krankheitsprocesses durchlaufen hatte. Nähere Nachweisungen macht Eisenmann's geistige Schilderung der Familie der Wechselkrankheiten („Typhosen“) überflüssig<sup>1)</sup>, um so mehr, da die Grundlage der bezeichneten Schrift wesentlich historisch ist. Aber noch immer möchte es nicht überflüssig seyn, mit Sarcone und Torti, der ganz analoge Beobachtungen machte<sup>2)</sup>, auszurufen: „*Quod attente juniorer observaverit velim medicos, et forte cum junioribus etiam senes!*“

#### 1764. Typhus.

Unabhängiger von diesen Uebeln, aber unendlich furchtbarer in seinen Folgen, entwickelte sich gleichzeitig ein Typhus, dessen ersten Ursprung Sarcone grösstentheils in der auf dem Lande herrschenden Noth der ärmsten Volksklassen, dessen Verbreitung in der Hauptstadt er vorzüglich in seiner Contagiosität begründet sieht. Ausfühlich widerlegt Sarcone die Meinung von dem ausschliesslichen Einflusse des Mangels an Lebensmitteln, welcher durch gewinnstüchtige Künste verworfenener Wucherer, aller Gegenmassregeln ungeachtet, noch gesteigert wurde<sup>3)</sup>. Mit Mottenkorn infossum verunreinigtes Getreide wurde in Neapel nicht eingeführt<sup>4)</sup>. Scharen halbverhungerten, zerlumpten und schmutziger Bettler strömten von allen Seiten der Hauptstadt zu, überall, wo sie aufgenommen wurden, den Typhus verbreitend, von welchem dagegen die Orte verschont blieben, welche den gefährlichen Fremdlingen die Aufnahme verweigerten. So blühten Capua, Aversa, Foggia,

1) Eisenmann, die Krankheiten der Typhosen, S. 465 ff.

2) Torti, *Therapeutica speiendi*, L. I. c. 3, p. 323.

3) Sarcone, II, S. 21.

4) Das. S. 22.



Lucera, Sansevero u. s. w. ihre Menschenfreundlichkeit<sup>1)</sup>. Zu Neapel irrten jene Elenden, lebenden Leichen gleich, umher, ohne Obdach, ohne Kleidung und ohne Nahrung. Viele sanken aus blosser Kraftlosigkeit ohnmächtig dahin, dem sichern Tode Preis gegeben, wenn ihnen nicht das Mitleid der Umstehenden schnelle Hilfe brachte. Andere starben unter colliquativen Lungen- und Magenblutungen. Andere erlagen dem Typhus, den sie selbst verbreiteten; Andere wurden von einem tödtlichen Rothlauf befallen, oder sie erlagen dem die Glieder ergreifenden Brande; Andere starben unter Ohnmächten und Convulsionen. Die Todten aber wie die Lebenden atmeten leichenartige Dünste, gepaart mit dem verpestenden Geruche der ekelhaftesten Unreinlichkeit<sup>2)</sup>.

Noch den von Sarcione mitgetheilten Thatfachen kann, wenigstens für den Anfang der Epidemie, die lediglich contagöse Verbreitung der Krankheit keinen Zweifel unterliegen. Dieselbe begann in den Hospitälern unter den von den Strassen aufgenöthigten Bettlern, und erschien auch bei denen, welche anderer Krankheiten wegen in den ersteren aufgenommen worden waren. Die Krankheit nahm schleichend überhand, zuerst unter dem gemeinen Volke, später unter den Bürgern, zuletzt drang sie bis in die Palläste, und im Juni und Juli war sie ganz allgemein. Fast alle Geistliche, die mit Kranken in Berührung kamen, wurden ergriffen, dagegen blieben die Klöster, vorzüglich die Nonnenklöster, gänzlich befreit<sup>3)</sup>, und auch von den Aerzten erlagen sehr wenige. Um so häufiger wurden die Krankenküster ergriffen<sup>4)</sup>. Die Contagiosität war indess durchaus nicht absolut; auf Säuglinge ging sie von den schwer erkrankten Müttern häufig nicht über. Zu Anfang der Epidemie erlagen vorzüglich die Kräftigsten, zu

1) Caserta wurde, obgleich es gegen Unglückliches seine Thüre öffnete, nicht angesteckt; nach Sarcione, weil diese Stadt fortwährend von starken Winden, „Casertanische Winde“ genannt, durchzogen wird, und weil die Wohnungen nicht so nahe aneinander gebaut sind.

2) Sarcione, a. a. O. S. 25 f.

3) Das. S. 27 ff.

4) Das. S. 61.

[1764.]

Ende vorzüglich die Kinder. Schwangere entgingen, wenn sie befallen wurden, selten dem Tode, ausser wenn in den ersten Tagen der Krankheit Abortus oder Frühgeburst erfolgte. Kindbettfeuern wurden häufig und gewöhnlich mit ungünstigem Ausgange befallen. — Prophylaktika waren nutzlos, Abführungen Gift.<sup>1)</sup> Am unschädlichsten schien ein Brechmittel aus Ipecacuanha oder der Gebrauch der China zu seyn. Höchst gefährlich waren in prophylaktischer Absicht gelegte Vesicator; Wunden, Krätze und andere Hautausschläge schützten nicht im Geringsten<sup>2)</sup>. — Sehr oft gingen andere Krankheiten, selbst das Podagra, in das epidemische Uebel über. Indessen war dies, vorzüglich mit Wechselfiebern, nicht immer der Fall.

Schon sehr früh nahm das mit rasender Schnelligkeit und grosser Bösartigkeit sich verbreitende Uebel die Fürsorge der Regierung in Anspruch, und vorzüglich gelang es, durch die strengste Ueberwachung fremder und einheimischer Bettler, durch Unterbringung der Kranken in neu errichtete, ausserhalb der Stadt gelegene Krankenhäuser u. s. w. die Epidemie so zu beschränken, dass sie im August beträchtlich abnahm, im September fast, und im Oktober völlig verschwunden war<sup>3)</sup>.

#### Errscheinungen.

Die Krankheit verlief in den einzelnen Fällen unter sehr verschiedenartigen Symptomen. Die ersten derselben gaben sich gewöhnlich erst acht Tage nach der Ansteckung u. s. w. zu erkennen; das nach dieser Zeit auftretende Fieber hatte in der Regel Anfangs einen unregelmässig intermittirenden, seltener, und zwar in den heftigsten Fällen und bei hervorstechendem Leiden irgend eines edeln Organs, den ankaltenden Typus. Im ersten Falle dauerte der Paroxysmus 12 bis 18 Stunden; nach dem Schreissen verlief das Fieber in wahre Remission, welche bei Einigen so lange anhielt und so klar und deutlich war, dass sie der Intermission oder Apyrexia nahe kam. Im Fortgange

1) Saccaro, u. s. O., S. 52.

2) Das., S. 51.

3) Das., II, 39.

der Krankheit indess, und wenn das Anfangs gelind erscheinende Uebel seine trügerische Maske abwarf, war stets der anhaltende Typus zugegen <sup>1)</sup>, und nur in der dritten Woche ereignete es sich ausweilen, dass der intermittirende Typus sich wieder einstellte, oft zum Heile der Befallenen, oft aber auch, namentlich wenn die Paroxysmen mit perniciösen Frostanfällen begannen, zum Verderben der unter allen Zeichen der ausgebildeten „Fäulniss“ erliegenden Kranken <sup>2)</sup>.

Die ganze Vielgestaltigkeit eines ungewöhnlich bösartigen Typus ist es, die uns in den zwei letzten Bänden der Sarcone'schen Schrift entgegentritt, und es würde überflüssig seyn, in das Detail der, noch dazu höchst ungedruckten, Beschreibung einzugehen. Es ist schwer zu entscheiden, welchen Antheil an jener Bösartigkeit der ursprüngliche Charakter des Uebels, welchen die Behandlung der neapolitanischen Aerzte hatte, die durchaus nicht die musterhafteste war <sup>3)</sup>. So viel ist gewiss, dass neben den directen Veränderungen der Blutmasse vorzugsweise die Schleimhäute dem Sitz der krankhaften Thätigkeit bildeten, und dass der grösste Theil der übrigen Erscheinungen in Folge dieser ursprünglichen krankhaften Veränderungen auftrat.

Ausführlich beschreibt Sarcone die Veränderungen, welche sich an dem Blute der Kranken zeigten <sup>4)</sup>. Dasjenige, welches in den ersten Tagen der Krankheit weggenommen wurde, war in den meisten Fällen mit einer aschgrauen, zähen Schicht („dichten Leime“) bedeckt; der Blutkuchen selbst hatte eine dunkelröthliche Farbe. Beide Schichten trennten sich oft sehr schnell von einander; den Blutkuchen umgab nur wenig gelbliches oder grünliches Serum. — Sarcone machte eine Menge chemischer Experimente mit jener obersten Schicht des gelassenen Blutes, aus denen sich um so mehr ergibt, dass dieselbe aus

1) Sarcone, 32.

2) *Ibid.*, 56.

3) *S. antea.*

4) Sarcone, II, 136 ff.



[1764.]

dem vielleicht in Gallerte angewandelten Faserstoffe des Bluts bestanden habe <sup>1)</sup>. — Der Blutkuchen ging nach 10 — 12 Stunden in Fäulnis über. Uebrigens bestanden zahlreiche Uebergänge von diesen Veränderungen des Blutes sowohl nach der synochalen, als nach der rein putriden Seite hin. Die Neapolitanischen Aerzte konnten dieselben um so genauer beobachten, als sie in jedem Zeitraum, nicht selten bei demselben Kranken dreimal, zur Ader ließen. Mehrere von ihnen ließen sich durch jene Faserstoffschicht verleiten, die Krankheit für eine entzündliche zu halten; eine Ansicht, welche Sarcone mit dem besten Erfolge widerlegt. Er sagt unter Andern, er habe meistens starke, wohlgenährte und handfeste Leute, wie die Schweizer, behandelt, und dennoch wieder Entzündungen, noch phlegmonöse Geschwüre wahrgenommen.

Von nicht geringerer Wichtigkeit sind die Angaben über das Leiden der Schleimhäute. Wenn hier auch die Sorgfalt der berühmten Beobachter der Göttinger Schleimfißerepidemie vermisst wird, so sind sie doch hinreichend, um die Identität der Erscheinungen mit denen jener Epidemie darzuthun.

Zunächst heft Sarcone die Bedeutung des „Gluten“ hervor, jener zähen Schleimmassen, welche den Epidemischen jener Zeit, wie manchen neueren, den Namen des Schleimfißers verschafft haben, so wenig sich deshalb ihre Verwandtschaft, ja ihre wesentliche Identität mit dem Typhus verkennen läßt.

Schon am ersten Tage der Krankheit zeigte sich die Zunge, der Gaumen und der Schlund mit einem weißlichen Schleim belegt, welcher später eine blaugelbe, zuletzt eine schmutzig rüthliche Farbe annahm, und sich alsdann nur auf dem Rücken der Zunge zeigte. — Sarcone folgte diesen Veränderungen

1) Wir können hier unmöglich die *Crosta pharyngea* der wahren entzündlichen Fieber, sondern nur jene ebenfalls gelatinöse Masse weism, welche bei den dynamischen Krankheiten so häufig ist, und mehr auf Zersetzung des Lestrils verbannt, als Erzeugung neuen Faserstoffs beruht. Ein Vorgang, welcher bekanntlich bei der Phlogia, bei der Cholera und selbst bei dem Scarlat sehr häufig beobachtet wird. — Vergl. u. A. Eisenmann, die Krankheitsaffekte Typhus, S. 11.

mit der größten Aufmerksamkeit, und benutzte sie mit Recht als bedeutsame Anhaltspunkte der Prognostik. — Die Bedeutung jenes Schleims ergibt sich aber vorzüglich aus den Beschaffenheiten der nicht sehr zahlreichen Leichenöffnungen. — Die Gedärme waren meistens von schwarzblauen Striemen oder von zerstreuten Flecken, wie Peterhühen, bedeckt. Ihre Höhle war fast stets mit einem zähen, glänzenden, zuweilen aschgrauen, klebrigen Schleime überzogen, der eine Art von Membran darstellte, nach deren Entfernung die unter ihr liegenden Theile meistens entzündet oder abgestorben erschienen. Nicht immer waren die Veränderungen im Dünndarme beträchtlicher als im Dickdarme, welcher letztere oft außerordentlich und an verschiedenen Stellen ungleich und blasenartig ausgedehnt, in seiner Höhle mit zähem Schleim und höchst übelriechenden, zuweilen den ganzen Dickdarm bis zum Zerspringen ausdehnenden Kothe überfüllt war<sup>1)</sup>. Würmer fanden sich nicht immer, noch stets an denselben Orten, von derselben Größe und Beschaffenheit<sup>2)</sup>.

Ähnliche Veränderungen zeigte der Magen, vorzüglich an seinen beiden Öffnungen. Derselben waren entweder erysipelatös geröthet, oder mit Striemen besetzt, oder mit einem trüben, zum Brandigen neigenden Roth gefärbt, oder auch völlig weis. Auf der Schleimhaut fand sich derselbe zähe, stinkende Schleimüberzug, wie im übrigen Darmkanale. Ähnlich und noch weit mehr der Schlund. — Die Leber erschien nur in einem Falle durch in Eiterung übergegangene Entzündung verändert;

1) Diese bekannte Erscheinung steht in einem interessanten Gegensatz zu dem völligen Mangel der Faeces im Dickdarme bei der Ruhr, wo derselben im unteren Theile des Dünndarms sich anhäufen. Dieses bekannt ist es, dass, vielleicht in Folge dieser Aufkantung des Dickdarms im Abdominaltyphus, bei diesem letzteren die Durchfälle sehr häufig fehlen, während die Gärungsfermentation im Dünndarme um so mächtigerer Verheerungen ausweicht. Das führt nach den Beobachtungen des Verfassers dieser Schrift vorzüglich zu sehr bösen Fällen statt, und alsdann geschieht es häufig, dass vergessene Aerzte es mit einem sogenannten „roinen“ oder „Crisialtyphus“ zu thun zu haben glauben. — Vergl. Küsch im Archiv für die gesamte Medic. Bd. I. 3, 8, 44.

2) Sarcocoe II, 181 E.

[1754.]

die Gallenblase, wenn kein Durchfall, dagegen aber Meteorismus, Icturie, Convulsionen dagewesen waren, übermässig erfüllt u. s. w. — In der bald leeren, bald vollen Blase fand sich ebenfalls der zähe Ueberzug der übrigen Schleimhäute. — Die Gekrösdrüsen vergrössert u. s. w.<sup>1)</sup>

In der Brusthöhle<sup>2)</sup> fanden sich fast immer sehr bedeutende gelatinöse, so wie seröse Exsudate; die Lungen mit Schleim überfüllt, entzündet, emphysematisch aufgeschwollen u. s. w. Die grossen Gefässe ausgedehnt, in denselben falsche Polypen.

Im Gehirn fanden sich zwischen der *dura mater* und *Arachnoidea* beträchtliche seröse Exsudate, auf der letzteren ausserdem eine gelatinöse Schicht von  $\frac{1}{2}$  Zoll (!) Dicke. Die Hirnhöhlen mit Serum, die Gefässe mit dünnem Blute überfüllt.

Diese Angaben werden hinreichen, um unsere Behauptung, dass die Neapolitanische Epidemie ein höchst ausgebildeter Typhus, vorwiegend Abdominaltyphus war, zu rechtfertigen.

Als kritische Erscheinungen schildert Sarcone Schweißse, Urinabgang, Durchfälle, Rothlauf, Mandelgeschwülste (Parotiden!), Blutungen, Brand der äusseren (Genitalien) und inneren Theile u. s. w.; in der Genesungsperiode in Verbindung mit andern Krisen einen eigenthümlichen krätzartigen Ausschlag. Kritisch war vorzüglich der 7te, 14te und 21ste Tag, aber Viele erlagen gerade unter dem Sturz der kritischen Bemühungen, Viele auch den äusserst leicht eintretenden Rückfällen und Nachkrankheiten<sup>3)</sup>.

Es ist unnöthig, die einzelnen Symptome der Krankheit nach ihrer prognostischen Bedeutung aufzuzählen; — zu den heilsamen gehörten gehörig beschaffene Schweißse, kritischer Schlaf, bei Vollblütigen Nasenbluten, Taubheit, welche in der Mitte der zweiten Woche eintrat, Harn mit melligem Bodensatz, Rothlauf an den obern oder untern Theilen, „Mandelgeschwülste“, die indessen oft auch sehr ominös waren, Rückkehr

1) Sarcone, 142 ff.

2) Das., 446 ff.

3) Das., II, 114 ff.



normaler, vor Allem galliger Stühle, und Gelbsucht<sup>1)</sup>. Stets aber kam es vorzüglich auf die Perioden der Krankheit und auf den allgemeinen Zustand an, ob diese Erscheinungen für wirklich günstig gelten konnten oder nicht.

Trotz dieser grossen Bösartigkeit des Uebels wurden doch verhältnissmässig Viele erhalten, und die Aerzte Neapels bestätigten es einstimmig „dass weit mehr genesen seyen, als es sonst bei Krankheiten mit den nämlichen Zufällen der Fall sey“<sup>2)</sup>.

### Behandlung.

Wir wenden uns zu der Betrachtung der von Sarcone und den vorzüglichsten der übrigen Neapolitanischen Aerzte befolgten therapeutischen Grundsätze, welche natürlich nach der Verschiedenheit des Zeitraumes, der Erscheinungen u. s. w. beträchtlich verschieden waren. Sarcone ging in dieser Beziehung für den Anfang der Krankheit von ihrer gastrischen Natur aus, und verordnete demgemäss in der ersten Woche zuweilen und ohne Nachtheil einen Aderlass, alsdann ein Brechmittel (Ipecacuanha, allein oder mit Brechweinstein), welches bei Fortdauer der gastrischen Zustände, bisweilen mit einem Abführmittel (Bittersalz) verbunden, wiederholt wurde, und gab zuletzt die Chinazinde anhaltend, in Dosen von zwei Drachmen mit Wasser oder als Bolus. Kleinere Dosen waren erfolglos. Nie wurde die China gegeben, ohne dass die Ausleerungen vorausgegangen waren, indem sich ihr Gebrauch ohne diese als schädlich erwiesen hatte<sup>3)</sup>.

Gegen die heftigen Kopfflectionen (bei dieser gelinderen Form der Krankheit) zog Sarcone örtliche Blutentziehungen und Vesicator, gegen die Convulsionen einfache warmeäder, Moschus, zuweilen Kampher, leichte Opiate, letztere vorzüglich

1) Sarcone, II, S. 123 ff.

2) Das., 127.

3) Das., III, p. 102 ff.

1754.]

bei hartnäckiger Schlaflosigkeit in Gebrauch. — Zum Getränk verdünnte Pflanzensäuren <sup>1)</sup>).

Unter dem Einflusse der China hörte das Fieber oft ohne merkliche Krisen auf. Indessen traten als solche doch ein mehriger, milchiger oder stiegemehlartiger Bodensatz im Harn, schwache nächtliche Schweißse, gelindes Erbrechen und Durchfälle, grüdlige, Frieselartige Hautausschläge u. a. w. angesehen werden. Bei Manchen ging die Krankheit unter dem Gebrauche der China in ein viertägiges Wechselfieber über <sup>2)</sup>).

In den ausgebildeteren typhösen, Anfangs mit heftigem, nicht remittirendem Fieber auftretenden Fällen wurde vor Allem zur Ader gelassen, und dann ebenfalls die übrigen Ausleerungen vorgenommen, von der China aber nicht eher Gebrauch gemacht, als bis sich bestliche Remissionen zeigten. Man pflegte sie in diesen Fällen mit Mittelsalzen zu verbinden; nie aber heimeisterte sie diese Formen des Uebels mit der bei den einfacheren so oft beobachteten Leichtigkeit. — In den ausgebildeten adynamischen Formen leisteten Säuren noch das Meiste.

Nach der Epidemie kamen drei- oder viertägige Wechselfieber, Wassersuchten und Pöthisen am häufigsten vor <sup>3)</sup>).

1) SARRACENI, *ibid.*, p. 155.

2) *Ibid.*, p. 208 ff.

3) SARRACENI schließt ferner auch folgende, meist früher als die vorige erwähnten Schriften an (II, 1):

a) CARLETA, *Saggio su le malattie di quest' anno 1764. Con un trattato del balsamo solimierico, cui si aggiunge l'apoteoza del Ruge e ros.* Nap. 1764. 8.

b) *Lettere concernenti l'epidemia inf.* in Napoli, scritte da D. FRANCESCO MERLI e D. LORENZO ZUCCA. Nap. 1764. 4.

c) JOH. BAPTISTA DE ROSA, *de febre populari Neapolitana libri duo.* Nap. 1764. 4. (in Hexametris).

d) COLASIA DOMINALE, *Historia physico-medica epidemiae neapolitanae anni 1764.* Nap. 1764. 4.

e) DOMENICO DE MULL, *Lettera sulle ragioni universali della costituzione epidemica dell' anno 1764 in questa città di Napoli ecc.* Nap. 1764. 8.

f) PEPE, Ant. *il metodo di Letti, o sia dissertazione su l'epidemia costituzionale dell' anno 1764.* Napoli 1765. (Von SARRACENI nicht angeführt).

**Die Krankheitsconstitution der Normandie in den Jahren 1765—1777. — Lepecq de la Cloture.**

Die umfassenden und werthvollen Beobachtungen von de la Cloture, einem durchaus Hippokratischen Arzte, schliessen sich am Passendsten hier an. Sie verdienen die Auszeichnung, auf Kosten der Regierung herausgegeben, und den Aerzten Frankreichs als Muster der Beobachtung von Volkskrankheiten empfohlen zu werden. Der innige Zusammenhang der von de la Cloture geschilderten mit den Ereignissen zu Neapel und in der Schweiz lässt sich keinen Augenblick verkennen. De la Cloture, welcher den Veränderungen der Witterung mit grosser Aufmerksamkeit folgte, bemerkt, dass der Winter des Jahres 17 $\frac{1}{2}$  sich durch eine höchst auffallende Gelindigkeit auszeichnete, dass im November mehrere Wochen lang der Südwestwind, der schweizerische Föhn, vorherrschte, und dass diese feucht-warme Beschaffenheit der Witterung, in Verbindung mit häufigen Stürmen, Gewittern und Ueberachernungen, bis zum Jahr 1765 fort dauerte. Die gewöhnliche Ordnung der Jahreszeiten erschien durchaus abgelenkt, und dieser Umstand wurde zur Quelle einer katarrhalisch-faulen Constitution, die am Ende des Sommers 1763 ihren Anfang nahm, bis in den Herbst unter allen Gestalten des Katarrhs fort dauerte, und gegen den November hin eine Verwickelung von einer gallichten, faulen Natur annahm, die sie sehr lange beibehielt <sup>1)</sup>.

Wie zu Neapel, so wurde auch zu Caen die Entwicklung des Drama's durch einfache, rheumatisch-katarrhalische Uebel eingeleitet. Auch hier gingen diese rheumatischen Krankheitsformen sehr bald in den gastrischen Charakter über, Koliken und einfach-gastrische Fieber erzeugend. Zuerst litten besonders Kinder (diese mit grosser Neigung zu separirten Affectionen), alte Personen und Weiber. Die katarrhalischen Brustaffectionen hatten fast stets in gastrischen Zuständen ihre Quelle. Allmählig wurden „falsche Lungenentzündungen“ häufiger, deren Zusam-

1) De la Cloture, p. 44.



[1764.]

zusammenhang mit den obenangeführten Eigenthümlichkeiten der Witterung de la Cloture sehr klar erkannte <sup>1)</sup>. Deshalb vermied unser Beobachter, eingedenk eines alten bewährten Satzes <sup>2)</sup>, den Adersaas, und verordnete statt dessen Brech- und Abführmittel. Immer deutlicher offenbarte sich der wahre Charakter aller dieser Erscheinungen, als im Januar und Februar 1764, besonders bei jungen Mädchen, ächte brandige Bräunen vorkamen, bei denen nächst zeitigen Brechmitteln der Gebrauch der Clima vorzügliche Dienste leistete <sup>3)</sup>. — Im Fortgange des Winters nahm die Neigung der „hitzen, nachlassenden Fieber“ zu galligem und fauligem Charakter immer mehr zu, besonders bildete sich nun die Wurmcomplication aus, und diese war es, welche sich im Frühlunge, nachdem die Winterregen und die feuchte warme Witterung durch die ersten warmen, heitern und schönen Tage waren ersetzt worden, zu dem fürchterlichsten Symptom der herrschenden Fieber abbildete. Wiederum offenbarte sich diese Wendung der nunmehr ihrer Höhe erreichenden epidemischen Constitution zuerst bei den Kindern <sup>4)</sup>. Höchst interessant aber ist die Bemerkung, dass sich die vorher einfachen rheumatischen Fieber und Koliken, mit denen sich die Reihe der epidemischen Erscheinungen eröffnet hatte, in dieser Zeit durch einen schein Frieselausschlag entschieden. Eine neue Bestätigung unseres alten Satzes von der Verbindung des typhösen, erysipelatösen und rheumatischen Processes, die hier, in einem der endemischen Erzeugung des Friesels so günstigen Lande, noch weniger auffallen kann.

Die grosse, fast ausschliessliche Geneigtheit dieser Frieselform, das Magenlebersystem zum Hauptsitze der örtlichen Affectionen zu machen, hörte mit dem Ende des anhaltenden Regens und der Südwinde im März auf. Seit den nun eintreten-

1) De la Cloture, p. 61.

2) „In pleuritide sanguinis detractionis impedimento sunt tempus anni, dies et lateris vel pituitosae, bilis, Hippocr. de humorib. in fac.“

3) De la Cloture, p. 69. 72.

4) Ders., p. 89.

den Frösten und Nordostwinden gewannen Brustaffectionen als Lokalfälle des Friesels die Oberhand <sup>1)</sup>. Die Ausdehnung, sagt unser Beobachter <sup>2)</sup>, der Schweiß, der Frieselausschlag auf der Haut, gaben damals eine sichere Krisis von allen beunruhigenden Zufällen der Brust ab, so wie die Schweißse und der Frieselausschlag vorher die Keliken vertrieben hatten. Die Veränderung der Witterung brachte diesen Unterschied hervor, die Constitution aber blieb im Grunde ebendieselbe. —

Unter diesen Umständen bietet das intercurrirende Auftreten der Blattern, der Masern, der Rötheln und der Ruhr <sup>3)</sup> seit dem Frühling bis zum Herbst des Jahres 1764, in welcher letzteren Jahreszeit besonders die Blattern eine ziemlich Hohe erreichten, und besonders an der ausgebildet typhösen Krankheitsstimmung den entschiedensten Antheil nahmen, Nichts Auffallendes dar <sup>4)</sup>. Die eigentliche Akme dieser, ganz Frankreich überziehenden, aber nicht sehr gefährlichen Epidemie fiel in den Herbst 1765. Noch im Jahre 1767 war sie nicht ganz verschwunden <sup>5)</sup>. Ausserdem wurden als Zwischenkrankheiten in dieser Periode im Herbst 1764 einfache Anginen, Schlagflüsse, katarrhalische Zustände und Wechselfieber beobachtet, die in den vorhergehenden Jahren ziemlich selten gewesen waren. Diese letzteren näherten sich häufig den anhaltenden typho-gastrischen Fiebern, und gaben ihre Hartnäckigkeit unter Andern auch durch die Erfolglosigkeit der gegen sie in Gebrauch gezogenen China zu erkennen.

So gross unserm Beobachter der Antheil erscheint, den die vom Sommer 1763 bis zum Winter 1764 anhaltende Feuchtigkeits auf diese im Allgemeinen „katarrhalisch-gastrische“ Constitution übte, für so unverkennbar er den Einfluss der kalten

1) De la Cloture, p. 106.

2) *Ibid.*, p. 121.

3) *Ibid.*, p. 131. — Es muss bemerkt werden, dass die Ordnung in der Schrift de la Cloture's nicht die beste ist. Von p. 181 an kommt er wieder auf die bereits früher geschilderten Ereignisse zurück.

4) *Ibid.*, p. 122.

5) *Ibid.*, p. 121.

[1766.]

und trockenen Witterung, welche mit dem Winter 17 $\frac{1}{2}$  herrschend wurde, auf die Umänderung der Krankheitsconstitutionen halt<sup>1)</sup>, so erlaubt scheint es zu seyn, den Zweifel zu hegen, ob diese nun folgende Steigerung der epidemischen Constitution wirklich von diesen Witterungsverhältnissen abhing, oder ob sich dieselbe auch ohne diese letzteren ausgebildet haben würde. Sey dem indess wie ihm wolle. Sehr richtig ist jedenfalls die Bemerkung, dass sich dieser Einfluss erst im Sommer 1765 recht deutlich zu offenbaren anfangen konnte. Im Winter 17 $\frac{1}{2}$  dauerten die früheren Katarhe, häufig zum Keuchhusten gesteigert, fort, bis denn endlich die „böartigen Fieber“ an die Spitze der epidemischen Ereignisse traten. Die Eigenthümlichkeit derselben ist hinlänglich charakterisirt, wenn wir bemerken, dass „herumziehende Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Uebelkeit, Brechen, wässrige und stinkende Durchfälle, Zufälle von Würmern und Petechien,“ mit denselben verbunden waren, dass die bisher so wohlthätigen Brechmittel, selbst gelinde abführende Mittel, die Kranken in eine beunruhigende Angst versetzten, heftig purgiren, dass Aderlässe sehr bedenklich waren, dass die China und Vesicatore bessere Dienste leisteten, und dass der Tod unter allen Erscheinungen der innersten Adynamie erfolgte<sup>2)</sup>. Als eine zweite Art dieser Fieber schildert de la Cloture eine Varietät des Typhus, die offenbar mit der *Neurosis lenta* Huxham's zusammenfällt<sup>3)</sup>. Wenn aber unser Beobachter denjenigen Zeitraum dieser Epidemie, in welcher (nach Wiedereintritt warmer Witterung im April 1765) der Hineintritt des von ihm selbst als symptomatisch erkannten Krystall-Friezels die höchste Steigerung der Krankheit anzeigte, als eine ganz neue und besondere Constitution schildert, so ist unverkennbar, dass er hierbei in den Fehler einer Alles zersplitternden Systematik verfiel<sup>4)</sup>. Bei dieser Ge-

1) De la Cloture, p. 147.

2) *Ibid.*, p. 150.3) *Ibid.* S. 412.

4) De la Cloture, p. 168.



genheit führt de la Cloture das Ergebnis der einzigen in dieser Periode der Epidemie angestellten Section an, die indess zufolge ihrer Oberflächlichkeit durchaus kein Resultat gab <sup>1)</sup>. Breche- und Abführmittel nützten zu Nichts, als die Ueberbleibsel der Lebenskräfte zu untergraben, eben so nutzlos waren *Antiseptica*. Die früher so nützlichen Blasenpflaster durften jetzt kaum in Anwendung gezogen werden, und eben so zweifelhaft war der Erfolg der China <sup>2)</sup>. — Mit dem Eintritt kalter und trockner Witterung im Mai fing die Epidemie an, ihrem Ende entgegenzugehen. Es wird hinreichend seyn, anzu merken, sagt unser Schriftsteller, dass der sehr wässrige und im Anfang stinkende Durchfall nach und nach galligter wurde und den einzigen Weg zur Reinigung abgab, dass man die China nicht in grossen Dosen geben durfte, und dass man sie selbst entbehren konnte; die Blasenpflaster aber waren keineswegs unnütz, wie bei dem vorübergehenden Friesel <sup>3)</sup>.

Die Angaben de la Cloture's über die Krankheiten der Jahre 1766 und 1767 sind sehr ungenau. Er spricht von einer allmähigen Abnahme der „schwarz-galligen“ Constitution, ohne auf die Zeitrechnung Rücksicht zu nehmen. Im Herbste 1767 erschien die Influenza <sup>4)</sup>, die Nichts Besonderes darbot. Der Winter 1767½ war trocken, und reich an Süd- und Südostwinden. Die herrschenden Krankheiten waren falsche Pneumonien, Durchfälle, Ruhren, Cholera und einzelne, der eben verschwindenden „*Nervosa leata*“ sich annähernde Krankheitsformen. Mit dem April 1768 aber hörten diese auf, und sie bezeichneten so, sagt de la Cloture, das Ende einer Constitution, welche ihre Herrschaft länger als dreissig Monate hindereinander behauptet hatte.

Mit dem Jahre 1768 beginnt unser Schriftsteller eine neue Periode der von ihm beobachteten Constitutionen, die „schlei-

1) De la Cloture, p. 179.

2) Desb., p. 172.

3) Desb., p. 181.

4) Schates.

[1757.]

nige," der er im J. 1769 die „gallige," im J. 1770 die „faule" folgen lässt. — Die nähere Betrachtung dieser epidemischen Vorkommnisse würde uns indess in eine neue Periode führen, welche jenseits der Grenzen dieses Abschnitts unserer Untersuchungen liegt. Wir sind bis jetzt unserem Beobachter nur so weit gefolgt, als es nöthig schien, um die grosse Verbreitung der epidemischen Constitution zu beweisen, deren schürfste Ausprägung uns die Schilderung Sarcone's an die Hand gab. —

### Allgemeine Verbreitung der Ruhr in den Jahren 1760 — 1767.

Die Ruhren spielen in der Geschichte der Krankheiten dieses ganzen Zeitraums eine ansehnliche Rolle, nicht allein durch die Bedeutung, die sie an sich selbst haben, als vielmehr wegen ihres innigen Zusammenhanges mit den Wechselfiebern einerseits, mit den Typhen andererseits. Irrren wir nicht, so ist hier das allgemeine Gesetz, dass der Cyklus der Volkskrankheiten, wo er zu seiner vollen Entwicklung gelangt, mit jenen beginnt, dann, unter dem Einflusse begünstigender Witterungsverhältnisse, in die Ruhr übergeht, um hierauf in dem Typhus, gleichviel ob typhöse Wechselfieber oder ausgebildeter Typhus, Schleimfieber u. s. w., seine Höhe zu erreichen, und zuletzt durch die Ruhr hindurch wieder in die Elemente seines Beginns überzugehen, während sich diesem ganzen Verlaufe fortwährend Masern, Scharlach, Blattern, Garotills und Lungentypus hinzugesellen.

### 1757 — 1762. Ruhr und Petechialtypus zu Mainz. Strack.

Die Nachrichten Strack's über die epidemischen Krankheiten der genannten Jahre stehen den meisten übrigen Darstellungen bedeutend nach. Namentlich wird in denselben die Erkenntniss des Zusammenhanges der epidemischen Ereignisse

gänzlich vermisst. Zu Mainz herrschte die Ruhr in den drei Sommern 1757—1759, ohne besonders verbreitet zu seyn<sup>1)</sup>. Strack ist der Meinung, dass, ausser der bedeutenden Sommerhitze dieser Jahre, vorzüglich die Durchzüge der französischen Truppen, unter denen die Ruhr herrschte, zur Verbreitung der Krankheit beigetragen haben, indem diese vorzugsweise diejenigen Orte befiel, welche von den Truppen berührt wurden<sup>2)</sup>. Indess herrschte die Ruhr doch auch im Sommer 1759, in welchem keine derartigen Durchzüge Statt fanden. Diese Epidemie schien sich vorzüglich von Wiesbaden aus über den Rheingau nach Frankfurt u. s. w.<sup>3)</sup> zu verbreiten; wir haben indess oben gesehen, wie sie in dieser Zeit fast ganz Europa überzog. Strack sucht indess auch diese Verbreitung vorzüglich auf die damaligen Kriegsevents zurückzuführen.

Die nosologischen Ansichten des genannten Arztes über die Ruhr sind befriedigend. Vor Allem sieht er in der Ruhr ein allgemeineres Leiden, welches sich auf der Schleimhaut des Dickdarms concentrirt, und in den Durchfällen erblickt er mehr oder weniger etwas Kritisches<sup>4)</sup>. Mit diesen Sätzen steht die gänzliche Verwerfung narkotischer und adstringirender Arzneien in Verbindung<sup>5)</sup>, statt deren er mit Degner<sup>6)</sup>, dessen Meinung von Verderbtaiss der Galle als Ursache der Ruhr er übrigens mit Recht nicht beipflichtet, die *Ipecacuanha*, später unter den bekannten Umständen das *Rhubar* anwendet<sup>7)</sup>. Andere Krisen, z. B. durch die Haut, wollte Strack nie bemerkt haben<sup>8)</sup>.

1) Im Sommer 1757 befiel sie nach Strack's Angabe ungefähr 200 Personen. Praefat. — Die Ruhr hatte zu Mainz zuletzt in den Jahren 1735 und 1742 geherrscht.

2) u. B. Niederlagsheim, Castell, Wintersheim, Elmsheim, — Kronbach, Dromersheim, Lankenheim, Eidsenheim.

3) Zu Frankfurt starben in einer Woche 50 Personen an der Ruhr. Strack, p. 8.

4) Strack, p. 45, 47.

5) *Ibid.*, p. 48.

6) *Ibid.*, p. 52 seq.

7) *Ibid.*, p. 72.



[1774.]

Zuweilen „verband sich die Ruhr mit einem Tertianfieber.“<sup>1)</sup> In Fällen dieser Art nützte indess die China Nichts, und diese Gestaltung der Krankheit hatte auf die Behandlung keinen Einfluss. Bei der China beobachtete Strack niemals die bei andern Verfahren sehr häufigen Nachkrankheiten, namentlich hydropische Affectionen, Leberverhärtung, Gicht, Asthma u. s. w. Aus einem ähnlichen Grunde enthält die Schrift auch keine Sectionberichte. — Eines gemauerten Eingehens in die den Typhus der Jahre 1760 — 1762 betreffende Schrift<sup>2)</sup> desselben Arztes, können wir uns füglich überheben, da dieselbe vorzugsweise aus Krankengeschichten besteht. Indessen ist die Bemerkung nicht uninteressant, dass, als der Typhus zu Ende des Jahres 1762, nachdem vom August an feuchtes, regnerisches und nebeliges Wetter geherrscht, und nachdem neue Züge von Truppen statt gefunden hatten<sup>3)</sup>, ein vorzugsweises Leiden der Respirationorgane beobachtet wurde, welches deutlich genug daran erinnert, dass gleichzeitig eine der ausgeprägtesten Epidemien des Alpenstichs die Schweiz durchzog<sup>4)</sup>. Strack behandelte diese Krankheit nach den allgemeinen Grundsätzen des Typhus. Ein sehr unglücklicher Gedanke indess war es, vorzugsweise in wiederholten Aderlässen Heil zu suchen. Welchen Erfolg dieses Verfahren gehabt habe, geht am Besten aus Strack's eigenen Worten hervor<sup>5)</sup>.

1) S. 4. Schmelzer.

2) Ende des siebenjährigen Krieges durch den Habsburg'schen Feldarzt (15. Febr. 1763).

3) S. oben S. 355.

4) „*Primum ortus frigoris (Strack), de morbo cum petechiis, p. 279.) cum subitanea acutata lateris sinis dexteri sine alio dolo erat: posteaque frigore excelsitas calidior erat, qui continuenter exaruit. Hinc dolor lateris sinis accessit, per quatuor dies; ut albamur vultum, ut rufa pueri videretur. Respirationis dextera erat, et ipsius ab incrementum dolorum difficile; inter haec etiam tussis sine, quae nihil emulsa erat, vixit et exaruit. Arteriarum pulsus parvus, frequens, et solus suppressus erat: qui post multum sanguinem coles et pueri videretur.*

*Extractiones ex aliorum vasa sanguis magis, ex aliorum vasa minus glutinosa erat: sanguinem etiam in cruribus inflammationem videtur. Costrum hujus quidem morbi plus tenet, ut morbus jam incipit, quam ut incipit.*

*Mixta vero strum strumque sanguis, et impure supra dactylum parum*

**Die Feldkrankheiten der Jahre 1761—1765. Monro.**

An dieser Stelle mag es vergönnt seyn, wiederum der Feldkrankheiten zu gedenken, die in dieser Zeit unsern des oben betrachteten Schauplatzes Verwüstungen anrichteten, die sich allerdings auch lediglich durch die Verhältnisse des Lagerlebens, und besonders der Lazarethe gebildet haben würden, die aber doch gerade in dieser Zeit durch die allgemeine Krankheitsstimmung eine wesentliche Steigerung erfuhren.

Die Schrift Monro's ist durchaus von dem Geiste Pringle's beseelt, ohne jedoch ihr Vorbild zu erreichen. Sie selbst indext, und die Zusätze ihres französischen Uebersetzers, Regue de Presle, bezeugen die grosse Wichtigkeit, die man einem bis auf Pringle gänzlich vernachlässigten, hochwichtigen Zweige der Staatsarzneikunde zugedreht liess.

Bald nach der Eröffnung des Feldzuges im Herbst 1760 zeigten sich in dem vereinigten Lager der englischen und deutschen Truppen bei Warburg in Westphalen, während es mehrere Monate lang fast unaufhörlich regnete, die gewöhnlichen Feldkrankheiten, Durchfälle, Rohren, bösartige Fieber. Im Hauptlazareth zu Paderborn steigerten sich diese zu dem entschiedensten Typhus, der sich erst verlor, nachdem man die Kranken in den Häusern der Stadt vertheilen konnte<sup>1)</sup>. Dieselbe Massregel verhinderte auch späterhin das bedeutendere Ausbreiten der allerdings auch im folgenden Jahre niemals ganz verschwindenden Krankheit.

Die Erscheinungen derselben werden von Monro gut, obschon ohne Ordnung beschrieben. Seine Darstellung löset Nichts Besonderes dar, ausser dass zuweilen, ausser den sehr

*fomenta emollientia, applicata item emplastra resolutoria lateri acque pulvis refrigerantia dicotagae emollientia cum oleis et multa aequalia aquiliter, solvere quae pleuritica juxta constant, nequequam, etiam ubi ob hoc morbi principia sollicita fuerint, praefecerunt. Nulla nempe specie curae erant. Arruit quinto die delirium; mox latebris febris est; urinae flosculi erant; serena gangraena est, quae aegram die septima jugulavit.*<sup>1)</sup>

1) Monro, p. 3 R. (A. de Presle, des Regue de Presle, Alenk. 1771. Th. 2. S. 1 R.)

[1762.]

gewöhnlichen und fast immer kritischen Parotiden, auch Geschwülste in der Achselgrube und Bulonen vorkamen <sup>1)</sup>. Petechien waren sehr häufig. Die Behandlung ist fast ganz die Pringle's, zamentlich in Bezug auf die China, die Monro noch weit häufiger benutzte, und zwar, wie es scheint, ohne sich der ganzen Bedeutung dieses Verfahrens klar bewusst zu seyn.

Dasselbe gilt von der Ruhr, welche gleichzeitig mit dem Typhus epidemisirte, und sich häufig mit demselben verband. Ebenso waren auch in diesem Fieber Wechselstieber mit ihrem ganzen Gefolge sehr häufig, und damit Nichts der vollständigen Analogie mit den Beobachtungen Pringle's fehle, so ergriff auch die Influenza im Jahre 1762 die Tropen <sup>2)</sup>.

**1762. Influenza. Fortdauer und höhere Ausbildung der erysipelatösen Krankheitsconstitution. Wien, London. — Mertens. Baker.**

Niemals vielleicht hat sich der rein intercurrende, von den übrigen Ereignissen auf dem Gebiete der Volkskrankheiten unabhängige Charakter der Influenza deutlicher offenbart, als in der Epidemie von 1762, welche für Europa in den März bis September des genannten Jahres fiel <sup>3)</sup>. Die Erscheinungen derselben wichen nicht wesentlich von ihrer gewöhnlichen Gestaltung ab; zum deutlichen Beweise aber, dass der ihr vorhergehende und in ihr selbst sich hier und da offenbarende erysipelatöse Krankheitscharakter <sup>4)</sup> durchaus nicht erloschen sey, trat nun die Ruhr an die Spitze der Krankheiten, begünstigt allerdings durch die enorme Sommerhitze des Jahres 1762 <sup>5)</sup>, aber doch gewiss nicht ohne den bei einer durchaus ähnlichen

1) Monro, p. 42 (Ueters. p. 42).

2) Müll., p. 127 (Ueters. p. 127).

3) S. Gluge.

4) Vergl. Hist. pathol. Ueters. I. 218.

5) Zu Göttingen beobachtete man 18 Tage 116° Fährheit = 45° Reaum. in der Somm. Vergl. Skauren.



Gelegenheit hundert Jahre früher von Sydenham erkannten Zusammenhang mit den allgemeinen Vorkommnissen dieser Zeit. So herrschte die Ruhr in den weitesten Kreisen über ganz Europa, während sich gleichzeitig die Typhen immer mehr ausbildeten.

**1762. Ruhr. London. — Baker.**

Zu London folgte der Grippe die Ruhr auf dem Fusse nach. Sie begann zu Ende Juli 1762, und nahm um so mehr die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch, als sie seit langer Zeit nicht beobachtet worden war. Die Jahreszeit war ausserordentlich heiss und trocken, nur zuweilen fiel Regen. Die Epidemie, welche bis zum November in einer ausserordentlichen Extensität herrschte, ergriff vorzüglich die niederen Stände, am heftigsten Kinder und schwächliche Personen. Die Erscheinungen der Krankheit boten Nichts Ungewöhnliches dar, und kamen fast ganz mit denen von Degner beschriebenen überein<sup>1)</sup>. Unter denselben verdient die oft gänzlich mangelnde Harnsecretion, die Gefahr des reinen Blutabgangs oder noch mehr stinkenden Wassers, des Schluckens, der Schlinglähmung, der Aphthen hervorgehoben zu werden. Wie gewöhnlich litten während der Epidemie viele Personen an leichten Durchfällen, die fast nie ärztlicher Hülfe bedurften. Gerade diese gefahrlosen Durchfälle wurden sehr häufig durch den Genuss des Obstes hervorgerufen, welcher sich überhaupt selbst bei der Ruhr, wie es schon Alexander von Tralles erfahrt<sup>2)</sup>, offenbar nützlich erwies<sup>3)</sup>.

Therapeutisch schritt sich Baker in keiner Periode des Uebels vor dem Aderlasse, sobald ihn die Heftigkeit des Fiebers oder der Entzündung zu erfordern schien. Aber am wichtigsten war der Gebrauch der Brechmittel, namentlich des kräf-

1) S. oben S. 282.

2) „Ὅθεν γὰρ τινος διακρίνου προσιόντος ἡλίμου, οὐ τίνεως ἀναδραμαδόντος ἀφαισίου ἀπολείπει τὰς νύκτας διαγυγνέμενος. Καὶ ἄλλας ἐκ τούτων ἐμαρτύλλει ὑπομνήσεις.“

3) S. ant. Zimmermann.

[1762.]

tigeren Brechereinstellen, den Baker um so ausschliesslicher anwandte, als er sich theils von einer specifischen Wirkung der Ipecacuanha nicht zu überzeugen vermochte, theils auch von jenen die so hilfreichen Schweisse, und zugleich die vor ihm folgenden kritischen Durchfälle beobachtete. Eben so frey widerspricht Baker den übertriebenen Lobeserhebungen der Rhabarber, namentlich zu Anfang der Krankheit, obgleich er ihre Verbindung mit dem Calomel um so weniger missbilligt, je mehr dieses Mittel vorwiegt. Gänzlich aber verurtheilt er Aromatika und Genturze, und besonders den Missbrauch der zwecklosen Klystiere. Ebenso das inzeitig angewendete Opium, welches er nicht eher zulies, als bis die normale Kottbildung wieder eingetreten war. Von seinem vorzeitigen Gebrauche beobachtete er Rheumatismen, Epilepsie und Brustentzündungen. — Desto mehr empfiehlt Baker schleimige, ölige Getränke und warme Bäder. — Rückfälle entstanden sehr leicht. Vorzüglich interessant aber sind einige von Hewson, Pringle und Wollaston schliesslich mitgetheilte Sectionsberichte, ausgezeichnet durch eine Genauigkeit, die selbst von den neuesten Untersuchungen dieser Art nicht übertroffen worden ist.

Aus diesen ging zunächst hervor, dass das livide Aussehen des Dickdarms, die schwarze Farbe des in ihm angehäuften Schleimes, durchaus nicht auf einem sphacelösen Zustande beruhte, indem sich durch Maceration beide entfernen, und das gesunde Ansehen des Darms gänzlich wiederherstellen liess. Sehr genau untersuchte Hewson auch die „Tuberkeln“ auf der Schleimhaut des Dickdarms, die er in mancher Hinsicht mit Blatterpasteln vergleicht, von denen sie sich indess durch den Mangel eines häutigen Ueberzuges und durch ihre solide Beschaffenheit unterschieden. Wurden dieselben zwischen zwei Fingern gedrückt, so schwätzten sie etwas blutige Flüssigkeit aus. Anfangs hielt sie Hewson für fungöse Excrecenzen von Schleimhautgeschwüren, bei genauerer Untersuchung aber gab er diesen Gedanken auf, ohne ihre eigentliche Natur bestimmen zu können.

Noch genauer beschreibt Wollaston, der die übrigen Angaben Hewson's bestätigt, die Veränderungen auf der Schleimhaut des Dickdarms. Derselbe war fast ganz mit bald runden, kleinen, rothen, bald breiten, hervorstechenden und fungösen Tuberkeln bedeckt, welche aus einer Menge einzelner kleiner zusammengefloßener Tuberkeln entstanden zu seyn schienen. Zwischen ihnen fanden sich gesunde Schleimhautstellen. Ausserdem fanden sich aber nur im obern Theile des Dickdarms kleine runde Pesechienartige Ekechymosen. Die Leber war an ihrer untern Fläche schwarz gefärbt, im Innern gesund; die Gallenblase von einer gelben, öligen, süss-schmeckenden Galle strotzend angefüllt. — In einem zweiten Falle fanden sich gangränöse Zerstörungen und mehrere Durchbohrungen im Dickdarne. Nach den kurzen Angaben Schnurrer's, dessen Quellen uns nicht zu Gebote stehen, folgten der Ruhr Faulfieber mit Friesel und Pesechien. An vielen Orten herrschte fortwährend der Garotillo, und auch in den überall verbreiteten Viehsuchen dieses und des folgenden Jahres wiesen alle Erscheinungen auf eine faulige Halsentzündung hin. In der Dauphinée und Klein-Burgund fand man den Schlund und die Luftröhre immer brandig <sup>1)</sup>).

**Ruhren und Faulfieber in Portugal und Spanien, 1763 und 1764. Douglas, Masdevall. — 1765. Irland. Sims.**

Denselben Verhältnissen begegnen wir in Portugal und Spanien, wo sich mit dem Einflusse der allgemeinen Krankheitsconstitution die ganze Gewalt der Schädlichkeiten des französisch-spanischen — englisch-portugiesischen Krieges vereinigte. Auch hier verbreitete sich zunächst die Ruhr (Douglas), dann die bösartigsten, und namentlich durch ihr höchst energisches Contagium verheerendsten Typhen.

1) Vergl. Schnurrer, II, 323 ff. — Die Beschreibung, welche Mertens von der Wiener Ruhr-Epidemie dieser Periode giebt, konnten wir, da der Druck bereits zu sehr vorgeschritten war, hier nicht mehr einschalten.





## 1765. Ruhr in der Schweiz. — Zimmermann.

Am berühmtesten unter allen diesen Schriften ist Zimmermann's Werk geworden; klassisch, weniger wegen der eigentlichen Beschreibung der Krankheit, welche im Ganzen Nichts darbietet, als was schon von den besten der früheren Aerzte bemerkt worden wäre, als vielmehr wegen der vor trefflichen Grundsätze der Behandlung, und namentlich der edlen Freimuthigkeit, mit welcher ihr Verfasser den verbreitetsten Vorurtheilen der Laien sowohl als der Aerzte entgegentritt, und welche offenbar für die Lehre von den Ursachen und der Behandlung dieser Krankheit von dem heilsamsten Einflusse gewesen ist. Vortreflich erfreulich aber ist die klare Einsicht in den innigen Zusammenhang der Epidemie mit den übrigen epidemischen Ereignissen derselben Zeit, namentlich mit dem oben beschriebenen „Faullieber“, welches dieser Ruhr vorherging, und ihr, wie sich unten ergeben wird, nachfolgte. Von der wesentlichen Identität beider Krankheitsformen war Zimmermann so überzeugt, dass er selbst aus dem bei der einen als erspriesslich Erkannten die Indicationen für die Behandlung der andern ableitete. „Sydenham's bekannte Anmerkung von dem Zusammenhange der Epidemien eines Jahres befand sich in diesem Jahre vollkommen wahr. Auf eine erstaunende Menge Faullieber folgte die mit einem Faullieber begleitete Ruhr <sup>1)</sup>.“ — „Die Aehnlichkeit unserer Ruhr mit dem vorher epidemisch gewesenen Faullieber erhellet aus der Aehnlichkeit der Zufälle beider Krankheiten, aus der Aehnlichkeit der Kurart, die in beiden die glücklichste gewesen, und selbst aus der Aehnlichkeit der Wirkung, die auf die dabei begangenen Fehler erfolgte <sup>2)</sup>.“ — „Unsere Ruhr schien mir bloß eine besondere Bestimmung oder derselben verdorbenen Säfte, die unsere sogenannten Faullieber oder galligten Fieber verursachen <sup>3)</sup>.“

Die Witterung dieses Jahres schien allerdings die Ruhr zu

1) Zimmermann, S. 24.

2) Ders., S. 25.

3) Ders., S. 24. u. s. m. u. d.

[1765.]

begünstigen. Der Juni war feucht und an sonnigen Tagen schwül, ähnlich der Juli und die erste Hälfte des August. Die zweite Hälfte des letzteren brachte sehr helle und heiße Tage, die mit der grossen Kälte der Nächte auffallend contrastirten; ähnlich der September; der übrige Theil des Herbstes veränderlich, regnerisch und kalt<sup>1)</sup>. Verhältnisse, welche keine Krankheit mehr als die Ruhr zu begünstigen pflegen. Nichts desto weniger war Zimmermann weit entfernt, die Entstehung der Volkskrankheiten einzig von diesen Witterungsständen abzuleiten, die er nur als Folge einer und derselben tiefer liegenden Ursache betrachtete; um so weniger, als sehr viele Orte doch auch von der Ruhr verschont blieben.

Die in Rede stehende Epidemie war im Jahre 1765 vorzüglich im Canton Bern, im Thurgauischen, so wie auf mehreren andern Punkten der Schweiz und in Schwaben verbreitet. Die ersten Fälle kamen schon im März vor, aber ihre grösste Höhe und Verbreitung erreichte sie in den späteren Sommermonaten, um endlich im Winter wieder in die „Faulfieber“, und insbesondere die „faulen Seitenstiche“<sup>2)</sup> überzugehen, aus denen sie entsprungen war; — überall eine bedeutende Sterblichkeit erzeugend (ungefähr  $\frac{1}{2}$  der Befallenen), und namentlich die im vorigen Jahre verschonten Orte ergreifend<sup>3)</sup>.

Die Erscheinungen der Krankheit boten, wie erwähnt, Nichts Ungewöhnliches dar. Nach einem Frost, Kopfschmerz u. s. w., folgte eine immer mehr zunehmende Fiebershitze; indem stand das Fieber mit der Heftigkeit der Krankheit, wie gewöhnlich, in umgekehrten Verhältniss. Bei Manchen stellten sich schon am ersten Tage Delirien oder Schlafsucht, letztere namentlich bei Kindern ein. Die Darmabgänge waren schleimig, wässerig, blutig, gallig, in schlimmen Fällen zuletzt ichorös, dabei sehr häufig, (20—30 mal im Tage), und mit sehr heftigen Lebeschmerzen verbunden. Die starken Schweißes waren nutzlos. Bei Einigen der am heftigsten Befallenen zeigte

1) Zimmermann, S. 11.

2) Ders., S. 11 ff.



sich ein Ausschlag am Munde und an der Zunge, bei Andern über den ganzen Unterleib oder den ganzen Körper, „da die Krankheit so viel als vorbei war.“ — Ein Zusatz, der zu der Annahme einer kritischen Bedeutung dieses Ausschlags berechtigen dürfte, wie sie von älteren und neueren Beobachtern bestätigt wird <sup>1)</sup>. Höchst gefährliche Kranke bekamen einen ordentlichen Friesel und zugleich Geschwüre am Leibe, wenn sie die abführenden Mittel nicht ordentlich gebraucht hatten; Kinder verfielen in Zuckungen und Sopor. — Unter den Nachkrankheiten spielten „laufende Gicht,“ Wassersuchten und Fessgeschwülste die Hauptrolle <sup>2)</sup>; höchst gefährlich war auch die trockene Ruhr, heftiges Bauchgrimmen mit kurzweiliger Verstopfung. Dagegen kamen auch, wie gewöhnlich, viele leichte Formen und einfache Durchfälle vor. Interessant ist noch die Angabe, dass einzelne Personen, welche dem Ruhrcontagium ausgesetzt gewesen waren, nach dem Ende der Epidemie mit häufigen grossen Eiterbeulen an der Brust, unter den Armen, an den Knien und an den Beinen befallen wurden. Einige hatten diese Beulen oben auf dem Kopfe und über den ganzen Leib, Verschiedene hatten statt der Eiterbeulen grosse weisse Blasen. Doch ward keiner von allen diesen Leuten heiläugerig <sup>3)</sup>.

Ausführlich erörtert Zimmermann das oben berührte Verhältniss des „fauligen Seitenstich's“ zu der Ruhr. Dieser herrschte in der Schweiz, und vorzüglich im Canton Bern vom Ende des Jahres 1764 bis Ostern 1765 in der oben <sup>4)</sup> beschriebenen Weise. Beide Krankheiten traten mit denselben Vorboten auf, beide waren durch dieselben bilärischen Zufälle, dieselbe Brechneigung, dieselbe tödtliche Natur, dieselbe Neigung zur Schlafsucht, dieselbe Heilsamkeit der Brechmittel und der Abführungen ausgezeichnet. Bei beiden zeigte sich in bösarti-

1) Zimmermann, S. 26. Vergl. eb. S. 355.

2) Ders., S. 22.

3) Ders., S. 22.

4) S. oben S. 493.

[1783.]

geren und schlecht behandelten Fällen der Friesel, oder ordentliche, in Eiterung übergehende Frieselblasen, gänzlich verschieden von dem „unschädlichen kritischen Ausschlage derer, die eine heftige Ruhr glücklich überstanden.“ In beiden Krankheiten machte sich eine so hervorstechende biliöse Complication geltend, dass Brechmittel und gelinde Abführungen dringend indicirt waren. Die ersteren (*Ipecacuanha*) gab Zimmermann, selbst in sehr vorgeschrittenen Zeiträumen der Krankheit, und, wie in der dieser Ruhr folgenden Keuchhustenepidemie, mit dem besten Erfolge; als Abführungen dienten Tamarinden, *Cremor Tartari*, ausserdem Pflanzensalzen, namentlich Weintrauben. Im Faulfieber bewährte sich ausserdem der Goblachwefel, in der Ruhr das vorzüglich von Dr. Machtlin zu Ravensburg empfohlene *Fatrum Antismuic ceratum*. Der Charakter aber der von Zimmermann eingeschlagene Behandlung übertrug, muss als hippokratisch-psychiatrisch mit jener gleichzeitigen Berücksichtigung der specifischen Natur der Krankheit bezeichnet werden, welche wir bei den Schülern Sydenham's und Boerhave's in so insiger Verquickung antreffen. — Selten war eine eigentliche Nachbehandlung, nur zuweilen Beseitigung der zu heftigen Schmerzen durch den vorsichtigen Gebrauch der Narcotica nöthig. „Den Mönsaft in der Ruhr zu geben, ehe der Zunder des Uebels vernichtet ist, hielt ich immer für gefährlich 1).“ Zum Getränk empfahl sich vor Allem das einfache warme Wasser. — Stopfende Mittel, namentlich aber Spiritus, zu denen das Volk nur zu oft seine Zuflucht nahm, waren unbedingt nachtheilig 2). Die Chamillen zeigten sich als das beste schmerzstillende Mittel. Zu Ende der Krankheit leistete der Rhabarber vortreffliche Dienste.

Dies der unsern Zweck angehende Hauptinhalt der Schrift

1) Zimmermann, S. 77.

2) Die Regierung von Bern liess von den Kurzein berath. vor dem Gebrauche des reifen Weins warnen. Zimmermann berichtet, dass diese Warnung häufig ganz verkehrt verstanden worden sey, und den Missbrauch der Spiritus zu noch allgemeiner gemacht habe [S. 144.]

des berühmten Arztes und Philosophen von Brugg: Ihr übriger Inhalt wird ihr jederzeit eine der ersten Stellen in der medicinischen Literatur sichern, sie wird stets als das Werk eines jener seltenen Männer gelten, in denen sich gründliche Gelehrsamkeit, praktisches Genie, Hippokratistische Einfachheit mit wahrer Lebensphilosophie, beckenloser Tugend und republikanischer Freimuthigkeit vereinigt finden.

### 1766. *Petechialfieber zu Siena. — Nerucci.*

In der Schrift Nerucci's über die Petechialfieber dieses und des folgenden Jahres tritt neben der genauen Beschreibung der Krankheit die Berücksichtigung ihres Zusammenhanges mit allgemeineren abnormen Erscheinungen des Erdlebens erfreulich hervor, und ertheilt der Schrift einen Werth, dem selbst die Hypothese des Verfassers von der alkalischen Luftverderbniss, als der gemeinsamen Ursache des Rostes im Getreide und der galligen Fieber nur geringen Abbruch thut. — Interessant ist die Bemerkung, dass die Gegend von Herculaneum vom Roste verschont blieb, der doch nicht allein in Italien, sondern in vielen Gegenden von Europa eine Missernte verursachte <sup>1)</sup>. Nerucci hielt die „vitriolischen Schwefeldämpfe“ und die durch sie bewirkte Neutralisation der alkalischen Luftverderbniss für die Ursache; neuere Beobachtungen beweisen den Antheil elektrischer Vorgänge bei derartigen Erscheinungen. Auf diese allein, namentlich auf eine sehr gesteigerte chemische Wirksamkeit wird sich eine zweite von Nerucci angeführte Thatsache zurückführen lassen. Man beobachtete nämlich, dass in diesem Jahre der Wein in den Fässern grösstentheils verdarbt <sup>2)</sup>.

Nerucci beschreibt die Krankheit unter dem Namen eines galligen Faulfiebers, bei welchem am 7ten Tage Petechien, Priesel und andere Hautausschläge ausbrachen, worauf sich die Zufälle sehr verschlimmerten, Delirien, Schenkelkrämpfe u. s. w.

1) Nerucci, p. 6.

2) Das., p. 79.



[1766.]

sich hinzugesellten. Bei Einigen war galliger, grünspanfarbiger Durchfall, mit Abgang von Spulwürmern, bei Andern Verstopfung, bei den Meisten schmerzhaftes, beim Druck zunehmende Spannung der Lebergegend zugegen.

Vorzüglich gefährlich war die Krankheit Personen von biläsa Temperament, und Solchen, die früher an Leberübeln gelitten hatten, obgleich bei ihnen sich Pseudokrisen durch Abceßes am *Os sacrum*, durch den trüben und übelriechenden Urin, durch Schweisse, gallige Durchfälle, zuweilen auch durch Parotidengeschwülste einzustellen pflegten. — Bei der Section fand man oft „gangränöse Entzündungen“ der Bauch- und Brustorgane, oft nur Gallenerguss und Spulwürmer. Manche starben durch den Eintritt eines Icterus, zwei Jünglinge durch copiose Nasenblutungen. — Aderlässe hatten stets die grössten Nachteile zur Folge; ihr häufiger Mißbrauch gab dem wackern Nerucci reichlichen Anlaß zu Klagen über die Verkehrtheit der gewöhnlichen Aerzte<sup>1)</sup>. Dagegen verordnete Nerucci mit dem besten Erfolge gelinde Abführungen aus Tamarindendekoct mit *Cremor Tartari*, dem Winke der Natur folgend, welche durch gelinde Durchfälle in der Regel die Genesung einleitete. — Nachtheilig fand er den innern Gebrauch des süßen Mandels, weil es sehr leicht rauschig werde; eben so verwarf er aus guten Gründen den Gebrauch der Narkotica, und gab dagegen in späteren Zeiträumen gelinde Aromatica, *Serpentaria*, Chinasuktionen u. s. w., vorzüglich aber Wein<sup>2)</sup>.

Bei einem weniger günstigen Verlaufe der Krankheit, bei Vernachlässigung der Abführmittel, bei vorhandenen Leberfehlern u. s. w., stellte sich gewöhnlich Tympanitis und vorzüglich Urinverhaltung ein, ein Symptom, welches stets von tödtlicher Vorbedestung war, so günstig auch der übrige Zustand der Krankheit erscheinen mochte. Bei einfacher Tympanitis leistete die

1) Nerucci, p. 18 seq.

2) Das., p. 57.

kässere und innere Anwendung des kalten Wassers wunderbare Diërete<sup>1)</sup>.

Schwer möchte es zu entscheiden seyn, ob Nerucci auf eins der kräftigsten Heilmittel, welches er in der Periode des Ausbruchs der Pestechien ferner anwandte, mehr durch jenen wunderbaren Kunst-Instinkt talentvollerer Aerzte, oder zufolge seiner, für die Behandlung sonst nirgends hervortretenden Hypothese von der alkalischen Ursache der Krankheit und der fauligen Zersetzung des Blutes gekommen sey. Es waren dies die warmen Essigwaschungen, welche neuerlich Herberger so dringend, namentlich beim Scharlach, empfohlen hat. Nerucci beobachtete von denselben Minderung der Fieberhitze, so dass die Kranken eine ruhige Nacht hatten, und am andern Morgen der Ausschlag fast spurlos verschwunden war<sup>2)</sup>. Andere pflegten, um den Ausschlag zu befördern, Scorpionöl einzureiben. Eben so viel hielt Nerucci auf Essigräucherungen.

Mit dem Eintritt der Kälte nahm die Verbreitung der Krankheit zu; im April des folgenden Jahres (1767) schien sie etwas nachzulassen, nahm aber Ende Mai, nach einigen kalten Nächten, starken, stinkenden Morgennebeln, wieder zu, um später vor den sich nun vertheilenden doppelten Tertianfiebern allmählig immer mehr zurückzutreten<sup>3)</sup>. In den Handtagen veränderte sich der Charakter der Krankheit, vorzüglich bei den zahlreichen Kranken des Hospitals, in so fern, als die biliofen und Wurmfälle weniger hervortraten, ferner, statt der Stühle, Erbrechen und Schweisse kritisch waren.

1) Nerucci, p. 34.

2) Das., p. 26. „*Trinque Ali (sibi Scorpionum immixtionibus) temper extenuandum existimari, eodem uicerebus refertur Florum Scudaci et Moscorum, vel aqua simplicis aceto mixta et imperfecta multire, a guttas refrigerato paulisper evaporare et cum vesicata placide super transigisse uicem, obliterata fore postea moralia, mane uicerebus cessare.*“ —

3) Das., p. 31.

## 1767. Eisench. — Grimm.

Wie umfassend die Wirksamkeit der diesen Erkrankungen zu Grunde liegenden ursächlichen Verhältnisse war, zeigt die groasse Analogie der Eisenchacher Epidemie, für deren Beschreibung sich Grimm den bisher genannten Beobachtern auf eine durchaus würdige Weise anreihet. Zu Eisench traten im J. 1767, dessen strengen Winter ( $17\frac{1}{2}^{\circ}$ ) ein warmer Frühling folgte, neben einer ausgebildeten katarthatischen Constitution, die sich Ende April zur Influenza steigerte<sup>1)</sup>, pleuritische Affectionen hervor, Anfangs unter rein entzündlicher Form, bald aber mit allen Zeichen des schweizerischen Alpenstichs; und damit das deutlichste Zeichen der wahren Natur der Krankheit nicht fehle, so brachen mit dem Eintritte der Epidemie die Blattern aus. Dieselben beobachtete auch Sagar zu Iglau in Mähren im J. 1766. Ausser den Blattern wurden auffallend viele Kinder vom „schlafüchtigen Fieber“ ergriffen, und es ist nicht schwer, auch diesem Umstande eine ungezwungene Deutung zu geben.

Die entzündlichen Formen des Seitenstichs, (vorwiegend im Anfange der Epidemie) behandelte Grimm mit dreisten Aderlässen, Nitram u. s. w. Aber auch bei den typhösen Formen waren erstere, rechtzeitig vorgenommen, von grossem Nutzen. Hierbei mag die bergige Lage Eisenchs in der nächsten Nähe des Thüringer Waldes, 700 F. über dem Meere, nicht unerwähnt bleiben. Ausserdem bewährten sich ganz besonders Fussbäder, zum Theil Klystiere, vor Allem Vesicatores. Innerlich leisteten, ausser dem vorsichtigen Gebrauche des Salpeters, Diaphoretika, dann die Schwefelmilch, und vor Allem der Kämpfer, für welchen Grimm sehr gute Indicationen feststellt, sehr gute Dienste. Durchfälle, die besonders leicht nach dem Salpeter entstanden, waren höchst ominös; kritisch erschienen zuweilen Frieselausschläge. Sectionen stellte Grimm nicht an.

1) Unger, Influenza, S. 35.



**1768. Garotillo, Scharlach. — Böhmer, Brunning,  
Marteau de Grandvilliers u. s. w.**

Wir haben schon oben angedeutet, dass während dieser ganzen Periode in sehr vielen Gegenden der Garotillo und der Scharlach herrschten. Dies war besonders in den letzten Jahren des sechsten Decenniums dieses Jahrhunderts der Fall. Die uns vorliegenden Berichte der unten genannten Schriftsteller<sup>1)</sup> erfordern keine nähere Betrachtung, da ihnen diese schon von Hecker zu Theil wurde.

Und so schliessen wir hier diesen Theil unserer Untersuchungen, an der Pforte von Krankheitsereignissen, deren Schilderung bereits die Meisterhand des eben genannten Forschers entwarf. Aber nach jenseits der ungeheuren Niederlagen, welche die Seuche der siebenziger Jahre des 18ten Jahrhunderts hervorriefen, fehlt es nicht an der Wiederkehr des alten Unheils sowohl als der Erzeugung neuen, unerbörten Jammers, dessen kaum entschundene Schrecknisse noch jetzt die Erinnerung der gelingsteten Völker schmerzlich durchzucken.

1) Böhmer, *Dis. de febre naturalit. maligna, angina gangrenosa stipula*. Hal. 1757. (Erdinger's Auszug, I. 187.)

Brunning, G. F. H., *Constitution epidemica Exanthematica anno 1769—1771, circa historiam febris scarlatinae-millaris anginosae*. Lips. 8.

Marteau de Grandvilliers, *Description des maux de gorge épidémiques et gangréneux*. — a *Annals. Per.* 1768. (*Journal de méd.* Tom. XXIX, p. 18.)



# A n h a n g.

## I.

### Auszug aus der Beschreibung des schwarzen Todes von Dionysius Secundus Colle.

(Aus Joh. Colle, *Medicina practica, sive methodus cognoscendorum  
et curandarum omnium affectuum malignorum et pestilentiarum.* Pissari,  
1617. Fol. p. 570 seq. — Jenaische Universitätsbibl. \*).

### Ex libro vetusto Dionysii Secundi Colle a me Titiano Colle Filio Leonis Ingegnerii collecto.

### De pestilentia 1548, 1550 et peripneumonia pestilentiali et maligna simul.

#### Cap. I.

A partibus orientalibus usque ad nos pestilentia cum spatio  
sanguinis, et notis peripneumonice malignae contagiosae vulgata  
est: antea vero ingens fumex grassabatur, quae totum Noricum  
Cisalpinum, et totam regionem Bellonae vastavit, hinc pestilens  
lues facere coepit, et tantam cedem iurare, ut fere tota Pro-  
vincia orba videbatur; neque medicamenta, neque ferrum iuva-  
bant, ingens ardor, et febris acutissima ad quartum, raro ad  
septimum eneubat: sitis magna, lingua nigra, et aspera, anxie-  
tas, et dolor cordis, anhelitus frequens, tussis, et spotamina va-  
ria, os saepe apertum, deliria tumultuantia, furor, urinae tur-  
bulae, et saepe nigrae conspiciebantur, excrementa atra, adusta,

\*) Anmerk. Ein anderes noch weit wichtigeres Dokument über den  
schwarzen Tod von Gabriel de Monsais hat Hr. Prof. Henrichel nach einer  
zu Bielefeld aufgefundenen Handschrift kürzlich in Hauser's Archiv für die ge-  
samte Medicin, Bd. II. Heft I. mitgetheilt.



melancholica, et ferina, exanthematata nigra, atraces, et faedi lunones vagabantur. Aegrotantes ob temperiem, et habitum corporis, atque victum, varii varia symptomata passi sunt; alii dysenterias, ulcera in toto corpore, laborans, nasique corrosivum, pedum gangrenas, et alia dira tollerabant, ob graves succos, et cibaria acris, et prava comesta; alii vero deliriis, siti, inquietudine infestabantur, et alii, aliis cruciati interibant; aer saepe nebulosus et calidus per plures annos dire afflixit, et hanc Provinciam perpetuo devastavit; e quibus Dei gratia ego immensis evasi, cum fere extinctus ab hoc malo viderer, et innumera remediis liberatus fui, quae exarare et communicare Civibus meis, et universis libenter volo. Recordabar, cum Juvenis essem, praeteritis annis vagasse aliam diram pestilentiam peripneumoniam, et pleuriticam ab Oriente exortam; pluribus medicamentis exhibui, et ab acri faucebus revocari. Oh! miseram hominum vitam, unusquisque sibi Medicus erat, neque pharmacopolae inveniebantur: deserta Provincia, mortibus, et cadaveribus plena aderat: funestum tandem spectaculum.

**De Pharmacis in hac constitutione pestilenti  
peripneumonica, et pleuritica usurpatis  
a Dionysio Colle Medico.**

Cap. II.

Pharmaca solutiva faciliora, et tutiora ad pestilentiam vagantem, quae apud me in promptu erant, et in regione facili, praesertim murepabam infusionem elleberi nigri, et elleborinae folia, et florae persicoroto, centaureae, et gratulae, soldanellae cum saccharo aut melle; aliquando propinavi succum Iridis nostralis deputatum cum Aniso, succum cucumeris agrestis, ethuli, et plura etiam Titimallorum amulosa in lacte caprino, et sero infusa exhibui; etiam agarici nostri montani infusionem, cujus apud nos in Alpibus maxima copia exuberat, vocatur ab Angordinis, Elaudanis, Catharinis, et aliis, montium incolis, fungus Laricis, quod quidem maxime malignitati resistit, pluribus, et

praesertim potentibus, et validis haec inter initia exhibui; quia morbus inducias non dabat.

**De Chirurgicis Praesidiis ad peripneumonias, et pleuritides pestilentes ex Dionysio Colle Medico.**

**Cap. III.**

Expurgato corpore primo mane; deinde scarificationem crurum, et regionum universo corpori admovebam, tanquam tutiora remedia, et praesertim pletoricis, et juvenibus (a venae sectione ut potissimum abstinui) quare omnis, qui sanguine abundabant, hae usi, interire, sanguis niger, et ater conspiciebatur, et crassus, aliquibus viridis, et serosus, aliquibus flavus, et ceruleus fluebat, forsam ob diversitatem temperamenti, aegrorum, et victus rationem, qua sui erant: sibi utilius expertus sum, quam frequens utraque scarificationum crurum, et cucurbitularum ad infernas partes, et hincidium ad haemorrhoides.

**De medicamentis Concoquentibus, Alterantibus, et Bezzarcticis, ad peripneumonias, et pleuritides pestilentes ex Dionysio Colle Medico.**

**Cap. IV.**

Omnes putabant sudore, et exiccationibus, et pestilenti malignitati adversantibus liberari; ideo passim mulieres idiotae, et omnes homines medicamenta propinabant, inveniabant, et experiebantur: memoriae non nulla commendabo, quae tutiora, et commodiora probati, et quae securam utilitatem aegris attulerunt, et suae medicamenta in variis publicis a me inventa et in communem utilitatem facile parabilia, et prompta. — — —

Diu et noctu per silvas et campos vagabar, quaerens aliquod simplex medicamentum pro tutela mortalium. Clades erat magna; sed Deus Optimus Max. mihi adiutor fuit. Tandem expertus sum, decoct. hederæ, Ramni, moschæ et vischæ quernæ, ligni ros. cotoneorum, prunorum, et fraxinæ ad us. 8 singulo

mane: experiebar enim sapore; et odore omnia hæc exiccare; et vagantem pestilentiam exiccantibus, et detergentibus sordiciem ipsam et malignitatem debellari.

**De remediis præservativis ad malignam, et pestilentem constitutionem. 1560. peripneumonicam, et pleuriticam etc.**

**Cap. VII.**

— — — Civibus meis ab omnibus derelictis opem his variis præsidiorum materiis contuli; summaque Dei misericordia multos præservavi, multosque infectos curavi. Coriarii, qui latrinas exportant, hi etiam, qui Xenodochiis inserviunt et loci factore gravi molestis, omnes fere a peste immunes comprebantur; venenum enim venenis debellatur, arcetur, et expellitur, fenum pulveris bombardarum, et nitri mane, ore, et naribus exceptum prodeesse, expertum est: ore quidem laccas lauri, aut Juniperi gestare, aut corticem laticis, aut pini, aut abietis (omnia odorifera, et spiritus refocillantia juvant) sicuti fumus ex his aut ex assa factus: Angurinis Zandavis Alpium incolis summo adjumento fore singulo mane drac. 2. resinae pinas, aut laticis, aut abietis cum scr. 1. pulveris corticis laticis, aut pinas, aut abietis, fumus etiam ex his auxiliabatur: sola metallina, et fossibilia, faetidaque omnia totum præsidium attulisse comperimus.



## II.

Ueber die Krankheiten des Jahres 1440, nach den Beschreibungen von Viventius und Bernardus Colle.

(Aus denselben Werke, p. 377 seq.)

**Medicae historiae Viventii, et Bernardi Colle de quibusdam epidemicis, et malignis, et pestilentibus constitutionibus, atque variolla ab egregio, et strenuo Viro Daniele Colle ejus Bonus recollectis.**

## Cap. I.

Cum Anno 1430. nostra constitutio perseverasset, ventis, et pluvii terra moderet, copia fructuum abundaret: non nulli tussis, sputamina, raucedines, variolas nigras et parvas cum dolore lateris passi sunt: alii rubris sputaminibus, difficultate anhelitus, rubore faciei, et febre infestabantur. 3. alii dysenteria, et torminibus ventris inferioris. 4. alii nausea, cibi fastidio, delirio, inaequalitate, angore, et inquietudine torquebantur; hi omnes morbis obnoxii semper febrilebant acute et maligne: demum variolas albas magnas, et raras non nulli habuere; sed febris insidens, sitis, ardor, urinae, ut plurimum turbatae hos omnes comitabantur. Haec fuere symptomata, affectus, et febres, quae constitutionem associabant.

**De cura aegrotantium Variolis nigris, et parvis, dolore lateris pungitivo, febre acuta, et aliis symptomatibus laborantium.**

## Cap. II.

Pueris, et adolescentibus plurimis, et praesertim Vico de Colle varia praesidia pro variolarum curatione adhibui, tum propter multitudinem aegrorum, et puerorum temperationem,

habitu, et rationem victus, tum propter morbi determinatum, in his tutius esse arbitratus sum, a sanguinis missione abstinere: sed statim portibus infernis cucurbitulas accubitas, et cum multa aqua calida, et spongiis huc imbibitis loca fovebam, ut sanguinem a locis inferioribus, et corde evellerem, et evocarem; et licet pleuritis infestaret, tunc brachiorum venam secui, ne vires pestilentialia succumberent, et succi maligni ad cor retraherentur: hac cautela multos ad sanitatem redaxi. Aderat quidem maligna pleuritis, et malignae variculae efflorescebant: adeo copia materiae rebellis abundabat, nonnullis etiam vesicis excitavi, brachiis, et coxis; fermento, simplici, allio, et pipere, aut flammula Jovis, et ranunculo, et allio, eas quidem reseratas diu ulcuscula emanantia consortavi, et ab his ichor ex atris, et maligni confectum fluebat. Omne quidem studium adhibendum est, ne malignitas cor occupet: verum cum magnitudo morbi maligni veraret, scopis quidem accommodatis ad emissionem sanguinis per sectionem venam, tanquam magnum praesidium videbatur: parvula tamen aetas, et languor virium praesens, et futurus reclamant; deinde mane decocto propinabatur ex floribus lini, fabarum, sem. cucurbitae, hordeo, pentaphyllo, corticatis lentibus, caricis, politriceo, flore sambuci, prunis augustanis: Facile porro expuebant hoc auxilio, et dolorem minus percipiebant, et humores ad cutem extrudebantur: primis diebus hac succorum ablatione adtemperata, consilium aderat, magis attenuantia, et sudorifica experiri; inter quae obiciebatur admodum utile, et jucunde decoctum liquiritiae, malvae, borraginis, politrichi, capillorum veneris, prunorum dulcium, funchi, florum periclimeni, sem. cucumeris, florum popaverum rubrorum, corticem fabarum, idque plurimis adjumento fuit; quibus vero crassior succus, et pituitosus laxabatur, potio furfurum, tritici, fabarum, liquiritiae, hyssopi, ligni Juniperi, tartari albi, hordei, funchi, rad. lil. alborum, graminis, scabiosae; pilosellae, prunorum dulcium, confecta in aëro caprino adhibebatur et pro potu ejusmodi etiam praesertim quoque ad quartam: qua transacta adhuc magis aperientia, et sudorifica in usu erant: si variolae non facile ad

extra efflorescerent, adjectis rad. Altheae, apii, faen. carlinae, pentaphylli praesto erant. Foces, et oculi tutabantur, aqua rosea calyceata, aut succo berberis, agrestae, prunorum acidorum, et morarum nigrarum, aut ex eorum foliis decocto. Alvus deinde fluida redebatur clystere ex hordeo, beta, aerenthali, et prunis; aut sero caprino, et saccharo: aut medicamento ex pulpa prunorum dulcium cum saccharo rubro; cæi refrigerantes, et modice lenientes administrabantur, quippe pyssana cum prunis, paratella cum semine cucurbitae: fistula alterata praedictis herbis; haec tamen morbi temporibus, et qualitati inecorum, et variolarum satisfaciebant.

Extra loco dolenti ex pleuritide linimentum admovebatur, e pinguedine gallinae, medulla bovilla, butyro, et pul. liquiritiae: aut cataplasma e malva, e semine lini: aut ex matre violarum, farfara, elyxia cum butyro, aut axungia; aqua etiam calida; ab aëre tandem frigido custodiuntur, et modice stragulis cooperti, quieti manebant; etenim nec aer frigidus ambiens tutus est, nec copia stragulorum affect, nisi angustiam anhelitus.

**Secunda constitutio maligna de pueris, ac adolescentibus, variolis, peripneumonia, sputo sanguinis, difficultate anhelitus, recta cervicæ expirantibus, et aliis symptomatibus vexatis.**

### Cap. III.

Verum multos pueros, et adolescentes, faeminas, et mares observavi, non solum febre acuta ex humore maligno putrescente in venis, sed variolis perniciosis, sputaminibus sanguinolentibus, rubore genarum, difficultate anhelitus, recta cervicæ spirantes, et altera febre ex pulmonis inflammatio adesset, saepe alias constitutiones malignas, et epidemicas pulmones, pleuram, et intestina lacerantes expertus sum, multasque acres defluxiones a cerebro fieri vulgares propter aerem, modo Austrinum, modo Aquilonarem, dumque vario hoc ordine infestantem agnovi: et corpora molli, capita humida, et frigida obnoxia his fuerunt,



et vagantem per multas Protophasias hanc constitutionem malignam adnotavi et perseverantem ad multos annos perspexi; tanta enim aliquando est aeris, et Coeli humiditas, et frigida, aut calida constitutio, ut corpora sublimaria ad sui similitudinem sensim, et sensim advertant. Medici igitur elegantes perpetuo aeris, et Coeli constitutiones, atque temperies advertant, ut facilius quid humanis corporibus accidere homineat, certo invenire sciant: enimvero frequenter morbi complicati infestant, qui ut plurimum Medicos ob signorum varietatem fallunt, et varia medicamenta varietati accommodata exposcunt; urgentiori tamen super primum incumbendum. His adductis, agnita natura, et malignae constitutioni, et symptomatibus consiliis expensis, pulmoniae opem quamprimum ferre duxi, et cito: quia pulmonis inflammationem sectionem venae ex Gal. non sanat, eo magis maligna. Crura igitur scarificari jussi et cucurbitulas aëtas affligendas, et demum linēdines, hēmotrōdibus, frictionibus, ligaturis exteroëcis administratis lenita alvo, ad saccos rebelles concoquendos, et bezoarticiis alterandos animum applicavi. — — —

**Tertia Constitutio maligna de laborantibus variolis, terminibus, dysenteria, et eorum curatione.**

**Cap. IV.**

Duplici febre pueri corripiebantur: una ducebat ortum ab humoribus maligne potrescentibus in venis, et variolas profutentibus; Altera vero ex inflammatione, et ulcere intestini crassi excitabatur: hi ob fluxionem epidemicam a capite ad ventriculum, et intestina crassae, pituitae salsae, atque malignae a calidiori lechore dysenteria torquebantur, atque doloribus ventris, et potissimum, qui temperie calida lechoris, habitu corporis gracili, et bilicoa aderant, et potius adolescentes laboribus, et ventationibus assueti, humores acres, et saluos facile procreantes.

Hos quidem inter initia curavi sanguine parce a vena secta emissio et praesortim vigiliis robustis hyndinibus brachii appa-

alitis, et cucurbitulis scarificatis lumbis, et coxis; deum Clysteribus alvo lenita, et evacata. — — —

**Quarta Constitutio maligna aegrorum, qui nausea cibi fastidio, delirio, inquietudine, et variolis torquebantur, et eorum curatione.**

#### CAP. V.

Tanta erat humorum copia, tanta biliosi sanguinis moles, et incendium, tantaque undique malignitas, ut febris acutissima universam occuparet, delirium cerebrum corripisset, nausea cili fastidium, stomachum, et culm graviter, et laethaliter variolae malignae deturpabant. His omnibus succurrendum censei, primo sectione venae parva (viribus et aetate permittentibus) venis, et plinum hyndines hemorrhoidibus applicabatur, quae a capite, stomacho, et iechore revellebant, et biliosi sanguinis copiam minuebant, cucurbitulae etiam scarificatio crurum, et infernarum partium summo cum aegrorum emolumento frequenter admovebantur; venas etiam ad aures, nares, oculos lumbosque secare jussi. — — — Tanta enim erat clades, et horum temporum miseria, ut neque astantes, neque pharmacopei inveniebantur: namqueque sibi parare remedia cogebatur, aut ab aliquo experto ea inquirere. Haec sunt, quae ex libellis antiquis sparsim facere collecta, et in hanc ordinem redacta.

### III.

Ueber die Epidemie des Jahres 1547.

(Aus demselben Werke, p. 539 seq.)

**De pestilentia Augurum oppidum devastante anno 1547, cum vomitu, delirio ardente febre et alii.**

#### CAP. I.

Prima historiam trucidantem, contagiosam, malignam plurimum perdentem enarrabo, quae Augurum oppidum et ejus

regionem, per duos annos saeviens, fere penitus destruxit. Post bella a Maximiliano Primo Imperatore Venetis illata, post tot calamitates, immanisque penuriam aëris inaequalitas tum austriaca, tum aestiva ita perseveravit, atque locustarum numerosa multitudo praecivit, ut sterilis regio tota evadit. Denum inficiens contagium, undique homines pestilenti febre, delirio, vomitu biliosorum, sitique clamorosa deprehendit, et quarta die interficiebat. Multis carboniculi, et pustulae priginosae et atrae supervenere, hujuscemodi pravia symptomata ortum ducebant a bile et melancholia maligne et contagiose putrescentibus.

**De remediis adhibitis huic pestilentiae, et  
eorum usu.**

**Cap. II.**

His malis remedia varia, et multiplicia offerebantur: crurum scarificatio utilis fuit, et cucurbitularum incisarum infernis partibus admissio, hirudinumque hemorrhoidibus et post aures affixio, sed majus caeteris emolumentum afferebant unctiones ferro candente, brachiis et cruribus et emunctoris inguibus; nam, batyro annota crusta, maligni ichores effluebant per loca illa: empiricus quidem summa cum aegrorum utilitate duo setacea ad inguina, et unum ad scrotum, imponebat, deinde tanquam arcanum administrabat pulverem ex visco querno, ulcea, radice cantaleontis nigri, corno caprae ss. p. aeq. ad drac. 15 in lixivio dulci, et oleo communi. Praeterea (scitu dignum) cornua, ungues, ossaque caprae silvestris, et capreoli calcinata, et corium etiam, et eorum omnium pulveris ad dr. 2 in jure dictorum tradebat, mira aegrorum utilitate; ear etiam lavabatur decocto rosarum, pyrris silvestris, et primulae veris, etiam frictions, et ligaturae proficiebant. — — Pauci salvati fuere. — —



## IV.

Dr. M. Luther.

## Ob das Sterben zu fliehen sey.

(Aus: J. Eyckman's, genant Dryander, Bedraken von dem ytrigen Sterben oder Pestilentz. Marb. 1554. 12.)

— Es sündigen etlich al zu sehr, auff der rechten seiten vnd seind also vermessen vnd keck, das sie Gott versuchen vnd lassen alles anstehen, damit sie dem sterben oder Pestilentzen weren solten, verachten artznei zunemen, so die Pestilentz gehabt vnd auffkommen seind, sonder rechen vnd spülen mit jhn, wollen damit ihre freydigkeyt beweisen, vnd sagen, es sey Gottes straffe, wolle er sie behöfen, so wird ers wold thun, on alle artznei vnd vnserem fleisch.

Solchs heist nicht Got trawen, sondern Got versuchen, denn Got hat die ertznei geschaffen vnd die veranfft gegeben, dem leibe vorzustehen vnd sein pflegen, das er gesundt sei vnd lebe, Wer derselhigen nicht braucht, so er wol hat vnn kan, on seines Nehesten schaden, der verwarloset sein leib selbst, vnd sehe zu, das er nicht sein selbst mörder erfunden werde, vor Gott.

Denn mit der weise möchte ydlerman, sich essen vnd trincken, kleyder vnd hawes, lassen anstehen, vnd keck sein, on sein glauben, vnd sagen. Wölle jhn Gott behüten vor hunger vnd frost, werd ers wol on speise vnd kleyder thun, Derselbige were freilich sein selbst mörder.

Zu dem ist das noch gewlicher, das eyn solcher on seinen leib also verwarloset vnd der Pestilentz nicht hilft weren, so vil er kan, möchte damit auch vil andere beschmeyssen vnd vergiften, welche suust wol lebendig bliessen, wo er seines leibs (wie er schuldig ist) hette gewartet, vnd würde also auch schuldig seines nechsten todts, vnd vil mal vor Gott ein mörder. —

— Siehe, das ist eyn rechter Gottsfürchtiger glaube, der nicht thummkühe noch frech ist, vnd versucht auch Gott nicht.

Widerum der die Pestilenz gehabt vnd zu kredten kompt, soll er sich selbst die last meiden, vnd nicht wollen bei sich leiden, ohn not. Dann wiewol man jetz soll in seiner not bestehen vnd nicht lasse, wie gesagt ist.

So er aber nun was der not ist kommen, soll er sich auch nit wider die andern halten, das niemand um seinem willen inn die fertigkeyt komme ohn not, vnd vrach gebe eynem andern zum tode. Denn wer fertigkeyt liebet (spricht der weise man) der wirt darinn verderben.

Wenn man sich also in eyner statt helff, das man keck im Glauben werde, wo es der nechsten not erfordert, vnd widerumb vorsichtig, wo es nit not were, vnd hilffe eyn jeglicher also der giilt weren, wem man könne, so soll freilich eyn gnediger sterben inn solcher Statt sein.

Aber wann es also zugeht, das eyn theyl allzumerzagt ist, vnd fleucht von seinem nechsten inn der not.

Das ander theyl allzu thummkühe, vnd nicht hilfft wehren, sondern mehren, so hat der Teuffel get machen vnd mass das Sterben wol gross werden, Dann auff beyden seiten Gott vnd menschen höchlich beleydiget wird, wie nit versuchung, dort nit verzagang, so jagt dann der Teuffel, wer da fleucht, vnd behält gleichwol den der da bleibet, das ihm also niemandt entleuff.

### **Böse Pestilenzische leute.**

Vber das sindt noch etliche erger, welche so die Pestilenz heynlich haben, vnter die leuthe ausgehen, vnd haben solchen glauben, wo sie ander leut kunden damit beschmeysen vnd vergiften so wurden sie derselbigen los vnd gesund, gehen also in solchen orten beyde auff gassen, vnd in hawser, das sie die pestilenz wollen andern oder ihren kindern vnd gesinde, an den hals hengen vnd sich damit erretten. Vnd wil wol glau-

ben, das der Teuffel solches thue, vnd helffe also das redlein treiben, das es also gehe vnd geschehe.

Auch lasz ich mir sagen, das etliche so verzweiffelt beschafftig sind, das sie mit der pestilentz alleynes darumb vnter die leuthe, oder in die hauser kuffen, das ihn leyd ist, das die pestilentz nit auch da ist vnd wollen sie dahin bringen gerade als were die sach eyn solcher schertz, als wen man ymandis zur schachtheyt, leuse in peltz, oder fligen in die stuben setzet. Ich weys nicht, ob ich es glauben sol, ist es war so weys ich nit ob wir deutschen menschen, oder selbs teuffel sind, Vnd zwar man findet vber alle mass grobe huse leuthe, So ist der Teuffel auch nit faul, Aber mein rath were wo man solche funde, das sie der Richter beyra kopff neme, vnd vberantwortet sie dem scharpfrichter meyster Hansen, als die rechten mutwilligen mörder vnd bösewichter, Was sind solche leuthe anders den recht meuchel mörder in der stadt, gleich wie die menckelmörder stoosen hie und dort eyn messer durch eynen, vnd muss dennocht niemandt gethon haben. Also schmeyszen diese auch, hie eyn kindt, dort eyn weib, vnd muss es auch niemandt gethon haben, vnd gehen dannoch lachen dahin, als hetten sie wol ausgericht. Mit der weise were es besser bei wilden thieren zuwonnen, denn bei solchen mördern. Diesen mördern weys ich nicht zu predigen, denn sie achtens nicht. Ich befelhe es der Obrigkeyt, das sie zusehe, vnd mit hilff vnd rath, nit der ärzte, sonder meyster Hansen darzu thue.

Hat nun Gott selbs im alten Testament befolhen, die aussetzigen mass der gemeyn zu thun, vnd aussen vor der Statt zuwonnen, vnd das geschmeyszen zu vermeiden. So sollen wir ja vil mehr also thun, in diesem geferlichen geschmeyszen, das so es yemandt krieget, sol es sich als bald selbst von den leuthe thun, oder thun lassen, vnd flux mit artzney hilff gesucht. Da soll man jm helfen, vnd im solcher noth nicht lassen wie ich droben gugsam hab angezeigt auff dass also die gift bei zeitnem gedempffet werde, nicht alleyn der eynigen person, sondern der ganzen gemeyne zu gut, welche dardurch möchte



vergift werden, so man sie liess so ansehren und vnder eynder kommen.

Denn also ist yetzund vnser Pestilentz hie zu Wittenberg alleyne mass geschmeysst herkommen, die luft ist (Gott lob) noch frisch von reys,

(Also auch hie zu Marburg)

Aber aus lautter thumuckeheytt und versetzung haben sie etliche, und der wenig, vergift, uiewol der Teuffel sein freudenspiel hat mit dem schrecken und fliehen so er vater uns treibet, Gott wölle jme weren. Amen.

## V.

Thomasius, Beschreibung der Influenza des Jahres 1580.

(Aus dessen „Tractatus de peste, Rom. 1587. 8.“ — Jen. Univ.-Bibl.)

**Relatio constitutionis anni currentis MDLXXX.**

**Francisco Thomasio ex Colle vallis Eliae**

**Tusco Medico physico auctore.**

— — — — In universa cui dominatur Sereoliss. D. Franciscus Medicus haec constitutio praesentata est, et paulo post attigit Romam, Umbriam, Picenum et Romandiolam, coeque aggressus ita inopinate et repente fuit, ut nullibi pro ea modum medendi opportunum possent medici profiteri. Attamen qui periti erant in arte facile cognoscere poterant, quod aestas sicca plerumque; nebula, equarum inops, aetherae parum aut modice spirantes, sparsi, aëris status ad austrina vergens, siccitates crescentes, antea vero ex subcontrario Aquilonio vere transacto, febres ardentes paucis hominibus ut suborirentur fuerant in causa. Modo experimento probatum est, quod quae febres oriebantur naturam ephemerarum plurimum dierum maxime referebant, si quidem in spiritibus ita vehemens concitabatur motus corporis, ut qui homines ab illis febribus detinerentur. Tussis erat lacerans, sputus crassus, lingua alba, nares humidae, oculi

a lacrimis moedebantur, aures resonabant, pectus et stomachus dolebant, intestina fiebant fluida, urina tenuis, clara, subfalsa; fluxus sanguinis narium liencosis, aut patientibus hepatis inflammationem, aut pulmonum: mulieribus vero supra per os, et infra, supra vero per os, quibus raenses detenti erant. In febribus dolor capitis, gravedo, et in fine plurimus sudor, spiritus multus, stillicidia urinae, et quae stillicidio contingere solent, neque strunguria, diauria, passio diabetica, testiculorum inflammatio et pubis simul, a quibus omnibus aegroti maxime torquebantur. Quae omnia senibus erant ad mortem, juvenibus ad saevitiam, pueris et infantibus ad tolerantiam. Ex quarum omnium perturbationum saevitia et feritate certus est ingens timor in populos, an secundum hanc anni constitutionem saeviret pestis; metus siquidem multiplicabatur ex eo, quod quando in una familia haec symptomata aliquem adoriebantur, ab uno crimine omnes domestici infirmabantur, et sic domus domum, et civitas civitatem fascinabat. Ex relatione etiam fide digna audiri a multis Senis, et Florentinae in principio accessionum mortuos esse, ac si suffocarentur, quos credo aut fuisse senes, aut talidos, qui multum cibi et potus abliguerant: et censendum fore arbitror illos non a contagio perisse, sed ab immoderantia aetas, evaporationis, calidi aeris, et caliginosae terrae, cui nullo remedio a flantibus ethesis succurrebatur. Adhuc pestis dicebatur, quia omnium hominum corpora adolebatur per contactum; et qui per dies aliquot resisterant, paulo post quin subirent idem discrimen convalescere non poterant. Attamen haec conditio inter homines erat, ut nullus timeret mortem, nullus fugeret accessum, sicuti contingit in constitutione verae et propriae pestilentiae; omnes siquidem omnibus compatiebantur, et si quid foedi erat in aegrotantibus nisi spurca sputamina, trases et excreta cernebantur.

Imper nemisabatur pestis ob vitiatum coelum, cui facile respondebatur, quod in coelo nullum erat contagium, quod odore, colore, et sapore perciperetur, aut per latentiam occultaretur, sed manifestus erat quidem excessus in calido, ob quem facile cor-

pora movebantur a suo temperamento. At cum temperamentum corporum sit, et consistat in virtutibus, in humoribus, et in spiritibus: ideo in hac constitutione ob violentiam illatam exterius spiritibus, sequebatur ingens motus ipsorum in corporibus, et eveniebant illa symptomata, de quibus jam dictum est. Similiter actiones secundum spiritus alterabantur, sed non ponebantur in alterato esse, et tandem humores non incendeantur, quia nullas febres humorales subsequuntur, et si quae contingerent, naturam simplicis et purae tertianae referebant: licet in aliquibus hemitritei vigere conspecti sint, attamen minimae erant efficaciae, et parvis diebus interciperentur. Quare inter Turcos nulla facta est commercii prohibitio, et si qua erat, secum portabat suas cruces. Etenim qui in aliquo loco sani erant, per accessum ad alium locum infirmabantur, sed nullae apparebant cutis defoedationes, neque carbones, licet aliquibus in principio accessuum nonnullae papulae rubrae, et cito evanescentes prae sudore conspiciebantur. Nulli etiam bubones in inguilibus apparere, nullae nascentiae sub alis, et parotides nullae post aures. In fine autem aegritudinum dolores in spatulis, in toto pectore, et circa septum transversum, et subcingentes costas graviter contingebant, sed facile cum anodinis resolvebantur.

Ex quibus omnibus signis et symptomatibus facta est conclusio, morbum hunc non esse pestem, sed morbum communem, secundum primam aëris constitutionem, de qua loquitur Hippocrates primo de morbis popularibus.

Dubitatur adhuc, an constitutio haec sit de natura morbillorum, super quibus nonnulli medici arguunt eos esse pestem. Quibus facile respondetur, morbillos non esse pestem, eo quod non conveniunt in definitione cum peste; siquidem pestis est morbus pascens mortalium corpora, ob vitii aëris evaporationem, de qua in tractatu nostro de peste plura haecuti supra sumus; morbilli vero sunt efflorescentes tumores in suprema corporis cute, atque hinc est, quod (cum morbilli non sint pestis, sed potius praecautio a peste) aut ipsa existente, et illis advenientibus pestis cessat. Ita dicendum de morbis advenientibus



in aëris constitutione, siquidem omnes ostendebant aut præcavitionem, aut a peste liberationem, quod comprobatur ratione et experimento. Ratio est ex Hippocrate sic dicente; parva causa medela exsolvitur, nisi quid locum principale offenderit, at inter parvas causas exterior numeratur, quia ex contrariis habet medelam suam et castigationem; ergo. Et quotiescunque communis fuerit, communi etiam medela castigari poterit, ut patet in experimentis. Flores aliae rationes dici possent, de quibus in tractatu nostro de peste locuti sumus. Experimentum autem evidens est, et nulli dubium, quod membra principalia, quae ab hac morbo affligerentur, facile etiam purgarentur, quando recte medicamenta habuissent in usu: siquidem caput mundabatur per nares, per oculos, per aures et per palatum continuis fluxionibus. Pectus purgabatur per sputamina, licet essent crassa, compacta, et difficilia in excretionibus. Urinae multae, tenues, dilutae, et subfavae. Dejectiones faecum non paucae, et diarrhoeae cum timore. Vomitiones cum multo amarore linguae, palati, et eorum quae evomebantur. In magno impetu morbi saepe fluxus sanguinis contingebat; nec non ita laxabantur corpora, ut se homines mori faterentur. Verum ex his defectionibus, purgationibusque eadem corpora remanebant immunia ab omni hominum noxiorum multitudine, ita ut facile omnis febris et perturbatio solveretur; et si qua febris erat præter ephemeram, dicebatur de genere tertianarum simplicium, cum minimis accidentibus; perturbatio autem erat secundum omnium membrorum lassitudinem, a qua facile solvebantur illi, qui rectam curationem secundum medicas administrationes exsequebantur.

Prædictiones a medicis fuerunt multae, verum qui aërios morbos esse futebantur, nullam mortis aut salutis dicebant prædictionem; qui vero symptomata observabant, aliquos morituros, et nonnullos salvos fore pollicebantur. At qui naturam morborum et symptomatum extuberantiam recto iudicio perscrutabantur, omnia tuto et salubria fore rebantur; siquidem velocitas motus in spiritibus arguebat morbi brevitatem, aestus spirituum facilem resolutionem, febres ephemeræ plerumque dierum natu-

rae et virium potentiam, remissionis symptomatum salubritatis recuperationem. Itaque hoc facilius dijudicabatur, cum nulla contingeret in humoribus perturbatio, vel parva, ita ut nullo pacto impedimento esse posset integre iudicationi, imo omnes morbi contingentes secundum impetum victoriæ spem pollicebantur, et taliter ut ne aegrotus quidem a morbo perderetur. Quare conclusi potest hos morbos non fuisse pestilentes, et ex consequenti non fuisse pestem, sed si quid mali secundum præfatam constitutionem referebant, id totum ad communem constitutionem in calido, sicco, humidoque astante referri potest; morborum etiam accidentia minus erant sæva, et minus mortifera, quam quæ in morbillis contingere possunt et in populis. Si quidem (ut dictum est) potius præcautionem et liberationem a peste quam pestem fore existimandum est. Inimica autem hæc constitutio cognita est tabidis, hecticis, et his omnibus qui proxi sunt ad marasmodum. Etenim omnes ii, qui tantum ferre non poterant impetum hujus constitutionis, ex levi occasione et infesta correpti, facile in perditionem et mortem inciderunt.

Intentiones denique curatiæ fuerunt plures et simplices; et relictis sanguinis missionibus, et medicamento exsolvente, in quibus nulla spes erat salutis, ita disposita est curatio. Motus reddebatur per medicamentum firmans, quod fuit saccharum roseorum, calor per aquam hordei, febris ephemera per semiplenam dietam cum farre, ptisana, socco ptisanæ, laevibus sorbitionibus, junculisque ex pane, pulla, et vervecina carne. Abstinencia dabantur a carne et a vino per tres dies, quod si in hoc triduo aegroti multum spuebant, et ea quæ stillicidio contingere solent, succedebant, atque febris remittebatur, carnis et vino albo matriebantur. Tussis facilis reddebatur cum saronica in forma liquida, dolor capitis tollebatur per concurbitulas cum scurificatione, impotentia motus pectoris quando contingebat cum tensione, et cum difficultate respirationis, solvebatur cum emplastro de caulibus Pauli Aeginetæ. Siccis fascibus erant obviam mella clysteria, fluxui ventris lotiva enuncta succurrebant. Quibus omnibus intentionibus recte et tempestive administratis,

in hac temporis constitutione ita feliciter negotiantes convalnere, ut pauci vel potius nulli in hac civitate perire: quid autem futurum sit post vigesimam quidam diem mensis Augusti 1580 Deus Opt. Max. scit; coepit autem laeviter p̄sare, aethiae spirare, corpora respirare coeperunt, faxit Deus, ut quod ex humano iudicio perquiritur, habeat suae voluntatis complementum.



## Schriftenverzeichniss.

(Enthält bloß die von Aerzten verfaßten und von uns direct besetzten Schriften, mit Ausschluss der bereits im Werke selbst angeführten. Einige indirect, namentlich nach Auszügen bei Haller u. s. w. besetzte sind mit † bezeichnet.)

- (Anonymus), *Leipziger Pest-Schade und Gottes-Gnade, das ist, Nachricht von dem Auszuge, Fortgange, Abnehmen u. z. w., der im J. 1680 ausgebrochenen Pestilenzischen Seuche, Leipz. 1681. 4. (Jen. Unibibl.)*
- v. Alle, J. L., *Kurze Geschichte der im 18ten Jahrhundert so sehr verheerenden Pest, u. z. w. Göttd. 1831. 8.*
- Allioni, C., *Abhandlung von Ursprunge, Fortgange, der Natur und Heilung des Frösels. A. d. Lat. mit Anmerk. u. Zusatz. von Fr. L. H'igoud. Mühlhous. 1785. 8.*
- Apianus, Joh. Luk., *Febris epidemice anno 1693 et 96 in Naricæ ditiosis oppida Herapraceensi et vicinis tractu grassari deprehensæ tandemque petrechiolis redditæ historica relatio. Nsrib. 1697. 8. (Jen.)* — *Worthsall*, aber mit höchst lästiger Breite abgefaßt.
- Baker, Georg, *De catarrho et de dysenteria Londinensi epidemica utriusque anno 1762 libellus. Lond. 1764.*
- Ballonius, Guilielm., *Epidemiarum et Ephemeridarum libri II. In ej. opp. omni. Gron. 1782. 4.*
- Baronius, Vincentius, *Neldstensis, De Pleuripneumonia, nempe: de morbo ex costalibus membranis et pulmonis inflammatione constante, perniciosa quidem et frequentissima, et a nemine hactenus observata. Libri II. Forolici, 1638. 4. (Jen.)*
- † Barkerius, J., *Curatio hydropis in urbe Mastiliensi. Aiz. 1636. 4.*

- Barbette, Paul, *Beſchryving der peſt. Amſterd. 1664. 8. (Erſt.)* Auch lateiniſch: — *Tractatus de peſte.*
- Bartholomaeus, Thom., *Cura medica Haſſanenſis etc. Haſſae, 1662. 8.*
- Bachin, Joh., *Kurzer Bericht, wie man ſich mit göttlicher Hülff vor der Peſtilenz verhalten und bewahren ſoll. A. d. Lat. von Theobald Noblet. Münden, 1714. 8. (Jen.)*
- Beerwinkel, Joh. Franc., *Excerpta quaedam ex obſervatis in aupta peſte Hauburgensi. Jen. 1714. 4.*
- Benedictus, Joh., *Libellus novus de causis, signis et curatione peſtilentiae ad praecervationem simul et curam ejus meli optime utilis. Cracov. 1521. 4. (Jen.)*
- † Beerenute, Jos., *Historia epistolaris de febre epidemica Luccensi. Lucc. 1754.*
- Beters, Feliciano, *Malignarum varietatum et obiter etiam petechiarum tractatus. Bris. 1589. 4. (Jen.)*
- Binsinger, L. E., *Mémoire concernant les fièvres purpurées et malignes, qui ont été épidémiquement dans la Principauté de Montéhiard, dès l'année 1712, tiré des observations manuscrites de feu L. E. Binsinger par L. E. Berdot. (Acte Helvétique physique-mathématique-anatomique-médicale. Basle. 1755. 4. T. II. p. 76—93.)*
- Bucangelinus, Nicolaus, *de febribus utriusque malignis et peſtilentis, novum de eorum causis, praenagis, curatione et praecervatione liber. Madrid, 1604. 4. (Jen.)*
- Bökel, Joh., *De peſte, quae Hauburgam circum a. 1562 gravissime afflixit. Heerſtopoli, 1577. 8. (Jen.)*
- de Baumgentibus, Victor, *decem problemata de peſte. Faust. 1556. 8. (Jen.)*
- † van den Bosch, J. I. Imm., *Historia constitutionis epid. vermiculatae, quae ann. 1760—63 per inviol. Overflaque etc. graui. ed. J. C. G. Achermann. Norimb. 1779.*
- Brandhorst, Feid., *Historia febris castrensis petechialis epidemicae. Leyd. 1746. (Haller, Diss. praef. F. p. 421.)*
- Budaeus, Gottl., *Consilium medicum, Wie man nicht allein wegen der höchstschädlichen Seuche der Peſtilenz, sondern auch der bösen Fleckfeber, und anderer hitzigen Krankheiten u. s. w. sich verhalten soll etc. Badiis, 1719. 4.*
- Burser, Joach., *De febre epidemica petechiali probe adgnosenda et curanda commentatio locupletata variis animadversionibus*

in opinionem hucusque receptas circa pathologiam tam generalem quam specialem. Lips. 1621. 8.

Camerarius, Joach., *Synopsis quarundam brevis sed perutilium commentariorum de peste antiquis aliquot excellentissimis medicis*. Norimb. 1583. 8. (Im Bea. d. Verf.)

Cardilucius, Joh. Biskias, *Traktat von der teidigen Seuche der Pestilenz*. Nürnberg. 1681. 8. (Jen.)

Castellus, Joh., *Tractatus de peste*. August. 1608. 8. (Jen. — Wertblos.)

Cartheuser, J. Frid., *De febribus intermittentibus epidemica pingu.* Francof. ad Viadr. 1749.

Castro, Roderic., *Tractatus brevis de natura et causa pestis, quae huc anno 1596 Bambergensium civitatem affligit*. Hamb. 1596. 4. (Erlang.)

Chenot, Adam, *Tractatus de peste*. Vindob. 1766. 8. — Deutsch: Dresden, 1776. 8.

Chiochi, Andr., *De epidemia Ferrenti anni 1602. In ejus Commentariis quatuordecim quarundam de febre mali moris et de morbo epidemicis*. Venet. 1604. 4. (Erlang.)

Cohér, Tobias, *Observationum castrorum et auguricarum Decas prima*. Francof. 1606. 8.

Codruschius, Bapt., medic. Imolensis, *De morbo, qui Imolae et ejus communiter hoc anno 1602 vagati sunt, — et de morbo novo, prolapsa acriter narratae cartilagine libellus*. — Bonon. 1603. 4. (Götting. Bibl.)

Colley, *Account of the late epidemical ague*. Lond. 1755.

Colle, Joh. Bellioensis, — *Medicina practica, sive methodus cognoscendorum et curandorum omnium affectuum malignarum et pestilentium*. Pineri. 1617. Fol. (Jen.)

Columba, Gerardus, Neustadiensis, *De febris pestilentis cognitione et curatione disputatuum medicarum libri duo*. Faust. 1600. 4.

† Coytari, (Joh.), Thauri Aloisensis, *consiliorum et medici regii: De febre purpure epidemiali et contagiosa lib. II. Ad illustrissimum Antistitem Bephtum Tiercellinum, Episcopum Lavicensem, B. Bachermentae*. Paris, 1578. 4. (Im Beitz des Hrn. Dr. Rosenbaum zu Halle.)

de Diemerbroeck, libensé. *de peste libri 4.* (Opera omnia. Ultraj. 1685. Fol.)

Donckers, Laur., *Idea febris pestentialis, 1. Tractatus de morbo particulari. Speciebus de eo, quo anno adhuc circiter tre-*



decim Coloniae ejusque vicinia afflictos fuere. Lugd. Batav. 1688. 8. (Jen.)

Darskrell, Tab., *Constitutio von zweyen ungewöhnlichen, neuen und seltlichen Krankheiten dieser 1602. Jahres.* Ulm. 1602. 4. (Erlang.)

Eggerdes, Alardus Mauric., *Aphurimi pestis essentiam ejusque causam, nec non infallibilem eam tam ascertandi, quam extinguendi methodum continentes.* (Ephem. N. C. Cent. III. et IV. app. p. 89. seq.)

Eisenmann, *Die H'udfieber und die Bludtfleber.* Erlang. 1827. 8.

Eychmann, (Joh.), (genannt Dryander), *Von dem ytzigen Sterben oder Pestilenz.* Sampt D. Luthera und D. Jodoci Willrichi zweyen Büchlin von dem Sterben. Hurgarg, 1554. 8.

Fabricius, Phil. Conr. et Pareskholtz, Joh. Dan., *Dis. exhibens observatiões quasdam circa constitutionem epidemicam anni 1750 adnotatas.* Helmsat. 1750. 4.

Fanois, Guido, *Dis. med. de morbo epidemico lacteas insidito, praeterita pestate anni 1669 Lugduni Batavorum vicinalique locis graivante.* Leyd. 1671. (S. auch Heller, *Dis. pract.* P. 201 seq.)

Fernelius, Joh., *De obditis rerum causis.* Francof. 1579. 8.

Fischer, J. Andr. et Kalbel, Gudsfr., *Hepatitis Pageniae in circulo Lipisani epidemice graivans abstrusa et curata.* Erford. 1718.

Fracastorius, Hieronymus, *Petrarchae. Opera omnia.* Secunda editio. Venetia, 1574. 4.

Foussca, Ant., *Elysiopontensis; De epidemia febrili graivante in exercitu regis catholici in inferiari polavate a. 1620 et 1621.* Meckliniae, 1623. 4. (Erlang.)

2 Fonte, Laelius, *De morbis acutis in Urbini statu vagantibus.* (In ejusd. *Coaculationib. medic.* Francof. 1609. 8.)

Gallus, Andr., *Fasciculus de peste et peripneumonia cum spate sanguinea, febre pestilentiali etc.* Brix. 1563. Francof. 1606. 8. (Erlang.)

Gallus, Car., *de febribus pestilentialibus.* Ferrar. 1600. 4.

Gemma, Corn., *De naturae divinis characteribus libri II.* Antwerp. 1575. 8.

Gemma, Joh. Bapt., *De vera ratione curandi bubonis atque carboiculi pestilentialis.* Edit. 3. Francof. 1603. 8.

- Gieseler, Joh. Henr., *Historia morborum Agemii praeteritorum*. Jen. 1728. 4. (Jen.)
- Giseler, Laur., *Observationes medicæ de peste Brunsvicensi anni 1637*. Brunsv. 1643. 8. (Jen.)
- Gliscnte, Antonio, Breseiano; *Il sommario delle cause, che dissipavano i corpi de gli uomini a patire la corrottione pestilente del presente anno 1576*. Vercel. 1576. 4. (Erlang.)
- Guelenius, Rud., *Leisographia, id est quæ graves quædam arduæque quaestiones, medicorum quorundam ignorantium atque errorum in curanda peste delinquentes explicatur*. — Francf. 1613. 8. (Jen.)
- Grainger, Jac., *Historia febris axomatae Belaræ annorum 1746, 1747, 1748 etc.* Altona, 1779. 8. Beatob. Leipz. 1785. 8.
- Grünwald, Franz. Jos., *Novæ febris miliaris sub exitum anni 1733 et initium anni 1734 in celeberrimo Alpium Prætorum Bovariarum jussu epidemice grassantis historia*. (Acta acad. Carol. Leop. Vol. VI. app. p. 37 seq.)
- Hahn, Joh. Godefr., *Febrim continuam, quæ anno 1729 Frattuloniæ populariter grassata fuit, recensio, occasione catarrhi febrilis per Europam epidemici adnotata*. Frattul. et Lips. 1731. 4.
- Harmand-Montgarny, Jean Pierre, *Précis médical et curatif des maladies éruptives, catarrhales simples, putrides-malignes et malignes-pestilentiellles, connues sous le nom de la Rouge épidémique qui règne dans le département de la Meuse*. Verdun. 1798. 4. (Jen.)
- Hannöchl, Joh. Georg, *Historia medica marci epidemici sive febris petechialis, qui ab anno 1757 fere finiente usque ad annum 1759 Viennæ gravata est. Cui adjecta notabilium observationum anatomicarum decem*. Viacob. 1760. 8.  
(S. auch Sandifort, thesaur. Tom. II. u. Wasserberg, opera miscra I. p. 239.)
- Hebenstreidt, Joh., *Artzney-Schulz! Wie der Neuen jetztregierenden, erbrecklichen, giftigen und tödtlichen Pestilenz — zu begegnen*, v. z. v. Erfurt, 1564. 4. (Jen.)
- Heer, Henr., *Observationes oppido raræ in Spa et Lesdū vaimodrense etc.* Leod. 1645. 12. (Erlang.)
- Heusler, Phil. Gahr., *Tentamen et observatum de morbo carissiois salure*. Göt. 1762. 4.

- Heurnius, *De peste. Lugd. Bat.* 1600. 4.
- van der Heyde, Herrn., *Discours et avis sur le flux douloureux soit qu'il y ait du sang au point, sur le cholerâ morbû ou transie galeux, la peste, les effets signalés de l'eau, la traye guérison ou évacuation de la peste, les fièvres tierces et quartes et leurs accidens et la cause de l'infection des Polders. Gand.* 1643. 4. 1645. 4.
- Malaria marhorum, qui anni 1699, 1700, 1701, 1702 Proletariis grauius axit. Praefat. est Alb. Haller. Lau. et Genev.* 1740. 4.
- Hodges, Nathanael, *Aspalotus, sive pestis uaperae apud papulum Londinensem grauius narratio historica. Lond.* 1672. 8.
- Hoffmann, Fr., *Dis. exhibens observationes quorundam praecitos circa febres tertianas anno 1701 grauiates. In Oper. om. Suppl. II. Genev.* 1753. Fol. p. 22 seq.
- Hoffmann, Fr., *Dis. sistens historiam febris malignae epidemicae petechiantis, hactenus (n. 1699) hucus grauiatis. In Opp. om. Genev.* 1753. Fol. Suppl. II. p. 36 seq.
- Hoppius, Joh., (resp. Mich. Heiland), *De Purpura disertatis medica. Lips.* 1652. 4. (Leips. Univ. Bibl.)
- Horn, W., *Attemmte Geschichte der Pest zu Halberstadt in den Jahren 1681 u. 1682. (In Horn's Archiv für medic. Erfahr. 1836. Jan. S. 1 ff.)*
- de Hortensii, Ascanio Gentorio, *I cinque libri dell'avvertimenti, ordini, grida et editti, fatti et osservati in Milano, nel tempo sospettosi della peste, ne gli anni 1576 et 1577 ecc. Venet.* 1579. 4. (Herzogb. Bibl. zu Wolfenbüttel. — *Audrer Ausgaben erwähnt Haller, welcher örig Rinci als Verfasser nennt.*)
- Hufeland, Chr. Theoph. (praes. Nicolai), *Dis. de purpura. Jen.* 1767. 4. (In historischer Hinsicht nicht wichtig.)
- Huxham, Ioannes, *Opera physico-medica, curante Georg. Christ. Reichel. Tsmi tres. Ed. nova. Lips.* 1784. 8.
- Jordanus, Thom., *Pestis Phasiana, seu de eo, quod circa febrem pestilentem apparet, exercitatio. (Tract. I. cap. 12. De iis phasiana.) Francof.* 1576. 8.
- Joubert, Lamy., *De peste lib. unus. Lugd.* 1567. 8.
- Kanold, Joh., *Kurze Jahreshistorie von den Seuchen des Viehes von Anno 1701—1717 u. s. w. Badiana, 1721.* 8. (Jen.)



- Kanold, Joh., *Einiger Medicorum Scediacreilen von der A. 1708 in Prentona und A. 1709 in Dautzig grassireten Pestilenz u. z. v.* 2te Aufl. Bresl. 1713. 4.
- Kanold, Joh., *Einiger Maritimenischen Medicorum in französischer Sprache ausgefertigte und ins Teutische übersetzte Scediacreilen von der Pest in Marilien u. z. v.* Leipz. 1721. 4.
- Köleser de Kerés-Ecs, Sam., *Pestis Danicae anni 1709 Seruissium et cura.* Cibinl 1709. 12. (Jen.)
- de Koker, Joh., *De morbo epidemico anni 1712.* S. l. et n. (Haller, *diu. pract.* P. p. 217 seq.)
- Kramer, Joh. Georg Henr., *Consilium medicum de dysenteria 1734 in hospitoli castrensi caesares Offenauensi ad Neccarin milites gregarios canalescentes impetente. — Consilium medicum de morbo castrensi epidemico 1734 et 1735. — In duorum Medicorum castrensis u. z. v.* Nürub. 1735. 8. (Jen.)
- Kramer, Joh. G. Henr., *Diu. epistolaria de scarbato.* Norimberg. 1737.
- Kreysel, Joh. Sigism., *De morbo hungarico sive febre castrensi.* Jen. 1741. 4.
- de Lamonière, Joh., *Observatio fluxus dysenteriae Lugdani Galbarum populariter grauatia anno domini 1625, et remedium illi utilem.* Lugd. 1626. 12. (Götting.)
- Lancisi, Joh. Mar., *Diu. de natura deque aduentitia romani corli qualitatibus. Cui accedit historia epidemice rheumaticae, quae per Aremum 1709 rogata est.* Genes. 1718. 4.
- Lancisi, Joh. Mar., *Dissectio hystorica de bacilli peste ex Compositione factae anno 1713 Latine impartita. — Cui accedit consilium de equorum epidemia, quae Romae grauata est anno 1712.* Celoa. 1718. 4.
- Landus, Bassianus, *de origine et causa pestis Patavinae, anni 1553.* Venet. 1553. 12. (22 S.)
- Langhans, Dan., *Beschreibung verschiedener Merkwürdigkeiten des Siemthalts, eines Theils des Bernergebiets; nebst einem grauatn Bericht, über eine neue ansteckende Krankheit, die in diesem Land existirend.* Zürich 1753. 8. (Desselle auch Lateinisch. Basel 1755. 4. — Cf. Sauvages, *basil. meth.* I, p. 531.)
- Lautter, Franc. Jos., *Historia medica biennalis morborum rariorum, qui a verno tempore anni 1739 usque ad finem huius anni 1761 Lorenburgi et in vicinis adique oppidis pagisque*

*demicati sunt, complectens memorabiles variatque febriam intermittentiam et de eorum genere remittentiam epidemicam. Vindob. 1761. 8.*

Lepeeq de la Clature, *Sammlungen von Beschreibungen über epidemische Krankheiten und Constitutionen der Jahre 1763—1777. A. d. Fr. Altab. 1788. 8.*

Low, Carol. Frid., *Epistola de morbo petechiali, qui anno 1683 epidemice Patavii grauitus est. (Acta N. C. H. app. p. 25—40.)*

Low, Carol. Frid., *Febris catarrhalis, quae anno 1723 mens. Nov. et Dec. per Europam epidemicè grauita est, hstoria. Accessit constitutio epidemica anni 1730. (Acta N. C. Vol. III. app. p. 79—120.)*

Louer, (praes. Rallink), *Dis de dysenteria malignae urbes Finxeriemem depopulante. Jena, 1672. 4. (Jen.)*

Lotichius, Joh. Petr., *Consiliorum et obseruationum medicinarum libri VI. (Im. Saecor. 1658. 4. (Jen.)*

Massaria, Alex., *de peste libri duo. Venet. 1579. 4.*

Mercurialis, Hieron., *De pestilentia lectissus habitas Patavii, a. 1573, in quibus de peste in universum, praesertim vero de Farsa et Patavina tractatur. Venet. 1577. 4. — 1578. 8. — 1601. 4. (Auch in desien: Opuscula aures et selectiora etc. Venet. 1644. Fol.)*

† Meysard, Antoine, *Traité de la dysenterie principalement de celle qui a eu cours à Tulle cette année 1625. Tulle 1625. 8.*

Molitor, Franc. Jos. et Mayr de Zianoau, Henr. Joh. Andr., *De febre continua maligna et intermittente tertiana utraque ad Rheum a. 1734 et 1735 epidemica et catarrali. Bielefeld. 1736. (Haller, Diss. pract. F. p. 263 seq.)*

Monro, Donald, *An account of the diseases which were most frequent in the British Military Hospitals in Germany from January 1761 to the Return of the Troops to England in March 1763 etc. Lond. 1764. 8. — Français, mit Zusätzen von Begue de Presle. — Hierarch deutsch; Altab. 1771. 8.*

Mustanus, Joh. Bapt., *De febre pestilenti. (Opuscula. Tom. II.)*

Morellus, Joh., Castellonensis, *De febre purpurea epidemica et pestilenti, quae ab aliquot annis in Burgundiam et omnes fere Galliae provincias misere debacchatur, medica dissertatio. ed. 2. Cebillae, 1654.*

- van der Mye, Frid., *Delphicus, praesidiū Bredani medici regii. De morbis et symptomatibus popularibus Bredavia impore ob-  
sidiois et eorum immutationibus pro anni victusque diversitate, deque medicamentis in summa rerum copia adhibitis, tra-  
ctatus duo. Antv. 1627. (Iterum edidit Graev., Jen. 1792. 4.)*
- Nerucci, Oct., *Historia febris epidemicae Senensis anni 1766 et  
1767. Senae. 1767. 8. (Lips.)*
- Oechi Rizzetti, Hieron., *De pestilentibus et venenatis morbis  
libri IV et exacta febrim per laevorem agrum Brizicensem  
anno 1649 divulgatorum narratio et curatio etc. Briz. 1654.  
4. (Erlang.)*
- Paaw, Petr., *Tractatus de peste, cum Henrici Florentis ad sin-  
gula ejusdem tractatus capita additamentis. Lugd. 1636. 16.  
(Erlang.)*
- † le Pois, Charl., (Piso), *Discours de la nature, causes, révéles  
tant préventifs que curatifs des maladies populaires accom-  
pagnées de dysenterie, autres flux de ventre, familiaires aux  
saisons chaudes et seches. Pant-à-Mousson, 1622. 8. (S.  
Haller, Bibl. H. 474.)*
- † Porcell, Juan Sardo, *Informacion y curatibo de la peste de Ze-  
ragoza y preservacion contra peste en general. Zaragoza, 1565.*
- Pringle, Joh., *Beobachtungen über die Krankheiten einer Armee,  
sowohl im Felde, als in Garnison. A. 4, Engl. v. Bräute,  
Altenb. 1772. 8.*
- Quesnay, Fr., *L'art de guerir par la saignée. Paris, 1736. 8.*
- Ramazzini, Bern., *De contagiosa epidemia, quae in Patavino  
agru et tota fere l'estate diffusa in hanc irrupit. Lips.  
1713. 4.*
- Ramazzini, Bern., *Opera omnia. Geneva, 1716. 6.*
- Raschin, Franc., *Histoire de la dernière peste de la ville de  
Montpellier, durant les années 1629 et 1630. — In ōsses  
„Opusculis ou Traictés divers et curieux en médecine. Lyon,  
1630. 8. (Götting.)*
- Reishard, Chr. Tob. Ephr., *Febris purpuratae libri tres. Prae-  
fatus de Mercurio certissimo adversus Syphilidem remediis car-  
men. Addebat de vulnorum hepatis lethaliitate et de haem-  
orrhagia pulmonum cernina. Glogeviae, 1758. 8. (Jen.)*
- Rhemelius, Cour., *Historia morbi, qui ex castris ad castra, ex  
castris ad castra, ab his ad arva et foci in superioris Bavaria*



re percrevit anno 1621 et permansit anno 1622 et 1623.  
Nürb. 1625. 8. (Jen.)

Biepenhausen, Joh. Henr., Morbi epidemici statim ab initio  
proximi belli usque ad ejus finem, scilicet ab anno 1757 usque  
ad 1762 Goettingae et circa eam grauari, curriti et descripti,  
quibus utraque simul eorum cognoscere e evanescere causa ante-  
cedenti petita, talis in fine ad hydropem per mercuriam dul-  
cem saxoniæ instituta anno adjunctus est. Holae, 1766.  
8. (Jen.)

Ritter, Joh. Jac., Historia et observata circa febrem petechialem  
mensibus Nov. et Decembr. 1740, itaque Jan., Febr. et Mart.  
1741 in Bassia, praesertim tractu Hassburgensi grauiorem.  
(Act. N. C. VII. p. 10 seq.)

Rivinus, A. G., Dissertatio de Lipsiensi peste anni 1680. Lips.  
8. (Jen.) — In Deutsche übersetzt: Tractat von der Pest.  
Leips. 1714. 8. (Jen.)

Röderer, J. G. et Wagler, C. G., De morbo maculo liber singu-  
laris. Gott. 1762. 4. — ed. II. cur. Wrisberg. Ibid. 1783.  
8. — (Später mehrere Ausgaben, unter Andern eine: Paris,  
Payot, in 32.)

† Roetenbeck, Joh. et Horn, Casp., Speculum scarlatinae, oder  
Beschreibung des Scharbels in zweyen Tractatlein abgefaßt,  
den gewöhnlichen Meas zum Besten. — Kurzer Bericht von der  
frunden vordem bey uns unbekanten, jetzt aber eingreifenden  
Krankheit dem Scharbel. Nürb. 1632. 8.

Rolfink, Wern. (resp. Loner), De dysenteria maligna, ubi  
Favosum depopulante. — Jen. 1672. 4.

Romeisen, Achat. Valent., Gründliche Untersuchung der jetzt  
wütenden sehr gefährlichen epidemischen Viehseuche, das dar-  
wider erfundene Gegenmittel und die zu des gemachten Viehes  
Präservativa nöthige Warnungen. (Hörb.) 1713. 4. (Jen.)

Rübel, Joh. Friedr., Observationes von Frisel und Fleckenfieber,  
wie er zuweilen in der Grafschaft Löwenstein-Wertheim, wie  
auch in der Grafschaft Erbach, im Monat April und Mai  
1742 curirt. — Zweite Aufl. Frankf. u. N. 1742. 4.  
(Leipz.)

Rulandus, Martin, De morbo negroico recte cognoscendo et suc-  
citer curando. Lips. 1610. 8.

Salzmann, Joh. Godofr., Historia purpuræ miliaris adæc, cum  
pennis Argentaratum nostrum et viciniam ante licentiam fere

- infestatus. Argent. 1736. (S. auch Haller, Dia. pract. Vol. V. p. 499 seq.)*
- Sargaus, Mich., *Geschichte der Krankheiten, die durch das ganze Jahr 1764 in Neapel sind beobachtet worden. 3 Theile. A. d. Ital. durch H. J. Th. Schmid von Bellikva. Zürich, 1770. 8.*
- Saxonia, Hercules, *De phœnigmi libri tres. Patav. 1593.*
- Schauer, Imman. Frid., *De febribus malignis in regione Bismundensi a mense Decembris anni 1740 ad Augustum usque anni 1741 grauitatis. Jen. 1741. 4.*
- Schreiber, Joh. Frid., *Observationes et cogitata de peste, quae annis 1738 et 1739 in Ukraina grauitata est. Petrop. 1740.*
- Schuller, Joh. Georg, *de morbo Hungarico Bagymar ejusque cura praecepta per specifiem. Balae 1726. (In Haller, diag. ad morb. curat. et hist. facient. Tom. V. p. 261.)*
- Serinci, J. Ant. Jos. et Bache, Guil., *De febre maligna castrorum Gallorum, quae cum ingenti eorumdem strage per totam regnum Bohemiae, maxime vero Pragae inter easdem grassabatur. Pragae, 1743. (Haller, Dia. pract. V. 385.)*
- Siebert, *Ueber die Ruhr und ihr Verhältniß zum Erysipelat. Bamberg, 1839. 8.*
- Simonius, Simon, *Artificiosa curandae pestis methodus, libellis duobus comprehensa. Lips. 1576. 4.*
- Somentius, Thom. Iosef. Cremsencis, *De morbis, qui per faustissimas populos adhuc grauitantur, et non illi ad pestilentiam referendi sint, post prius responsa Mantuae allata, brevis disputatio. Cremae. 1576. 4.*
- de Sorhait, Paul, *Fremdliches Gespräch über den betrübten und armeneligen Zustand der kaiserlichen Residentz- und Haupt-Stadt Wien in Oesterreich, bei dieser gefährlichen und vorher nie erhörten Contagion. Gotha, 1681. 12. (Jen.)*
- Stöck, Ant., *Anus medicus (I. et II.) quo sistuntur observationes circa morbos acutos et chronicos etc. Edit. 2. Vindob. 1760. 8.*
- Strack, Car., *Tentamen medicum de dysenteria et qua ratione eadem medendam sit. Mogunt. 1760. 8.*
- Strack, Car., *Observationes medicales de morbo cum petechiis et qua ratione eodem medendam sit. Carolinac. 1766. 8.*
- Susio, Gio. Batt., *Libro del conoscere la pestilenzia. Mantova, 1576. 4. (Erlang.)*
- Sydnam, Th., *Opera medica. Graec. 1723. 4.*

- Sylvius, Franc. de le Boë, *Opera medica*, Amstelæd. 1680. 4.
- Thomasius, Franc., (ex colle Vallæ Eliæ Heltraci) *Tractatus de peste*, Romæ, 1587. 8. (Jen.)
- Tissot, *Lettre à Zimmermann sur l'Épidémie courante*, Lausanne 1765. 8.
- Torena, Alois., *De febris epidemicæ et æviæ, quæ latine Pæcticularis, vulgo Taverdillo et Pictas dicitar, natura, cognitione et modo*, Burgis, 1574. 12. (Erlang.)
- Tosius, Anton. & Sereæ & Quirici, *De anthrax seu carbunculo tractatus. Ejusdem de nova quadam peripneumonia curandi ratione a nemine hactenus excogitata*, Feuet. 1618. 4. (Jen.)
- Trericius, Andr., *de causis, natura, moribus ac curatione pestilentium febrium vulgo dictarum cum signis sine petechiis. Perbrevis tractatus et observatio*, 1587 et 1588. Mediol. 1588. 4. (Jen.)
- Triumph, Joh. Conr., *Observationes pathologico-præcticae de Purpura per viros 1737 et 1738 in coasaliis Gasteriæ epidemicæ gravitate*. (Acta acad. Car. Leop. vol. VI. p. 71—88.)
- Velaschius, Georg. Hier., *Syllage observationum et curationum medicinarum*, Aug. Vindel. 1658. 4.
- Voëhs, Joh., *de pestilentia anni præsentis et ejus cura*, Magdeb. 1597. 4. — *Væcha, Joh.*, *opusculum proœclaram de anni pestilentia, — et de diuturna peste morbi Gallici etc. Per Oryanderum socium repurgatum*. S. l. 1537. 8. (Beide Augsburg — Jen.)
- Waldschmidt, Christ., *De singularibus quibusdam pestis halitibus*, Ell. 1721. 4. (S. Haller, Diss. præcl. Vol. V. p. 547 seq.)
- Wedel, G. W., (resp. Rumpel), *Dis. de purpura purpurarum*, Jen. 1690. 4.
- Weilbrecht, Josias, *De febrili constitutione petechizante Patropoli anni 1735 gravitate*, Regim. 1736. (Haller, Diss. præcl. V. p. 395 seq.)
- Welsch, Godefr. et Sulzberger, Sigism. Rupert., *Historia medica accuratissima purpurarum morbum continens, qui ipis der Feuersch dititur*, Lips. 1655. 4. (Haller, disputationes ad morbor. histor. et erat. facientes. Tom. V. p. 449 seq.)
- † Wepfer, J. Jac., *De dysenteria præcipue maligna, quæ per ætatem et ætatem a. 1702 in Cæcia et vicinis regionibus gravata est*, Daisb. 1764. 4.



- Werlhof et Saalman, *Commercium de dysenteria* a 1761. Navar. 1762. 4. (S. auch in Werlhof's opp. ana. T. II. p. 779 seq.)
- Willichius, Jodocus, *Von der Pestilenz ein nützlich Regiment*. Leipzig, 1553. 8. — Frankfurt, 1563. 8. (Jen.)
- Willis, Thom., *Opera omnia*. Colou. Allobrog. 1693. 4.
- Wintringham, Clifton, *Commentarius aetiologicalus, morbes epidemicos et alios variatissimos in urbe Eboracensi hucusque visissimos per viginti annos grauatissimos complectens*. Ed. III. Berol. 1791. 8. — Deutsch. Das. 1791. 8.
- Wittich, Joh., *Dysenteria epidemica, das ist Ein ausführlicher und gründlicher Bericht: Von der rothen ansteckenden und beschreckenden Ruhr, So Anno 95 und 96 in Augustusvat regiret, jetsiges 1605 Jahr wiederum in Thüringen und an andern Orten sich fast vermerken u. z. w.* Jena, 1605. 8. (Jen.)
- Zimmermann, Joh. G., *Von der Ruhr unter dem Volke im J. 1765 und denen mit derselben eingebrungenen Faraytheilen u. z. w.* Zürich, 1767. 8.
- Zwinger, Joh. Rud., *Diaria physico-medica anni 1755*. (Vergl. Act. helvet. mattem. etc. III. p. 295 seq.)

## V e r b e s s e r u n g e n .

---

Seite 32 ist die Note 2) einzuschalten: *Forssk. charvat. medicea.*

- 48 letzte Zeile füge hinzu — S. 48. 8. 21.
- 61 Zeile 11 von unten statt 200 lies 100.
- 165 — 11 — — lies Rindergesch.
- 168 — 5 — — statt *gaed* lies *gaed*.
- 193 — 2 — — oben lies: natürlich.
- 210 — 6 — unten statt *hier* lies *hier*.
- 245 — 18 — — — 1523 lies 1500.
- 271 — 15 — — lies: ausschließendes.
- 289 — 2 — — statt *erstem* lies *erstens*.
- 313, Note 4, ist zu bemerken, dass sich die thermometerischen Beobachtungen des *Pater Caille* nicht auf Paris, sondern auf Marseill beziehen.
- 322 Zeile 3 von oben statt *wäre* lies *würde*.
- 324 — 12 — — — das lies *dass*.
- 331 — 20 — — nach *verleichte* setzt hinzu — *sie*.
- 417 — 11 — unten statt *des* lies *den*.
- 436 — 19 — oben — *welcher* lies *welcher* *en*.
- 459 — 5 — — — 1760 lies 1660.
- 481 — 20 — — — *Ihren* lies *seinen*.

Schließlich haben wir noch dankbar der Güte zu gedenken, mit welcher uns Hr. Prof. *Plescher* in Zürich, Direktor des dortigen Hospitals, über einen Irrthum im ersten Theile dieser Schrift belehrt hat.

Dort (S. 157) besagten wir nämlich nach Einsicht eines Capis der gewöhnlich eürten Stelle bei *Jacobus de Perstibus* (*Tract. 4. v. 2.*) dass bei diesem Schriftsteller Petaschum beschrieben würden. Indess ist eben nach gütiger Mittheilung des oben genannten Gelehrten das gewöhnliche Cist falsch, und es heisst bei *Despagnis*, cap. I. „*De febre petitis et de signis ejus*“ folgendermassen:

*„Petitum leptimum (signum) est, quod in febre petitis aliquando oculi habent subtile et rubrum, id est parvas puntulas in superficie corporis quandoque aliae avianae, quosdamque rubores similes oculis et subtilem patrefecti*

sanguinis. Et circa vias pedales notat (*deirama*) quod interdum relictis apparet et interdum cito occultantur et delitescunt, quod patridas sanguis statim ante foras erumpit, nunc intra retrahitur. Et sub hoc signo quorundam cutis morales intelliguntur, nigrae aut virides aut violaceae, tuberculae, similes illis, quae rati contingunt ex morellis palmarum, quae vulgare diei solent planae et sunt de signis mali et mortalis, praecipue nigrae vel violaceae vel tubercula viridia, quae attestantur asper magna humorum corruptione non emendabili.<sup>2</sup>

„Es unterliegt keinem Zweifel,“ setzt Hr. Prof. Plenker hinzu, „dass dies weder Blattern, noch Masern, sondern Ekeljucken sind; wo aber ein alter Schriftsteller der Falschlich-ähnlichen Flecken erwähnt, da willerten die Neutren Petechialtyphus.“







RA64  
8395  
2

Accession no.

JFF  
Author

Haeser  
Historisch

Call no. v.2.

History



